VIII.

Zur Casuistik der Schädelverletzungen.

Von

Dr. B. Beck,

General- und Corpsarzt des 14. Armee-Corps.

In vorliegender Arbeit theile ich meine in den letzten Jahren, seit Beendigung des deutsch-französischen Feldzuges gesammelten Erfahrungen über eine Verletzungsart, welche ich schon lange zum besonderen Gegenstand eingehender Studien gemacht habe, mit.

Von jeher erregten die Schädelverletzungen meine grösste Aufmerksamkeit, da sich bei ihnen, abgesehen von der Wichtigkeit für das Leben, die mannigfaltigsten Störungen der anatomischen Gebilde bemerkbar machen und diese, bei der nicht so seltenen Unmöglichkeit durch den Gesichts- wie Tastsinn nachgewiesen zu werden, nur durch entsprechende Kenntnisse im Gebiete der Anatomie wie Physiologie, namentlich jener des Nervensystems, wahrgenommen und sicher gestellt werden können. Gestützt auf solche Kenntnisse, gelingt es allein bei einer ununterbrochenen ruhigen und eingehenden Beobachtung des Falles sich die bestehenden Verhältnisse klar zu legen, Differential-Diagnosen zu stellen und in prognostischer wie therapeutischer Beziehung richtige Anschauungen zu gewinnen.

Obgleich von hervorragenden Chirurgen in letzter Zeit — ich nenne hier beispielsweise nur Bergmann — für die Lehre von den Schädelverletzungen viel Treffliches geleistet wurde, desgleichen manche junge Kraft sich bemühte, namentlich auf dem Wege des Experimentes, ersohntes Licht zu verbreiten, so herrscht doch noch nicht die nöthige Klarheit in Beurtheilung der einzelnen Vorgänge, stimmen die Ansichten der Forscher und Beobachter nicht in zu wünschender Weise überein, und überzeugt man sich deshalb leicht in der Praxis, wie ungenügend und mangelhaft häufig die ärztlichen Auffassungen sind, wie oft ganz gedanken- und grundlos die Erscheinungen willkürlich gruppirt, die verschiedenen Processe und ursächlichen Momente verwechselt, untereinander und zusammenge-

worfen oder in Eins verschmolzen, nicht scharf und zweckmässig auseinandergehalten, dem entsprechend auch falsch beurtheilt werden.¹⁾ Mit der Unsicherheit der Diagnose gehen natürlich Vorhersage und ärztliches Verfahren Hand in Hand.

Ein interessantes Material, über welches ich seit Aufstellung des 14. Armee-Corps verfüge, veranlasst mich deshalb dasselbe auch zu weiterer Belehrung zu verwerthen, dabei meine neuen Erfahrungen mit den in verschiedenen Schriften²⁾ bereits niedergelegten früheren zu vergleichen, meine Ansichten mit dem gegenwärtigen Stand der Physiologie in Einklang zu bringen, sowie meine bisher befolgten Grundsätze einer abermaligen Beurtheilung zu unterziehen.

Die zahlreichen Schädelverletzungen, welche seit Sommer 1871 im 14. Armee-Corps vorkamen, sowie solche, welche anderweitig zu meiner Kenntniss gelangten oder von mir selbst in ihrem Verlaufe verfolgt wurden, bieten, wie dies in Friedenszeiten mehr als im Kriege der Fall ist, eine grosse Mannigfaltigkeit bezüglich der gesetzten Störungen, der ursächlichen Momente, führen die verschiedensten Verhältnisse vor Augen und können aus diesen Gründen sowie wegen der leichter ermöglichten ruhigen klinischen Beobachtung zu einer eingehenden, dem Zwecke dieser Arbeit genügenden Besprechung der wichtigsten Fragen verwendet werden.

Um eine grössere Uebersichtlichkeit zu erzielen, die Verschiedenartigkeit der einzelnen Verletzungen sowie jener der dabei auftretenden Zwischenfälle möglichst klar zu stellen, habe ich versucht entsprechende schematische Tabellen zu entwerfen, welche den beiden Hauptkategorien von Schädelverletzungen vorgesetzt sind und auf welche bei Beschreibung der einzelnen Fälle³⁾ behufs Einreihung in dieselben stets Bezug genommen ist.

1) Wie oft wird z. B. der äusseren Beschädigung mehr Werth beigelegt und derselben mehr Aufmerksamkeit geschenkt als den Cerebralerscheinungen, wie häufig wird der Hirndruck mit der Erschütterung verwechselt und vice versa, wie häufig werden unwesentliche Störungen als Todesursache beim gleichzeitigen Bestehen anderer sehr wichtiger und lebensgefährlicher Veränderungen, wie z. B. Fissuren neben kolossalen Extrasaten, Hirnläsionen etc. bezeichnet.

2) 1. Entsprechendes Kapitel in meinen „Schusswunden“. Heidelberg 1850. — 2. Ueber isolirten Glastafelbruch. Archiv für klin. Chirurgie. 1862. — 3. Interessante Schädelverletzung. Deutsche Klinik. 1863. — 4. Schwere Kopfverletzung. Deutsche Klinik. 1864. — 5. Die Schädelverletzungen. Freiburg 1865. — 6. Weit verbreitete Schädelfractur. Memorabilien 1865. — 7. Zur Diagnose und Prognose der Brüche des Schädelgrundes. Archiv für klin. Chirurgie. 1866. — 8. Kriegschirurgische Erfahrungen im Feldzuge 1866, in Süddeutschland gesammelt. Freiburg 1867. — 9. Chirurgie der Schussverletzungen. Freiburg 1872.

3) Bei der Casuistik werde ich am geeigneten Platze auch einzelne schon

Da die Gefahr bei den Schädelverletzungen vorzugsweise, ja beinahe allein von der Betheiligung des Gehirns abhängt, so zerfallen dieselben auch in zwei Hauptklassen (Arten), nämlich in die ohne gleichzeitige Affection des Gehirns, also ohne sogenannte Cerebralerscheinungen, und in jene mit gleichzeitiger Hirnbetheiligung, mag sich diese also gleich beim Setzen des Traumas bemerkbar machen, durch besondere Symptome zu erkennen geben oder sich erst im späteren Verlaufe dazu gesellen.

Zuerst betrachten wir, als die weniger wichtigen, die Verletzungen ohne gleichzeitige Betheiligung des Gehirns, welche aber, wie aus der beigefügten Tabelle I zur Genüge ersichtlich ist, durch verschiedenartige Insulte bewirkt und in sehr mannigfaltigen Störungen der verschiedensten Gebilde der Schädelblase und ihrer Bedeckungen begründet sein können. Diesen folgen alsdann jene Läsionen von höchster Bedeutung, nämlich die mit Betheiligung des Gehirns verbundenen.

Bei der Eintheilung und Besprechung der verschiedenen Unterarten der letzten Kategorie habe ich absichtlich der Gehirnreizung kein besonderes Kapitel gewidmet, derselben keine besondere Rubrik angewiesen, weil sich dieselbe nicht als eine erhöhte Sensibilität, als eine gesteigerte Erregbarkeit der Nervenlemente allein ohne gleichzeitige materielle Veränderungen bemerkbar macht, sondern stets von wesentlichen Circulations- und Ernährungsstörungen begleitet ist, deshalb nur für ganz kurze Zeit hin und wieder im Beginn einzelne Erscheinungen wie: psychische Verstimmung, Unruhe, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, Empfindlichkeit gegen äusseren Eindruck, Lichtscheu, Funkensehen, glänzenden, stechenden Blick, Ohrenklingen, Zähneknirschen, Krämpfe, Delirien, bei verengter Pupille und erhöhter Herzaction, beschleunigten, härtlichen Puls etc. wahrnehmen lässt, beinahe immer gleichzeitig auch die Symptome des Hirndruckes als Folge der Congestion, der überfüllten Hirngefässe, der erhöhten Absonderung von Cerebro-spinalflüssigkeit mit oder ohne bereits eingetretenen weiteren Ernährungsstörungen darbietet, sich unter solchen Verhältnissen die Processe durch den raschen Uebergang ineinander nicht mehr gut auseinander halten lassen, ferner der weitere Verlauf nur von der Zu- oder Abnahme der Compressionerscheinungen abhängt, auch in prak-

früher beobachtete, aber grosse Belehrung bietende Krankengeschichten in möglichster Kürze beifügen.

tischer Beziehung bei den verschiedenen Unterarten des Hirndruckes schon auf die Symptome eines vorhergehenden Reizungszustandes in geeigneter Weise aufmerksam gemacht werden muss.

I. Schädelverletzungen ohne gleichzeitige Betheiligung des Gehirns und seiner Hüllen, beziehungsweise ohne Cerebralerscheinungen.

- A. Trennung der Weichtheile:
 - a) oberflächliche Trennung.
 - b) bis auf die Beinhaut.
- B. Störung der Continuität der Knochen, beziehungsweise Verletzung des Schädelgehäuses:
 - a) Verletzung des Periosts.
 - b) oberflächliche Knochenverletzungen: Contusion, Wunde, Infraction der Corticalis.
 - c) tiefgehende Knochenverletzungen: Wunden, Fissuren, Fracturen.
- C. Auftritt von Blutungen.
- D. Directe Ursache der Verletzung, Bezeichnung des mechanischen Insultes:
 - a) scharfes Instrument. Schnitt-, Hieb- und Stichwunde.
 - b) stumpfe Gewalt. Schlag, Stoss, Wurf, Fall, Schuss.
- E. Behandlungsmethoden:
 - a) mit der Naht.
 - b) ohne Naht mittelst Verbandmittel.
- F. Verlauf:
 - a) Complicationen: Wundfieber, Rothlauf, diphtheritischer Belag, Septicämie, Pyämie, Pneumonie, Abscessbildung in inneren Organen, Diabetes, Albuminurie, Tetanus, Delirium tremens.
 - b) Heilung:
 - α) per primam intentionem,
 - β) durch Eiterung.
 - c) bleibender Schaden.
 - d) Tod.

Von Schädelverletzungen, welche in diese Kategorie gehören, bei denen sich weder beim Setzen des Traumas, noch im weiteren Verlaufe Cerebralerscheinungen bemerkbar machten, kamen beim Armee-Corps 166 Fälle vor, und zwar 82 mit oberflächlicher Weichtheiltrennung, 32 mit tiefgehender, ferner 42 mit Zusammenhangsstörung des Periosts, 2 mit oberflächlicher Beschädigung der Knochen-

blase, 2 mit tiefgehender. Dabei wurden im Ganzen 20 Blutungen, darunter 3 stärkere, arterielle, welche durch die Ligatur gestillt wurden, beobachtet.

Mit scharfen Instrumenten, wie Messer, Säbel, Faschinenmesser, Stemmeisen, wurden 46 gesetzt, durch mehr stumpfe Gewalt, wie Schlag mit dem Stiefelabsatz, mit dem Koppelschloss, Feuerhaken, Bierglas, Essgeschirr, Wasserkrug, Topf, Spaten, Stock, Heugabel, Pflasterstein, Holzstück, wie Stoss mit dem Gewehrkolben, Schemel, an die Ecke eines Schrankes, an den Ofen, wie Auf-
fallen eines Ziegelsteines, eines Ofenrohres, einer Granate, Sturz vom Querbaum, vom Sprungbrett etc., Schuss kamen 103 zu Stande; in den übrigen 17 Fällen ist die verletzende Ursache nicht angegeben.

Da ich am Schlusse der Arbeit bezüglich des ärztlichen Verfahrens, namentlich über die Erfolge der blutigen Naht, über den Verband das Nöthige mittheilen werde, so erübrigt mir hier nur anzugeben, dass in allen 166 Fällen perfecte Heilung erfolgte, dass sich nur bei wenigen eine unbedeutende Complication, wie Wundfieber, Rothlauf, einstellte, dass somit das Resultat der Behandlung und Besorgung als ein ganz günstiges bezeichnet werden muss.

Gewiss würde es den Leser sehr ermüden, wollte ich alle hierher gehörigen, an Abwechselung nicht reichen Krankengeschichten mittheilen, denn nur wenige bieten ein solches Interesse, dass ich deren Veröffentlichung für gerechtfertigt erachte. Eine Auslese möge deshalb nur hier folgen.

Casuistik.

L. Nr. 1. I. A. a. D. b. E. b. F. b. β .

Grenadier Vögele, am 11. April von dem erbsengrossen Geschoss eines Zimmergewehres getroffen, zeigt einen Haarseilschuss, mit der kleinen Eingangsöffnung dicht über dem äusseren Ende der rechten Augenbraue, einer kleinen Ausgangsöffnung horizontal dahinter unweit der Ohrmuschel. Eisblase. Am 15. dringt aus beiden Oeffnungen Eiter, und ist die ganze Umgebung des rechten Auges geschwollen und glänzend geröthet, ohne Fiebererscheinungen. Am 25. ist die Schwellung geschwunden, die Eiterung nur noch gering und am 5. Mai hatte die letztere ganz aufgehört. Am 20. Mai ist die Heilung perfect und wird also Pat. nach 45 Behandlungstagen entlassen.

L. Nr. 2. I. A. a. D. b. E. a. F. b. β .

Grenadier Gamber stiess mit der Stirn gegen die scharfe Ecke eines Schrankes. Es bildete sich in einigen Tagen eine nicht schmerz-
hafte Geschwulst aussen und unten vom linken Stirnhöcker mit den charakteristischen Symptomen des Aneurysma spurium. Den 11. März wurde die Geschwulst gespalten, das sie bildende harte Gewebe excidirt und zwei

kleine daselbst einmündende Zweige der Art. temporalis mittelst Umstechung unterbunden. Am 16. wurden die Nadeln entfernt, und bis zum 2. April war die Heilung vollendet.

L. Nr. 3. I. A. b. D. b. E. a. F. b. β .

Dragoner Lusch erlitt durch Pferdeschlag in der linken Schläfe eine circa $1\frac{1}{2}$ Cm. lange, $\frac{3}{4}$ Cm. tiefe Wunde mit klaffenden unterminirten Rändern. Die Trennung der Gebilde erstreckte sich bis zum Periost. Die Wunde wird mit fünfprocent. Carbollösung ausgespült, unter Carbolspray mit 2 Catgutfäden genäht, mit Selk protective, zehnproc. und vierproc. Salicyljute, endlich mit einer Carbolbinde bedeckt. Beim Wechsel des Verbandes, 3 Tage später, ist die Wunde zwar oberflächlich geschlossen, sie fluctuirt aber in der Tiefe und zeigt sich die Umgebung infiltrirt. Nach weiteren 4 Tagen bricht die Wunde auf, übelriechendes Wundsecret zieht ab, die Catgutfäden zeigen sich gelb, weich und gequollen. Die Eiterung dauert längere Zeit an und erst nach 59 Tagen erfolgte definitive Heilung.

Da im vorliegenden Falle eine Quetschung des Zellgewebes unter der Galea mit Unterminirung und Infiltration bestand, so war die Anlegung der blutigen Naht nicht angezeigt. Der antiseptische Verband konnte die Verhältnisse nicht ändern, er gewährte deshalb auch keinen Nutzen.

L. Nr. 4. I. A. b. c. D. b. E. a. F. b. α .

Dragoner Maiwald wurde am 7. Juli von einem Pferde derart geschlagen, dass ihm in Form und Grösse eines Hufeisens ein Theil der Kopfhaut bis auf das Periost in der Scheitelgegend lappenartig losgelöst wurde und nur an einer 6 Cm. breiten Brücke nach rechts unten mit der übrigen Kopfhaut zusammenhing. Der Knochen war intact, Gehirnerschütterung nicht vorhanden, Blutung fehlte. — Nach Entfernung der Haare und mehrerer kleiner Gewebsetsen wurde die Wunde sorgfältig gereinigt, eine plötzlich spritzende Arterie unterbunden und die Wundränder mit 16 Heften vereinigt, demnächst mit einer nassen Compresse und Eisblase bedeckt. Am 2. Tage wurden die Hefte bis auf drei entfernt, diese letzten am nächsten Morgen wie auch der Unterbindungsfaden. Es trat *prima intentio* in der ganzen Ausdehnung ein und wurde Patient schon nach 7 Tagen geheilt entlassen.

L. Nr. 5. I. B. b. c. D. a. E. a. F. b. β .

Kanonier Ziegler erhielt am 10. Februar mittelst Säbelhieb eine stark blutende, 10 Cm. lange Wunde, die im flachen Bogen in der Richtung von vorn nach hinten über das rechte Scheitelbein verläuft und ausserdem eine kleine Stichwunde in den rechten Arm. Die Wunde am Kopf dringt bis auf den Knochen, ihre Ränder bluten stark, sind theilweise unterminirt und klaffen weit, so dass 5 Nähte angelegt werden und über einer Carbolcompresse die Eisblase applicirt wird. Auch die Armwunde wird genäht und gleicher Behandlung unterworfen. Am 3. Tag werden nach vorausgegangenem und sich steigendem Kopfweh, beträchtliche Ansammlung von Wundsecret in der Tiefe der Wunde zuerst zwei und am nächsten Tage alle Nähte entfernt. Temperatur war vorher erhöht, Schlaf- und Appetitlosigkeit eingetreten. Wie das zersetzte Wundsecret aus der Tiefe freien Abzug hat, bessert sich allsogleich der Zustand. Die Wundränder haben sich auseinandergezogen und man erblickt deshalb

in einer Länge von 5 und einer Breite von $1\frac{1}{2}$ Cm. den weissen Knochen, an dem sich im äusseren Theile des vorderen Abschnittes eine seichte Depression, Infractio der Corticalis, zwei feine Spältchen wahrnehmen lassen. Der rechte Wundrand lässt sich taschenartig vom freiliegenden Knochen mehr als $1\frac{1}{2}$ Cm. abheben. — Einlegung von reiner geschabter in Carbollösung getauchter Charpie; zweimaliger Verband im Tage. Nach einiger Zeit erscheint der Knochen leicht rosa gefärbt, die Granulationen schieben sich von der Peripherie gegen die Mitte der Wunde; eine merkliche Verkleinerung der Wunde wird bemerkt. Im weiteren Verlaufe stellen sich keine Complicationen ein, und geht deshalb die Heilung nach Exfoliation eines papierdünnen Knochenblättchens ungestört vor sich.

In diesem Falle war die Naht nicht am Platz, da sogar der Knochen beträchtlich contundirt und die Weichtheile von ihm abgelöst waren; nur durch rechtzeitige Entfernung der Nähte, durch freien Abzug des sich in Zersetzung befindenden Wundsecretes wurde der Auftritt einer bedenklichen Complication verhindert.

L. Nr. 6. I. B. b. D. a. E. a. F. b. β .

Grenadier Gross erhielt am 27. Januar einen Hieb über den Kopf. Die Wunde geht schief über den rechten Theil der Stirn, der untere Winkel liegt 5 Cm. über der Augenbraue, der obere 12 Cm. über der Nasenwurzel. Die Wunde durchdringt alle Weichtheile und bildet desgleichen eine Rinne im Knochen, welche bis in die Diploe reicht. Die linke Pupille ist etwas erweitert. Die angelegten Nähte müssen, weil in der Tiefe Eiterung eintritt, bald wieder entfernt werden. Einfacher Verband, gute Eiterung, üppige Granulationsbildung und nach 26 Tagen perfecte Heilung.

L. Nr. 7. I. B. b. D. b. E. b. F. b. β .

Kanonier Maier wurde am 4. Juli von seinem Pferde gegen die Stirne geschlagen und am 5. ins Lazareth aufgenommen mit einer etwa 6 Cm. langen Wunde am rechten Stirnhöcker, deren Ränder wenig geschwollen und im unteren Theile der Wunde scharf sind. Der Schädel liegt in der Ausdehnung eines 50-Pfennigstückes bloss und zeigt einen unebenen Defect von Bohnengrösse. Den Abend vorher sollen bereits einige Knochensplitter entfernt worden sein. Die Blutung war eine unbedeutende, Hirnerscheinungen nicht vorhanden. Unter fortdauernd gutem Allgemeinbefinden, ohne Fieber beginnt am 9. Juli die Wunde zu eitern, sich schnell mit Granulationen zu bedecken und sich von den Rändern zu verkleinern. Am 20. löst sich ein kleiner Splitter, und ist am 20. August die Wundfläche bis auf eine kleine in die Tiefe führende Oeffnung vernarbt, aus welcher sich im Laufe der nächsten Wochen mehrere Knochenstückchen entleeren. Patient acquirirt in dieser Zeit zufällig eine rechtsseitige Pleuritis, welche mit der Verwundung in gar keiner Beziehung steht. Als diese überstanden war, überzeugt man sich, dass noch weitere Splitter von der Wunde abgehen werden. Im weiteren Verlaufe kommen bei einfachem Verbande noch mehrere nekrotische Knochenstückchen zu Tage und geht die Schliessung der Wunde erst dann vor sich. Dauer der Heilungszeit 9 Monate.

L. Nr. 8. I. B. c. D. a. E. a. F. b. β .

Musketier Gradinger wurde am 21. December 1873 durch einen Hieb

mit dem scharfen Faschinenmesser am Kopfe verwundet und zwar am rechten Scheitelbein. Die Wunde zeigte scharfe Ränder und erstreckte sich in einer Ausdehnung von circa 6 Cm. durch die Weichtheile und etwa $1\frac{1}{2}$ —2 Cm. lang durch die Rindenschicht und die Diploe hindurch, so dass man mit der Sonde bis auf die Glastafel dringen konnte. Nachdem ein abgeschlagenes Knochenstückchen entfernt war, wurde die Wunde durch die Naht vereinigt. Das Bewusstsein war nie getrübt gewesen. Verband, Eisbeutel, Limonade, Abführmittel. Am 27. werden die Nähte entfernt, es bricht nachher der untere Theil der Wunde wieder auf und blutet auch etwas, jedoch ohne üble Folgen. Es entsteht ein Schorf, unter welchem die Wunde allmählich verharscht. Bei einfachem Verbande und geeigneter Diät tritt die Heilung nach 18 Tagen ein und kann Patient ohne bleibenden Schaden entlassen werden.

L. Nr. 9. I. B. c. D. a. E. b. F. b. β .

Stabsordonnanz Weigel wurde in der Nacht zum 1. November 1875 überfallen und ihm mit dem eigenen Säbel eine Kopfverletzung beigebracht. Er stürzte zu Boden ohne jedoch bewusstlos zu werden. Ueber der rechten Schläfe unweit der Haargrenze und dieser etwa parallel befindet sich eine scharfe, stark klaffende, noch jetzt mässig, früher aber sehr stark blutende Wunde von 6—7 Cm. Länge. Dieselbe dringt in der ganzen Ausdehnung durch die Weichtheile und den Knochen bis auf die Tabula vitrea. Die äussere Knochenplatte ist vollständig durchgeschlagen und ragt ein Stück derselben, nach der Stirn zu in Guldengrösse und völlig beweglich, mit seinem Rande in die Wunde hinein. Das Allgemeinbefinden ist gut, weder Pulsfrequenz noch Körpertemperatur erhöht; es wurden auch im weiteren Heilverlaufe ausser anfänglichem mässigem Wundschmerz keine Störungen bemerkt. Anfangs in der Umgebung geschwellt, begann die Wunde vom 4. ab zu eitern und zwar bald so profus, dass der Charpie-Wasserverband zweistündlich gewechselt werden muss. Am 22. war bereits die ganze Wunde vom Grund aus bis zum Niveau mit Granulationen ausgefüllt und der hervorstehende Knochenrand ganz von ihnen umwuchert. Die Wunde verkleinerte sich schnell bis auf eine etwa 3 Cm. lange und $\frac{1}{2}$ Cm. breite granulirende Fläche, welche nun mit Carbolölcharpie verbunden wurde. Die Knochenleiste löst sich nach und nach in Ausdehnung von 3 Cm. Länge und einer Breite von 3 Mm. los und kann beim Verbande entfernt werden. Später stösst sich nochmals ein kleiner Knochenstreifen ab. Es erfolgt nun im unteren Theil der Wunde rasche Vernarbung, während sich das gehobene Knochenstück immer mehr consolidirt. Entsprechend der Fracturstelle desselben fühlt man eine harte Auftreibung wie von Callus. Am 20. ist nur noch ein ringförmiger Granulationswulst in der oberen Wundhälfte offen, weitere grössere nekrotische Knochensplitter, Sequester sind nicht aufzufinden, auch entleeren sich im Verlaufe der nächsten Tage nur ganz minimale Knochenstückchen. Am 12. Januar ist die letzte wunde Stelle geschlossen, und kann deshalb Ende des Monates Patient geheilt entlassen werden. Die Narbe sitzt fest auf dem Knochen auf; es zeigt dieser sowohl eine Hervorragung als eine Depression dicht neben einander, erstere entsprechend dem abgesprengten Knochenrande. Behandlungsdauer: 82 Tage.

II. Schädelverletzungen mit gleichzeitiger Betheiligung des Gehirns und seiner Hüllen, beziehungsweise mit Cerebralerscheinungen.

1. *Hirnerschütterung.*

A. Reine, wahre Gehirnerschütterung, d. h. ohne jegliche gleichzeitige Verletzung der Hirnmasse und ihrer Hüllen:

a) leichteren Grades.

b) schweren Grades.

B. Unreine Gehirnerschütterung, d. h. solche mit gleichzeitigen Hirnläsionen wie: capillären Apoplexien, disseminirten hämorrhagischen Herden, Zertrümmerung der Hirnsubstanz selbst.

2. *Hirndruck.*

A. Hirndruck in Folge der Anwesenheit fremder Körper, welche in die Schädelhöhle eingedrungen sind.

B. Hirndruck in Folge von Infraction und Impression von Schädelknochen ohne weitere Complication.

C. Hirndruck in Folge von Gefässzerreissungen, Ruptur von Schlagadern, Venen, Blutleiter und hierdurch bewirkter Blutergiessung in die Schädelhöhle und in das Gehirn selbst mit oder ohne gleichzeitige Beschädigung der Knochenblase und Zertrümmerung der Hirnsubstanz:

a) mit gleichzeitiger Continuitätsstörung des Schädelgehäuses, und zwar entweder mit äusserer Wunde und hierdurch ermöglichtem Austritt des Blutes nach aussen oder ohne äussere Wunde.

b) ohne gleichzeitige Continuitätsstörungen des Schädelgehäuses; die Blutung bleibt intracraniell.

α) Blutung zwischen Schädelgehäuse und Hirnhüllen,

β) innerhalb der Hirnhüllen,

γ) ohne gleichzeitige Insultation der Hirnsubstanz,

δ) mit gleichzeitiger Trennung derselben, deshalb mit Blutung im Gehirn selbst,

ε) mit Diastase der Nähte,

ζ) mit Infraction der Schädelwand und Ablösung der Glastafel, mit isolirtem Glastafelbruch,

η) mit Fissuren und Brüchen des Schädeldaches,

θ) mit Fissuren und Brüchen der Schädelbasis.

D. Hirndruck in Folge von Zertrümmerung der Hirnmasse durch Druck. Hirnquetschung mit nachfolgender Eiterung.

- a)* Wahre Hirnquetschung ohne Trennung der harten Hirnhaut,
- b)* mit Trennung der Hirnhüllen, deshalb gequetschte Hirnwunde.

E. Hirndruck in Folge von Circulations- und Ernährungsstörungen, Reizung und diffuser Entzündung der Hirnhüllen und des Gehirns, mit meist nachfolgender Eiterbildung. — Meningitis purulenta, encephalitische Erweichungs- und Eiterherde, Abscesse.

- a)* Ohne Betheiligung der Hirnmasse,
- b)* mit gleichzeitiger Betheiligung derselben,
- c)* durch Fortsetzung der Entzündung oder Eiterung der Diploe auf die Dura mater,
- d)* als Folge der Ablösung der harten Hirnhaut vom Schädeldach,
- e)* als Folge einer Hirnläsion selbst,
- f)* als Folge des Insultes und der Reizung infracturirter Knochenstücke mit scharfen Rändern, vorstehender festsitzender oder frei beweglicher, loser, spitzer Knochensplitter sowie secundärer Osteophytenbildung.

F. Directe Ursache der Verletzungen, Bezeichnung des mechanischen Insultes:

- a)* scharfes Instrument.
- b)* stumpfe Gewalt.

G. Behandlungsmethoden:

- a)* mit der Naht.
- b)* ohne Naht mittelst Verbandmittel.

H. Verlauf:

- a)* Complicationen: Wundfieber, Rothlauf, diphtheritischer Belag, Pyämie, Septicämie, Pleuritis, Pneumonie, Abscessbildung in inneren Organen, Diabetes, Albuminurie, Tetanus, Delirium tremens etc.
- b)* Heilung:
 - α)* per primam intentionem.
 - β)* durch Eiterung.
- c)* bleibender Schaden.
- d)* Tod.

1. Gehirnerschütterung.

Den Zustand des Gehirns, welcher sich als Folge der Einwirkung einer äusseren Gewalt, je nach der Heftigkeit, dem Grade des stattgehabten mechanischen Insultes, entweder durch eine rasch vorübergehende Erregung, Excitation, oder aber im Gegentheil sich durch eine Schwächung, Depression, selbst eine vollständige Erschöpfung und Functionsvernichtung gewisser wichtiger Hirncentren zu erkennen gibt, bezeichnen wir als Hirnerschütterung.

Dieselbe ist entweder eine reine, wahre, d. h. ohne jegliche gleichzeitige Hirnläsion, Trennung des Zusammenhangs von Gefässen und Hirngebilden auftretende, oder eine unreine mit materiellen Störungen, anderweitigen, wirklichen Gehirnverletzungen complicirte, welche letztere deshalb je nach den bestehenden Veränderungen als in besonderen Vorgängen begründet aufzufassen und zu beurtheilen sind.

A. Reine Gehirnerschütterung.

Die reine, wahre Hirnerschütterung, welche zuerst hier einer eingehenden Betrachtung unterzogen wird, bewegt sich innerhalb verschiedener Grade, die am zweckmässigsten als leichte und schwere Form bezeichnet werden. Dem niederen oder höheren Grade entsprechend, besteht nur eine kurz vorübergehende Betäubung oder eine längere Zeit andauernde, an Koma streifende Bewusstlosigkeit, eine mehr oder weniger prononcirte Functionsaufhebung der Sinne, ein Schwinden derselben, eine geschwächte oder vernichtete Erregbarkeit des Nervensystems bei gleichzeitig geschwächter, darnieder liegender Herz- und Athemthätigkeit.

Wir nehmen daher an dem einem tief Schlafenden oder Scheintodten gleichenden Verletzten Blässe des Körpers, namentlich des Gesichts, herabgesetzte Körpertemperatur, schwachen, verlangsamten, meistens aber noch regelmässigen Puls, verlangsamte Respiration, träg reagirende, etwas erweiterte Pupillen, hin und wieder Muskelschwäche, Zittern der Glieder, in einzelnen Fällen auch unregelmässiges mit leisem Stöhnen und Seufzen verbundenes Athmen, sowie auch Erbrechen, selbst unwillkürlichen Harn- und Kothabgang wahr.

Bei einem niederen Grade von Erschütterung verlieren sich schon in kurzer Zeit die entsprechenden Erscheinungen der gestörten Hirnfunction. Bald stellt sich nämlich wieder das Bewusstsein ein, kehrt die Energie der Athmung und der Herzthätigkeit wie die normale

Körpertemperatur, und zwar ohne einen Schaden zu hinterlassen, zurück. Ist ein höherer Grad, also die schwere Form vorhanden, so dauern die Symptome länger, oft nicht allein Stunden, sondern selbst 1—2 Tage an, treten dann entweder ohne jegliche Folgen zurück, oder sie machen einem Reactionsstadium von verschiedener Intensität, in welchem sich der Puls voller und rascher, die Temperatur erhöhter anfühlen lässt, das Gesicht sich geröthet zeigt, Lichtscheu, subjective Schallempfindungen bemerkbar machen, dem selbst Schwindel und Kopfschmerz, Schwäche der geistigen Thätigkeit beigesellt sein kann, Platz, bilden sich also erst allmählich und nicht ohne Störung zurück, oder der komatöse Zustand geht direct ohne besondere wesentliche Veränderungen oder unter Erscheinungen auffallender Circulationsstörungen im Gehirn, eines intracraniellen Hirndruckes in jenen des Todes über.

In Folge der bestehenden Gefässlähmung kreist nämlich das Blut in den Capillaren sehr langsam, geht der Abfluss des venösen Blutes nicht prompt von statten, stellt sich häufig in rapider Weise eine erhöhte Ausscheidung von Cerebrospinalflüssigkeit, eine beträchtliche seröse, diffuse Durchfeuchtung des Gehirns, seröser Erguss in die Kammern ein. Auch nach einiger Zeit, wenn schon die charakteristischen Symptome der Erschütterung geschwunden sind, können sich noch nachträglich die Folgen derselben durch Erscheinungen, welche auf eine gestörte Ernährung des Gehirns schliessen lassen, bemerkbar machen. Nicht allein Schwindel, zeitweiser Kopfschmerz oder Schwäche des Gedächtnisses, Reizbarkeit, trübe Stimmung, Muskelzittern treten hier in den Vordergrund, sondern auch, zwar in sehr seltenen Fällen, wurden Erbrechen, Schlingbeschwerden, heftige Dyspnoe, Fallen und Ansteigen der Pulsfrequenz (dem wechselnden Reizungs- oder Lähmungszustand des Vagus, der Compression dessen Kerns entsprechend), selbst Lähmungserscheinungen, Contractionen, überhaupt Störungen in der Function verschiedener Nerven und unter Verhältnissen, welche einen Hirndruck durch directe Läsionen, Extravasate und Gewebezetrümmerungen, Vereiterung hervorgerufen, ausschliessen, beobachtet.

Hier bildet sich nämlich, wie dies Willigk in Olmütz in überzeugender Weise beschrieb, nach der Erschütterung eine hochgradige Angiektasie der feinen Gefässe mit selbst cavernöser Structur, mit beträchtlicher Blutüberfüllung aus, und finden sich dann die Wandungen der Gefässe fettig entartet, ferner kleine Anhäufungen von gelbem feinkörnigen oder ölarartigen Pigment, ausserdem in den Lymphkanälen, in den Scheiden der Gefässe reichlich lymphoide,

theilweise fettig entartete Zellen.¹⁾ Die Hirnsubstanz selbst ist an verschiedenen Stellen in rother Erweichung begriffen, ohne an irgend einer Stelle eine recente Hämorrhagie, einen eigentlichen capillären apoplektischen Herd, also eine Hirnläsion nachzuweisen. Die Ganglienzellen hatten in dem mitgetheilten Falle die faserige Structur eingebüsst, waren trüb und feinkörnig; Veränderungen wie sie auch bei schleichender Myelitis, bei einem mehr diffusen Prozesse angetroffen werden.

Allerdings bietet ein solcher Verlauf, einigermassen auch der Befund, grosse Aehnlichkeit mit dem Vorgang bei unreiner Hirnerschütterung, bei welcher keine ausgebreiteten Extravasate, sondern nur capilläre Hämorrhagien, kleine mehr umschriebene Zertrümmerungsherde zu Stande gebracht werden, und stösst deshalb eine Differentialdiagnose sicherlich auf bedeutende Schwierigkeiten. Im gegebenen Falle wäre es alsdann von grösster Wichtigkeit alle Erscheinungen, die Aufeinanderfolge derselben, deren Wechsel, die Dauer der Bewusstlosigkeit, welche bei Läsionen immer eine protrahirte ist, schon von Anfang gehörig zu würdigen, um ein richtiges Krankheitsbild zu gewinnen.

Wie die Symptome der Commotion nicht bald abnehmen, ununterbrochen in jene des Hirndruckes allein oder mit zeitweiser Reizung verbunden übergehen, der komatöse Zustand andauert, sich sogar anderweitige Zufälle, wie Convulsionen und Paralysen auftreten, sich die Athem- und Herzthätigkeit weiter alterirt erweist, sich die Körpertemperatur erhöht, so muss man an das Bestehen von wirklichen Hirnläsionen, Rupturen mit ihren Folgen denken, denn eine reine Hirnerschütterung dauert nicht Wochen, sondern höchstens 1—2 Tage an und wird, wenn sie auch wesentliche Circulations- und Ernährungsstörungen ohne Aufhebung des Zusammenhangs der Gebilde im Gefolge hat, diese schon sehr bald durch Erscheinungen, wie sie oben geschildert, möglichst erkennen lassen.

Beim höchsten Grade der Gehirnerschütterung, bei der schwersten Form wird die Verrichtung der für das Leben wichtigsten Gebilde, der entsprechenden Hirnbezirke für immer aufgehoben, und erfolgt deshalb auch momentan der Tod.

Veranlassung zur Commotio cerebri bieten mechanische Insulte, welche entweder direct auf den Schädel selbst ihren Einfluss äussern, oder zuerst auf andere Theile des Körpers, von diesen aber zum

1) Dr. Obersteiner fand übrigens auch in sonst gesunden Gehirnen Fettkörnchen in der Adventitia, sowie in den Lymphkanälen gelbliches und bräunliches Pigment.

Gehirn gleich weiter geleitet wurden. Stumpfe, massige Instrumente bewirken mittelst Schlag auf den Schädel, in das Gesicht (in gleicher Weise Ohrfeigen), ferner auf den Stamm (z. B. Hufschlag eines Pferdes auf die Brust, Auffallen einer schweren Last auf die Wirbelsäule), desgleichen Stoss in die verschiedenen Partien des Gesichts, namentlich in die Kinn- und Oberkiefergegend, Sturz auf den Kopf, auf die Füsse, auf das Rumpfbende, die Sitztheile, ferner Hinschlagen des Körpers auf harten Boden, ohne dass gerade der Schädel auffällt, sogar gewaltsames anhaltendes Rütteln und Schütteln des Stammes die geschilderte Affection.

Am Kopfe rufen namentlich massige Instrumente von entsprechenden Dimensionen, welche mit einer grösseren, ausgebreiteten Fläche in Berührung kommen, eine Erschütterung hervor; bleibt die Wirkung des Werkzeuges auf eine kleine Partie des Schädels beschränkt, so concentrirt sich auch der Effect nur auf diese Stelle, setzt sich auf die weitere Umgebung nicht fort.

Vorzugsweise disponiren Beleidigungen der Scheitelgegend, wenn dabei der ganze obere Theil des Schädels getroffen wird, ferner solche der Hinterhauptsgegend und jene, welche direct auf die Basis cranii ihren Einfluss äussern können, wie z. B. Schlag und Stoss auf das Kinn, den Oberkiefer, auf die Nasenwurzel, in die Schläfen- und Ohrgegend zum Auftritt der Commotion.

Von grossem Interesse ist auch zu wissen, dass die Gewalten nicht gerade direct auf das Schädelgehäuse einwirken müssen, um eine Hirnerschütterung zu veranlassen, sondern dass auch von anderen Körpertheilen sich der Insult auf das Gehirn durch Bewegung der Atome fortsetzen kann ¹⁾, denn hierdurch werden einzelne Erklärungsarten das Wesen der Commotion betreffend ganz besonders hinfällig.

Ueber das Wesen der wahren Hirnerschütterung herrschen nämlich bis jetzt noch verschiedene Ansichten, je nach dem anatomischen Befunde an der Leiche oder beim Experiment, nach der Beurtheilung des Krankheitsbildes, je nach der schärferen, bestimmteren oder unbestimmteren Trennung der beiden Arten von Hirnerschütterung, des Zusammenfassens beider doch so verschiedener Vorgänge.

Ganz allgemein wird von Manchen das Wesen der Hirner-

1) Natürlich sind alle jene Fälle auszuschliessen, bei welchen anderweitige grossartige Verletzungen, selbst Zertrümmerungen wichtiger Organe, wie Zerreissungen des Herzens, der Lunge, der Leber etc. sich vorfinden oder bei denen andere wesentliche krankhafte Veränderungen in den Geweben bestehen, da hierdurch der Einfluss des Insultes modificirt wird.

schütterung als eine Störung der Cohäsionsverhältnisse des Gehirns, als eine Verminderung der Elasticität der Gebilde, als eine Paralyse der Nervenfasern, als eine mangelhafte Oxydation der Ganglienzellen des Grosshirns, als eine Verschiebung und Veränderung der Hirnelemente, als eine Expansion derselben in Folge centrifugaler Schwingungen, als eine multiple Zerreißung des Nervengewebes, von Anderen dagegen als Folge capillärer Apoplexien, disseminirter hämorrhagischer Herde, überhaupt von Gefäss-Rupturen mit gleichzeitiger Vernichtung von Nervelementen aufgefasst. Andere sehen die Hirnerschütterung als Folge einer bei solchen Insulten stets auftretenden Hirnquetschung, welche nach den Bruns'schen Versuchen durch die grosse Elasticität der Schädelknochen ermöglicht werde, an; auch Bergmann glaubt, dass bei der mechanischen Einwirkung, welche eine Commotion herbeiführe, eine gewaltsame Formveränderung des Schädels, welche die Grenzen seiner Elasticität nicht übersteigt, stattfinde und dass deshalb eine mehr oder weniger beträchtliche Contusion des Hirns zu Stande komme. Laugier verlegt den Sitz der Erschütterung in die Rindenschichte des Grosshirns; Stromeyer spricht die Vermuthung aus, dass sie eine indirecte Contusion der Vaguswurzeln sei und glaubt gleichzeitig, dass die capillären Blutergüsse der Reactionsperiode angehören.

Alle diese verschiedenen Anschauungen und Theorien kritisch zu beleuchten würde mich hier zu weit führen. Ich will nur, bevor ich meine eigene auf anatomische Studien, auf viele Versuche an Thieren wie Leichen basirte Ansicht über das Wesen der Hirnerschütterung mittheile, kurz darzulegen suchen, dass bei der wahren Commotion wie von einer Expansion, so auch von einer Compression, einer Quetschung des Gehirns mit gleichzeitigem Verdrängen der Flüssigkeiten aus demselben und hierdurch bewirkten Anämie keine Rede sein könne.

Bei allen Versuchen mittelst Einwirkung massiger Instrumente auf die Schädelblase, mittelst Zusammenpressen derselben überzeugte ich mich stets, dass unter normalen Verhältnissen bei einem ausgebildeten Schädel kein derartiger Elasticitätsgrad bestehe, dass ohne Zusammenhangsstörungen irgend ein Theil der Schädelwand gegen das Cavum hingedrängt und eingedrückt werden könne, um eine Quetschung der im Inneren geborgenen Organe zu bewirken, dass also keine Gestaltveränderung, welche auf die Hirnmasse selbst ihren wesentlichen Einfluss äussere, mit alsbaldiger Rückkehr zur früheren Form beobachtet werde. Der geringe Grad von Elasticität des Schädelgehäuses hängt betreffs der einzelnen Knochen von der Be-

schaffenheit der Diploe, von einer geringeren oder beträchtlicheren Entwicklung des gefässreichen, schwammigen Gewebes, bezüglich der Schädelblase in toto von jener der Nahtknorpel, der faserknorpeligen Zwischenlage ab. Diese letztere allein ermöglicht in unbedeutendem Grade eine vorübergehende Verschiebung, die aber niemals einen so nachtheiligen Druck nach Innen auszuüben im Stande ist. Bei Einwirkung einer heftigen Gewalt von aussen kann ein Nachgeben nur durch Aufhebung der Nahtverbindung oder durch Bruch der Knochenmasse herbeigeführt werden. An der Schädelbasis trägt eine frühzeitige Verknöcherung der knorpeligen Verbindung (Synostose), das dichte Anliegen der Dura gleichsam als Periost dazu bei, dass die Elasticität ganz verloren geht, weshalb auch leicht Fracturen daselbst erzeugt werden. Insulte dieser Schädelpartie ohne Continuitätsstörungen rufen aber gerade sehr häufig eine intensive Commotion hervor.

Abgesehen davon, dass die anatomischen Verhältnisse der Theorie von der Hirncontusion und Compression als Ursache der Erschütterung keine Unterstützung gewähren, spricht weiter gegen sie, dass Commotion des Gehirns in vielen Fällen herbeigeführt wird, in welchen der Insult den Schädel direct gar nicht trifft, sondern andere, häufig selbst vom Kopfe entfernt gelegene Körpertheile beleidigt werden, von diesen aus sich die Erschütterung erst dem Gehirn mittheilt, sich also eine Veränderung der Schädelblase gar nicht einstellen kann. Ferner steht die Dauer der Commotionserscheinungen nicht im Einklang mit einer nur momentan wirkenden Compression, mit einer nur für den Augenblick erfolgten Anämie des Gehirns; desgleichen ist allgemein bekannt, dass ein vorübergehender Druck niederen Grades keine besonderen Symptome und Folgen hervorruft, dass sogar verschiedene Völker, namentlich Amerikas, wie z. B. die Eskimo durch Zusammenschnüren des Kinderkopfes, durch Ueberziehen enganschliessender Lederkappen eine künstliche Verunstaltung des Schädeldaches anstreben, auch Bewohner der Steppen Südrusslands, ferner die Conivos in Ucayali, die Smu, die Tschinuk in Britisch Columbia durch Pressen zwischen Brettern dem noch elastischen kindlichen Schädel eine steilere Gestalt zu geben versuchen, ohne dass dabei das Gehirn durch die Compression nothleidet und dabei Erscheinungen wie bei einer Commotion wahrgenommen werden. Ferner wird man sicherlich nicht eine Gehirnerschütterung bei Explosion von Munition, von grossen Hohlgeschossen bewirkt, wie solche recht häufig ohne jegliche äussere Beleidigung, nur durch die gewaltige Erschütterung der den Verletzten umgebenden Luft zu

Stande kommt, durch ein mechanisches Zusammenpressen des Schädels, durch eine Quetschung des Gehirns selbst erklären wollen und können.

Der wiederholt verbürgte, von mir selbst beobachtete Befund bei Sectionen an Commotion plötzlich Verstorbenen, welcher das Fehlen jeglicher Veränderung an dem Schädelgehäuse, am Gehirn und seinen Hüllen ausser Zweifel stellt, sowie das öftere Vorkommen von disseminirten hämorrhagischen Herden, capillären Apoplexien, begrenzten Extravasaten, von Zerreissung, Zertrümmerung der Hirnsubstanz selbst an Stellen, auf welche die äussere Gewalt nicht einwirkte, auch ohne gleichzeitiges Bestehen einer Commotion, sowie das Fehlen von Hirnläsionen in manchen Fällen, bei welchen der mechanische Insult sogar die Schädelwand im Zusammenhang störte und eine Ruptur der Art. meningea media verursachte, aus welchem mit Sicherheit geschlossen werden konnte, dass das eigentliche Wesen der wahren Hirnerschütterung nicht in groben materiellen Störungen, wirklichen Trennungen des Zusammenhangs begründet sei, veranlassten mich, durch geeignete Experimente an Thieren mir möglichst Licht zu verschaffen, mir auf solchem Wege eine richtige Vorstellung von den die Schädelverletzungen begleitenden Vorgängen zu verschaffen.

Bei meinen Versuchen, über welche das Nähere in meiner Schrift „Die Schädelverletzungen“ nachzulesen ist, war ich im Stande, je nach Absicht, die verschiedenen Grade von Erschütterung zu bewirken, ohne dass eine Continuitätsstörung der Schädelknochen verursacht worden wäre, es stellten sich aber meistens gleichzeitige Hirnläsionen ein und nur in wenigen einzelnen Fällen gelang es, ein solches Resultat, das gewünschte Auskunft zu ertheilen vermochte, zu erreichen.

Hierbei beobachtete ich, dass die beim Insulte im Bereiche der Knochen erzeugten Schwingungen sich auf die im Inneren gelegenen Organe übertragen und ganz dem anatomischen Bau und den physikalischen Verhältnissen entsprechend, die in den verschiedenen Röhren und Räumen vorhandenen Flüssigkeiten in aussergewöhnliche Bewegung versetzen, wodurch je nach der Heftigkeit der Gewalt, der Erschütterung, entweder materielle wirkliche Cohäsionsstörungen, vorzugsweise Gefässrupturen verursacht werden, oder nur eine erhöhte Erregung, Bewegung, anderweitige Gruppierung, eine moleculäre Umlagerung in den Elementen des Nervengewebes allein zu Stande kommen. Die Ansicht, dass sich die Schwingungen von aussen auf das Gehirn selbst nicht direct fortsetzen, dass im Inneren desselben keine Bewegungen der Atome, keine Oscillationen, sondern nur eine

Verschiebung des Gehirns im Allgemeinen, mit oder ohne Quetschung desselben, entstehen, kann ich nicht theilen, da uns der momentane Effect bei Einwirkung einer mehr oder weniger heftigen Gewalt, sei es direct auf den Kopf, sei es von einem andern Körpertheile aus, vom Gegentheil überzeugt. Die Versuche von Gama, Alquié etc. mit Erschütterung kleisterartiger Massen in gläsernen Gefässen, um von diesen aus auf das Verhalten des lebenden Gehirns, in welchem ohne Unterbrechung in zahlreichen Gefässen eine grosse Menge von Blut lebhaft kreist, sich in den Lymphbahnen und Räumen die Cerebro-spinal-Flüssigkeit bewegt, schliessen zu können, haben keine Beweiskraft, da die Verhältnisse nicht übereinstimmen, keine analogen sind. Am Schädel einer Leiche verhält sich das Gehirn, in welchem sich die Flüssigkeiten theilweise in geronnenem Zustande befinden, allenfalls wie eine Leimmasse, bestehen derartige Veränderungen, dass es auch bei Einwirkung massiger Instrumente auf die Knochenblase nicht mehr gelingt, Extravasate, capilläre Apoplexien, disseminirte Herde im Inneren zu verursachen, wenn nicht die Knochen eingebrochen werden und mit denselben das Gehirn eingedrückt, theilweise zertrümmert wird.

Die Erscheinungen, welche sich bei den Experimenten kundgeben, richten sich ganz nach dem Grade der gesetzten Erschütterung.

Bei einem geringen Grade bemerken wir augenblicklich eine Veränderung in der Athmung und Herzthätigkeit; beide sind nämlich erhöht. Der Anstoss hat also eine Erregung, Excitation hervorgerufen. Hat eine stärkere, intensivere Erschütterung eingewirkt, so zeigt sich jetzt das Gegentheil. Die Erregung hat einer Schwäche, oft einer Erschöpfung ähnlichen, Platz gemacht; die Athmung wird alsdann auffallend langsamer, oberflächlicher, die Herzaction schwächer, deshalb auch der Puls verlangsamer, gleichzeitig stellt sich Schwinden der Sinne, Bewusstlosigkeit und Coma unter Abnahme der Körpertemperatur ein. — Rufen wir den höchsten Grad der Commotion hervor, so tritt der Tod augenblicklich ein, und bemerkt man hierbei, dass sich kein Athmenmuskel (auch nicht das Zwerchfell und die vom Facialis abhängenden Muskeln der Nase) mehr bewegt, die Respiration ganz erloschen sei und sich das Herz nur noch in Folge des Einflusses der automatischen Nervencentren in ihm selbst sehr schwach zusammenziehen. Oeffnet man hierbei alsogleich den Schädel, so findet man, wie auch bei einem solchen Grade von Commotion, der nicht getödtet, aber Coma erzeugt hat, das Gehirn in Folge der niederliegenden Herzthätigkeit anämisch, in der Schädelhöhle zusammengesunken. Ist der Tod nicht gerade eingetreten und erholt sich das

Thier, so sieht man, wie sich das blutleere Gehirn allmählich wieder füllt und sich nach Ausdehnung der Gefässe bei der Expiration wieder hebt.¹⁾ Es stellt sich also nach Ablauf eines sog. Toleranz-Stadiums, nach Wiederkehr der Energie der Athem- und Herzthätigkeit die Circulation ein, und nur die beeinträchtigte Spannkraft der Gefässwandungen gibt hin und wieder Veranlassung zu weiteren secundären Störungen, zu Stasen, Durchfeuchtungen und Ernährungs-Alterationen.

Diese Beobachtungen, auf welche ich zuerst aufmerksam machte, veranlassten mich zur Annahme, dass der Erschütterungs-Tod allein durch Aufhebung der Athem- und Herzthätigkeit, nicht durch Tetanisation der Vaguswurzeln erfolge, dass die Schwingungen von aussen auf entsprechenden Bahnen zum verlängerten Mark, in welchem die automatischen Athmungscentren und das automatische Centrum der excitirenden Herznerven gelagert sind, geleitet werden und hier, je nach dem Grade der Erschütterung, entweder eine rasch vorübergehende Erregung, Excitation oder eine Schwächung, Erschöpfung, Depression der betreffenden Nervenelemente oder selbst eine völlige Ertödtung, Durchwirkung derselben, eine gänzliche Aufhebung der Function nach sich ziehen, dass also von dem Verhalten der im verlängerten Marke sich befindenden Elemente allein die Gefahr für das Leben bei einer reinen Hirnerschütterung abhängen.

Seit dem Jahre 1865 haben sich unsere Kenntnisse über das vasomotorische Nervensystem wesentlich verbessert und hat man, wie dem Athmungscentrum und jenem der excitirenden Herznerven, gleichfalls dem vasomotorischen Centrum einen Platz in der Medulla oblongata angewiesen. Hierdurch lassen sich nun einige Erscheinungen bei der Hirnerschütterung noch leichter erklären, da ein geringer mechanischer Insult auch im Bereiche dieses Centrums wie der bereits früher genannten eine Erregung, ein starker dagegen, je nach dem Grade, Schwächung, Erschöpfung oder selbst Ertödtung, sog. Durchwirkung herbeiführen wird. Die Hirngefässe können hierdurch entsprechend in einen zuerst krampfhaften, dann gelähmten Zustand versetzt, deshalb Anämie des Gehirns, namentlich der so gefässreichen Hirnrinde, dieser zufolge eine länger andauernde durch die Erschütterung hervorgerufene Bewusstlosigkeit bewirkt werden.

1) Bergmann fand bei Untersuchung des Augenhintergrundes in solchen Fällen, dass anfänglich die Ränder der Netzhautgefässe gar nicht sichtbar waren und dass erst nach längerer Zeit, wie sich das Thier erholt hatte, dieselben deutlicher und strotzender gefüllt als gewöhnlich erschienen.

Das Wesen der wahren Hirnerschütterung ist also in einer auf mechanische Art hervorgerufenen Affection der genannten, im verlängerten Marke dicht neben einander gebetteten Centren begründet, und nur wenn diese gemeinschaftlich in ihrer Function gestört sind, wird das Krankheitsbild auch das charakteristische sein. — Die mit grosser Sachkenntniss und Umsicht von W. Koch und W. Filehne angestellten Experimente, bei welchen zwar die Analogie zwischen einem heftigen Schlag und dem sog. Verhämmern keine ganz reine ist, bei denen aber sonst den verschiedensten Factoren und Eventualitäten Rechnung getragen wurde, liefern noch weitere Beweise hierfür und bestärken mich noch mehr in meiner Anschauung.

Die Gehirnerschütterung nur als Folge einer reflectorischen Zusammenziehung der Hirngefässe aufzufassen, geht nicht, da sich eine solche zu rasch wieder zurückbildet, auch alle Gefässe fest verschlossen sein müssten, die stärksten Reize verschiedenartigster Natur aber einen solchen Effect nicht zur Folge haben ¹⁾; in gleicher Weise kann nicht eine Reflexlähmung der Hirngefässe allein als Ursache der Commotions-Erscheinungen aufgefasst werden, da Versuche bis jetzt für diese Theorie den nöthigen Beweis nicht geliefert haben. Bei meinen Experimenten mit Aufsägung des Schädeldaches nach erfolgter Hirnerschütterung nahm ich wenigstens im Momente keine erweiterte paralysirte mit Blut sehr gefüllte Gefässe der Pia und der Hirnrinde wahr. Ohne gleichzeitige Herabsetzung der Herzthätigkeit könnten auch die Gefässnerven für sich allein diese Wirkung auf die Dauer nicht äussern.

In gleicher Weise, wie sich die Verhältnisse bei Einwirkung mechanischer Insulte auf den Kopf gestalten, so kann auch der höchste Grad von Hirnerschütterung bei Aeusserung einer heftigen Gewalt auf eine vom Schädel entfernte Körperpartie durch Weiterleitung des Stosses, Schlages, der Schwingungen bis zum verlängerten Mark hervorgerufen werden und den augenblicklichen Tod zur Folge haben. Man bezeichnet dann gewöhnlich die Todesart als eine durch Reflexlähmung des Herzens oder durch Shok verursachte. Im Wesen unterscheidet sich aber der Vorgang gar nicht von jenem bei der heftigsten Commotio cerebri, denn auch hier kann nur eine Ertödtung der Nerven-elemente der in der Medulla oblongata geborgenen Centren augen-

1) Die Gehirnerschütterung, die Bewusstlosigkeit während derselben, kann nicht mit einer Affection wie die Epilepsie verglichen werden, bei welcher das schwer reizbare Krampfcentrum im Pons vorzugsweise erregt ist, ein vorübergehender Krampf in den Hirngefässen besteht, die Action des Herzens aber dabei nicht wie bei der Commotion darniederliegt.

blicklich das Leben vernichten. Belehrende Beobachtungen stehen mir in dieser Hinsicht zu Gebot. In 3 Fällen wurde sofortiger Tod durch Hufschlag von Pferden in die Brustgegend verursacht, und nur in einem hatte das Herz eine Läsion erlitten, welche übrigens an und für sich auch nicht eine momentane Sistirung der Maschine zur Folge haben konnte. Eine kurze Mittheilung der entsprechenden Obductionsbefunde dürfte hier am Platze sein.

1. Dragoner Esperg, kurmärkisches Dragonerregiment Nr. 14, 4. Escadron wurde, als er mit dem Busche auf dem Helm im Stall zu seinem Pferde trat, von demselben auf die Brust geschlagen, so zwar, dass er sofort todt zusammenstürzte. An der Leiche fand man in der Mitte der Brust einen 12 Cm. langen, 2 Cm. breiten, braungelben Fleck ohne Sugillation; ein zweiter halbmondförmiger 6 Cm. langer, 3 Cm. breiter gleicher Fleck an der linken Seite 7 Cm. unter der Brustwarze. Rippen und Muskeln der Brust intact, desgleichen die Lungen. Von Verletzung des Herzens keine Spur. Die rechte Vorkammer mit Blut gefüllt, Musculatur des Herzens sehr entwickelt; in der rechten Herzkammer kein Gerinnsel, linkes Herz sowie der gesammte Klappenapparat normal. Am Schädel nichts zu finden, dagegen in der Bauchhöhle flüssiges Blut, welches von einem Riss in der Milz stammt. Die übrigen Organe normal.

Die Continuitätsstörung der Milz kann natürlich den augenblicklichen Tod nicht herbeigeführt haben, da bei grossartiger Zertrümmerung dieses Organes mit nachfolgenden Blutungen nicht allein Stunden, sondern selbst Tage lang das Leben fortbestehen kann. Vor 1½ Jahren habe ich mich, wie schon mehrmals früher, hiervon überzeugen können, als sich ein Selbstmörder mehrere Steine in den Leib schoss und hierdurch nicht allein die ganze Milz zertrümmerte, sondern auch noch den Magen durchlöcherzte; erst nach 15 Stunden erfolgte der Tod.

2. Unterofficier Seifert vom gleichen Regiment, 2. Escadron wurde von einer als Schläger bekannten Remonte vor dem Aufsitzen derart gegen die Brust geschlagen, dass er sofort todt zusammenstürzte.

Links nach oben und aussen von der Brustwarze befindet sich eine handtellergrösse Sugillation in der Haut. Auf dem linken Lungenüberzuge zwischen 4. und 5. Rippe und vorderen Rande und dahinter auf dem Herzbeutel Sugillation. In der linken Lunge einige haselnussgrosse Blutextravasate. Herz und aus demselben abgehende Gefässe vollständig normal, zeigen keine Spur einer Verletzung. Die Kranzvenen sind strotzend mit flüssigem Blut gefüllt. Alle übrigen Organe normal.

3. Kanonier Fritschi der 2. Abtheilung, 2. bad. Feldartillerieregiments Nr. 30 war am 27. Februar 1875 von einem durchgegangenen Pferde auf die Brust geschlagen und sofort todt geblieben. Bei der Obduction fand sich mit Ausnahme eines oberflächlichen Einrisses im linken unteren Lungenlappen nur ein 4 Cm. grosser, klaffender Längsriss in der Kammerseidewand. Herzwandungen, Klappen wie die übrigen Organe intact. — Obgleich in diesem Falle ein Riss des Septums erfolgte, so kann doch dieser Läsion der sofortige, momentane Tod nicht zugeschrieben werden, da bei Rupturen selbst der Kammerwandungen, wie sie hin und wieder bei patho-

logischen Processen eintreten, oder bei Verwundungen das Organ nicht alsogleich still steht, noch Secunden, selbst Minuten vorübergehen bis das Leben zum Abschluss kommt.

Bezüglich des Vorganges beim Zustandekommen des Septum-Risses bei intacten Kammerwandungen stelle ich mir vor, dass der Schlag im Momente der Diastole oder gerade beim Beginn der Systole, also während der grössten Ausdehnung und Spannung der Kammern, während des Zuflusses des Blutes aus der Hohlvene und der Lungenvene in die Vorkammern, die Brustwand traf. Da derselbe blitzschnell einwirkte, so wird die Blutmasse in der rechten nach vorn gelegenen Kammer, gleichsam wie ein fester Körper, gegen die Scheidewand und den linken Ventrikel geschleudert worden sein und durch die Wucht das Septum an der schwächsten Stelle im Zusammenhange gestört haben.

Besondere neue Erfahrungen über das Verhalten der Pupillen bei der Hirnerschütterung, welche sich im Allgemeinen bei geringem Grade verengt, bei höherem Grade etwas erweitert zeigen, wurden keine gemacht. Physiologischen Experimenten zufolge richtet sich stets das Verhalten nach dem jeweiligen Uebergewicht des 5. Hirnnervenpaares oder des Sympathicus.

Auch über die eine Hirnerschütterung hin und wieder begleitenden oder derselben nachfolgenden Störungen in der Function der Nieren, wie z. B. über den Auftritt von Albuminurie oder Diabetes findet sich in den Krankengeschichten nichts aufgezeichnet. Meine Erfahrungen sprechen dafür, dass derartige Complicationen nicht direct von der Commotion des Gehirns abhängen.

Hat man sich eine richtige Vorstellung von dem Vorgang bei der Gehirnerschütterung gemacht, liegt das Bild klar vor Augen, hat man das eigentliche Wesen der Affection richtig erkannt, so wird eine Verwechselung mit einem anderen cerebralen Processe nicht leicht erfolgen, und ist man dann auch in Stand gesetzt, therapeutisch richtig zu handeln.

So lange der comatöse Zustand andauert, Herz- und Athemthätigkeit herabgesetzt ist, sich die Körpertemperatur als eine niedere erweist, das Schlucken unmöglich ist, muss man sich mit einer richtigen, horizontalen Lagerung des Verletzten, mit Abhaltung aller schädlichen Einflüsse, mit Erwärmung der Glieder und des Stammes, mit belebenden Abwaschungen, Bespritzen der Herzgegend etc. begnügen und, da Anämie des Hirns besteht, keine Kälte auf den Kopf in Anwendung bringen. Kann geschluckt werden, so flösse man Wein und kräftige Brühen ein. Im Reactionsstadium, wenn in Folge

einer Alteration des vasomotorischen Centrums, der Dilatation der Gefässe, der Verlangsamung des Kreislaufes eine Hyperämie des Gehirns, eine venöse Stase erfolgt, beträchtliche Ausscheidung von Serum in die Kammern und Lymphräume zu befürchten ist, der Herzschlag wieder kräftig, der Puls voll ist, sich das Gesicht röthet, Kopfschmerz und Lichtscheu entstehen, so muss man zur Kälte greifen, unter Umständen selbst locale Blutentziehungen vornehmen und ableitend auf den Unterleib wirken.

Casuistik.

a) Leichten Grades mit oder ohne weitere Beschädigung der Bedeckungen und der Schädelkapsel.

L. Nr. 1. II. 1. A. a. F. b. G. b. H. b. β .

Grenadier Henninger vom Leib-Gr.-Rgt. 109 erhielt Abends auf der Strasse einen Schlag auf den Kopf mit einem unbekannten Instrumente, so dass er bewusstlos niedersank, sich aber bald wieder erhob und später keine weiteren Hirnsymptome zeigte. Die $1\frac{1}{4}$ Zoll lange oberflächlich verklebte grössere Wunde auf dem rechten Scheitelbeine wird mit einem Oelläppchen bedeckt und kalte Umschläge auf den Kopf applicirt. Nach geringer Eiterung ist am 13. Tage die Heilung beendet.

L. Nr. 2. II. 1. A. a. F. b. G. b. H. b. β .

Grenadier Müller, Leib-Grenadier-Rgt. 109, am 20. Mai 1872 wahrscheinlich mit dem Bleiknopfe eines Stockes auf den Kopf geschlagen, wurde vorübergehend bewusstlos. Eine kleine oberflächliche Quetschwunde fand sich am Tuber frontis, eine zweite, $\frac{1}{2}$ Zoll lange und bis auf den Knochen dringende mitten auf dem Schädel; beide verheilten mit mässiger Eiterung bis zum 17. Juni 1872. Behandlung: Eisblase, Oelverband.

L. Nr. 3. II. 1. A. a. F. b. G. b. H. α .

Grenadier Langensieben vom 1. Garde-Rgt. zu Fuss wurde von einem Pferde in die Gegend des linken Auges derart geschlagen, dass er bewusstlos zusammensank, sich aber nach einiger Zeit wieder erhob. Eine kleine Hautwunde auf dem linken Scheitelbein, wie auch die ursprünglich beträchtliche Schwellung und Sugillation der linken Supra- und Infra-orbitalgegend waren bei einem Deckverband und Eisumschlägen nach 6 Tagen geheilt.

L. Nr. 4. II. 1. A. a. F. b. G. a. H. b. β .

Grenadier Koch vom Leib-Gr.-Rgt. 109 stürzte am 21. Juni 1874 aus einem Fenster des ersten Stockwerkes der Kaserne auf einen Steinhäufen. Bei der erfolgten Aufnahme ins Lazareth war er noch bewusstlos, doch reagierten die Pupillen auf Lichtreiz, der Puls war bald wieder beschleunigt. Verletzungen fanden sich folgende: 1) eine etwa 6 Cm. lange, gerissene und bis auf das Periost des linken Scheitelbeins dringende Wunde, 2) eine ganz kleine Excoriation am rechten Schläfenbein, 3) eine gelappte Hautwunde am linken äusseren Augenwinkel. Diese wurde genäht; Eisblase auf den Kopf. Am 22. stellte sich das

Bewusstsein wieder her. Die Wunde im Gesicht eitert, so dass die Nähte entfernt werden müssen. In 22 Tagen ist die Heilung beendet.

L. Nr. 5. II. 1. A. a. F. b. G. a. H. b. β .

Soldat W. stürzte beim Baden mit dem Hinterkopfe auf einen Stein und ging mit einer sternförmigen Quetschwunde am Vertex im Lazareth zu. Die Lappenwunde wird mit 6 Nähten geschlossen. Pat. war nach dem Sturze besinnungslos und verspürte später Brechreiz. Der Lappen ist nekrotisch geworden; die Wundränder sind teigig geschwollen und geröthet; es wird ein schmutziger, braunrother Eiter secernirt. Der Lappen und 3 Nähte werden entfernt. Die ziemlich geräumige Wundhöhle wird mit Sol. Kal. hypermang. gereinigt. Bald nachher tritt gute Eiterung ein. Drei Wochen später kann Pat. geheilt entlassen werden.

L. Nr. 6. II. 1. A. a. F. b. G. a. H. b. β .

Soldat Kücherer erhielt am 17. December 1872 einen Hufschlag gegen die Stirn, dass er einige Zeit bewusstlos war, auch sehr stark fror, nachdem er ins Lazareth gebracht war. Die Wunde beginnt in der Mitte der Nasenwurzel und geht 3 Cm. nach auf- und auswärts. Sie ist mit 3 Nähten vereinigt. Nachdem sich Pat. erholt hat, treten keine weiteren Hirnsymptome auf. Eisblase. Den folgenden Tag klagt Pat. über Kopfschmerz und Abends zeigt sich starke ödematöse Anschwellung beider Lider und der rechten Gesichtshälfte. Die Nähte werden weggenommen und aus der Wunde entleert sich viel dünner übelaussehender Eiter. Rascher Nachlass der Erscheinungen. Hydropathischer Verband. Nach 33 Tagen vollständige Heilung.

L. Nr. 7. II. 1. A. a. F. b. G. a. H. b. β .

Soldat H. erhielt am 3. März 1873 einen Pferdeschlag gegen die Stirn mit Hirnerschütterung leichten Grades und einer Wunde quer über den Nasenrücken. Augenlider stark geschwollen und blutunterlaufen, die Pupillen erweitert. Eisüberschläge. Am 14. werden die 4 Nähte entfernt, weil sich in der Tiefe der Wunde Eiter gebildet hat. Hydropathische Umschläge. Nach 19 Tagen wird der Verletzte geheilt entlassen.

L. Nr. 8. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Soldat Oesterle fiel 4 Fuss hoch beim Turnen vom Querbalken herunter und acquirirte dabei eine Gehirnerschütterung leichten Grades. Puls 64, kühle Hauttemperatur. Nach Rückkehr des Bewusstseins klagt er über Kopfschmerz, der sich bald verliert. Heilung.

L. Nr. 9. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Musketier Blümel ist am 3. November 1872 in gleicher Weise gefallen. Derselbe klagt nach Wiederkehr der Besinnung über Schmerzen am Hinterkopf, über Schwindel und Schlaflosigkeit. Den folgenden Tag sind die Klagen verstummt; nach 2 Tagen kann Pat. entlassen werden.

L. Nr. 10. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Am 5. Juni 1872 Nachts 3 Uhr stürzte p. Englert in der Trunkenheit aus dem Fenster des zweiten Stockes der Kaserne herunter und blieb $\frac{1}{2}$ Stunde bewusstlos liegen; nachher trat zweimaliges Erbrechen ein. Nach Rückkehr des Bewusstseins klagt Pat. namentlich über Schmerzen im Unterleib; Urin blutig gefärbt. Das Sensorium wird allmählich frei.

Eine handtellergrösse Stelle der linken Leistenegend bleibt noch einige Zeit beim Druck schmerzhaft. Heilung.

L. Nr. 11. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Am 7. Mai fiel p. Steger beim Rücksprung über den Querbaum ziemlich heftig zunächst auf das Gesäss, dann auf den Hinterkopf und wurde in bewusstlosem Zustande ins Lazareth gebracht. Unmittelbar nach dem Sturz war Erbrechen eingetreten. Spuren äusserer Beschädigung sind nicht wahrnehmbar. Puls verlangsamt, klein, noch zweimaliges Erbrechen. Da später Kopfschmerz vorhanden, Auflegen einer Eisblase. Pat. schlief darauf hin gut, ist besinnlich; Kopfschmerz geschwunden; Puls wieder voll und weich, 76 Schläge. Baldige Wiederherstellung.

L. Nr. 12. II. 1. A. a. F. b. H. b.

P. Schneider fiel am 15. Februar 1874 vom Reck herab auf den Kopf und wurde für lange Zeit unbesinnlich. Bei seiner Aufnahme in das Lazareth klagt er über Schmerzen im Kopf, Nacken und auf der Brust. Objectiv ist nichts nachzuweisen. Da sich ein beträchtlicher Lungenkatarrh entwickelt, erst nach 17 Tagen Entlassung.

L. Nr. 13. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Lieutenant von B. stürzte mit dem Kopf auf Sandboden, brach sich dabei den Proc. condyloid. des Unterkiefers, schlug sich mehrere Zähne aus, blutete aus dem Ohr und erlitt vielfache Abschürfungen im Gesicht. Pat. war bald wieder bei Besinnung, klagte nur über Kopfschmerzen und über solche an den beschädigten Stellen des Körpers. Eismuschläge werden mehrere Tage ununterbrochen fortgesetzt und milde Laxantien gereicht. Die Heilung ging ohne Zwischenfälle vor sich.

In diesem Falle befürchtete man anfänglich die Anwesenheit eines Bruches der Schädelbasis. Zu Rathe gezogen, konnte ich aber keine Erscheinungen wahrnehmen, welche zu einer solchen Diagnose berechtigten. — Pat. hatte sich nach dem Sturz sehr rasch erholt, war nur kurze Zeit bewusstlos gewesen; es fehlten Functionsstörungen des Gehirns, die Blutung aus dem Ohr war sehr unbedeutend, hörte bald auf, kehrte nicht wieder, seröse, gelbliche Flüssigkeit floss gar nicht ab.

L. Nr. 14. II. 1. A. a. F. b. G. b. H. b. β.

Dragoner Merz wurde beim Reiten abgeworfen und dabei vom Pferde auf den Kopf geschlagen. Pat. war unmittelbar nach dem Schlag einige Minuten bewusstlos. Auf dem Scheitel findet sich eine bis auf den Knochen dringende Wunde. Unter lauwarmen Wasserüberschlägen, Oelverband reinigt sich die Wunde und kann nach 15 Tagen Pat. geheilt entlassen werden.

L. Nr. 15. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Dragoner Mussler wurde beim Remontereiten abgeworfen und stürzte so heftig auf Kopf und Rücken, dass er 4—5 Stunden bewusstlos blieb, sich dann aber rasch erholte und nur über Schwindel klagte. Eis und Limonade leisten gute Dienste. Entlassung nach 5 Tagen.

L. Nr. 16. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Dragoner Henn stürzte mit dem Pferd, blieb eine halbe Stunde bewusstlos und wurde erst durch Reizmittel wieder zu sich gebracht. Im Lazareth ist er gut bei Besinnung; seine Klagen beziehen sich auf Kopf-

weh, starken Schwindel und Schmerz an mehreren contundirten Körperstellen. Eis auf den Kopf und die gequetschten Körperstellen; innerlich Limonade. Entlassung nach 17 Tagen.

L. Nr. 17. II. 1. A. a. F. b. G. a. H. b. β .

Unterofficier Heckmann wurde im Streite zu Boden geschlagen und erhielt dabei zwei Quetschwunden auf das Scheitelbein, beide 3—4 Cm. lang und wahrscheinlich bis auf den Knochen gehend. Gleich nach der Verletzung war Pat. unbesinnlich, dann ging er in sein Quartier und machte dort während der Nacht kalte Ueberschläge. Am nächsten Morgen wurden die Wunden durch je eine Naht vereinigt, Eis aufgelegt und innerlich Limonade gegeben. Nach oberflächlicher Eiterung wird H. geheilt entlassen.

L. Nr. 18. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Dragoner Imhof erhielt einen Schlag mit dem Besenstiel in die Schläfengegend, dass ihn schwindelte, die Ohren brausten und er für kurze Zeit besinnungslos wurde. Ausserdem war eine kleine Hautwunde sichtbar. Eisüberschläge. Schwindel dauert noch etwas an, nach 8 Tagen Entlassung.

L. Nr. 19. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Musketier Müller fiel beim Turnen auf den Hinterkopf und war alsogleich bewusstlos, auch trat Erbrechen bald nachher ein. Eine kleine Hautwunde befindet sich am Hinterkopf. Gegen die nachfolgenden Stirnschmerzen wird Kälte in Anwendung gebracht. Heilung.

L. Nr. 20. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Musketier Klein hatte durch Schlag mit einer Latte eine 4 Cm. lange Hautwunde auf dem rechten Scheitelbein und eine andere von derselben Grösse hinter dem linken Ohr erhalten. Bewusstlosigkeit von Dauer einiger Minuten, später noch Brechneigung und Schwindel. Nach 20 Tagen Entlassung.

L. Nr. 21. II. 1. A. a. F. a. G. b. H. b. β .

Füsilier Herz erhielt in angetrunkenem Zustande mit einem unbekannten Instrumente zwei Kopfverletzungen, welche sofort Bewusstlosigkeit herbeiführten. In der Mitte des rechten Scheitelbeins befand sich eine transversal verlaufende $3\frac{3}{4}$ Cm. lange oberflächliche Wunde; eine beträchtliche tiefere bis auf die oberste Schädelplatte dringende zweite Verletzung in einer Länge von 2 Cm. war am rechten Winkel des Hinterhauptbeins. Die Umgebung der Wunde ist beträchtlich angeschwollen und bestand anfänglich eine ziemlich starke Blutung, welche nach kurzer Digitalcompression rasch stand. Das Bewusstsein kehrte erst nach einiger Zeit zurück. Die vordere Wunde heilte bei einfachem feuchtem Verbande per primam, die hintere, mit Carbolöl verbunden, heilte bei geringer Eiterung erst nach 17 Tagen.

L. Nr. 22. II. 1. A. a. F. b. G. a. H. b. α .

Füsilier Ami stürzte beim Turnen am Querbaum auf Steinboden und erlitt eine oberflächliche Wunde am Hinterkopf. Pat. war für kurze Zeit unbesinnlich, erbrach sich, hatte einen wankenden Gang, Kopfweh, sehr benommenes Sensorium, verlangsamten Puls und träge reagirende Pupillen. Die Wunde heilte nach blutiger Naht per primam. Die Hirnsymptome bildeten sich rasch bei Anwendung von

Kälte und Laxantien, absoluter Ruhe, blander Diät zurück. Entlassung nach 10 Tagen.

L. Nr. 23. II. 1. A. a. F. b. G. a. H. b. α .

Musketier M.: 3 Cm. lange bis auf den Knochen gehende Hieb-
wunde durch ein stumpfes Instrument in der rechten Scheitelgegend.
Gleich nach der Verletzung Bewusstlosigkeit, die aber nach kurzer
Zeit schwindet. Vereinigung durch die blutige Naht, Heilung per pri-
mam. Entlassung nach 10 Tagen.

L. Nr. 24. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Musketier J. fiel über den Sprungkasten auf den Kopf, quetschte
sich den rechten Vorderarm und die Schulter. Er klagte nach Wieder-
kehr des Bewusstseins über Schwindel und Kopfschmerz.
Unter Anwendung kalter Ueberschläge auf den Kopf verlieren sich
die Schmerzen, die gequetschten Theile des Vorderarmes entzündeten sich
aber phlegmonös, so dass die Heilung des Pat. erst nach 5 Wochen per-
fect ist.

L. Nr. 25. II. A. a. F. a. G. a. H. b. β .

Grenadier Frank, mit einem Faschinenmesser über den Kopf ge-
hauen, fiel bewusstlos nieder, erhob sich aber bald, blutete stark,
wurde genäht und verbunden. Es stellt sich Eiterung in der
Tiefe ein, und nach Entfernung der Nähte zeigt sich, dass der Kno-
chen angeschlagen sei. Oelverband und Ueberschläge mit kaltem
Wasser. Heilverlauf ohne Störung. Entlassung nach 69 Tagen.

L. Nr. 26. II. 1. A. a. F. b. G. a. H. b. β .

Artillerist Kugel erhielt einen Pferdeschlag ins Gesicht und blieb
darauf 2 Stunden bewusstlos. Bei der Aufnahme ist das Sensorium
frei, der Puls verlangsamt, unregelmässig, 60 Schläge, über dem rechten
Auge, den Brauen entlang, eine grosse klaffende Wunde mit Einbruch
der vorderen Wand der rechten Stirnhöhle; das abgelöste, tief
herabhängende obere Augenlid wird mit einer Naht gehoben. Am näch-
sten Tage hat sich viel Wundsecret angesammelt, so dass die Naht
entfernt, die Höhle mit Waschwassermstückchen, die später durch Oel-
charpie ersetzt werden, ausgefüllt werden muss. Unter einfachem Oel-
verband schreitet die Verheilung gut vorwärts, es lösen sich einige
Knochensplitter ab, die Höhle füllt sich nach und nach aus. Nach 14
Wochen ist die Wunde geschlossen, die Narbe ziemlich eingezogen und
wenig verschiebbar, der Orbitalrand etwas abgeflacht. Zeitweilig treten
noch Stirnschmerzen auf, welche von der Wunde nach dem Stirnhöcker
ausstrahlen. Der Geruchsinne der rechten Seite ist fast Null, das
Sehvermögen hat nicht gelitten. Nach 126 Tagen wird Patient geheilt
entlassen.

Dieser Fall bietet nur bezüglich der Verletzung der Stirnhöhle,
Eröffnung derselben, des später beeinträchtigten Geruchsinnes In-
teresse.

Eine auf die Stirnhöhle beschränkte Schusswunde habe ich
auch in den letzten Jahren beobachtet. Bei einem Selbstmordver-
suche drang das kleine Geschoss von oben durch die Stirnhöhle

gegen den Bulbus und zerstörte denselben. Die Heilung verlief ohne Zwischenfall. Einen ähnlichen Vorgang, welcher sich bei einem Pistolenduell ereignete, habe ich in meinen Schädelverletzungen bereits mitgetheilt.

L. Nr. 27. II. 1. A. a. F. b. G. a. H. b. β .

Füsilier Metzger vom Wagen aufs Steinpflaster gestürzt, erlitt hierbei eine Hirnerschütterung mit bald vorübergehender Bewusstlosigkeit sowie am linken Stirnhöcker eine kreuzförmige gerissene 2 Zoll lange Wunde bis aufs Periost. Gesichtsausdruck etwas verstört. Die Verletzung wurde mit 3 Nähten vereinigt und eine Eisblase aufgelegt. Kopfschmerzen und Urinverhaltung folgten nach. Puls und Temperatur normal. Die Blase wird katheterisirt. Am nächsten Morgen waren alle diese Zeichen geschwunden, Urinentleerung normal, die Wunde verklebt. Unter Eintritt der Eiterung stiess sich ein Theil der gequetschten Partien ab und wurde ein kleiner Punkt des Knochens vom Periost entblösst gefunden. Carbolöl- und später Heftpflasterverband. Nach 27 Tagen Entlassung.

L. Nr. 28. II. 1. A. a. F. a. G. b. H. a. b. β .

Grenadier Schuhmacher, über den linken Stirnhöcker mit dem Faschinenmesser geschlagen, stürzte besinnungslos nieder, erhob sich jedoch bald und konnte seine stark blutende Wunde selbst am Brunnen auswaschen. Sie geht von oben hinten nach unten vorn, ist 6 Cm. lang, scharf und gerade. Nach einigen Tagen unbedeutendes Erysipel. Die Heilung schreitet langsam vor sich; die Narbe fest mit dem Knochen verwachsen. Weitere Cerebralerscheinungen hatten sich nie bemerkbar gemacht.

L. Nr. 29. II. 1. A. a. F. a. G. a. H. b. β .

Trainsoldat Stöckel wurde mit einem Faschinenmesser auf den Kopf geschlagen, so dass er bewusstlos wurde. Die Wunde in der Mitte des Stirnbeins ging bis auf den Knochen, wurde mit 3 Nähten vereinigt und mit Eis bedeckt. Die Hirnsymptome, anfänglich prägnant, schwanden bald und kehrten nicht wieder. Im weiteren Verlaufe bildet sich Eiter im Grunde der Wunde und müssen die Nähte entfernt werden, um dem Secret Abfluss zu verschaffen. Nach 20 Tagen Heilung und Entlassung.

L. Nr. 30. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Musketier Dinger erlitt durch Sturz von der Turnstange eine Gehirnerschütterung und eine starke Quetschung am Hinterhaupt. Die Cerebralerscheinungen: Trübung des Bewusstseins, langsamer Puls, erweiterte Pupillen etc. verloren sich rasch. Heilung ohne Störung.

L. Nr. 31. II. 1. A. a. F. a. G. b. H. b.

Grenadier Ries erhielt durch Schlag auf dem Kopf eine Gehirnerschütterung mit kurz andauernder Bewusstlosigkeit und eine gequetschte Wunde von der Grösse eines Silbersechszers. Bis zum 3. Tage blieb Pat. apathisch. Kalte Ueberschläge und einfacher Charpieverband bewirkten bald völlige Heilung (12 Tage).

L. Nr. 32. II. 1. A. a. F. a. G. b. H. b.

Unterofficier Dienstbach erhielt mit dem eigenen Säbel einen Hieb über den Kopf, dass er 5 Minuten bewusstlos dagelegen haben soll, dann aber allein nach seiner Kaserne ging. Die Wunde, 3 Cm. lang, befand sich mitten auf der Stirn vertical verlaufend, die Ränder ziemlich scharf und verklebt. Hirnerscheinungen kehren nicht wieder. Die Heilung erfolgte unter Salicylwatte nach 13 Tagen.

L. Nr. 33. II. 1. A. a. F. a. G. b. H. b. β .

Musketier Lehmann erhielt einen Schlag mit dem scharfen Rande der irdenen Essschüssel gegen die linke Stirn- und Jochbeingegend. Die Wunde war eckig gerissen, circa 5 Cm. lang, das Stirnbein in der Grösse eines Zehnpfennigstückes entblösst. Mit dem Schlage ward Pat. bewusstlos. Drei Tage blieb die Eisblase auf dem Kopfe, nach 6 Wochen war die Wundheilung eingetreten.

L. Nr. 34. II. 1. A. a. F. b. H. b.

Unterofficier Armbruster fiel vom Reck aufs Steinpflaster und blieb eine halbe Stunde unbesinnlich, übergab sich auch in den nächsten Stunden mehrfach. Kopfweh blieb trotz Eisblase und Laxantien einige Tage lang. Die kleine Wunde am Hinterkopf war nach 11 Tagen verheilt.

b) Schweren Grades mit oder ohne Beschädigung der Bedeckungen und der Schädelkapsel.

L. Nr. 35. II. 1. A. b. F. b. H. b.

Am 12. Januar 1873 erlitt p. Löwe durch Schlag eine Hirnerschütterung und eine Contusion am rechten Stirnbein. Ins Lazareth aufgenommen, ist er noch sehr schwer besinnlich, spricht noch sehr lallend, klagt über Kopfschmerzen. Gegen 4 Tage dauern diese Folgen der Commotion an. Bei antiphlogistischer Behandlung bessert sich der Zustand, so dass nach 14 Tagen die Entlassung erfolgt.

L. Nr. 36. II. 1. A. b. F. b. G. b. H. b. β .

Dragoner Lill wurde beim Reiten abgeworfen und erhielt durch Hufschlag zwei kleine Hautwunden am linken Augenwinkel und auf der Stirn. Trotz Eisumschläge redete der längere Zeit bewusstlose Patient in der ersten Nacht häufig irre. Die Cerebralerscheinungen schwinden langsam; die Wunden, mit Oel verbunden, heilen, so dass nach 31 Tagen die Entlassung erfolgt.

L. Nr. 37. II. 1. A. b. F. b. H. b. β .

Trompeter Grumann fiel vom Wagen, erlitt eine 5 Cm. lange bis auf das rechte Scheitelbein gehende Quetschwunde mit Gehirnerschütterung in Unbesinnlichkeit, Erbrechen, langsamem Puls, schwachem Athem etc. ausgesprochen. Das Reactionsstadium bleibt nicht aus und erfordert wegen heftigen Kopfschmerzes, Congestionen die Anwendung der Kälte und jene von Blutegel. Nach leichter Eiterung tritt Heilung ein (13 Tage).

L. Nr. 38. II. 1. A. b. F. b. H. b.

Dragoner Höninger wurde, auf dem Pferde sitzend, vom Vorderhufe

des Nachbarpferdes auf die Nase getroffen. Hirnerschütterung, Unbesinnlichkeit, Crepitation und geringe Verschiebung der Nasenbeine, geringfügige äussere Wunde. Erst nach 2 Tagen wird unter Anwendung der Kälte das Sensorium frei. Entlassung nach einigen Tagen.

L. Nr. 39. II. 1. A. b. F. b. H. b.

Dragoner Reif fiel vom Pferde und mit dem Kopf gegen einen Baum, wodurch die linke Schläfen- und Supraorbitalgegend gequetscht, das Bewusstsein für längere Zeit aufgehoben, der Puls verlangsamt wurde. Wegen starken Kopfschmerzes, welcher der Commotion folgt, Anwendung von Eis. Nach 12 Tagen kann Pat. geheilt entlassen werden.

L. Nr. 40. II. 1. A. b. F. b. G. b. H. b. β .

Füsilier Arkenkeil wurde durch Schläge mit einem grossen Pflastersteine erheblich am Kopfe verwundet. Gleich nach der Verletzung war der Verwundete bewusstlos, bei der Aufnahme in das Lazareth klagte er über starken Schwindel, heftigen Kopfschmerz, und hatte intercurrente leichte Delirien, deshalb Eis und Laxantien. Wunden fanden sich zwei bis auf den Knochen gehende, welche im weiteren Verlaufe stark eiterten; dieselben wurden mit Carbolöl verbunden. Erst nach 7 Tagen war das Sensorium wieder ganz frei, verloren sich die Delirien und stellte sich gesunder Schlaf ein. Die Heilung erfolgte ohne weitere Störungen.

L. Nr. 41. II. 1. A. b. F. b. G. a. H. β .

Musketier Korbmacher, vom Pferde abgeworfen, wurde besinnungslos in die Kaserne und von dort ins Lazareth gebracht. In der linken Scheitelgegend ist die Haut 4—5 Cm. vom Knochen abgelöst, in mehrere Lappen gespalten und stark gequetscht. Patient noch immer schwer besinnlich. Die Wunde wird mit 3 Nähten geschlossen und kalte Umschläge applicirt. Am folgenden Tage steigt die Temperatur auf 39,2, der zuerst langsame Puls auf 104 Schläge. Patient ist noch sehr somnolent und erhielt deshalb 5 Blutegel an die Schläfe, Abführpulver und eine Eisblase auf den Kopf. Rückbildung der Hirnerscheinungen. Eiterung in der Tiefe der Wunde, Entfernung der Nähte. Nach 35 Tagen Heilung.

In diesem Falle stellte sich nach der Hirnerschütterung in Folge des geschwächten Gefässtonus eine Circulationsstörung mit Durchfeuchtung und Somnolenz ein. Die geeignete Behandlung beseitigte in Bälde den secundären congestiven Zustand.

L. Nr. 42. II. 1. A. b. F. b. H. b.

Dragoner N. stürzte bei der Attake vom Pferde auf den Kopf. Hochgradige Gehirnerschütterung. Mehrere Stunden andauernde vollständige Bewusstlosigkeit, verbunden mit langsamem Puls und Athem, verminderte Körpertemperatur, erweiterten Pupillen. Am folgenden Tag erhebliche Reaction mit Kopfschmerz, Lichtschem. Congestionen. Eis und Blutegel hinter die Ohren, sowie salinische Mittel innerlich wirken vortheilhaft. Heilung vollkommen.

L. Nr. 43. II. 1. A. b. F. b. H. b.

Unterofficier H. erhielt einen Schlag mit einem dicken Stock auf den Vorderkopf. Der Getroffene stürzt bewusstlos zusammen. Die Unbesinnlichkeit dauert nebst weiteren Erscheinungen 3 Stunden an. Später Circulationsstörungen mit starker Empfindlichkeit gegen Licht und Schall, Kopfschmerz, geröthetes Gesicht, voller, rascher Puls. Antiphlogose. Eis und locale Blutentziehung nebst Laxantien. Heilung.

L. Nr. 44. II. 1. A. b. F. b. H. b.

Artillerist B. erlitt durch Explosion eines grösseren Hohlgeschosses eine Gehirnerschütterung, welche einige Stunden in hohem Grade andauerte. Nach Rückkehr des Bewusstseins stellte sich rasch eine nicht unbedeutende Reaction ein und machte die Anwendung antiphlogistischer Mittel dringend nothwendig. Eis und Blutentziehungen, Ableitungen auf den Darm leisten gute Dienste. Heilung vollständig.

Hochgradigste Gehirnerschütterung mit sofortigem Tode.

L. Nr. 45. II. 1. A. b.

Peter Bohmüller, 1. Comp. bad. Trainbat., Nr. 14, geboren 29. Juni 1855 zu Jöhlingen, Grösse 1,64, Brustumfang 89—92, wurde den 23. März 1877 Morgens $\frac{1}{2}$ 8 Uhr vom Pferde ins Gesicht geschlagen. Der Getroffene fiel rückwärts auf das Hinterhaupt auf gepflasterten Boden und war sofort todt, ohne eine Faser zu bewegen, einen Athemzug zu thun.

Obduction 24 Stunden nachher. Im Gesicht findet sich die Oberlippe in ihrer Mitte oberflächlich eingerissen; etwas nach aufwärts gegen das rechte Jochbein hin nimmt man eine umschriebene, gequetschte Stelle, vom Stollen des Hufeisens herrührend, wahr. Beim Eingehen mit dem Finger unter die Oberlippe fühlt man deutlich, dass der Oberkiefer in ziemlicher Ausdehnung gegen den Boden der Nasenhöhle hin scharf und in querer Richtung durchgeschlagen ist; weitere Verletzungen bestehen in der Mundhöhle nicht. — Bei Ablösung der Weichtheile des Schädeldaches sind mit Ausnahme einer kleinen Wunde in der Hinterhauptsgegend, da wo der Getroffene auffiel, keine Beschädigungen wahrzunehmen, desgleichen auch keine bei Wegnahme des Schädeldaches selbst. Die Knochen haben in keiner Weise Noth gelitten. Die Hirnhäute sind nicht mit dem Schädeldache verwachsen, sie sind normal gefärbt. Die Blutleiter mit dunklem Blute strotzend gefüllt (der Getödtete hatte in der Nacht vom 22. auf den 23. März den Festlichkeiten zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers beige-wohnt); die Oberfläche des Gehirns nirgends verflacht oder niedergedrückt; in der rechten Hinterhauptsgegend findet sich der äusseren Wunde entsprechend in der Ausdehnung eines Fünfmarkstückes die Pia und die Rindenschicht etwas blutig gefärbt, was von der Trennung eines kleinen Gefässchens der Pia herrührt. Eine capilläre Apoplexie in der Corticalis des Gehirns besteht nicht, auch verdient die gefärbte Stelle der Pia nicht die Bezeichnung eines Blutergusses, so unbedeutend ist die Quelle des Blutaustrittes. Das Gehirn erweist sich sowohl bei genauer äusserer Besichtigung als bei Durchforschung seiner inneren wichtigen Partien allwärts als vollständig intact. Rindensubstanz wie Marklager ganz normal. Hirnsubstanz fest, zähe, nicht zerreisslich, die unverletzten Gefässe der Markmasse mit Blut gefüllt, deren Lumina deutlich nachzuweisen; die Hirnganglien in nor-

malem Zustande. An keiner Stelle lassen sich capilläre Apoplexien, disseminirte hämorrhagische Herde oder grössere Extravasate, an keiner Stelle Gefässrupturen oder Continuitätsstörungen des Gehirnparenchyms selbst, also nirgends Läsionen entdecken. Alle Hirnkammern sind frei von jeglichem Erguss, weder serösem noch blutigem, sie sind trocken; die Gefässplexus zeigen sich zusammengefallen, leer. Das kleine Gehirn normal, ohne jegliche Läsion, desgleichen der Pons, das verlängerte Mark. Es lassen sich keine, auch nicht die minutiösesten Störungen im anatomischen Bau dieser Hirntheile auffinden. — In den Schädelgruben fehlt jeglicher Bluterguss. Der Schädelgrund erweist sich gleichfalls als vollkommen intact. Die Dura sitzt überall ganz fest auf, ist ganz glatt, nirgends von einem Knochen durchbohrt etc. — nach Ablösung der harten Haut überzeugt man sich, dass an der Schädelbasis weder eine Spalte, noch ein Bruch bestehe. Der Türkensattel zeigt sich ganz intact, die in die Schädelhöhle eintretenden Carotiden sind gleichfalls frei von jeglicher Beschädigung.

Das Ergebniss der Section muss somit als ein höchst lehrreiches, als ein gewiss nur selten zu beobachtendes angesehen werden. Es traf hier der intensive Schlag des Pferdes nicht den eigentlichen Schädel, sondern den oberen Theil des Gesichtes dicht unter der Nase. Die Knochenverletzung beschränkte sich nur auf die Stelle des Insultes, der Stoss, die Erschütterung wurde aber von hier aus auf die Basis des Schädels und das Gehirn direct fortgesetzt und bis zur Medulla oblongata geleitet. Von einer Compression des Gehirns durch Verschiebung der Schädelknochen, durch eine Raumverminderung der Schädelhöhle kann in diesem Falle absolut keine Rede sein, sondern nur von einer directen Fortpflanzung der heftigen Schwingungen auf das Centralorgan des Nervensystems selbst. Gefässrupturen mit entsprechenden Folgen waren nicht vorhanden; grosses und kleines Gehirn, Pons und Medulla zeigten sich an keiner Stelle im Zusammenhange gestört. Freier Bluterguss fehlte gleichfalls, ein Druck auf das Gehirn durch einen solchen also auch unmöglich. Der Tod erfolgte hier wirklich blitzartig durch vollständige Erschöpfung, Durchwirkung der im verlängerten Marke geborgenen so wichtigen Centren. Da auch nicht die geringfügigste Hirnläsion nachgewiesen werden konnte, so haben wir es hier mit einem so seltenen Falle von hochgradigster, ganz reiner Gehirnerschütterung zu thun.

B. Unreine Gehirnerschütterung.

Bei dieser Form kommt es bei nicht beeinträchtigtem Zusammenhange des Schädelgehäuses ¹⁾ ausser der Beleidigung der früher be-

1) Jene Fälle, bei denen gleichzeitig Schädelbrüche, grossartige Extravasate,

zeichneten Hirncentren auch zu materiellen Störungen selbst, nämlich zur Ruptur von kleinen Gefässen, wodurch capilläre Apoplexien, Extravasate von der Grösse eines Stecknadelkopfes, eines Mohn-, Hirsekornes, bis zu jener eines Apfelmehls, einer Linse, oder disseminirte hämorrhagische Herde, coagulirtes Blut enthaltend, bis zum Umfange einer Erbse, eines Kirschkernes, einer Haselnuss, mit Zertrümmerung und breiiger Erweichung der Nervensubstanz entstehen. Diese Läsionen finden sich sowohl an der Peripherie des Gehirns in der Rindenschicht, die betroffene Partie dunkelroth färbend, als im Innern, im Marklager, wobei sie letzten Falles den Anblick bieten, als wäre mittelst eines Pinsels Blut in die weisse Masse gespritzt worden, sie stehen entweder gleichsam in einander fliessend in dichter Nähe beisammen, oder sind weithin zerstreut. Ersteren Falles können dabei auch kleine flächenförmige, engbegrenzte Extravasate zu Stande kommen, welche aber keine besonderen Erscheinungen verursachen und das Leben nicht direct bedrohen.

Seit Dupuytren hat man solche Zerreibungen, diese wirklichen Hirnläsionen verschiedenen Grades und verschiedener Ausbreitung als sogenannte indirecte Hirnquetschungen beschrieben, von der falschen Idee ausgehend: der elastische Knochen würde sich einerseits ohne Beeinträchtigung seines Zusammenhangs soweit gegen das Cavum hinpressen lassen, dass er die Hirnoberfläche bequem contundiren könne, andererseits als liesse sich das zähe, zur Zerreibung gar nicht geneigte Nervengewebe des Hirns ohne Beschädigung der Kapsel derartig comprimiren und auseinanderzerren, dass dabei die beschriebenen Verletzungen gleichsam als Folge eines durch Raumverminderung der Schädelhöhle bewirkten Druckes zu Stande kämen.

Seit ich meine Versuche über isolirten Glastafelbruch etc. im Jahre 1861 und später jene über *Commotio cerebri* angestellt, habe ich mir meine eigene Ansicht über diese Vorgänge gebildet, da ich mich sowohl durch Experimente als wie am Leichentisch überzeugen konnte, dass die Rupturen der Gefässe nicht durch Quetschung und Verschiebung des Nervengewebes, sondern durch die Erschütterung allein, durch die Gewalt der kreisenden Flüssigkeiten im Gehirn und dessen Hüllen hervorgerufen werden.

Wenn man die anatomischen Verhältnisse, den Bau der Schädelkapsel, das Verhältniss der Hirnhüllen, jenes der Arachnoidea mit

ausgebreitete Hirnquetschungen bestehen und bei denen deshalb auch die Symptome des eigentlichen Hirndruckes in den Vordergrund treten, gehören natürlich nicht hierher.

ihren Räumen für die Cerebro-spinal-Flüssigkeit, namentlich der Gefässhaut, der Pia mater und hier vorzugsweise der von derselben ab- und zu derselben gehenden Hirngefässe ¹⁾ und die Beschaffenheit des Gehirns selbst näher ins Auge fasst, so wird man zur Ueberzeugung kommen müssen, dass sich bei einer Erschütterung des Schädels (in Folge eines directen mechanischen Insultes oder bei indirecter Erschütterung durch Luftbewegung etc.) die Schwingungen von den harten Gebilden auf die darunter liegenden Häute und namentlich auf die in denselben wie im Gehirne sich befindenden Flüssigkeiten, auf das in seinen Kanälen kreisende Blut wie auf den Liquor cerebro-spinalis übertragen werden und dass namentlich erst von

1) Nach Duret überwiegen die Arterien bedeutend; am anschaulichsten wird dies Verhältniss, wenn man von feinen Rindenquerschnitten die Pia los-trennt. Man findet dann nur Arterien von verschiedenen Dimensionen. Die Venen dagegen sind alle von ziemlich gleichem aber grösserem Durchmesser und übertreffen noch die grössten Arterienstämmchen. Die Arterien bilden eine kolossale Erweiterung des Strombettes, in welche das Blut sich wie in einen weiten Sack ergiesst. Bei den Arterien besteht die Einrichtung, dass ihre Zweige vor dem Eintritt in die Rinde regelmässig eine Strecke parallel der Hirnoberfläche verlaufen. Duret unterscheidet zwei Arten von Schlagadern: die einen sehr langen überschreiten die graue Substanz, um sich in die weisse zu begeben, Art. medullares, die anderen verbreiten sich in der Rinde allein — Art. corticales. — Bei den Venen machen die Stämme innerhalb der Pia keine Schlingelung und die Zweige treten in geradem Verlaufe in die Hirnrinde ein, dagegen haben sie hier zahlreichere Verzweigungen als die Arterien. Die ganze Einrichtung ist der Art, dass bei ausgiebigem Zufluss arteriellen Blutes für einen möglichst ungehinderten Abfluss des venösen gesorgt ist. Wie sich die Stämmchen in vielfache Schlingelungen und Windungen in feine Zweige auflösen, so nimmt die Adventitia einen anderen Charakter an. Sie wird feiner, zarter, hin und wieder treten noch Bindegewebszüge ab, um mit der Pia zu verschmelzen, bis schliesslich an dem letzten parallel der Hirnoberfläche verlaufenden Gefässzweige die Adventitia als eine glashelle, homogene Membran mit hin und wieder eingelagerten Kernen erscheint. In dem Augenblicke aber, wo diese Zweige rechtwinkelig nach abwärts steigend die Pia verlassen, erhalten sie eine neue Umhüllung. Ein scheidenartiger Fortsatz, der von der unteren dem Cortex unmittelbar aufliegenden Lamelle der Pia entspringt, nimmt das Gefässstämmchen auf, begleitet es in die Hirnsubstanz hinein und liegt der Adventitia unmittelbar an. An einer Stelle pflegt dies Verhältniss deutlich hervorzutreten; nämlich dort, wo das Gefäss unter rechtem Winkel die Pia verlässt, ist constant eine kleine trichterförmige Erweiterung der Scheide, die durch das rechtwinkelige Abgehen der Gefässe bedingt ist, indem dadurch ein genaues Anlegen der von der Pia ausgehenden Hülle verhindert wird. Die Scheide ist eine neuhinzugekommene Hülle, innerhalb welcher die Gefässe im Gehirn verlaufen, sie ist also analog den bindegewebigen Balken und Scheiden, welche in anderen Organen die Träger der Blutgefässe sind. Die Spalträume des Bindegewebes, welche wir als die Wurzeln der Lymphgefässe aufzufassen pflegen, treten so im Gehirn mit besonderer Deutlichkeit hervor.

der Stärke dieser Bewegungen auch der weitere Einfluss auf die Cohäsion des Nervengewebes, auf die Verrichtungen desselben abhängen. Die in heftige Bewegung gesetzten Flüssigkeiten überwinden häufig den ihnen von Seite der zarten Gefässwandungen gebotenen Widerstand, überwältigen in Folge der zu grossen Spannung, Streckung und Zerrung die Elasticität der Häute, die Dehnbarkeit derselben und verursachen deshalb an verschiedenen Punkten sowohl in der Rinde als in der weissen Substanz Zerreiſung der Gefässchen und in Folge des Blutaustrittes auch Zertrümmerung der Nervensubstanz.

Die Duret'schen Aufschlüsse über den Gefässverlauf in der Pia und in der Hirnrinde, über den anatomischen Bau und das Verhalten der Gefässe selbst machen ersichtlich, wie leicht durch Erschütterungs-Schwingungen die Aa. corticales und medullares und die entsprechenden Venen an der Peripherie des Gehirns im Zusammenhange gestört werden können und wie alsdann die von den betreffenden Gefässen versorgte Partie des Córtes bis zu einer gewissen Tiefe durch Bluterguss in die Scheiden gleich in Mitleidenschaft gezogen werden muss. Wie die Schwingungen sich auf die Oberfläche des Gehirns fortpflanzen, so durchsetzen sie auch das Gehirn selbst und können deshalb, namentlich wenn sie von verschiedenen Punkten ausgehen, auch an verschiedenen Stellen im Inneren des Hirns zu Gefässruptur Veranlassung geben. Dass hin und wieder nicht allein an der Stelle, an welcher die äussere Gewalt einwirkte, sondern auch an der gerade entgegengesetzten eine Läsion zu Stande kommt, rührt daher, dass die Schwingungen einer Hohlkugel derart sind, dass sich die gegenüberstehenden Hälften einander zu nähern bestreben.

Würden die capillären Apoplexien und disseminirten hämorrhagischen Herde durch Druck, durch eine Quetschung bewirkt, so müssten sie sich vorzugsweise auf die Stelle beschränken, auf welche der Insult seinen Einfluss übte; wir finden aber häufig diese Läsionen an den verschiedensten Stellen des Gehirns. Bei Versuchen an Thieren habe ich mich wiederholt davon überzeugen können, dass ohne Beeinträchtigung der Schädelblase Gefässzerreiſungen nicht allein an der Oberfläche, sondern auch im Marklager zu Stande kommen, wobei man aber nie das Bild einer wirklichen Quetschung gewann, auch übte ich hin und wieder auf das blossliegende Gehirn einen raschen Druck aus, ohne eine derartige Störung nachfolgen zu sehen. An der Leiche stellte ich gleichfalls entsprechende Versuche durch Einwirkung stumpfer Gewalten an, konnte aber, wenn die Knochenkapsel intact blieb, im Bereiche des todten, des Ein-

flusses der Herz- und Athemthätigkeit, des Blutlaufes beraubten Gehirns keine Störungen, welche jener bei unreiner Gehirnerschütterung analoge sind, hervorrufen; nur wenn der Schädel selbst eingeschlagen, eingedrückt ward, nahm man auch Zusammenhangsstörungen der inneren Gebilde wahr.

Gleich nach dem Insulte lässt sich die unreine Gehirnerschütterung, wenn man ihr in meinem Sinne Grenzen zieht, von der reinen nicht unterscheiden. Die Erscheinungen sind dieselben; erst im weiteren Verlauf treten nach und nach solche auf, welche an dem Bestehen der reinen zweifeln lassen. Dauert die Bewusstlosigkeit mehr als 1—2 Tage an, wird dabei die Herzaction eine kräftigere, stellen sich später Congestiv-Zustände gegen das Gehirn ein, erhöht sich die Körpertemperatur, machen sich Erscheinungen eines localisirten Hirnreizes, Unruhe des Patienten, Muskelzittern, Zähneknirschen oder jene partieller Lähmung ohne das Bild des wahren Hirndruckes zu gewähren, bemerkbar, bleiben nach Wiederkehr des Bewusstseins Schwindel, heftiger Kopfschmerz, Lichtscheu, zeitweises Irrereden, Schwäche des Gedächtnisses, Unfähigkeit zu geistiger Arbeit, Schlafsucht, Aphasie, Störungen der Function gewisser Hirnbezirke für einige Zeit zurück, so darf man mit Sicherheit auf das Bestehen capillärer Apoplexien, hämorrhagischer Herde etc. schliessen.

Die Störungen, wenn sie nicht augenblicklich, d. h. durch die Erschütterung der Medulla tödten, können sich, wie ich mich in einzelnen Fällen, in welchen in einem späteren Stadium, selbst nach Jahren, der Tod erst erfolgte, sowie auch bei Versuchen an Thieren überzeugte, auf dem Wege der Resorption des Ergossenen und der umgewandelten Gewebe-Elemente vollkommen zurückbilden, bei welchem Vorgange wir alsdann nur rostfarbene, pigmentirte Stellen wahrnehmen; oder es kommt gleichsam zu einer Vernarbung mit oberflächlichem Substanzverlust und Verlöthung der Hirnfläche mit den Hüllen, zu Atrophie, Verdichtung der Gewebe, selbst Verkalkung in der Rinde. Häufig machen sich aber im weiteren Verlauf ausgedehntere Circulations- und Ernährungsstörungen bemerkbar; die Erscheinungen nehmen stetig zu, es entstehen, wie im Reactionsstadium der wahren Commotion, erhöhte Absonderung der Cerebro-spinalflüssigkeit, Durchfeuchtung und Ergüsse führen dann den Tod in rapider Weise herbei, oder die Hirnsubstanz selbst erkrankt tiefer; es kommt zu wirklichen Erweichungs- und Vereiterungs-Processen, welche dann entweder in manchen Fällen in Form schleichender Hirnerweichung das Bild einer mit Schwachsinn verbundenen Melancholie intensiver psychischer Verstimmung liefern,

in anderen aber einen letalen Ausgang in Bälde herbeiführen. In einzelnen Fällen, wenn die Herde im Marklager ihren Sitz haben, bildet sich scheinbar die Affection zurück, macht sich eine oft lange andauernde Periode einer vollkommenen Latenz bemerkbar, es treten erst später in überraschender Weise die Erscheinungen der Umwandlung des ergossenen Blutes in Eiter auf, es kommt unter den Symptomen des secundären Hirndruckes zur Abscessbildung. In allen solchen Fällen muss deshalb die Prognose sehr vorsichtig gestellt werden, muss die ärztliche Ueberwachung eine lange andauernde sein.

Die Behandlung unterscheidet sich im Allgemeinen von jener bei der reinen Commotio cerebri nicht. Nur wenn sich die Erscheinungen erhöhter Reaction, der Reizung einstellen, greife man zur Kälte, zu örtlichen Blutentziehungen, zur örtlichen Anwendung ableitender Mittel, zur Application reizender Klystiere. Die Abhaltung der schädlichen Einflüsse tritt in die erste Linie; ein operativer Eingriff — wie die Trepanation — ist, da sich der Schädel in intactem Zustande befindet, nicht angezeigt.

Casuistik.

L. Nr. 46. II. 1. B. F. b. H. d.

Dragoner Feil stürzte am 12. August 1874 mit dem Pferde auf dem Exercirplatze, wurde sofort bewusstlos und gleich ins Lazareth verbracht. Auch hier dauerte die Bewusstlosigkeit an; der Körper war wie gelähmt. Kein Erbrechen. Temperatur nicht wesentlich vermindert. Abends stieg die Temperatur auf 39,0, Puls 104, die Bewusstlosigkeit dauert an, Temperatur 39,2, Puls 120. Patient ist unruhig, scheint Schmerzen zu fühlen, zupft krampfhaft an den Ohren, am Kopfe, am Bett. Die Gesichtsfarbe ist hochroth, und werden wegen der heftigen Reactionsercheinungen 8 Blutegel an die Schläfen gesetzt. Der Puls wird sehr klein, von Nahrungsmitteln kann nur etwas Milch eingeflösst werden. Abends Stöhnen und Röcheln, Temperatur 40,2, Puls 128, circa 1 Schoppen Urin mit dem Katheter abgelassen. Ordin. Essigklystier.

Die Nacht verläuft im Ganzen ruhig; die Athmung wird aber immer erschwerter; Patient collabirt rasch, das Röcheln nimmt zu, der Puls kaum fühl- und zählbar, Temperatur 41. Um 10 Uhr Morgens Exitus letalis.

Section: Körper schlank, wohlgebaut; Gesicht mager; weitverbreitete Todtenflecken. Schädelhöhle: Auf dem rechten Seitenwandbein befindet sich unter der Kopfschwarte ein handtellergrosser Bluterguss in das Zellgewebe, darunter der Schädel selbst unverletzt, weder ein Sprung noch ein Eindruck sichtbar, die Knochen der rechten Schädelhälfte, besonders in der Diploe sehr blutreich, links fast normal, die Nähte fest, auch in der Schädelbasis nirgends ein Sprung oder sonstige Verletzung; dagegen enthält die Schädelhöhle mindestens vier Esslöffel heller seröser Flüssigkeit,

die Hirnhautgefässe sind in ihren feinsten Aestchen injicirt, mit Blut überfüllt, die inneren Hirnhäute mit der Hirnmasse verklebt, die Hirnleiter mit dunklem Blute gefüllt, kein faserstoffiges Exsudat in den Hirnwindungen; die Hirnsubstanz erweicht, wasserreich, übersät mit capillären Apoplexien. In der Mitte der rechten Hirnhälfte, ziemlich tief, zwei erbsengrosse Extravasate, ebenso viele und grosse am Wurm. Die Ventrikel sind mit blutigem Serum gefüllt. Sonstige Verletzungen oder pathologische Producte wurden weder an der Wirbelsäule, noch in der Brust- und Bauchhöhle getroffen.

In diesem Falle erfolgte der Tod durch hochgradige unreine Hirnerschütterung, verbunden mit Hirnläsionen, capillärer Apoplexie, hämorrhagischen Herden und nachfolgender Lähmung der Hirngefässe, entsprechender venöser Stase, erhöhter Absonderung der Cerebrospinalflüssigkeit, Hirndurchfeuchtung und ausgebreitetem serösem Ergüsse in die Schädelhöhle und die Hirnkammern. Die Erscheinungen während des Lebens traten in ganz charakteristischer Weise auf, markirten den Process ganz scharf und lieferten deshalb ein deutliches Bild von dem rapiden Verlaufe bei einer intensiven Erschütterung der wichtigsten Hirncentren. Die Apoplexien und hämorrhagischen Herde führten natürlich nicht den raschen Tod herbei, sondern derselbe war in der nachfolgenden Lähmung der Hirngefässe, in der hierdurch bewirkten Ausscheidung der Flüssigkeiten begründet.

L. Nr. 47. II. 1. B. F. b. H. d.

Dragoner Blasko wurde vom Pferde geworfen und derartig gegen eine Thürklinke mit dem Kopfe geschleudert, dass der Tod sofort eintrat.

Sectionsbefund: Der Körper ist gut genährt, der rechte Schenkel schwächer als der linke; Todtenstarre vorhanden und Todtenflecken auf dem Rücken. Ueber dem rechten Auge befindet sich eine klaffende $\frac{3}{4}$ Zoll lange horizontal verlaufende Wunde mit glatten Rändern, welche bis auf das Periost dringt. Um diese Wunde, in der Gegend des Jochbeins, an der Nasenspitze, den Mundwinkeln, an dem Brustbein und am 3. und 4. Finger der rechten Hand sind Hautabschürfungen sichtbar. Die Unterlippe ist in der Mitte auf der inneren Fläche tief, die Oberlippe nur leicht eingerissen. Bei Eröffnung des Schädels fliesst aus dem Sinus longitudinalis nur wenig flüssiges Blut, die Dura mater ist normal, die Venen mit Blut gefüllt, die grosse rechte Hemisphäre zeigt vorn ein kleines Blutextravasat unter der Arachnoidea und ebenso an einzelnen Stellen der Gehirnbasis. Im rechten Seitenventrikel sind die Plexus stark gefüllt, wie auch die Gefässe der Hirnsubstanz.

Hier erfolgte der momentane Tod durch hochgradigste Gehirnerschütterung, durch directe Ertödtung der wichtigen Centren, welche im verlängerten Mark gebettet sind. Die unbedeutenden Gefässrupturen in der Pia bei voll-

ständigem Mangel einer Hirnläsion selbst konnten natürlich bei dem Vorgange keinen wesentlichen Einfluss äussern. Der Fall ist deshalb auch ein sehr belehrender.

L. Nr. 48. II. 1. B. F. b. H. c.

Wachtmeister Elsner erlitt am 29. Mai 1872 eine Kopfverletzung durch einen herabfallenden Ziegelstein und zugleich durch Fall auf das Steinpflaster eine Quetschung der rechten Schulter. Die erstere bestand in einer 4—5 Cm. langen, stark gequetschten Wunde der Schädelbedeckungen auf der linken Stirnbeinseite, von vorn nach hinten in den behaarten Theil des Kopfes fast bis zur Sutura coronaria verlaufend. Ein Knochenbruch war nirgends zu constatiren. Es trat sofortige Bewusstlosigkeit ein und eine 36 Stunden anhaltende Somnolenz. Die Heilung der Wunde erfolgte binnen 4 Wochen; die Cerebralerscheinungen schwanden erst nach 10 Tagen. Mehrere Wochen nachher that E. wieder Dienst, aber nur kurze Zeit, da sich Störungen des Gedächtnisses neben leichter Erregbarkeit und Schlaflosigkeit bemerkbar machten. Patient musste später invalidisirt werden, da er sich nicht mehr zum Dienst eignete.

In diesem Falle war die Hirnerschütterung mit Läsion der Hirnrinde mit capillären Apoplexien verbunden. Die Erscheinungen gleich nach der Verletzung, der weitere Verlauf, die lange andauernden weiteren Störungen in der geistigen Sphäre, die Gedächtnisschwäche etc. sprechen ganz dafür.

L. Nr. 49. II. 1. B. F. b. H. b.

Dragoner Laible stürzte auf dem Exercirplatze mit dem Pferde, fiel auf den Kopf und ward sofort bewusstlos. Im Lazareth machte er den Eindruck eines Schwerberauschten: die Pupillen erweitert, der Puls verlangsamt, die Athmung oberflächlich. Die Bewusstlosigkeit dauert noch Abends an, der Puls 52; Somnolenz hält 3 Tage an, mitunter stellt sich auch Erbrechen ein. Vom 4. Tage an ist die Schlafsucht nicht mehr so anhaltend und tief; Patient klagt über unangenehmes Gefühl im Kopf; beim Aufsetzen im Bett steter Schwindel, später schwankender Gang. In geistiger Beziehung macht Patient den Eindruck, als wäre eine Schwächung und Trübung, ein Defect eingetreten. Erst nach 24 Tagen wird der Verletzte ruhiger und fängt an sich zu erholen. Entsprechende Antiphlogose that gute Dienste.

Auch bei diesem Insulte war die Gehirnerschütterung mit oberflächlicher Hirnläsion complicirt. Ein ausgebreiteter Bluterguss hätte auffallende Erscheinungen von Hirndruck nach sich ziehen müssen; die verhältnissmässig rasche Rückbildung, die Somnolenz, die Alteration der geistigen Kräfte, der Schwindel, das unangenehme Gefühl im Kopf, der schwankende Gang sprechen dagegen für Circulations- und Ernährungsstörungen im Gehirn in Folge capillärer Apoplexien.

L. Nr. 50. II. 1. B. F. b. H. c.

Füsilier Merkel erlitt bei der Belagerung von Strassburg durch eine in der Nähe crepirende Bombe, wobei er durch die Lufterschütterung umgeschlagen wurde, eine hochgradige *Commotio cerebri* ohne jegliche äussere Beschädigung. Während mehreren Tagen lag er völlig bewusstlos im Lazareth. Als der Zustand eine Evacuation gestattete, kam er in die Heimath. Nach dem Feldzuge machten sich bei ihm die secundären Erscheinungen von vorausgegangenen Hirnläsionen durch entsprechende Functionsstörungen bemerkbar; er wurde deshalb wegen beginnender Gehirnerweichung invalidisirt. Im weiteren Verlaufe gesellte sich eine psychische Verstimmung, Melancholie mit Schwachsinn als Folge des bestehenden Defectes, des gestörten Ernährungsprocesses im Bereiche der Hirnrinde dazu, auch stellten sich in letzter Zeit neuralgische Schmerzen, welche jede psychische Anstrengung unmöglich machen, ein. In diesem Falle haben die capillären Apoplexien und hämorrhagischen Herde, welche bei der Commotion in der Hirnrinde entstanden, einen bleibenden Schaden zurückgelassen, da sie sich nicht vollkommen zurückbildeten, sondern einen Zerfall des lädirten Gewebes mit secundärer Erweichung bewirkten.

L. Nr. 51. II. 1. B. F. b. H. b.

Musketier Lucassen hatte eine 4 Cm. lange Schusswunde hinter dem rechten Ohr durch eine Platzpatrone erhalten; die Haut war noch 3 Cm. unterminirt, der Knochen jedoch nirgends blossgelegt. Das Bewusstsein mangelte vom ersten Tage gänzlich und war noch 6 Tage lang sehr getrübt, dabei Sprachlosigkeit, die sich erst nach 14 Tagen allmählich verlor. Am 8. Tage nach der Verletzung traten alle 3 Stunden wiederkehrende, durchschnittlich 5 Minuten andauernde Krampfanfälle auf, die einige Tage anhielten. Die Behandlung bestand in Eisumschlägen, Blutegeln und später Jodkali. Erst nach 57 Tagen konnte die Entlassung aus dem Lazareth erfolgen.

In diesem Falle bestand jedenfalls eine unreine schwere Hirnerschütterung mit capillären Apoplexien, kleinen hämorrhagischen Herden, wodurch das Sprachcentrum vorübergehend in seiner Function gestört wurde. Eine Rückbildung erfolgte und so hinterliess die Läsion keinen bleibenden Schaden.

L. Nr. 52. II. 1. B. F. b. H. d.

Artillerist B. stürzte von einem Wagen herunter auf die rechte Seite des Kopfes und erlitt dabei eine hochgradige Hirnerschütterung. Im späteren Verlauf stellen sich die Erscheinungen von Eiterbildung im Inneren des Schädels ein: Kopfschmerz, Schwindel, Brechreiz, Erbrechen, Delirien, halbseitige Lähmung und erst später Coma, Sopor. Die Anwesenheit von Hirnläsionen in Folge der intensiven Commotion wird von Anfang an angenommen. Nach 16 Tagen erfolgte schon der Tod; bei der Obduction fand sich das Schädelgehäuse vollständig intact, die Hirnhüllen waren eiterig infiltrirt, ein Theil des rechten Schläfenlappens, welcher oberflächlich durch die hämorrhagischen Herde sehr Noth gelitten hatte, zeigte ausgedehnte grauröthliche Erweichung der Hirnsubstanz.

Belehrung halber theile ich hier noch einige früher von mir beobachtete Fälle mit.

L. Nr. 53. II. 1. B. F. b. H. b.

Sturz eines 11 Jahre alten Knaben vom Heuboden auf die Scheuer-
tenne 22 Fuss hoch herunter. Kälte des Körpers, Athem sehr schwach,
Puls klein und langsam, 8 Tage lang völlige Bewusstlosigkeit. In
dieser Zeit stellte sich zwischendurch Congestion gegen das Gehirn mit leich-
ten Convulsionen ein, deshalb Anwendung intensiver Kälte, von Blutegel
hinter die Ohren. Nach und nach erholt sich der Verletzte, es bleibt aber
für einige Zeit Schwäche des Gedächtnisses, behindertes Sprechen zurück.
— Hier bestanden capilläre Apoplexien, hämorrhagische Herde an der
Hirnoberfläche, Erscheinungen eines wirklichen Druckes machten sich nicht
geltend, nur solche einer unreinen Hirnerschütterung.

L. Nr. 54. II. 1. B. F. b. H. b.

Sturz eines Arbeiters 52 Fuss hoch vom Gerüste auf die Erde. Es
bestehen alle Erscheinungen hochgradiger Erschütterung mit 17 Tage
andauernder Bewusstlosigkeit. Intereurrirend stellen sich Con-
gestionen ein; nach einigen Tagen Schlucken der gereichten Flüssigkeiten
möglich. Am 18. Tage Erwachen wie aus einem tiefen Schlaf. Für kürzere
Zeit blieb geistige Schwäche zurück. Da die Erscheinungen des wahren
ausgebreiteten Hirndruckes stets fehlten, so ist nur anzunehmen, dass die
Commotion mit Hirnläsionen verbunden war.

L. Nr. 55. II. 1. B. F. b. H. b.

Sturz aus dem Wagen mit der Stirne voraus auf harten Boden. Lange
andauernde Bewusstlosigkeit, welche neben den anderen Erschei-
nungen der Commotion gleich mit dem Insulte besteht. Drei Wochen ver-
gehen, bis nach und nach die Besinnung vollständig wiederkehrt und die
oft beängstigenden Congestiv- und Reizzustände bekämpft sind. Beträcht-
liche Gedächtnisschwäche und Unfähigkeit zur Versetzung des Berufes
bleiben noch einige Zeit zurück. Auch hier bestand eine unreine Hirner-
schütterung mit entsprechenden Hirnläsionen.

L. Nr. 56. II. 1. B. F. b. H. d.

Fall eines Mannes in einen Abgrund auf den Kopf. Hochgradige
Gehirnerschütterung; 9 Tage bis zum Eintritt des Todes andauernde
Bewusstlosigkeit. Bei der Section: starke Durchfeuchtung des Ge-
hirns, an vielen Stellen capilläre Apoplexien und disseminirte hämorrhagische
Herde von verschiedener Grösse; kein freier Bluterguss in die Schädel-
höhle. Knochenblase vollständig intact.

2. Hirndruck.

Die Affection, bei welcher die Verrichtungen einzelner Bezirke
des Gehirns oder dieses letzteren in toto in Folge eines mechanischen
Missverhältnisses zwischen Hirn, seinen Hüllen und der Schädelblase
sich entweder als sehr abgeschwächt oder völlig aufgehoben, das
Leitungsvermögen sich als wesentlich vermindert oder völlig ver-
nichtet erweisen, bezeichnen wir als Hirndruck.

Durch irgend eine Ursache muss das normale Expansions-Verhältniss entweder eines Hirnthells oder des gesammten Gehirns gestört, muss entweder durch eine Volumszunahme der in der Schädelkapsel geborgenen Organe oder durch eine Verminderung des Raumes der Schädelhöhle eine Einengung, eine Compression, sei es in toto oder nur an einer abgegrenzten Stelle verursacht sein.

Hirndruck kann, abgesehen von den krankhaften Zuständen der Knochen, pathologischen Neubildungen im Innern, die uns natürlich hier nicht interessiren, herbeigeführt werden durch Anwesenheit fremder Körper, durch Lageveränderung der knöchernen Wandungen, durch Infraction mit Eindruck, durch Fracturen mit Dislocation, durch isolirten Glastafelbruch, durch Ansammlung von Flüssigkeiten im freien Raum der Schädelhöhle oder innerhalb des Gehirns selbst, durch intracranielle Blutungen, Extravasate, durch Circulationsstörungen, venöse Stauungen, Ueberfüllung der Gefässe, hierdurch verlangsamten Blutlauf, durch zu beträchtliche Absonderung der Cerebrospinalflüssigkeit, Durchfeuchtungen, durch seröse Ergüsse, durch Entzündungsproducte, Eiterablagerung, Abscessbildung. — Verschiedene Zustände ziehen somit Hirndruck nach sich und es werden deshalb auch den ursächlichen Verhältnissen, der Ausbreitung des Druckes, dem Sitze desselben, der weiteren Entwicklung der Processe entsprechend die für die Hirncompression charakteristischen Erscheinungen: Benommensein des Kopfes, Veränderungen in der geistigen Sphäre, Apathie, Schlafsucht, Bewusstlosigkeit, Coma, Sopor, verbunden mit geröthetem Gesicht, erweiterten Pupillen, mit späterer Entwicklung der Stauungspapille am Eintritte des Opticus, erhöhter Körpertemperatur, schnarchender, langsamer Respiration mit Blasen der Lippen, mit vollem langsamem Puls, Empfindungslosigkeit, Lähmung verschiedener Körpertheile nach hin und wieder vorausgegangenen Convulsionen etc. nicht immer in ihrer ganzen Vollständigkeit und Intensität, nicht stets schon beim Setzen des Traumas, sondern häufig während des weiteren Verlaufes und im Einklang mit den localen Störungen, der alterirten Function der getroffenen Hirnstelle wahrgenommen. — Manchmal zeigen sich zuerst auch Symptome von Hirnreiz, die aber oft rasch in jene der Compression übergehen; es entstehen nämlich Circulationsstörungen und in Folge dieser solche der Ernährung der betreffenden Hirnpartie. Für kurze Zeit erträgt oft das Gehirn einen beträchtlichen Druck, nach einiger Zeit müssen sich aber üble Folgen, wie: Atrophie, Erweichung, Vereiterung der comprimirten Gewebe, einstellen. Man darf sich deshalb nicht mit der Kenntniss der wichtigsten Erscheinungen des

Hirndruckes zufriedenstellen, sondern muss die als Ursache wirkenden Störungen, den physiologischen Process stets ins Auge fassen und die Art des Auftretes wie des weiteren Verlaufes richtig zu beurtheilen verstehen.

Betrachten wir deshalb etwas näher die hauptsächlichsten Vorgänge, durch welche Hirndruck erzeugt werden kann.

A. Hirndruck als Folge fremder, in die Schädelhöhle eingedrungener Körper.

Befinden sich fremde Körper in der Schädelhöhle, so richtet sich ihr Einfluss nach der Grösse, der Gestalt, der Beweglichkeit und dem Sitz; kleine, runde, stumpfe, festsitzende schaden durchschnittlich weniger als grosse, spitze und bewegliche. Ein unbedeutender oder langsam wirkender Druck wird bekanntlich vom Hirn oft gut, wogegen ein plötzlich verursachter, starker nur höchst selten ohne auffallenden Nachtheil ertragen. Gewöhnlich rufen die fremden Körper neben den Erscheinungen des Druckes auch solche localer Reizung, diese letztere macht sich oft zuerst bemerkbar, hervor. Ragen die fremden Körper nur in die Schädelhöhle hinein oder liegen sie zwischen Schädelwand und Dura, ohne Trennung der Hirnhüllen und Läsion des Gehirns, so sind die Verhältnisse als noch relativ günstige zu bezeichnen, da sich nicht immer weitere üble Folgen einer Meningitis purulenta, einer oberflächlichen Hirnvereiterung einstellen, das Gehirn sich allmählich an den Druck gewöhnt, der fremde Körper, wie ich es schon sah, einheilte oder auch im weiteren Verlaufe einem ärztlichen operativen Eingriffe zugänglicher wird und extrahirt werden kann, wie dies vor Kurzem dem Dr. Pilat in Orléans gelang. — Schuss in den Kopf, Wunde in der linken Occipito-parietal-Gegend, 8 Cm. nach hinten und oben vom äusseren Gehörgang, 1 Cm. gross. Man fühlte den entblössten Knochen und Splitter, ein Projektil fand man nicht. Gehirnerscheinungen bestanden nicht, nur Schwerhörigkeit auf dem linken Ohr. Die Wunde eiterte, Splitter gingen ab. Sieben Wochen später heftiger Kopfschmerz mit Fieber; bei der Untersuchung mit der Sonde fühlte man einen fremden Körper, der beweglich war, aber zu gross, um durch die Oeffnung im Knochen extrahirt zu werden. Trepanation. Langblei zwischen Schädeldach und Dura, etwa 1 Cm. von der Eingangsöffnung entfernt. Gehirn zurückgedrängt, intact. Heilung.

Ein Fall von Hirndruck durch Anwesenheit eines fremden Körpers erzeugt, hat sich bei uns in den letzten Jahren nicht zuge-
tragen.

B. Hirndruck in Folge von Infraction und Impression der Schädelknochen mit oder ohne Ablösung der Glastafel und ohne anderweitige Complicationen.

Aehnlich ist das Verhalten bei eingedrückten Schädelknochen. Sind grössere Partien der Schädelwand eingebrochen, niedergedrückt und pressen das Gehirn in grosser Ausdehnung zusammen, so machen sich natürlich die intensivsten und ausgebreitetsten Functionsstörungen bemerkbar; üben aber nur kleinere Knochenstücke durch unzweckmässige Lagerung eine Compression auf eine begrenzte Stelle des Gehirns aus, so lässt sich entweder dieser Insult bei einem hohen Grade von Druck augenblicklich durch Störung der Verrichtung des getroffenen Hirnthteils oder bei unbedeutender Dislocation auch erst später, meistens nach vorausgegangener Reizung, an den Folgen der Fluxion der alterirten Circulation und Nutrition der comprimierten Gebilde erkennen.

Sowohl bei isolirten Glastafelbrüchen als bei Infraction mit Ablösung der Tabula vitrea und bei vollkommener Fractur mit Eindruck und Splitterung bemerken wir öfters alsogleich die Compressionserscheinungen durch die gestörte Function des beleidigten Hirnbezirkes; wir nehmen sie aber auch in manchen Fällen erst wahr, wenn sich in der Tiefe schon purulente Producte im Bereiche der Hirnhüllen oder des Gehirns selbst gebildet haben.

Casuistik.

L. Nr. 57. II. 2. B. F. a. H. b. β .

Gefreiter Kubach erhielt am Abend des 2. November 1873 einen Stich mit einem grossen Taschenmesser auf den Kopf und brach sogleich bewusstlos zusammen. Es fand sich eine geradlinige, scharf-randige $6\frac{1}{2}$ Cm. lange Wunde am Scheitel nach dem linken Ohr zu verlaufend, in deren Mitte man mit dem kleinen Finger zwischen zwei scharfen Knochenrändern eindringen konnte. Dabei bestand ein soporöser Zustand, hin und wieder durch convulsivische Anfälle unterbrochen. Patient kam unter Anwendung von Eis und Blutegel im Laufe des folgenden Tages zum Bewusstsein, doch zeigt sich vollständige Aphasie; 2 Tage später Lähmungserscheinungen im Gebiete des Quintus, namentlich des Facialis linkerseits und Störungen der Motilität und Sensibilität im rechten Vorderarm und der Hand. Die rechte Pupille war erweitert, die linke reagirte unvollkommen, das Sensorium blieb weiterhin ganz frei, die Sprache stellte sich nur allmählich in mühsam lallender Weise ein; Patient sucht oft lange nach Worten und findet einzelne überhaupt nicht. Der Puls war von Anfang an verlangsamt und blieb zwischen 48—64, die Temperatur zwischen 36—37,2. — Die Wunde heilt allmählich unter mässiger Eiterung, die Lähmungserscheinungen gehen

zurück. Vom 18. Tage an macht die Besserung keine Fortschritte mehr und wird Patient zur elektrischen Behandlung ins Garnisonlazareth Carlsruhe aufgenommen. Hier wurde folgender Status praesens constatirt: Auf dem linken Scheitelbein, von der Sagittalnaht nach links unten vorn beinahe parallel der Kronennaht läuft eine etwa 6 Cm. lange rothe mit dem Knochen nicht verwachsene Narbe. Periostitische Auftreibungen unter der Narbe sind nicht fühlbar. Beide Pupillen reagiren gut, doch ist die rechte etwas weiter als die linke, die Zunge weicht beim Herausstrecken etwas nach rechts ab, das Zäpfchen steht gerade, die Gesichtsmuskeln arbeiten normal. Patient muss sich etwas länger, als üblich, auf die Antwort besinnen, gibt auch an, alle Fragen richtig und schnell zu percipiren; es fehlen ihm nur die Ausdrücke der Antwort oder auch die Kraft, sie augenblicklich und schnell auszusprechen. Gefühls- und Motilitätsstörungen bestehen nur noch am rechten Daumen, dessen Musculatur sichtbar atrophisch und dessen Druck schwächer ist als links. Tiefe Nadelstiche werden am ganzen Daumen und Daumenballen erst auf 3 Cm. Abstand als gesondert gefühlt, links in 0,5 Cm. und weniger, wie auch hier viel seichtere Stiche percipirt werden. Auch am rechten Vorderarm ist die Entfernung beider Spitzen eine weitere als links, widersprechend werden die Angaben bezüglich des Oberarmes. Temperatur- und Gewichtssinn intact. Elektromusculäre Erregbarkeit erhalten. — Anwendung des constanten Stromes während 5 Minuten Dauer theils auf den Daumen allein, theils auf den Vorderarm. Es stellt sich zunächst auf der Dorsal- dann auch auf der Volarseite des Daumens baldige und stets zunehmende Besserung des Gefühlsvermögens, langsamere der bestehenden Atrophie der Muskeln ein: nach 14 Tagen war die gesonderte Empfindung zweier Nadelspitzen auf 1—1½ Cm. beschränkt, auch die Sprache besserte sich. Eine in dieser Zeit auftretende Schmerzhaftigkeit und erbsengrosse Erhebung der Narbe war ohne Weiteres bald geschwunden. Nach 2 Monaten war die sichtbare Ungleichheit der Musculatur zwischen rechts und links fast geschwunden, die Anästhesie beseitigt und konnte Patient (nach 102 Tagen) als geheilt entlassen werden. Um denselben vor schädlichen Einflüssen zu schützen, ward er als zeitig dienstunbrauchbar bezeichnet.

Dieser Fall bietet in vieler Beziehung grosses Interesse.

Es besteht nämlich sogleich neben Bewusstlosigkeit (Folge der Erschütterung) auch Hirndruck und zwar ein bestimmt localisirter, circumscripiter, welcher nicht die Folge eines Extravasates, sondern nur die eines infracturirten Stückes der Glastafel, welche beim Eindringen des Instrumentes in die Schädelwand einbrach, sein kann, da alle Erscheinungen, wie der ganze Verlauf, für das Fehlen eines Blutergusses und einer directen Verletzung des Gehirns sprechen, sich dagegen von Anfang an gleich Symptome einer längere Zeit andauernden Functionsstörung ganz eng begrenzter Hirnbezirke bemerkbar machen. Es zeigt sich nicht allein augenblicklich nach Wiederkehr des Bewusstseins Aphasie, sondern es zeigen sich auch Lähmungs- und Reizungs-Erscheinungen, namentlich im Gebiete des

Facialis linkerseits und Störungen der Motilität und Sensibilität im rechten Vorderarm, namentlich der Hand. Bei zweckmässiger Behandlung bilden sich, da jegliche Complication fern gehalten wird, im Laufe der Zeit, in welcher sich die beleidigte Hirnstelle nach und nach durch veränderte Kreislaufs-Verhältnisse an den Druck gewöhnt, die Störungen zurück.

Wie wir wissen hat vorzugsweise das Centrum für das Sprachvermögen seinen Sitz in der 3. linken Stirnwindung und befindet sich nach Hitzig das Centrum für den Facialis in dem supra-Sylvischen Gyrus. Dieses letztere soll bei Verletzungen in der Höhe des Scheitellappens nothleiden und von Motilitäts-Störungen im Bereiche der Zungen- und Mundmuskeln, sowie von Krämpfen, Zuckungen, Lähmungen besonderer Muskelgruppen an den oberen Gliedmassen begleitet sein. Die Verletzung im vorliegenden Falle befindet sich gerade in der bezeichneten Gegend und bewirkte deshalb auch die schon beschriebenen Functionsstörungen in dem genannten Gebiete.

Wenn ich auch Brown Séquard bezüglich des Broca'schen Sprachcentrums in der 3. linken Centralwindung, insofern dasselbe nicht das einzige sei, auch bei Läsionen anderer Hirnpartien Sprachstörungen herbeigeführt werden können, beistimmen muss, da ich schon Aphasie beobachtete bei wirklich intacter 3. Stirnwindung, so möchte ich aber nicht seinem Ausspruche, dass man an den verschiedensten Hirnstellen die gleiche Art von Beeinträchtigung der Function, von Lähmungen, hervorrufen könne, dass man deshalb aus diesen auf eine bestimmte Läsion nicht zurückschliessen könne, dass die Nervenzellen, welche einer bestimmten Function vorstehen, nicht an einer circumscripten Stelle des Gehirns angehäuft, sondern über das Gehirn ausgestreut und mit einander verbunden sind, im Principe beitreten. Die Beobachtungen am Krankenbette, wie namentlich die Versuche an Thieren, haben ja das Bestehen bestimmter Hirncentren ausser allen Zweifel gestellt, und gerade der vorliegende Fall lieferte hierfür wieder einen neuen Beweis. Ob sich sog. Filialen der bis jetzt bekannten Centren in anderen Hirnpartien vorfinden und durch bestimmte Leitungsbahnen mit den Hauptcentren in Verbindung stehen, bleibt späteren Forschungen vorbehalten.

Da es nicht ohne Interesse sein kann bezüglich der Aphasie und der Störungen im Bereiche des Facialis bei Verletzungen der Scheitelgegend und einem entsprechenden Druck auf die unterliegende Hirnpartie oder einer directen Beleidigung derselben überzeugende Beweise zu erhalten, so theile ich hier noch 2 weitere

dahin bezügliche Fälle mit; der eine stammt aus meiner Privatpraxis, der andere wurde im 9. Jahrgang der Memorabilien von einem Collegen veröffentlicht.

a) Geheilte Fraktur der Schädelbasis bei gleichzeitiger Fractur des rechten Stirn-, Scheitel- und Schläfenbeins mit Impression durch Auffallen eines 6 Pfund schweren Beils. Keine Bewusstlosigkeit; trotz Blutung aus der Wunde kehrt der Verletzte erst eine Stunde später in die Wohnung zurück. Sprache gleich undeutlich, linke obere Gliedmasse gar nicht, die entsprechende untere nur schwer beweglich. Blutung aus dem rechten Ohr, nachher Abfluss seröser gelblicher Flüssigkeit, Bewegungen der Zunge mühsam, Spitze derselben nach links gerichtet, Schlingen erschwert, beständiger Abfluss des Speichels aus dem linken Mundwinkel, Pupille rechts erweitert, klonische Krämpfe im Bereiche des rechten Facialis. Langsamer, voller Puls, 45 Schläge, Athmung verlangsamt. Es bestehen alle Erscheinungen eines partiellen Hirndrucks, sowie auch solche einer Fractur der Schädelbasis. Bei entsprechender Behandlung (Kälte, Blutegel, salinische Mittel, blande Kost) bilden sich im Laufe mehrerer Wochen nach und nach die bedenklichen Symptome zurück. Der Ausfluss aus dem Ohr, später sogar von eitrigem Beschaffenheit, hörte erst in der 5. Woche auf. Heilung vollkommen. — In diesem Falle verursachte die Fractur an der Basis zwar keine wesentlichen Störungen; der Haupteffect ward durch den Druck der Knochen auf das Gehirn im Bereiche der Scheitelgegend bewirkt.

b) Verletzung mittelst einer Misthacke. Verwundeter stürzte zusammen, ging aber bald nachher herum und that sogar noch eine Fuhre. Patient ist den Tag nachher bei Besinnung, aber stieren Blickes, kann nicht sprechen, gibt unartikulierte Töne von sich; Puls träge, voll, Athem ruhig, Pupille links erweitert, rechter Mundwinkel herabgezogen, die Zunge nach rechts geneigt, Bewegung des rechten Armes sehr langsam und mühsam. Auf der Höhe des linken Scheitelbeins eine kleine Wunde, in welcher die Sonde 2 Zoll tief eindringt. Die Parese des rechten Arms, die Verziehung des Mundes und das Abweichen der Zunge nach rechts, starre verzogene Pupille des linken Auges, die Unmöglichkeit zu sprechen sind hier in Verletzung des Facialis-Centrums, in jener des Bezirkes des Sprachvermögens, in Druck auf den Hirntheil, welcher seinen Einfluss auf den Augennerven derselben Seite und auf die Bewegung des Brustgliedes der entgegengesetzten Seite äussert, begründet.

Im letzten Feldzuge kam auch eine Schussfractur des linken Scheitelbeins mit Lähmung des linken Facialis und solcher

des rechten Arms, sowie mit gleichzeitiger Aphasie vor; die Somnolenz machte aber rasche Fortschritte und schon am 5. Tage erfolgte der Tod. Leider unterblieb die Obduction.

C. Hirndruck in Folge von Gefässzerreissung und hierdurch erfolgter Blutergiessung in die Schädelhöhle und in das Gehirn selbst, mit oder ohne gleichzeitige Zertrümmerung der Hirnsubstanz.

Durch eine hochgradige Erschütterung des Schädels, des Gehirns und seiner Hüllen, namentlich durch Continuitätsstörungen: penetrirende Wunden, Diastase der Nähte, Fracturen mit oder ohne gleichzeitige Dislocation der gebrochenen Knochen kommen Gefässzerreissungen und deshalb Blutungen zu Stande, welche je nach der Beschaffenheit der Verletzung entweder intracranielle bleiben, ihren Sitz zwischen Schädeldach und Dura, innerhalb der Hirnhüllen oder im Gehirn selbst haben, theils umschriebene Herde, theils freie, flächenförmige, über die Oberfläche des Gehirns verbreitete Ergüsse, oder solche an der Basis cranii in den Gruben derselben bilden, oder wegen gleichzeitig bestehender äusserer Wunde, oder begünstigt durch die anatomischen Verhältnisse der getroffenen Partie zu Tage treten und durch den Gesichtssinn wahrgenommen werden.

Quellen der Blutungen sind vorzugsweise Rupturen und oft durch das verletzende Instrument selbst verursachte Trennungen von Schlagadern, Blutadern, Blutleitern, aber auch kleinere Gefässe des Gehirns liefern häufig störende Hämorrhagien. Diese Blutungen treten, meistens als primäre, alsogleich als Folge des mechanischen Insultes auf und rufen entsprechende Störungen hervor, sei es momentan, oder erst nach einiger Zeit wie bei hämorrhagischen Herden im Marklager nach vorgeschrittener eitriger Umwandlung, sie können sich aber auch als consecutive erst in einer späteren Zeit, im weiteren Verlaufe durch Einwirkung von scharfen Splittern auf die Gefässwandungen oder bei weitgediehener Erweichung der Hirnsubstanz durch Arrosion der Gefässe einstellen. Desgleichen können, durch verschiedene Einflüsse veranlasst, den primären Hämorrhagien auch spätere sog. Nachschübe folgen.

Je nach der Wichtigkeit und der Lage des eröffneten oder zerrissenen Gefässes, des Hirnsinus, des ermöglichten Blutaustrittes, wird der Erguss, das Extravasat ein mehr oder weniger beträchtliches, mehr oder weniger flächenförmiges oder abgesacktes, scharf begrenztes, beutelförmiges sein. Von der Grösse der ergossenen Blutmasse wie vom Sitze derselben hängt natürlich die Intensität der Erscheinungen, der Hirncompression ab.

Ist die durch ihre anatomische Lage den Insulten sehr ausgesetzte Art. mening. media in ihrem Zusammenhange gestört, hat das Gehirn keine wahre Erschütterung erlitten, sind die Hirnhäute und das Gehirn nicht eingerissen, getrennt, so wird bei klarem Bewusstsein noch einige Zeit vortübergehen, bis sich nach und nach die Erscheinungen eines anfänglich beschränkten, dann aber auch totalen intensiven Hirndruckes, der oft ganz rasch den Tod zur Folge hat, bemerkbar machen. Bei verschiedenen Fällen habe ich beobachtet, wie Verletzte, als wäre ihnen nichts Besonderes passirt, nach dem erlittenen Insulte weitergingen und dann erst entweder nach Verlauf einiger Secunden, Minuten oder selbst längerer Zeit vom Schwindel erfaßt, zusammenbrachen und besinnungslos wurden, ihr Leben aushauchten. — In ähnlicher, aber nur viel rapiderer Weise, beinahe momentan, bewirkt eine Trennung der Art. fossae Sylvii oder der Carotis selbst den hochgradigsten Hirndruck und raschen Tod, namentlich wenn sich das Blut in die hintere Schädelgrube massenhaft ergiesst und daselbst eine Compression des Pons, des verlängerten Markes hervorruft.

Weniger stürmisch ist durchschnittlich der Vorgang bei Verletzung, Eröffnung der Blutleiter, bei Trennung von Venen, welche letzteren von stärkerem Kaliber als die entsprechenden Arterien von der Oberfläche des Gehirns stammen und durch die Pia ohne Schlingelung verlaufend, sich in den Längsblutleiter einsenken. Das Blut ergiesst sich dann zwischen einzelne Windungen des Gehirns, infiltrirt die Pia, breitet sich namentlich im Arachnoidealsacke aus und bildet somit ein flächenförmiges Extravasat von grösserem oder geringerem Umfang, von verschiedener Blutmenge. Es verstreicht deshalb immer einige Zeit, bis nach Setzen der Verletzung sich die Erscheinungen des sich allmählich steigernden Druckes: Schwindel, Erbrechen, Unbesinnlichkeit, Koma, oft mit Parese oder Paralyse verbunden, bemerkbar machen.¹⁾ Findet sich der beträchtliche Bluterguss an der Basis des Gehirns, am Boden der Schädelhöhle, sind die Subarachnoidealräume strotzend gefüllt, breitet sich der Erguss in den verschiedenen Gruben aus, zieht er gegen den Rückenmarkskanal hin, umfaßt er den Lebensknoten, so erweisen sich die Störungen bald als hochgradige, weil die Athem- und Herzthätigkeit wesentlich beeinträchtigt wird, die Circulation im Gehirn selbst mehr Noth

1) Die Erscheinungen sind allerdings hin und wieder in Folge des Bestehens weiterer Complicationen wie: Gehirnerschütterung, Fractur des Daches, der Basis, Läsion des Hirns selbst, getrübt.

leidet, deshalb bei bestehender Bewusstlosigkeit, bei trägem, vollem Pulse, schwachem Herzschlag, die Respiration eine sehr verlangsamte, schnarchende, stertoröse wird.

Hat die Blutung ihren Sitz im Gehirne selbst, in der Hirnsubstanz oder in den Kammern, so bewirkt sie der Intensität und der Stelle entsprechend, je nachdem einen localen oder ausgebreiteten Druck. Sind die Extravasate nur von sehr mässiger Ausdehnung, so sind auch die Erscheinungen momentan keine auffallenden, machen sich häufig erst im weiteren Verlauf bemerkbar; bei starken Blutungen treten aber die Symptome des Druckes ganz rapide auf. Die rasche, stürmische Wirkung gibt uns auch das Unterscheidungszeichen bei Spätblutungen einer Erweichung und Abscedirung der Hirnsubstanz gegenüber. Im Ganzen lassen sich die Blutergüsse in die Schädelhöhle mit ihrer Druckwirkung auf das Gehirn nicht schwer erkennen, wenn nicht gleichzeitig anderweitige schwere Verletzungen, weitere mannigfaltige Complicationen bestehen. Der Hirndruck macht sich nämlich nicht momentan, sondern erst eine gewisse, wenn auch kurze Zeit nach der Einwirkung der Gewalt, nicht wie bei Eindringen eines fremden Körpers in das Cavum, bei Infractio eines Knochenstückes augenblicklich bemerkbar, er bleibt dann gewöhnlich auch nicht für einige Zeit wie bei den anderen bezeichneten Veranlassungen ein localer, sondern breitet sich rasch aus und liefert deshalb bald unter Steigerung der Symptome das Bild einer totalen Compression des Gehirns.

Mässige Extravasate werden oft verhältnissmässig schnell von der Natur beseitigt, selbst grosse von beträchtlichem Umfange können zur Resorption gelangen, ohne dass sie, abgesehen von einer protrahirten Dauer der Compression, wesentliche Veränderungen zur Folge haben. Wirkliche Entzündung der Hirnhüllen mit Eiterung habe ich ohne gleichzeitige Läsion des Gehirns selbst bis jetzt nicht beobachtet. Meistens bleibt das ergossene Blut flüssig, selbst die Coagula lösen sich auf im weiteren Verlaufe, organisiren sich nicht. Einigemal konnte ich, wenn der Tod erst nach Wochen eintrat, bei der Obduction blutige Trübung der Hirnhüllen, schichtweise Auflagerung veränderter, verfärbter Blutzellen nebst flockigen Niederschlag, auch Verstopfung und Verschluss von kleinen Gefässen, ja einmal Obliteration des oberen Sichelblutleiters gegen das Foramen coecum hin nachweisen.

Bei beträchtlichen Ergüssen erfolgt sehr häufig schon in Bälde der Tod. So lange jedoch der Druck nur die vorderen Partien des Gehirns in ihren Functionen stört, sich auf die Oberfläche des Ge-

hirns beschränkt, dauert das Leben weiter an; macht sich derselbe aber, stetig umsichgreifend, im Bereiche der Medulla oblongata bemerkbar, so kann jeden Augenblick durch Aufhebung der Athem- und Herzthätigkeit, durch die unvollständige Ernährung und Erfrischung der Hirnsubstanz in Folge der gestörten Circulation der Tod seinen Einzug halten.

Was die Behandlung betrifft, so richtet sich dieselbe nach dem einzelnen Fall, nach den bestehenden Verhältnissen. Höchst selten dürfte behufs Stillung der Blutung zur Unterbindung des getrennten Gefässes, wie der Art. mening. med., also zu einem operativen Eingriffe Gelegenheit geboten sein, und die Trepanation zur Beseitigung des extravasirten Blutes in Anwendung zu bringen, findet schon längst keine Anhänger und Vertheidiger mehr, da abgesehen der Schwierigkeit die richtige Stelle zur Eröffnung des Schädels zu ermitteln, durch den erleichterten Zutritt der Luft nur eine wesentliche Verschlimmerung herbeigeführt, nämlich eine Zersetzung des ergossenen Blutes und hierdurch secundäre jauchige Meningitis angebahnt wird.

In den gegebenen Fällen bleibt es die Hauptsache die Blutung möglichst zum Stillstand zu bringen, möglichst zu verhindern, dass das Missverhältniss zwischen Hirn und Schädelhöhle grössere Dimensionen annehme, dass sich die venöse Stauung nicht steigere, dass der Druck nicht den höchsten Grad von Intensität erreicht. Ununterbrochene Anwendung der Kälte in Form von Eiscompressen, Eisbeutel oder von Berieselung, locale Blutentziehungen (Blutegel hinter die Ohren), um die Sinus zu entleeren, den venösen Abfluss zu erleichtern, ableitende, reizende Klystiere sind vorzüglich am Platze. Ueber die Wirkung des elektrischen Stromes im Bereiche des Sympathicus habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt. — Meistens bestehen übrigens gleichzeitig noch anderweitige wichtige Störungen sowohl im Bereiche des Schädelgehäuses, Daches wie Basis als auch des Gehirns selbst, und richtet sich dann die ärztliche Hülfe gleichfalls nach den hierdurch veranlassten Verhältnissen.

Casuistik.

Trennung der Arteria meningea media.

L. Nr. 58. II. 2. C. a. a. d. e. η. F. b. G. a. H. d.

P. Cohrs stürzte am 14. October 1873 Nachmittags 4 Uhr von einem hochbeladenen Artilleriewagen, dessen Pferde durchgingen, nach rückwärts herab, erlitt eine Kopfverletzung und verlor auf einige Zeit das Bewusstsein. Die Wunde nahe dem unteren Theile des linken Seitenwand-

beins ist sternförmig, Knochen nicht entblösst. Die Wunde wird mittelst 4 Nähte geschlossen. Patient ist sehr benommen, weiss nichts von der Verletzung, Puls auf einige 50 Schläge verlangsamt. Eisblasen auf den Kopf. Gegen Mitternacht 6—8 maliges Erbrechen, worauf das Bewusstsein gänzlich schwindet. Die Athemzüge verlangsamt, stertorös. Pupillen reagiren nicht mehr, das Gesicht wird blau und aufgetrieben. Gegen Morgen nehmen die Erscheinungen, namentlich die Cyanose, sehr zu. Aderlass ohne Erfolg. Letaler Ausgang 10 Uhr Morgens.

Obductionsprotokoll: Kräftiger Körper, Leichenstarre. An der hinteren unteren Seite der linken Kopfhälfte sieht man eine mit 4 Suturen geschlossene Risswunde. Nach Entfernung der Nähte zeigt sich die Kopfschwarte vom Periost abgelöst. Nach Entfernung der Beinhaut bemerkt man eine 5 Cm. lange Fissur des Seitenwandbeins, die nach oben gegen die Sutura pariet. geschlängelt endigt, nach unten mit breiter Basis in die Sutura squamos. übergeht. Letztere selbst ist in ihrer ganzen Länge gelockert.

Schädelhöhle: Beim Durchsägen des Knochens fällt das obere Stück der Schuppe aus seinen Verbindungen. Die Schädeldecke ist im Verhältniss zu den anderen Körperknochen auffallend dünn und durchscheinend. Die Fissur auch an der Innenseite des Os pariet. deutlich sichtbar und ohne Splitterung. Gleichsam als Fortsetzung derselben ist die Sutura spheno-palatina, besonders nach Vergleichung mit der anderen Seite erheblich auseinander gewichen. Nach Entfernung des Daches quillt eine Blutmasse hervor, welche links zwischen Cranium und Dura sitzt, nach oben bis zur Falx cerebri reicht und nach unten die ganze mittlere Schädelgrube ausfüllt. Sie entspricht dem Verlaufe der Art. meningea media, welche eingerissen ist. Die grösste Dicke des Extravasates beträgt 2 Cm. Diesem Ergüsse entsprechend ist die linke Hemisphäre sehr erheblich comprimirt, die Gyri fast verstrichen, die Hirnsubstanz blutleer und bedeutend weicher als normal. Im rechten Ventrikel circa 30 Grm. klarer Flüssigkeit; an der Basis rechts zwei kleine hämorrhagische Herde unter der Pia, welche die Hirnmasse theils suffundirt, theils zertrümmert haben, und zwar findet sich der eine dieser Herde am Stirn-, der andere am Schläfenlappen. Ein gleiches Extravasat besteht auch an der Basis des linken Stirnlappens. Alle übrigen Hirntheile, wie auch die Med. oblong. zeigen keine Anomalien. Brust- und Bauchhöhle bieten nichts Pathologisches.

Der vorliegende Fall bietet ein gutes Beispiel von unreiner Hirnerschütterung mit Gefässzerreissung, unbedeutenden hämorrhagischen Herden und capillären Apoplexien innerhalb der Hirnhüllen und der Gehirnmasse selbst, demnächst aber von Hirndruck in Folge Zerreissung der Art. meningea media. Der Bluterguss machte sich anfänglich nur in mässigem Grade bemerkbar, gewann aber an Intensität durch Nachschub, als Erbrechen eingetreten.

L. Nr. 59. II. 2. C. a. a. β. δ. ε. η. F. b. H. d.

Artillerist Schultheiss machte zuerst eine Pneumonie durch, acquirirte alsdann einen Typhus und stürzte im Delirium Nachts aus dem Fenster, fiel hierbei aus einer Höhe von etwa 5 1/2 Meter mit dem Kopf voraus aufs Pflaster. Während des Transportes nach dem Zimmer stöhnte er fort-

während tief, ins Bett verbracht, fing er an zu reden und reagirte auf Ansprechen, streckte die Zunge heraus, verlor aber allmählich während der Untersuchung das Bewusstsein. Auf der rechten Seite des Stirnbeins, von der Kronennaht schräg nach dem Stirnbeinhöcker verläuft eine $1\frac{1}{2}$ bis 2 Zoll lange Wunde mit gequetschten, zerrissenen Rändern, aus der eine ziemlich beträchtliche Blutung erfolgte. Während der Wunduntersuchung bildete sich eine bläulichrothe Anschwellung in der rechten Schläfengrube und zuletzt eine dunkelblaue Schwellung des unteren Augenhidles. Beim Husten wird etwas Blut ausgeworfen. Die Pupillenreaction träge, Respiration schnarchend, erfolgte unter Zuhülfenahme aller accessoirischen Athemmuskeln; der Puls sehr langsam und voll, 56 Schläge. Unter Steigerung des intensiven Hirndrucks, den comatösen Erscheinungen, einer Pulsfrequenz von 40, Respiration 6—8, erfolgte in der 6. Stunde der Tod. Reizmittel übten gar keinen Einfluss.

Obduction: Bei der äusseren Besichtigung ergeben sich die erwähnten Beschädigungen. Nach Entfernung der Galea findet sich der äusseren Wunde entsprechend eine etwa handgrosse Blutsugillation, die sich nach unten in den rechten Schläfenmuskel und in die Fossa maxill. canina und pterygopalatin. sowie in sämtliche Gebilde des Bodens der Orbita erstreckt. Rechts von der Mitte der Kranznaht beginnt eine Depression des Stirnbeins mit Diastase des übrigen Theils der Kranznaht; von hier aus zieht eine nicht ganz geradlinige Fissur, die ganze Dicke des Knochens durchdringend, in der Richtung der Sutura coron. im unteren Theile etwas nach hinten abweichend bis zum Foramen spinos. hin. Eine zweite Fissur zieht von jener und zwar aus dem mittleren Verlaufsgebiet der Art. mening. media in sagittaler Richtung nach vorn 2 Zoll ins Stirnbein hinein, ferner durchsetzen zwei Fissuren die Lamina externa in der unteren Ecke des rechten Scheitelbeins. Am Foramen infraorbitale ein zwanzigpfennigstückgrosser Splitter ausgebrochen. Das Antrum Highmori mit geronnenem Blute gefüllt. — Die Dura mater haftet im ganzen festen Knochen; doch in der mittleren Schädelgrube, in der Umgebung der Art. meningea media ist sie in 2 Zoll Durchmesser vom Knochen abgehoben durch ein beträchtliches Extravasat. Ein ebenso grosses findet sich am hinteren Theile des rechten Schläfenlappens zwischen Dura und Pia, welches an mehreren Stellen die letztere durchbohrt und sich in die Rindensubstanz des Hirns fortsetzt und mit kirsch kerngrossen Herden die Hirnmasse zertrümmert hat. Die Hirnmasse ist fest, derb, mit vielen Blutpunkten durchsät, die Ventrikel leer, im Pons ziemlich zahlreiche hirsekorn- bis apfelkerngrosse hämorrhagische Herde.

In diesem complicirten Falle wurde nicht allein die Blutung von der Art. meningea media, sondern auch durch getrennte Gefässe der Pia geliefert. Charakteristisch das allmähliche Auftreten des Hirndrucks und dessen Steigerung.

L. Nr. 60. II. 2. C. a. a. η. F. b. H. d.

Ein junger Mensch erhielt im Zustand der Trunkenheit und einer heftigen Gemüthsbewegung mittelst eines Steines einen starken Schlag auf das linke Scheitelbein in solcher Weise, dass ohne äussere Verletzung

Bruch des Knochens jedoch ohne Eindruck erfolgte. Der Beschädigte konnte nachher noch sprechen, richtige Antwort geben und unterstützt eine Strecke weit gehen. Erst zu Hause angekommen, verlor er das Bewusstsein, erbrach sich, hatte langsamen Puls und sehr erschwerte Respiration. Der Hirndruck steigerte sich rasch und führte schnell den Tod herbei.

Bei der Obduction fand sich ausser der Fractur ein grossartiges Extravasat zwischen Schädel und Dura. Zweige der Art. meningea media waren abgerissen. Im Gehirn fand sich nichts Pathologisches. — Schulfall von Hirndruck in Folge von Ruptur der Art. meningea media.

L. Nr. 61. II. 2. C. b. a. F. b. H. d.

Schlag mit einem Brett auf den Kopf eines jungen Landmannes. Bewusstlosigkeit mit Erscheinungen des Hirndrucks bis zum 2 Tage später eintretenden Tode andauernd. Grosses Blutextravasat zwischen Schädelwand und Dura; das Gehirn an einzelnen Stellen hierdurch mehrere Linien tief zusammengedrückt. Die Schlagadern abgerissen.

L. Nr. 62. II. 2. C. a. a. d. η. F. b. H. d.

Sturz auf den Kopf. Erscheinungen eines intensiven Hirndrucks. Tod nach einigen Stunden. Abgesehen von Sprüngen im Schädeldach und einer Fractur, oberflächlichen Hirnläsionen, kolossales Blutextravasat zwischen Cranium und Dura durch Zerreißung der Art. meningea media.

L. Nr. 63. II. 2. C. a. a. η. F. b. H. d.

Schlag mit einer Hacke auf die linke Schläfen- und Scheitelgegend. Gehirnerschütterung unbedeutend; der Verletzte geht noch in sein nahe gelegenes Haus und wollte sich auf die Ofenbank setzen; jetzt erst stellen sich rasch die Erscheinungen eines intensiven Hirndrucks ein, der Geschlagene bricht bewusstlos zusammen und stirbt nach einigen Stunden. Bei der Section fand sich, abgesehen von einer Continuitätsstörung des Schädels ein kolossales Extravasat zwischen Cranium und Dura in Folge Trennung der Art. meningea media. Sehr belehrender Schulfall.

In 2 Fällen von Schussverletzungen beobachtete ich durch Trennung der Art. meningea media tödtliche Blutungen, ohne dass das Geschoss das Gehirn selbst lädirt hatte.

Trennung der Arteria fossae Sylvii und der Carotis interna selbst.

L. Nr. 64. II. 2. C. a. β. δ. ε. F. b. H. d.

Sturz eines Officiers vom Pferde auf das Steinpflaster. Erscheinungen hochgradigen Hirndrucks, unter welchen auch in Bälde der Tod erfolgte. Section: Grossartiges Extravasat in die Schädelhöhle, auch unterhalb des Zeltes und des kleinen Gehirns und verlängerten Markes in Folge von Zerreißung der Art. fossae Sylvii und einzelner Venen. Gleichzeitig Diastase der Stirnnaht mit Eindruck und deshalb bewirkter directer Hirnquetschung.

L. Nr. 65. II. C. a. β. δ. F. a. H. d.

Stichwunde durch das Schädeldach tief in das Gehirn eindringend

und die Carotis interna und ihre Aeste trennend mittelst eines starken Dolches. Die Klinge hatte den ganzen rechten vorderen Hirnlappen passiert. Enormer Bluterguss, dem ein rapider Tod unter den Erscheinungen intensiven Hirndrucks folgte.

Trennung und Zerreissung von Blutadern und Blutleiter.

L. Nr. 66. II. 2. C. b. β . F. b. H. b.

Füsilier Schwellenbach fiel vom Querbaum herab, erhob sich nach einigen Secunden, ging ohne Hülfe nach seinem Zimmer und legte sich daselbst zu Bett nur über Kopfweh klagend. Nach einiger Zeit fing er aber an zu phantasiren und lag bewusstlos im Bett, die Pupillen weit, reactionslos, Puls voll mit 62 Schlägen. Antiphlogose und Ableitungen beseitigen im weiteren Verlaufe die Bewusstlosigkeit bis auf ein unangenehmes Gefühl im Kopfe, die Pupillen reagiren wieder, doch ist die linke noch weiter als die rechte, der Puls noch verlangsamt. Im Laufe von einigen Tagen wesentliche Besserung; nach 3 Wochen Entlassung.

Hier hatte jedenfalls die Trennung einer Vene der Pia mit nachfolgendem begrenzten flächenförmigen Extravasat stattgefunden. Die Zeit des Eintrittes der Erscheinungen, die Steigerung derselben, welche in einem zwar kurz andauernden Hirndrucke gipfelte, sprechen dafür.

L. Nr. 67, II. 2. C. a. β . δ . ϑ . F. b. H. d.

Dragoner Kaltenbrunn fiel in der Trunkenheit vom Heuboden in einen Pferdestand und blieb einige Zeit bewusstlos liegen. Bei der Lazarethaufnahme bestanden: 1) oberflächliche Hautabschürfungen an der Nase, zwischen den Augen und am rechten Handgelenk, hier mit starken Sugillationen verbunden, 2) Blutung aus der Nase, Mund und Ohr, hier zugleich Ausfluss seröser Flüssigkeit, 3) leichte Parese des linken Facialis, 4) Schmerzen über den ganzen Kopf hin, 5) Druckschmerz am Rücken. Es besteht Hirndruck mit Somnolenz und Sopor. Der seröse Ausfluss aus dem linken Ohr dauert auch den folgenden Tag an; Patient wird unruhig, delirirt abwechselnd. Meine Diagnose ging dahin, dass hier bei Bruch der Schädelbasis ein beträchtliches Extravasat Ursache des Hirndrucks sei, dass auch anderweitige Hirnläsionen bestehen dürften. Das Coma nimmt zu, die ganze linke Körperhälfte ist paralysirt, die Pupillen starr, erweitert, der Ausfluss aus dem Ohr serös, blutig, zuletzt eiterig. Am 6. Tag erfolgt der Tod.

Section: Gefunden wurde ein erheblicher Sprung im linken Felsenbein, von der Spitze der oberen Fläche nach der Schuppe und noch 1 Zoll in diese hinein sich erstreckend und zwar durch die ganze Dicke des Knochens; ferner ein Sprung im linken grossen Keilbeinflügel und endlich noch ein querer im rechten grossen Flügel. Auf der linken Hemisphäre ein bedeutendes Extravasat und ausserdem ein sechskreuzergrosser Defect in der Hirnsubstanz.

Hier bestanden mehrfache Verletzungen. Der hochgradige Hirndruck, welcher sich bald nach dem Trauma bemerkbar machte, ward

durch Ruptur von Pia-Gefässen und entsprechendem Bluterguss bewirkt. Ausser dieser Läsion und einem hämorrhagischen Herd in der Hirnrinde fanden sich auch beträchtliche Störungen im Zusammenhange der Knochenblase, namentlich im Bereiche der Basis, welche sich schon während des Lebens durch die lange andauernde Blutung aus dem Ohr, durch den charakteristischen Abfluss serös-blutiger Flüssigkeit aus demselben erkennen liessen.

L. Nr. 68. II. 2. C. b. β . δ . F. b. H. d.

Dragoner Müller wurde in der grossen Reitbahn vom Pferde mit dem Kopfe gegen die Bande geworfen, soll darauf noch ein paar Schritte dem Pferde nachgelaufen und dann erst bewusstlos zusammengestürzt sein. Seine Aufnahme in das Lazareth erfolgte sofort. — Bei der Aufnahme ist Patient vollständig bewusstlos, Athem stockend, unregelmässig, röchelnd; Puls langsam, aussetzend, 62. Nirgends eine Verletzung nachweisbar, nur auf dem rechten Stirnhöcker eine rasch anschwellende Beule. Eine Viertelstunde nach der Aufnahme tritt Würgen und Erbrechen ein. Eis auf den Kopf, Senfteig auf die Waden. Respiration wird bald schlechter, aussetzender, röchelnd, es tritt Muskelzittern ein, Puls klein, aussetzend. Während eines vorgenommenen Aderlasses stockt die Athmung, obgleich das Blut reichlich fliesst, und muss die künstliche Athmung eingeleitet werden. Tod nach 2½ Stunden.

Obduction. Beim Abziehen der Galea zeigt sich über dem rechten Stirnhöcker etwas Blutextravasat und leichte Quetschung der Weichtheile. Das Schädeldach ist normal dick und zeigt nirgends einen Eindruck oder Sprung. — Die Dura ist leicht ablösbar, die linke Hirnhemisphäre mit Ausnahme einer stärkeren Füllung der Venen normal. Bei Wegnahme der Dura von der rechten Grosshirnhemisphäre zeigt sich ein massenhafter Bluterguss zwischen den feinen Hirnhäuten, aus frischen Gerinnseln bestehend und im Betrag von mindestens 5 Esslöffeln. Nach Abspülung des Gerinnsels finden sich zwei Venen ganz in der Nähe ihrer Einsenkung in den grossen Längsblutleiter eingerissen. Die im Uebrigen unverletzte Hemisphäre ist besonders seitlich stark zusammengedrückt; in der Decke des rechten Seitenventrikels ist noch ein kleines erbsengrosses Extravasat, sonst sind die Ventrikel normal, mit geringer Menge gelblicher Flüssigkeit erfüllt. An der Schädelbasis nirgends eine Verletzung, ebenso wenig an Hals- und Rückenwirbeln. Organe der Brust- und Bauchhöhle normal.

Der Hirndruck mit raschem letalem Ausgange war hier durch Ruptur stärkerer Venen veranlasst. Die Erscheinungen des Druckes traten in charakteristischer Weise auf.

L. Nr. 69. II. 2. a. β . δ . η . θ . F. b. H. d.

Gefreiter Fürst stürzte um Mitternacht aus dem 2. Stock der Kaserne und wurde bewusstlos aufgehoben. An der äusseren Seite des rechten oberen Augenlides fand sich eine 2 Cm. quere Wunde mit scharfen

Rändern, welche den Knochen freilegte. Die Pupille dieses Auges ist weit und unempfindlich, die linke reagirt langsam. Die rechte Körperhälfte ist paretisch, der rechte Mundwinkel steht tiefer als der linke. In der folgenden Nacht Erbrechen, Patient vollständig soporös, lässt den Urin ins Bett. Einen Tag später das Gesicht dunkelblauroth, die Respiration sehr erschwert, so dass noch Abends 11 Uhr zu Ader gelassen und damit verhältnissmässige Erleichterung herbeigeführt wurde. Bald hierauf aber Athmung oberflächlich, Puls jagend, klein, die Augen stets geschlossen, leichtes Rasseln auf der Brust. Temperatur steigt von Stunde zu Stunde bis 41,8, Tod.

Section. Unterhalb des rechten oberen Augenhöhlenrandes läuft eine 2 Cm. lange mit Blut verklebte Wunde, Schürfungen der Haut auf der linken Seite der Stirn und linken Schläfe. Aus Mund und Nase quillt eine reichliche Menge flüssigen Blutes. Am inneren Knöchel des linken Fusses sind ebenfalls leichte Schürfungen wahrnehmbar.

Nach Ablösung der Kopfschwarte zeigt sich im Umkreis des rechten Schläfen- und Stirnbeins eine ausgebreitete Blutunterlaufung, auch Blutimbibition des Schläfenmuskels und der Kopfhaut. Ausser einer geringen Schürfung des Knochens ist ein Eindruck oder eine Fissur nicht zu entdecken, die harte Hirnhaut ist innig mit dem Schädel verwachsen und kann nur mit Gewalt von ihm getrennt werden. Die Oberfläche des Gehirns ist blutreich, die Venen strotzend gefüllt, das Gehirn turgescirend. Ueber den ganzen hinteren Umfang des Gehirns breitet sich ein Bluterguss aus; die weiche Hirnhaut ist enorm mit Blut infiltrirt. Vordere und mittlere Schädelgrube sind blutig tingirt, namentlich die mittlere linke, und ungefähr 1½ Esslöffel dunkelrothes Blut in der hinteren. Die obere Wand der rechten Augenhöhle ist gespalten hart hinter der Stirnhöhle vom vorderen Rande des Hahnenkamms bis zum äusseren Theile des Stirnbeins und 4 Cm. lang; der Knochen in der Umgebung dieser Fissur ist missfarben. An den Seiten des Gehirns, besonders links, ist die weiche Hirnhaut mit Blut ganz durchtränkt, auch die Hirnmasse selbst ist hier erweicht und zum Theil zertrümmert; die Consistenz der betreffenden Hirnwindung völlig matsch. Im linken Streifenhügel ist ein apoplektischer Herd von Erbsengrösse, im rechten Sehhügel ein ähnlicher stecknadelkopfgrosser, im linken einige bis zur Grösse eines Kirschkerns. Zwei weitere bohngengrosse Apoplexien finden sich in der Rindensubstanz beider Hemisphären. Die linke Pyramide ist in ihrer ganzen Länge gespalten.

In der Bauchhöhle sind alle nach hinten unten gelegene Partien und Organe blauroth gefärbt, mit Blut durchsetzt, zwischen den Fasern des rechten Psoasmuskels sind zahlreiche Blutgerinnungen, im kleinen Becken bis vor die Blase dunkelrothes flüssiges Blut.

Hier führte ein intracranieller Druck in Folge von beträchtlichem freien Bluterguss, von ausgebreiteter Läsion, Zertrümmerung der Hirnsubstanz selbst den Tod herbei.

L. Nr. 70. II. 2. C. a. β . δ . η . F. b. H. d.

Am 6. April 1876 Mittags 12 Uhr zog sich Oberst B. durch Sturz aus dem Wagen eine schwere Schädelverletzung zu. Bei der Unter-

suchung fanden sich am Hinterhaupt zwei gequetschte Wunden, ziemlich parallel neben einander. Am ganzen Hinterkopf war ein bedeutendes Hämatom vorhanden. Fractur kann nicht nachgewiesen werden. Der Verletzte lag im tiefsten Sopor mit stertoröser Respiration, welche tiefe Betäubung vom Momente des Sturzes an dagewesen sein soll. Aus dem linken Ohr floss ebenfalls Blut aus. Die linke Pupille war verengt und reagirte nicht, die rechte beträchtlich erweitert. Puls voll und sehr verlangsamt, 58 Schläge. Der Sopor nahm rasch zu, es trat cyanotische Verfärbung der Ohren und Lippen ein und nach 18 Stunden erfolgte der Tod.

Obductionsbefund: Dem Wunsche der Familie gemäss beschränkte sich die Section auf die Eröffnung der Schädelhöhle. Das Ergebniss war folgendes: Auf der linken Hälfte des Os occipitis befinden sich zwei Wunden, unter der Kopfhaut ein Blutextravasat. Nach der Eröffnung des Schädels fand sich die Dura mater fast an ihrer ganzen oberen Fläche mit dem Schädel verwachsen. Die Hirnsinus und die Gefässe der Pia mater sind stark mit Blut überfüllt, auf den beiden Stirnlappen centimeterdicke schwartenartige Blutauflagerungen, geringere auf Scheitel- und Hinterhauptslappen. Nach Herausnahme des Gehirns zeigte sich die linke Fossa Sylvii, ebenso beide hintere Schädelgruben mit sehr reichlichem Blutextravasat gefüllt. Die Gehirnsubstanz ist stark durchfeuchtet, jedoch mässig bluthaltig, die Windungen zum Theil abgeplattet, in den Hirnhöhlen keine abnorme Flüssigkeitsansammlung. In der Mitte der unteren Fläche der linken Hemisphäre des kleinen Gehirns ein haselnussgrosser Blutherd, umgeben von zertrümmerter Hirnsubstanz, einige ähnliche kleinere Herde in der rechten Grosshirnhemisphäre. — Am abgehobenen Schädeldache sieht man eine vom hinteren Winkel des linken Scheitelbeins ausgehende zum Hinterhauptsbein verlaufende Fissur, welche, je mehr sie sich dem Hinterhauptsloche nähert, um so klaffender wird und am Foramen jugulare endet. Im Foramen jugulare selbst befanden sich in Verbindung mit den daselbst mündenden Sinus stärkere, fest anhaftende Gerinnsel, so dass hierselbst jedenfalls eine Zerreißung stärkerer venöser Gefässe stattgefunden haben musste, aus welchen die bedeutende Blutung zu erklären ist.

Belehrender Fall von intensivstem Hirndruck in Folge von beträchtlichem freiem Bluterguss innerhalb der Hirnhüllen, in die Schädelgruben durch Zerreißung stärkerer Venen am Foramen jugulare bewirkt. Die Erscheinungen des Sopors wie jene des Druckes auf das verlängerte Mark steigern sich stetig und verursachen in Bälde den letalen Ausgang.

L. Nr. 71. II. 2. C. a. *a. β. δ. η. θ. F. b. H. d.*

Unterrossarzt St. fiel in der Nacht vom 7. zum 8. September 1874 in einen 12 Stufen tiefen Keller seiner Kaserne und blieb daselbst von Mitternacht bis Morgens 6 Uhr liegen, zu welcher Zeit ihn eine Frau anscheinend schlafend auffand, mit den Beinen auf der zweiten Stufe, mit dem Kopfe am Boden des Kellers. Erweckt, wurde er nach seinem Zimmer

geführt; dabei machte er den Eindruck eines Betrunkenen. Ins Bett gelegt, schlief er und erbrach sich zeitweise. Erst nach 2 Tagen, als die Umgebung bemerkte, dass Patient völlig bewusstlos sei, Faeces und Urin unter sich liess, wurde die Aufnahme ins Lazareth bewirkt. Man fand nun in der Mitte der Scheitelgegend eine kleine offene Wunde, ausserdem einige Hautabschürfungen. Patient lag unter den Erscheinungen eines ausgebreiteten Hirndruckes theilnahmlos auf dem Rücken, die Augen geschlossen, der Mund wenig geöffnet, Puls klein (60), Respiration regelmässig. Von Zeit zu Zeit machte er schwache Bewegungen, wandte auch den Kopf nach den ihn Anrufenden, öffnete auf Geheiss die Augen. Die Antworten erfolgten langsam, erst auf 2—3 maliges Befragen. Trotz Eis und Ableitungen war Patient während der Nacht unruhig.

Einige Tage später traten bei kleinem Puls (56) Abends tetanische Zuckungen im ganzen Körper ein mit Schaum vor dem Munde, die Lider geöffnet, die Bulbi nach oben rotirt, Pupillen weit, der ganze Körper kalt, das Gesicht cyanotisch, der Athem kurz, stöhnend, mit langen Intervallen. Puls sehr unregelmässig, klein, bald 120—130, bald 50—60 und öfters aussetzend (abwechselnder Druck und Reizung des Vaguskerens, der verschiedenen Centren in der Medulla, auch des Krampfcentrums im Pons). Der Anfall wiederholte sich noch einmal, aber schwächer. Da am Morgen bei der Visite das Gesicht noch sehr geröthet und heiss ist, wurden sechs Blutegel hinter die Ohren gesetzt, die man lange nachbluten liess, worauf Ruhe eintrat. — Den 5. Tag war die Temperatur auf 39,2 gestiegen, sank aber Abends auf 37,8 und hielt sich auch weitere 10 Tage auf dieser Höhe bei schwankendem Puls. In gleicher Weise schwankte der Allgemeinzustand; war Patient heute ruhig, sogar besinnlich, so ward er bald wieder benommen, völlig theilnahmlos oder Nachts in Delirien befangen. Am 15. Tage wurde nach einem verhältnissmässig recht günstigen Vormittage die Temperatur höher, stieg auf 39,6, der Puls wurde rascher, kleiner (136), die Respiration beschleunigt. Senfteige auf Brust und Waden hatten nur geringe Besserung zur Folge. Das Fieber blieb stets hoch, über 40 (40,9), der Puls ausserordentlich rasch und klein (120—130), Respiration stertorös, das Gesicht blass, die Wangen eingefallen; am 18. Tage erfolgte der tödtliche Ausgang.

Sectionsbefund. Leiche gross, von kräftigem Körperbau, gut entwickelter Musculatur; geringe Todtenflecke, mässige Starre. In der Mitte des rechten Scheitelbeins, etwas näher an der Sutura sagittalis ist eine kleine festvernarbte Wunde. Das Gewebe darunter mit Blut durchsetzt, Schädelknochen sehr dick und schwer. Bei Eröffnung der Schädelhöhle fallen geringe Mengen schwarzen halbflüssigen Blutes zu Boden, die Dura wie die innere Fläche des Craniums rechterseits sind mit geronnenem Blut reichlich bedeckt. Auf der rechten Seite ein etwa Centimeter langer Riss in der harten Haut. Die Oberfläche des Gehirns selbst ist auf beiden Seiten mit theils geronnenem, theils mit flüssigem Blut in reichlicher Quantität überzogen, die Gyri abgeflacht, die Pia stark injicirt, an der Basis sehr getrübt. Nach Entfernung des Gehirns zeigt sich das Blut bis zur Medulla oblongata und den Rückenmarkskanal ergossen. An der Spitze der beiden Schläfenlappen und des rechten Hinterlappens ist die Rindensubstanz dunkelgefärbt, zu einer breiigen Masse er-

weicht und zwar rechts bis zur Markmasse hin. Am linken Vorderlappen ist die Erweichung fast bis zur Fossa Sylvii ausgedehnt, während sie an den übrigen genannten Stellen die Grösse eines Thalerstückes nicht überschreitet. Am rechten Hinterlappen fand sich ein etwa bohnergrosser Eiterherd. Im Uebrigen ist die Hirnsubstanz feucht, blutreich, von normaler Consistenz. — Am rechten Scheitelbeine befindet sich eine 17 Cm. lange Fissur, welche nach hinten unten zur Sutura lambdoidea verläuft, diese am Sulcus transversus wieder verlässt und sich demnächst in zwei kleine Aeste spaltet, von welchem der eine parallel mit der Pyramide laufend im Foramen jugulare endet, der andere zum Foramen magnum sich windet. In Brust- und Bauchhöhle Alles in Ordnung.

Hier haben wir es mit einem complicirten Falle zu thun. Da der Verletzte mehrere Stunden hilflos dalag, die bei dem Insulte augenblicklich auftretenden Cerebralerscheinungen nicht beobachtet werden konnten, so musste bei der ersten Besichtigung schon sowohl an das Bestehen einer unreinen Hirnerschütterung mit Läsion des Gehirns selbst, als an jenes eines ausgebreiteten freien Extravasates gedacht werden, da sich die intracraniellen Drucksymptome, hin und wieder durch Reizerscheinungen, selbst heftigen Convulsionen unterbrochen, vorzugsweise bemerkbar machten. Ob und in welcher Weise das Schädelgehäuse Noth gelitten habe, konnte wegen Mangel entsprechender äusserer Beschädigung nicht ermittelt werden, war auch ohne jegliche Bedeutung, weil nur von der Wichtigkeit der inneren Verletzungen der weitere Verlauf abhing. Die Vorhersage ward gleich von mir als eine sehr dubiose, schlimme gestellt.

Im weiteren Verlaufe machten sich dann nicht unbedeutende Circulationsstörungen, die theilweise mit Erfolg bekämpft wurden, bemerkbar. Vorübergehend schien sich auch in Folge von Resorption des ergossenen Blutes der Hirndruck zu mässigen; die Erscheinungen von Hirnläsionen (Zuckungen, Rotation des Bulbus nach aufwärts, geistige Theilnahmlosigkeit mit Delirien wechselnd) blieben aber constant. Als sich der Bluterguss, welcher sowohl zwischen Dura und Cranium als innerhalb der Hirnhüllen seinen Sitz hatte, durch Verflüssigung des Blutes gegen den Pons hin mehr ausbreitete und bis in den Wirbelkanal erstreckte, traten die Symptome von Alteration der Vaguswurzeln, des Athmungscentrums ein und erfolgte der Tod.

L. Nr. 72. II. 2. C. b. β . γ . F. b. H. d.

Sturz mehrere Fuss hoch auf den Schädel; rasch eintretender Hirndruck. Nach einigen Stunden Tod. Bei der Obduction fand sich Zerreissung des linken Querblutleiters mit grossartigem Bluterguss. Das Knochengestütze wie das Gehirn selbst waren intact.

Fälle von consecutiven Blutungen, wie mir solche früher vorkamen (einmal Anbohrung eines Blutleiters durch einen Splitter des zerbrochenen Hinterhauptbeins, das andere Mal Verletzung der Carotis interna in der Höhe des Türkensattels durch einen Splitter des Keilbeins mit rasch tödtlichem Ausgang), sind in den letzten Jahren nicht beobachtet worden.

**D. Hirndruck in Folge Zertrümmerung der Hirnmasse durch Druck.
Hirnquetschung mit nachfolgender Eiterung.**

Richter sprach zuerst von einer Quetschung des Gehirns bei Erschütterung; erst später machte namentlich Dupuytren auf eine solche wieder aufmerksam. Wie ich bereits bei der Hirnerschütterung in ausführlicher Weise auseinandersetzte, kann eine wirkliche Hirnquetschung nur zu Stande kommen, wenn entweder das verletzende Instrument selbst durch die Knochenblase dringt und eine Trennung des Gehirngewebes verursacht, oder wenn bei dem Insulte das Schädelgehäuse zerbrach und die eingedrückten Knochenstücke das Hirn selbst comprimiren. — Ist bei dem mechanischen Eingriff die harte Haut in ihrem Zusammenhange nicht gestört, unter ihr aber die Läsion erfolgt, so besteht die wahre Hirncontusion. Sind dagegen die Hirnhäute gleichzeitig getrennt, so ist die Verletzung als eine gequetschte Wunde des Gehirns zu bezeichnen, wie wir auch an anderen Körpertheilen einen Unterschied zwischen Quetschung (Continuitätsstörung durch Druck ohne Aufhebung der Cohäsion der Haut) und gequetschte Wunde (mit wirklicher Trennung der Haut und ermöglichter Blutung nach aussen) aufrecht erhalten.

Bei den durch directe Quetschung herbeigeführten Zusammenhangsstörungen, bei welchen sich meistens der mechanische Insult mehr localisirt erweist, deshalb auch nicht immer mit Hirnerschütterung verbunden ist, richten sich die Erscheinungen nach der Wichtigkeit der Hirnstelle, nach der Ausbreitung und dem etwa andauernden Einfluss des quetschenden Körpers, nach dem gestatteten Zutritt der Luft. Die oberflächliche Quetschung des Hirns ruft weder Schmerz, noch momentan eine Störung der Verrichtungen hervor, und wir besitzen, wenn nicht besondere Hirnbezirke afficirt sind, kein charakteristisches Zeichen, um diese Verletzungsart gleich von vornherein zu diagnosticiren; wir können sie nur den äusseren Wundverhältnissen, dem ursächlichen Momente entsprechend, vermuthen. Erst wenn die bekannten Circulations- und Ernährungsstörungen an der gequetschten Stelle vor sich gehen, sich ein Er-

nährungs- oder Eiterherd mit seinen Folgen formirt, die Affection sich bald nachher zu einer diffusen gestaltet, so ändert sich das Krankheitsbild. Ohne vorausgehende reine Reizungssymptome entsteht plötzlich bei nicht auffallend verändertem Pulse, oft ohne Fieber, hin und wieder unter einem Frostanfall, bei etwas eingenommenem Kopfe, Schwindel, Brechreiz, alsdann Schlafsucht, selbst Bewusstlosigkeit; der Patient kann nur mit Mühe für Augenblicke wach erhalten werden, fällt gleich wieder in Schlummer, von Delirien unterbrochen, und dieser geht später in Sopor über. Im Verhältnisse mit diesen Erscheinungen zeigen sich auch nach und nach jene der gestörten Verrichtung verschiedener Hirnbezirke und deshalb auch anderer Organe. Es erweitert sich die Pupille, die Iris reagirt nicht mehr gegen das Licht, Convulsionen und Paralysen treten auf, die Athmung wird dann bei Hirndruck überhaupt langsamer, stertorös, und nach vorgeschrittenen Infiltrationen des Hirns, hierdurch ausgeübten Druck auf das verlängerte Mark erfolgt der Tod.

Diese Erscheinungen von zuerst mehr localisirtem, später ausgebreitetem Hirndruck, welche in so vieler Beziehung grosse Aehnlichkeit mit jener bei Meningitis purulenta, Fortsetzung derselben auf die Oberfläche des Gehirns und namentlich mit jenen bei encephalitischen Herden, Abscessen haben, überraschen häufig den Arzt, da der Verlauf oft scheinbar ein ganz günstiger ist, die Patienten sich subjectiv wohl fühlen, selbst ihren Geschäften nachgehen, keine ärztliche Hülfe sogar in Anspruch nehmen. Um in solchen Fällen die Diagnose sichern zu können, ist es nöthig, dass der Verlauf von Anfang an mit Umsicht beobachtet werde, dass man die verschiedenen Symptome und den Eintritt derselben richtig zu würdigen weiss. Bei Hirnquetschung stellen sich die beschriebenen Symptome der Hirnläsion durchschnittlich früher ein als bei Fällen von Meningitis purulenta und Eiterablagerung auf die Hirnoberfläche, wenn dieselbe nicht Folge eines im Gehirn selbst sich entwickelnden Processes ist, wogegen sich bei den anderen Affectionen eher Reizerscheinungen als bei der Contusion wahrnehmen lassen. Die Störung der geistigen Verrichtungen, die Abnahme der Intelligenz, des Bewusstseins bietet auch bezüglich ihres Auftrittes einen Unterschied. Bei Hirnquetschung, also tiefem Hirnleiden, entwickelt sich viel rascher Sopor, wogegen bei Meningitis und Eiterablagerung auf die Hirnrinde das Bewusstsein und die Intelligenz oft noch ungestört fortbestehen, wenn schon andere Erscheinungen der Circulationsstörungen, des Druckes, Convulsionen wie Parese, selbst Lähmungen sich bemerkbar machen.

Bei den gequetschten Wunden ist die Diagnose durchschnittlich leichter zu stellen, da die Veränderungen eher dem Gesichts- und Tastsinn zugänglich sind, auch schon früher die Erscheinungen des Zerfalles, der Vereiterung der zertrümmerten Hirnmasse wahrgenommen werden.

Das ärztliche Verfahren richtet sich ganz nach den bestehenden Verhältnissen. Tritt trotz der umsichtigsten Abhaltung schädlicher Einflüsse, trotz der geeignetsten, prophylaktisch-antiphlogistischen Lebensweise die beschriebene Affection auf, macht sich der Sopor bald bemerkbar, so ist die Prognose als eine sehr schlechte zu stellen, da selbst, wenn der Sitz des Eiterherdes sicher zu bezeichnen ist, die Trepanation behufs Entleerung des Depots nicht leicht etwas fruchtet, weil die Störungen schon zu weit gediehen sind und sich nicht mehr zurückbilden lassen. Von einer richtigen, rechtzeitigen Beurtheilung des Zustandes hängt es natürlich allein ab, ob ein geeignetes operatives Verfahren noch Erfolg verspricht oder nicht, beziehungsweise ein solches noch ausgeführt werden soll, um das Möglichste zur Erhaltung des Lebens gethan zu haben.

Casuistik.

a) Wahre Hirnquetschung.

L. Nr. 73. II. 2. D. a. F. a. G. a. H. d.

Der p. Schmalz wurde durch einen Säbelhieb derart verletzt, dass sich bei der Untersuchung eine 8 Cm. von der Mittellinie der Stirne nach hinten bis zum Scheitel ziehende Wunde mit glatten Rändern vorfand. Es erfolgte eine bedeutende Entleerung dunkel gefärbten Blutes aus der Wunde. Diese wurde durch drei Knopfnähte bis auf den vorderen Winkel geschlossen; letzterer blieb offen, um das Abfließen des noch hervorquillenden dunklen Blutes, und später des Wundsecretes zu ermöglichen. Auf die Wunde eine Eisblase applicirt, der Kranke auf absolute Diät gesetzt, und innerlich kühlende Arznei gereicht. Den 2. Tag stellte sich Erbrechen ein, stechender Kopfschmerz sowie das Gefühl von Ameisenlaufen in den Fingerspitzen. Die Sprache erfolgte ohne Hinderniss. Am 4. Tage hatte sich das Brechen wiederholt und nahm der Kopfschmerz zu; am 6. entleerte sich Eiter aus der Wunde. Der Zustand blieb bis zum 12. Tage derselbe; Patient war bei vollem Bewusstsein, Körpertemperatur 36,7, Pulsfrequenz 72. Dann aber trat rasch Unbesinnlichkeit ein nebst zitternder Bewegung der Hände; mitunter gesellten sich Delirien zum Sopor. Der Puls wurde klein, die Extremitäten kühl, und es erfolgte der Tod.

Obduction. Kopfhöhle: Die innere Fläche der weichen Schädelbedeckungen zeigt in der Umgebung der Wunde eine ausgebreitete Blutunterlaufung. An dem Stirnbein zeigt sich entsprechend der Wundrichtung eine Trennung des Knochens von 9 Cm. Länge. Der rechte Rand dieser

Knochenwunde überragt den anderen Wundrand ein wenig. Etwa in der Mitte der Wunde ist ein Defect von $2\frac{1}{2}$ Cm. Länge und $\frac{1}{2}$ Cm. Breite, und sieht man hier das abgesprengte Knochenstück nach innen und unten in die Schädelhöhle hineinragen. Vom oberen Rande geht eine unregelmässige zackige Fissur nach rechts quer ab, und befindet sich an der Abgangsstelle der Fissur ebenfalls ein kleines abgesprengtes Knochenstück. Die Knochenhaut ist in der Umgebung der Schädelwunde in der Ausdehnung eines Handtellers unregelmässig fetzig abgelöst; auf dem Knochen blutiger Eiter befindlich. Die harte Hirnhaut zeigt sich ziemlich fest mit dem Schädel verwachsen und stark geröthet, die Blutgefässe allenthalben stark gefüllt. — An der oberen Fläche des von seinen Häuten noch umgebenen Gehirns findet sich nach Abnahme des Schädeldaches, ungefähr der Mitte der Wunde entsprechend, das abgesprengte Knochenstück in das darunter liegende Gehirn hineingedrückt. Das betreffende Knochenstück besteht aus einem gratartigen Stück der äusseren Tafel, während die Glastafel in einer Ausdehnung von $4\frac{1}{2}$ Cm. Länge und $1\frac{1}{4}$ Cm. Breite abgesprengt ist, aber mit dem Knochenfragment der äusseren Tafel noch fest im Zusammenhang steht. Dem vorderen Wundwinkel entsprechend befindet sich ein zweites Knochenstück von $2\frac{1}{2}$ Cm. Breite und $1\frac{1}{4}$ Cm. Länge, welches allein der Glastafel angehört und lose daliegend gefunden wird. Die weiche Hirnhaut ist ebenfalls stark geröthet; unter dem eingedrückten Knochenstück befinden sich auf derselben mehrere Blutgerinnsel. Der Längsblutleiter ist nur mit wenig Blut gefüllt; eine Verletzung desselben nicht zu erkennen. Die Gefässe an der Gehirnoberfläche strotzen dunkel von Blut. An der Oberfläche des rechten Vorderlappens befindet sich unmittelbar neben der Längsfurche eine Blutaustretung von der Grösse eines $\frac{1}{2}$ -Guldenstückes. Beim Einschnitt in dieselbe findet sich eine Höhle vor von der Grösse einer Haselnuss, in deren Innerem sich neben dunkelrothen Blutgerinnseln Trümmer von Hirnsubstanz und Spuren von Eiter vorfinden. An der Oberfläche des linken Vorderlappens findet sich der äusseren Wunde entsprechend eine Erweichung der Gehirnssubstanz. Aus einer linsengrossen Oeffnung daselbst ergiesst sich ein mit wenig Blut vermischter Eiter. Diese Oeffnung führt in eine Höhle mit glatten Wandungen, welche die Grösse einer Baumnuss hat und mit Eiter gefüllt ist. — Die weiche Hirnhaut an der unteren Fläche des Kleinhirns zeigt sich an einzelnen Stellen durch eiterige Ausschwitzung getrübt. Die Gehirnssubstanz ist blutarm, etwas feucht. In den beiden Seitenventrikeln ist eine trübe eiterige Flüssigkeit in geringer Menge vorhanden. Die Hirnganglien bieten nichts zu bemerken; dasselbe gilt von der Brücke, dem verlängerten Mark und dem kleinen Gehirn. Die Schädelbasis ist unverletzt.

Bei Eröffnung der Brust- und Bauchhöhle findet sich nichts Pathologisches vor.

Dieser Fall stellt in belehrender Weise die Verhältnisse, wie der Verlauf bei wahrer Hirnquetschung durch Druck veranlasst vor. Das nicht scharfe Instrument verursachte nämlich beim Passiren der Schädelwand eine Ablösung der Glastafel, drückte das dislocirte Stück, ohne die Dura zu trennen, gegen das Gehirn an und zer-

trümmerte hierbei die Substanz des letzteren in entsprechender Weise, so dass es zur Erweichung und Abscessbildung kommen musste. Der hämorrhagische Herd mit Detritus der Hirnsubstanz ist als Folge der bewirkten Erschütterung, welcher das Vorderhirn in toto ausgesetzt war, anzusehen. Der Verlauf bietet ganz die charakteristischen Erscheinungen der Hirnquetschung.

Ähnliche Fälle habe ich bereits früher beobachtet; da diese Art von Hirndruck nicht sehr häufig vorkommt, so stehe ich nicht an belehrungshalber dieselben hier kurz mitzutheilen.

a) Ein kräftiger Mann erhielt einen Hieb mit einem stumpfen Säbel auf die Stirngegend; er stürzte bewusstlos zusammen, erholte sich aber bald und trat einige Tage später in das Lazareth ein. Da man überzeugt war, dass das Schädeldach durchgehauen sei und sich also im weiteren Verlaufe Manches hinzugesellen könne, geschah betreffs Behandlung und Wartung Alles, um dem Auftritte schwerer Complicationen entgegen zu wirken. Ohne auffallende Reaction verliefen die ersten 9 Tage ganz gut, dann aber stellten sich Kopfschmerz, Schläfrigkeit, bald darauf Sopor ein. Lähmung der Blase, des Mastdarms, Erweiterung der Pupille folgten nach. Den 13. Tag starb der Patient. Sectionsbefund: Nach Hinwegnahme des Schädeldaches zeigte sich ein Theil der Glastafel von der Diploe abgelöst auf der harten Hirnhaut liegend und durch adhäsive Entzündung fest gelöthet. Unter der Dura fand sich ein grosser Eiterherd im Gehirn, welcher über $1\frac{1}{2}$ Zoll in die Tiefe drang und sich gegen die Hirnbasis erstreckte. Die Umgebung war erweicht, eitrig infiltrirt. In allen Theilen des Gehirns konnten Circulationsstörungen, Erweichung und seröse Durchfeuchtung nachgewiesen werden.

b) Im Feldzuge 1870/71 kam gleichfalls in Strassburg eine ähnliche Verletzung vor. Der Säbel drang in das Cavum ein, verletzte die Dura nicht, quetschte aber einen grossen Theil des Gehirns derart, dass auch Extravasat in den Kammern verursacht wurde. Verlauf in gleicher Weise.

c) Bei Streitigkeiten auf der Strasse erhielt ein Dienstknecht mit dem Stiel eines Kugelgiessers einen Schlag auf die Stirn. Hirnerschütterung bestand nicht, der Verwundete ging allein nach Hause. Zwölf Tage lang spürte Patient nichts, verrichtete seine Geschäfte, dann fühlte er Kopfweh und Brechreiz, was ihn aber nicht abhielt auf dem Felde zu eggen. Am 16. Tage nahm man an ihm einen schwerfälligen Gang wie Neigung zum Schlafen wahr. Den 17. Tag trank er noch Kaffee, ward aber später todt im Bett gefunden. Bei der Obduction zeigte sich ausser der Hautwunde eine 5 Linien lange

und 1 Linie breite penetrirende Trennung des Stirnbeins. Die harte Hirnhaut war nur in der Ausdehnung eines Guldienstückes von der Schädelfläche abgelöst; sie war mit kleinen Splitterchen bedeckt. Der linke vordere Hirnlappen war der Stelle der Knochenverletzung entsprechend, eingedrückt, weich, schwappend; die Rindensubstanz in grossem Umfange verdünnt, theilweise fehlend; die Markmasse erweicht, einen Abscess formirend, in welchem $1\frac{1}{2}$ Unzen Eiter vorhanden waren.

d) Aus Unvorsichtigkeit wurde ein junger Mann mit dem Stiefel eines Regenschirms in den linken inneren Augenwinkel gestossen. Die ersten Tage verliefen ganz gut, dann stellte sich Schmerz in der Stirne, Brechreiz, Schwindel ein, und bald folgte Unbesinnlichkeit, Sopor nach. Der Verletzte starb am 15. Tage. Bei der Section fand sich, dass das Instrument, ohne den Conjunctivalsack zu durchbohren, denselben wie den Finger eines Handschuhs vor sich herdrängend, durch die Fissura orbitalis superior in die Schädelhöhle getreten und ohne Zerreissung der Hirnhüllen wenigstens einen Zoll tief in den vorderen Hirnlappen eingedrungen sei. Ein grosser Eiterherd, Erweichung und seröse Infiltration in der Umgebung liessen sich constatiren.

b) Gequetschte Hirnwunde.

L. Nr. 74. II. 2. D. b. F. b. H. d.

Schuss aus einem Terzerol, dessen Lauf sich von hinten nach vorn erweiterte, auf $1\frac{1}{2}$ Fuss Entfernung; als Projectil wirkten zwei Geschossstücke von ungleicher Grösse. Der Getroffene stürzte bewusstlos zusammen; erst später kam er wieder zu sich, bot aber dann die Erscheinungen partiellen Hirndruckes. Zwei Schusskanäle fanden sich vor. Eine Oeffnung war in der linken Augenbrauengegend, die andere in der linken Schläfengegend. Letztere Oeffnung anfänglich etwas flach, nimmt im weiteren Verlauf den Charakter eines Wundkanales an, zieht in schräger Richtung zum Schläfenbein von vorn nach rückwärts, geht alsdann in die Knochenverletzung über, welche nicht ein offenes Loch darstellt, sondern mehr oder weniger mit lose aneinander hängenden Knochenstückchen angefüllt ist. Im Kanale Reste des Papierpfropfes sowie abgespritztes Blei; der grösste Theil des kleinen Geschosses drang in die Schädelhöhle nach Einbruch derselben. Hierbei ward die Art. meningea media in ihrem Zusammenhange gestört, deshalb entsprechenden Bluterguss verursachend, ferner die Dura gequetscht und eingerissen, desgleichen eine oberflächliche Zertrümmerung der Hirnsubstanz durch das auf der Oberfläche des Gehirns gelagerte Geschoss bewirkt. Die andere Oeffnung stellte eine mehr gerissene Wunde dar; das noch kleinere Projectil hatte die vordere Stirnwand durchschlagen, an der hinteren Wand eine Partie im Zusammenhange gestört und in die Höhe gehoben, so dass sich eine Spalte zeigte, in welcher das Bleistück eingekeilt war. Die Dura hatte dabei nicht Noth gelitten.

Unter den Erscheinungen des Hirndrucks, der localen Hirnvereiterung trat am 13. Tage der Tod ein.

Dieser gerichtliche Fall ward mir seiner Zeit zur Begutachtung vorgelegt. — Aehnliche Schussverletzungen ¹⁾ kommen, wie bekannt, im Kriege nicht selten vor.

L. Nr. 75. II. 2. D. b. F. H. d.

Eindringen eines 2 Zoll breiten und $\frac{1}{2}$ Zoll dicken Spahns in die rechte Stirngegend der Hirnschale, 2 Zoll tief. Bewusstsein anfänglich gestört, stellt sich bald wieder her. Erbrechen. Linke Körperhälfte paretisch, Convulsionen, namentlich während des Schlummers. Gequetschte Hirnmassen hervorgetreten; viele Knochensplitter gleich extrahirt. Beträchtliche Eiterung, im späteren Verlaufe Schmerzen im Kopfe sowie Convulsionen, Bewusstsein vorhanden. Nach der 4. Woche Sopor und am 36. Tage Tod. Obductionsbefund: Weitverbreitete Fractur der Schädelknochen, partielle Nekrose solcher. Vereinigung eines abgelösten Knochenstückes mit der inneren Fläche der Hinterhauptsschuppe durch organisirtes Exsudat; die Rindenschicht des Stückes ruht auf der Glastafel des Craniums. Auf der Dura finden sich verkittet mit derselben Knochen- wie Holzsplitter. Das Gehirn an der verletzten Stelle erweicht und vereitert, von einem Abscess über dem rechten Sehhügel durchsetzt.

E. Hirndruck in Folge von Circulations- und Ernährungsstörungen, Reizung und diffuser Entzündung der Hirnhüllen und des Gehirns selbst mit meist nachfolgender Eiterbildung. Meningitis purulenta, encephalitische Erweichungs- und Eiterherde, Abscessbildung.

In sehr vielen Fällen von Schädelverletzungen stellt sich der Hirndruck nicht gleichzeitig, mit oder kurz nach dem mechanischen Insulte, sondern erst im weiteren Verlaufe ein.

Sehen wir von den consecutiven Blutergüssen ab, so haben wir es hier allein mit den Folgen einer vorzugsweise eiterigen, meist diffusen Entzündung der Hirnhüllen (Meningitis purulenta), gewöhnlich mit gleichzeitiger Betheiligung der Hirnoberfläche oder mit encephalitischen Processen, d. h. mit Erweichungs- und Eiterherden, mit Abscessbildung im Hirn selbst zu thun.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich hier in extenso die bezeichneten bekannten Processe schildern; ich beschränke mich nur auf das Hauptsächlichste und Wichtigste, und verweise dabei auf

1) Eindringende Schädelschussverletzungen mit sofortigem Tod kamen nur bei Selbstmördern des Armeecorps vor. Unter allen Fällen bietet nur einer Interesse, weil bei demselben der Schuss, der Carabiner war mit Wasser geladen und in den Mund gesetzt, eine derartige Zersprengung des Schädels verursachte, dass die einzelnen Theile in der Umgebung zerstreut waren.

die im einleitenden Theil meiner Arbeit niedergelegten Auseinandersetzungen, aus welchen Gründen ich der Gehirnreizung an und für sich keine besondere Besprechung gewidmet habe.

a) Meningitis purulenta.

Die anatomische Beschaffenheit der Hirnhüllen, namentlich der Arachnoidea und Pia mit ihrem lockerem Zellgewebe, den vielen Hohlräumen, den zahlreichen Gefässen, welche, wie schon früher beschrieben, tief in das Gehirn, selbst bis in das Marklager eindringen und von scheidenartigen Fortsätzen der Pia, also von Lymphkanälen begleitet sind, die innige Verbindung, welche hieraus mit dem Gehirn, namentlich der Oberfläche desselben resultirt, sowie auch jene der Dura mit dem Schädeldach, mit den Gefässen der Diploe machen es erklärlich, wie leicht bei stattgehabten Insulten eine Betheiligung dieser Gebilde stattfinden muss. Alle reizenden Einflüsse, welche eine Erregbarkeit der Nerven Elemente, eine Veränderung in dem Gefäss tonus, deshalb entsprechende Circulationsstörungen, Andrang von Blut, Ueberfüllung der Kanäle, Hyperämie, Austritt des Gefässinhaltes in die Umgebung, in das zu Infiltrationen so sehr geneigte Parenchym zur Folge haben, können im weiteren Verlaufe eine Umwandlung des Exsudates zu Eiter und hiermit noch weitere wesentliche Circulations- und Ernährungsstörungen nach sich ziehen. Schon im Stadium der Congestion machen sich, gemischt mit den Symptomen von Hirnreizung und erhöhter Erregbarkeit, solche des Druckes bemerkbar, dieselben steigern sich, dem Umsichgreifen des Processes entsprechend, einer vollkommenen Depression Platz machend; sie können aber doch bei geeigneter Beobachtung, abgesehen der vorausgegangenen Reizerscheinungen, von jenen der Compression durch Extravasate, fremde Körper, Dislocation eines Knochenstückes wegen des ungleichen Verhaltens bezüglich der Zeit des Auftrittes sowie der Hirnfunction, der geistigen Thätigkeit unterschieden werden.

In den meisten Fällen von Reizung und Entzündung der Hirnhüllen kommt es zur Eiterung, findet man serös-purulentes Exsudat oder dicken Eiter; seltener beobachtet man einen serös-flockigen, gallertigen Erguss, eine sulzige, faserstoffige Auflagerung, welches letzteres Verhalten sowohl in der Reactionsperiode nach heftigen Gehirnerschütterungen mit nachfolgender Gefässschwäche, als bei Ablösung der Dura von dem Schädeldach, bei Thrombose der Gefässe derselben angetroffen wird.

Der Process beschränkt sich nur selten auf die Hirnhüllen allein; meistens participirt das Gehirn daran, da die anatomischen Verhältnisse hierzu sehr günstig sind, namentlich die scheidenartigen Fortsätze, welche die Gefässe der Pia ins Gehirn begleiten, als ebenso viele Kanäle zur weiteren Ausbreitung der eiterigen Flüssigkeit dienen. Die Meningitis bleibt entweder auf eine Stelle mehr beschränkt, was übrigens selten ist, oder sie entwickelt sich als ein diffuser Process, eine grosse Ausdehnung gewinnend. Die Zeit ihres Auftrettes, die Intensität des Verlaufes hängt von den ursächlichen Momenten ab; diese letzteren können mannigfaltiger Natur sein. Wir beobachten sie deshalb als Folge directer Fortsetzung der Entzündung und Eiterung in der beschädigten oder durch Processe von den Bedeckungen aus (Rothlauf, Phlegmone) in Mitleidenschaft gezogenen Diploe auf die Dura, als solche der Ablösung der harten Hirnhaut vom Schädeldach, ein Verhalten, auf welches ich schon früher aufmerksam machte und das durch Zerreissung der Verbindungsgefässe, entweder mit Thrombosirung, Verjauchung der Thromben oder des ergossenen Blutes, mit oder ohne gleichzeitige Betheiligung der Blutleiter, oder durch partielles Absterben der in der Ernährung beeinträchtigten harten Haut zu Stande kommt. Unter solchen Verhältnissen bildet sich hin und wieder auf der äusseren Seite der Dura eine klebrige Schicht von Exsudat, die Haut selbst schwillt auf, wird missfarbig, auf der inneren Fläche liegt anfänglich eine sulzige, später eiterige Masse auf.

Hin und wieder finden sich die beiden genannten ursächlichen Störungen auch vereint vor.

Es entsteht ferner die eiterige Hirnhautentzündung sehr leicht bei Einwirkung eingedrungener fremder Körper, infracturirter Knochenstücke mit scharfen Rändern, vorstehender, sowohl festsitzender als namentlich spitzer abgelöster Splitter, selbst auch im späteren Stadium als Folge des schädlichen Einflusses beträchtlicher Osteophytenbildung, ausserdem bei Hirnläsionen selbst. — Im letzteren Falle befindet sich entweder die Verletzung an der Oberfläche des Gehirns, und wir betrachten dann den Auftritt des entzündlichen Processes zur gleichen Zeit sowohl am Gehirn als an seinen Hüllen, d. h. eine diffuse, nicht auseinander zu haltende Verbreitung desselben, oder die Läsion hat mehr in der Tiefe des Gehirns ihren Sitz und der sich daselbst entwickelnde Eiterungsprocess zieht allmählich, gegen die Peripherie des Gehirns fortschreitend und sich mit den Ausläufern der Pia in Verbindung setzend, auch die Hirnhüllen in Mitleidenschaft.

Da die Schädelverletzungen nicht rasch heilen, die Rückbildung der gesetzten Veränderungen nur allmählich erfolgen kann, leicht durch Zwischenfälle, durch anderweitige schädliche Einflüsse, öfters selbst durch die geringfügigsten, wesentliche Störungen veranlasst werden, so beobachten wir auch Auftritt des beschriebenen, entzündlichen Vorganges als Folge von Excessen mannigfacher Art, sowohl im Essen, Trinken und in Venere, als Folge psychischer Affecte, geistiger Beschäftigung, körperlicher Anstrengungen, intensiver Erkältungen etc., weil durch jeglichen Congestivzustand, durch jegliche Alteration des Kreislaufes im Gehirn bis dahin schlummernde Reize aufgeweckt werden können.

Dass der Zutritt der Luft Nachtheil äussert und Eiterung begünstigt, ist nicht zu bezweifeln, dass aber ohne einen solchen, also bei geschlossenem Schädel, Eiterung nicht, oder nur als Folge von pyämischer Complication beobachtet werde, ist unwahr.

Wie ich schon bei der Hirnquetschung mittheilte, lassen sich die Druckerscheinungen bei Meningitis purulenta von jenen bei anderen encephalitischen Vorgängen nicht unschwer auseinander halten, da, abgesehen des zeitlichen Auftretens, sich hier anfänglich jene der Reizung bemerkbar machen und erst im weiteren Verlauf, wenn selbst anderweitige wesentliche Functionsstörungen bereits eingetreten sind, nicht so schnell wie bei Hirnläsion und encephalitischen Processen selbst, solche intensive diffuse Alteration der geistigen Sphäre: wie Schläfrigkeit, Unbesinnlichkeit, tiefer Sopor, welche erst im letzten Stadium, kurz vor dem letalen Ende sich dazu gesellen, wahrnehmen lassen.

Vorhersage und Behandlung richten sich nach den Ursachen, der Ausbreitung, nach den constitutionellen Verhältnissen. Für den Arzt bleibt es immer die Hauptsache, prophylaktisch zu wirken, und alle Einflüsse, welche eine derartige schlimme Störung zur Folge haben können, fern zu halten, gleichsam den Auftritt einer eiterigen Meningitis unmöglich zu machen. Hat sich eine solche entwickelt, so ist anfänglich eine rationelle Antiphlogose mit möglichster Beseitigung der Ursache am Platz. Nehmen die Druckerscheinungen an Intensität zu, ist man, geleitet von der Art der Verletzung und ihrem Sitze, im Stande auch jenen des etwa circumscripten Eiterherdes sicher zu localisiren, so kann auch, zwar gewiss sehr selten, ein operativer Eingriff, die Trepanation, behufs Entfernung der Ursachen wie des Entzündungsproductes angezeigt sein.

Casuistik.

L. Nr. 76. II. 2. E. b. d. F. a. G. a. H. d.

Sonntag den 2. Juni 1871 erhält der Grenadier Steidel von einem Civilisten mit dem eigenen Faschinenmesser einen kräftigen Hieb über die linke Stirnseite. Ueber den Stirnhöcker läuft eine 1½" lange geradlinige scharfrandige Wunde bis auf den Knochen reichend und ist die äussere Knochentafel in der Länge der Hautwunde getrennt bis in die Diploe hinein. Das obere Dritteltheil der Wunde sitzt im behaarten Kopftheile. Bei der Aufnahme in das Lazareth ist die Stirnwunde roth geschwollen und schmerzhaft. Patient klagt über Schwindel, Kopfschmerz, Durst. Eisblase auf den Kopf. Am 3. Tage ist die untere Hälfte der Stirnwunde geschlossen, die obere klappt, eitert aber gut. Am 12. Juni ist das Fieber geschwunden; Entfernung eines kleinen losen Splitters aus der äusseren Tafel. Am 19. stellt sich Frost ein, die Eiterung ist reichlich, die Granulationen werden schlaff, Fieber nicht mehr vorhanden. Am 24. werden über den linken unteren Lungenlappen Dämpfung und Reibungsgeräusche nachgewiesen, die Haut ist heiss, Puls 132; es zeigen sich rostfarbene Sputa, schnelles Athmen, Diarrhoe; die Dämpfung hat sich über die ganze linke Brusthälfte verbreitet, Bewusstsein ungetrückt. Temperatur 38,5—40,5, Orthopnoe, Schleimrasseln, Cyanose, schmutziggroße Sputa. Puls 132. Agonie, Abends 6½ Uhr Tod.

Obductionsbefund. Der Hautwunde entsprechend ist auf dem linken Stirnhöcker eine Furche bis in die Diploe hinein. Am äusseren Rande der Furche sitzt ein 8 Linien langer, 4 Linien breiter Splitter der äusseren Tafel und ist um die Furche das Periost ein Quadratzoll weit abgelöst. Das Schädeldach sonst normal; die innere Tafel unversehrt. Der äusseren Verletzung entsprechend liegt auf der abgelösten Dura eine gelblichgrüne Eiterschicht in der Grösse des äusseren abgelösten Periostlappens und ist an dieser Stelle die Dura matt und grau verfärbt. Auf der Höhe des Grosshirns viele Eiterpunkte, die Hirnmasse selbst normal. Die Venen und Sinus sind strotzend mit dunklem Blute gefüllt, im Sinus longitudinalis ein 3 Zoll langes Fibringerinnsel. Brusthöhle: Unter den vier obersten Rippen links liegt eine ausgebreitete Eiterschicht und sind beide Pleurahöhlen mit gelblichgrauer Flüssigkeit erfüllt. Die linke Lunge ist vollständig comprimirt, an die Wirbelsäule gedrückt und ganz luftleer; am unteren Rande ein geöffneter nussgrosser Abscess, dessen Oeffnung wie zerfressen aussieht, der untere Lappen der rechten Lunge sehr blutreich, die übrigen Organe gesund.

Belehrender Fall von ganz circumscripiter Meningitis purulenta in Folge von Ablösung der Dura, von Thrombosirung der Gefässe im Bereiche des Insultes, Uebertritt des Processes auf die Hirnoberfläche in seinem Anfangsstadium. Leider gibt das Sectionsprotokoll keinen Aufschluss über die Beschaffenheit der Diploe, ob eiterig infiltrirt oder nicht. Der Process complicirt sich, wahrscheinlich in Folge von Thrombose, mit Pneumonie und Abscessbildung in der

Lunge, secundärem pleuritischen Erguss ohne das Bild einer exquisiten Pyämie zu liefern.

L. Nr. 77. II. 2. E. b. c. d. F. a. G. a. H. d.

A. v. B., 19 $\frac{1}{2}$ Jahre alt, erhielt in den ersten Tagen des Juli 1872 einen Schlägerhieb über den linken Stirnbeinhöcker. Nach der Verletzung schonte sich der Verwundete in keiner Weise, in der Tiefe der Wunde kam es trotz Naht zur Eiterung, später gesellte sich ein Rothlauf hinzu. Gegen Ende der 2. Woche Pat. von heftigem Kopfweh, Erbrechen und starkem Fieber befallen, bald stellten sich auch Convulsionen ein. Am 25. Juli trat plötzlich rechtsseitige Hemiplegie und völlige Aphasie auf bei gut erhaltenem Bewusstsein. Vom 28. an besserten sich Aphasie und Besinnung, das Fieber sank, täglich vermehrte sich der Wortschatz bis zum 4. August, an welchem Tage nach vorausgegangenen stürmischen Erscheinungen der Tod erfolgte.

Sectionsbefund. An der Stirn, schief über dem linken Höcker herüberreichend ist eine Narbe von 11 Linien Länge sichtlich, welche in der Mitte eine Breite von fast einer Linie hat, so dass also nach der Verletzung die Wundränder sich nicht per primam vereinigten. Das Narbengewebe ist an den Knochen geheftet, wie auch letzterer eine der Narbenrichtung entsprechende strich-rinnenartige Verletzung zeigt, welche in die äussere Tafel eingreift, so dass dieselbe etwas gesplittert erscheint. Von dem nach innen liegenden Ende dieser Wundlinie steigt in der Richtung eines fast senkrechten Winkels ein weiterer Ast der Knochenverletzung von 4 Linien Länge auf nach oben und von diesem abermals rechtwinklig nach aussen parallel mit dem unteren ein letzter Einriss von gleicher Länge. Die Dicke der Schädelknochen beträgt an der Stirn 1 $\frac{1}{2}$ “, von derber Structur, die innere Tafel unverletzt, die Diploe findet sich im Bereiche des Insultes dunkelgefärbt und blutig infiltrirt. Die Dura ist nicht verwachsen, durchweg von Gefässen durchzogen und auf ihrer inneren Seite mit feinem, membranartigem organisirtem Ueberzug versehen. Die Hirnoberfläche ist vollständig von vorn bis hinten mit einer gelben faserstoffartigen Exsudatmasse überlagert, am dicksten auf der vorderen Fläche bis auf die Höhe des Scheitels und erreicht an der Trennungsfurche der beiden Hemisphären eine Dicke von 1 $\frac{1}{2}$ Linien, senkt sich auch, der weichen Hirnhaut folgend, in die Hirnwindungen. Der verletzten Stelle entsprechend, findet sich auf der Spinnwebenhaut eine organisirte Zellgewebsauflagerung von einigen Linien Umfang. Die Blutgefässe der Hirnhäute sind strotzend gefüllt. Das beschriebene Exsudat setzt sich auch an der Basis bis zum kleinen Hirn fort. Die Hirnmasse selbst ist sehr blutreich, die Substanz durchfeuchtet. Die Ventrikel enthalten eine grössere Menge seröser Flüssigkeit, in welcher fibrinöse Massen herumschwimmen.

In diesem Falle entwickelte sich die fibrinös-purulente Meningitis als Folge von Thrombosirung der aus der blutig infiltrirten Diploe zur Dura ziehenden Gefässe mit partieller Ablösung der Haut. Durch das ausgebreitete faserstoffige Exsudat, durch die beträchtliche organisirte sulzige Auflagerung auf der Ober-

fläche des linken Vorderhirns entstanden, von Convulsionen begleitet, Druckerscheinungen, welche bei völligem Bewusstsein oder nur zeitweise vermindertem, dem Sitze des Broca'schen Sprachcentrums, das übrigens nicht lädirt war, entsprechend, zu völliger Aphasie und zu rechtsseitiger Hemiplegie führten. Durch die weitere Ausbreitung des Processes steigerte sich der Hirndruck zu einem allgemeinen und erreichte eine Höhe, welche den Tod zur Folge haben musste.

Anderweitige instructive Fälle von Meningitis purulenta lasse ich hier noch einige in möglichster Kürze folgen.

a) Meningitis purulenta als Folge von Loslösung der Dura vom Cranium nach Zerreißung der entsprechenden Verbindungsgefäße. — Schlag mit einer Pistole auf die Stirn. Quetschwunde der Weichtheile; keine Gehirnerschütterung. Der Verletzte besorgte seine Geschäfte mehrere Tage; erst am 15. fühlte er sich unwohl, klagte über Kopfschmerzen. Antiphlogose. Bewusstsein nicht gestört, abermalige Blutentziehungen wegen intensiven Kopfschmerzes. Am 18. Tage trübte sich das Bewusstsein, Hirndruck stellte sich ein, Puls retardirt, Athmung erschwert, Sopor mit Lähmung. Am 20. Exitus letalis. Obductionsbefund: Knochen unverletzt, mehrere grosse Gefäße zwischen Cranium und Dura zerrissen. Zwischen harter Haut und Pia und in diese selbst Ansammlung dickflüssigen Eiters, der beim Einschneiden der Dura herausquoll. Im Vorderlappen des Gehirns ein mit der Arachnoidealseite communicirender Abscess von der Grösse einer Baumnuss.

b) Meningitis purulenta in Folge einer Loslösung der Dura durch Erschütterung und Contusion des Knochens bewirkt mit gleichzeitiger Eiterung in der Diploe. — Verletzung der Scheitelgegend durch Wurf mit einem Trinkglas. Die Verletzte tritt erst nach 4 Tagen in ärztliche Behandlung. Sieben Tage guter Verlauf, dann Zeichen von Hirnreizung und Druck; Convulsionen, Lähmung der rechten Gliedmassen bei vollstem Bewusstsein, heftiger Kopfschmerz. Tod unter comatösen Erscheinungen, unter zunehmendem Sopor. Bei der Section fand sich weitgehende Loslösung der Dura, gallertiges und eiteriges Exsudat zwischen Schädeldach und harter Haut, Schwellung, veränderte Färbung, auf der inneren Fläche purulente Auflagerung, eiteriges Exsudat auf der Oberfläche des Gehirns mit Erweichung der Rindensubstanz. In der Diploe traf man Eiter, an der Glastafel war ein Stückchen abgelöst aber nicht aus Verbindung und nicht nachtheilig gelagert.

c) Meningitis purulenta in Folge Einwirkung der scharfen

Knochenränder einer penetrirenden Schädelwunde. Bei Streitigkeiten wurde einem Soldaten mittelst eines scharfen Säbelhiebes ein Stück aus dem Stirnbein in der Grösse eines Thalers geschlagen. Bei der Untersuchung fand sich eine eindringende Wunde, deren innerer von der Glastafel gebildeter Rand sehr scharf war. Nach einigen Tagen, da man versäumte die vorstehenden scharfen Ränder abzutragen, stellten sich Symptome der Hirnreizung und in Bälde jene des Druckes mit letalem Ausgang ein. Bei der Section fand sich die Dura in grösserem Umfange abgelöst; auf ihrer inneren Fläche lag Eiter, desgleichen in und unter der Pia auf der Oberfläche des vorderen linken Hirnlappens. Die Knochenwunde war trichterförmig; aus der Tabula vitrea war ein Stück so scharf herausgeschlagen, dass die Ränder wie Glasscherben hervorstanden.

d) In 3 Fällen von isolirtem Glastafelbruche, die bereits von mir veröffentlicht sind, und bei welchen die Fragmente der abgelösten Tabula vitrea vermöge ihrer Beschaffenheit und Lage sehr nachtheilig einwirken mussten, stellten sich nach einiger Zeit zuerst die Erscheinungen der Hirnreizung und später jene des Druckes, als Folge einer intensiven Meningitis purulenta mit tödtlichem Ausgange ein. Auch bei Infractionen der Schädelknochen mit oder ohne Loslösung der Glastafel entwickelt sich häufig eine eiterige Hirnhüllenentzündung; solche Fälle sind allwärts bekannt. Sehr selten beobachtet man aber consecutive Meningitis als Folge theilweiser Loslösung der Glastafel und secundärer Knochen-neu-Osteophytenbildung. Einen einschlägigen Fall kann ich hier mittheilen.

e) Stichwunde in den Schädel dringend. Das Instrument verletzte weder Hirnhüllen noch Gehirn. Der Verlauf günstig, Heilung ohne Störung. Erst nach Wochen, als der Verwundete wie früher seinen Geschäften auf dem Felde nachging, zeigen sich plötzlich Erscheinungen von purulenter Meningitis, welchen jene intensiven Druckes nachfolgen. Ein operativer Eingriff behufs Entfernung der localisirten Ursache findet nicht statt, deshalb letaler Verlauf. Bei der Section fand sich, abgesehen der ausgebreiteten Eiterablagerung im Bereiche der Hüllen und an der Oberfläche des Gehirns ein Stück der Tabula vitrea theilweise abgesprengt; dasselbe ragte mit nicht abgeschliffenen Rändern und mit frischen Wucherungen versehen in die Höhle hinein. Durch die beständige Reibung der harten Hirnhaut an dem vorspringenden unebenen Knochenfragment kam, da Patient sich nicht schonte, sich sogar verschiedenen schädlichen Einflüssen bei seiner Arbeit in gebückter

Stellung aussetzte, eine Meningitis mit Eiterproduction zu Stande, und tödtete nachträglich den bereits als „geheilt“ bezeichneten Verwundeten.

b) Hirnvereiterung und -Erweichung.

Da das Gehirn aus Mangel an Bindegewebe zur Reproduction, zu einer raschen Organisation des ausgetretenen Blutplasmas, der Exsudate, dagegen eher zu einer rückwärtsschreitenden Metamorphose, zum Zerfalle der einzelnen Elemente, zur fettigen Umwandlung geneigt ist, hierzu bei Cohäsionsstörungen die sich wiederholenden Blutungen auch das Ihre beitragen, so beobachten wir selbst bei nicht ausgebreiteten Läsionen ¹⁾ häufig nach einer gewissen Zeit wesentliche locale Circulations- und Ernährungsstörungen, welche meistens schleichend, nur selten acut ²⁾ verlaufen, nach und nach eine Erweichung oder eine wirkliche Vereiterung des Gewebes, wodurch in der nächsten Umgebung eine später weiter ziehende Infiltration, ein Oedem wichtiger Hirnpartien zu Stande kommt, bewirken, und sich gleichfalls durch Druckerscheinungen zu erkennen geben.

Sowohl bei capillären Apoplexien in der Hirnrinde wie im Marklager, bei disseminirten kleinen hämorrhagischen Herden, bei beträchtlichen Extravasaten in Folge von Gefässrupturen, von heftiger Erschütterung der Hirnsubstanz, als bei directer Quetschung derselben, bei Trennungen des Gehirns mittelst Instrumente, beim Eindringen fremder Körper etc. kommt es zum Absterben der beleidigten, zertrümmerten Gebilde und in manchen Fällen dann secundär zu dem bekannten Erweichungsprocess, welcher bald als sogenannte gelbe oder rothe Erweichung auftritt und im Ganzen einen langsamen Verlauf nimmt, meistens jedoch zur eiterigen Schmelzung, zur wirklichen Vereiterung der lädirten Hirnstellen und deren nächster Umgebung. Findet sich ein solcher Herd nicht am Umfange des Gehirns, sondern in der Tiefe desselben, im Marklager, so müssen in noch auffallenderer Weise secundäre Circulationsstörungen auftreten und zu weiteren bereits angegebenen Vorgängen führen, da

1) Behufs Gewinnung entsprechender Anhaltspunkte über den Heilungsvorgang bei Hirnwunden habe ich früher an Thieren Versuche angestellt. Das Ergebniss derselben wurde bereits in meiner Schrift: Ueber die Schädelverletzungen S. 97—99 mitgetheilt und muss ich deshalb auf jene Arbeit verweisen. — In neuester Zeit haben namentlich Stricker und Jolly diesem Gegenstand grosse Aufmerksamkeit geschenkt.

2) Acute Abscessbildung, schon wenige Tage nach der Verletzung, habe ich übrigens früher mehrmals beobachtet.

bei dem anatomischen Bau der Gewebe eine bestimmte Abgrenzung, eine wirkliche Abkapselung des Herdes, wenn auch hin und wieder schalenförmige Verdichtung der nächsten Umgebung getroffen wird, nicht leicht möglich ist, die Infiltration in das Nachbargewebe nicht ausbleibt. Diese Störungen machen sich dann erst durch Entstehung von Drucksymptomen mehr bemerkbar, wenn sich bereits der Process auf die Umgebung fortgesetzt hat.

Hat die Eiterung ihren Sitz an der Peripherie der Hirnrinde, so werden, wie bei Meningitis die Hirnrinde, jetzt die Hirnhüllen, vorzugsweise die Pia bald in Mitleidenschaft gezogen, und wir haben dann das Bild wie bei einer umschriebenen Meningitis purulenta, die sich aber bald weiter ausbreiten und selbst secundär durch Eindringen des Eiters in die Lymphräume zu weiteren Ablagerungen in das Marklager führen kann. Entwickelt sich dagegen im Inneren ein Abscess, meist in chronischer, seltener in acuter Form, gewöhnlich als Folge eines Blutergusses, der in eiterige Umwandlung gerathen ist, sich nicht zurückbildete, einer Quetschung, selten einer Thrombosirung, so machen sich andere Erscheinungen bemerkbar, d. h. die Drucksymptome treten oft nach einem einige Zeit andauernden relativen Wohlbefinden in ganz überraschender Weise, wenn nämlich die Kreislaufsstörungen im Gehirn einen grossen Höhepunkt erreicht haben, plötzlich und mit einer gewissen Vehemenz, wie ich sie bereits bei dem Verlaufe der Hirnquetschung beschrieb, hin und wieder selbst ohne jegliches Fieber, auf, und es prävalirt alsdann das tiefe Ergriffensein des Sensoriums durch unterdrückte Intelligenz, durch Schlafsucht, Unbesinnlichkeit, durch rasch nachfolgenden Sopor. Im Verhältnisse mit diesen Erscheinungen gehen auch solche anderweitig gestörten Functionen Hand in Hand, abhängig von dem Sitze des Eiterherdes, von dem ergriffenen Hirnbezirk. Wir nehmen alsdann nebst Unempfindlichkeit der Iris gegen das Licht vorzüglich halbseitige Lähmungen, selbst Paralyse der Blase, des Mastdarmes wahr, hin und wieder begleitet von Convulsionen, Zuckungen in bestimmten Muskelgruppen, Contracturen, von Aphasie, Facialislähmung u. s. w.

Ofters ist der Verlauf ein sehr protrahirter, chronischer, abwechselnd stillstehender, dann wieder vorschreitender; es stellen sich unter solchen Umständen Latenzperioden, die sich, nach Aufhören früherer intensiver Druckercheinungen, meistens nur durch Bestehen von zeitweisem Schwindel, Kopfschmerzen, welche in einem von mir beobachteten Falle von der Stelle des Sitzes des Herdes ausgingen, wohin auch der Patient stets automatisch griff, zeitweise

durch Unbesinnlichkeit, Schwäche des Gedächtnisses, Neuralgien, Krämpfe u. s. w. kundgeben, ein.

Die Eiteransammlung nimmt oft, ohne während einer geraumen Zeit hervorstechende Erscheinungen zu bieten, kolossale Dimensionen an, erfüllt häufig einen grossen Theil der Hemisphäre, entwickelt sich sowohl gegen die Peripherie, als gegen die Kammern, und bricht sich nicht selten sogar Bahn in diese letzten wie gegen die Hirnhüllen hin. Bei umsichtiger Beobachtung, wenn man den Fall von Anfang an verfolgen kann, ist die Diagnose des encephalitischen Eiterherdes, des Abscesses nicht schwierig, weil die eigentlichen Druckerscheinungen mit Ausnahme des ganz acuten Verlaufs, der übrigens dann mit Meningitis purulenta vergesellschaftet ist, erst in einer späteren Periode, nachdem früher Cerebralsymptome geschwunden sind, und zwar alsdann mit wesentlicher Beeinträchtigung der Function sowohl einzelner Hirnbezirke, als des Gehirns in toto sich in der bereits geschilderten, intensiven Weise bemerkbar machen. Der Unterscheidungszeichen von der eiterigen Hirnhautentzündung wurde schon früher Erwähnung gethan.

Die Vorhersage ist als eine sehr schlimme zu stellen, da eine Rückbildung des Abscesses, eine Entleerung des Eiters auf natürlichem Wege, z. B. durch den Gehörgang, das Siebbein, die Fissura orbitalis nach aussen nur in höchst seltenen Fällen zu Stande kommen dürfte.

Bei der Behandlung kann, wenn von Anfang an auf Verhütung eines solchen Processes gehöriger Bedacht genommen wurde, die gewöhnlichen Mittel fruchtlose Anwendung fanden, die Drucksymptome beängstigender, gefährlicher werden, der Sitz des Abscesses möglichst bestimmt werden kann, die Trepanation, d. h. die Eröffnung des Schädels und hierauf des Eiterherdes als letztes Hülfsmittel zur Ausführung kommen. Wenn auch die Veränderungen im Gehirn meistens schon zu weit gediehen sind, deshalb der letale Ausgang nicht abgewendet werden kann, so wurde doch auch schon in wenigen einzelnen Fällen ein günstiger Verlauf beobachtet. Durch Benutzung feiner Explorativtroikarts ist man, wenn bereits Zutritt zum Gehirn geschaffen wurde, eher in Stand gesetzt, ohne wichtige Nebenverletzungen in die Tiefe des Gehirns zu dringen, den Sitz des Herdes zu erforschen und für Abfluss des Eiters bei vorsichtigem Gebrauche einer subcutanen Injectionsspritze oder der Saugsonde von Renz, welcher zuerst die Aspirationsmethode mit glücklichem Erfolge in Anwendung brachte, zu sorgen.¹⁾

1) Dieses Verfahren ist auch hin und wieder von Misserfolgen begleitet, da

Die Erweichung der Gehirnsubstanz zeigt sich, sowohl als rothe wie gelbe, gewöhnlich als directe Folge von Gewebszertrümmerung nach Ruptur, Quetschung und Verwundung, secundär auch bei lange andauernder starker Durchfeuchtung, hämorrhagische Infiltration bei wesentlichen Circulations- und Ernährungsstörungen wie in der Umgebung von Entzündungs- und Eiterherden, wodurch nach und nach eine Maceration, eine Verflüssigung der Elemente zu Stande kommt. Je nach dem ursächlichen Momente bleibt der Process auf eine kleine Stelle beschränkt oder er breitet sich, immer mehr um sich greifend, über grössere Partien aus. Im Allgemeinen schreitet er sehr langsam vorwärts und machen sich oft für Jahre sogar die Erscheinungen der beeinträchtigten Ernährung grösserer Hirnbezirke und in Folge dieser auch die alterirte Function derselben, oft sogar psychische Störungen bemerkbar, bis das Leiden zu tieferen Störungen und endlich zum tödtlichen Ausgang führt. Wenn der Verlauf nicht, wie gewöhnlich, ein protrahirter ist, zugleich die Erweichung im Inneren, in der Nähe eines wichtigen Hirnthteils seinen Sitz bat, so kann der Vorgang leicht mit einem Hirnabscess verwechselt werden.

Casuistik.

a) Hirnabscess.

L. Nr. 78. II. 2. E. b. e. E. b. H. d.

Dragoner Herberich wurde am 10. September 1875 bei den Brigadeübungen vom Pferde geworfen und mittelst des Hufeisen-Stollens auf die rechte Seite des Hinterkopfes getreten. Bei der Untersuchung fand sich eine Wunde in den Weichtheilen und ein Einbruch des Knochens. Cerebralerscheinungen fehlten bei der Aufnahme in das Lazareth. Vier Tage nach der Verletzung befand sich Patient verhältnissmässig noch wohl, das Sensorium war frei, der Kräftezustand befriedigend. Temperatur 37,8, Puls 54 blieben auch fernerhin in diesen Grenzen, nur der Puls hob sich bis auf 72—78 Schläge. — Am 15. September trat anhaltender ziemlich heftiger Stirnkopfschmerz auf; am nächsten Tage stiessen sich mehrere Zellgewebsetzen ab, und reinigte sich die Wunde immermehr, auch die Eiterung wurde reichlicher und dicker, ja bis zum 22. September war die Wundhöhle erheblich verkleinert. Der Schlaf war anhaltend tief und ruhig, doch schon vom 18. trat zeitweises Erbrechen, namentlich des Morgens, auf, vom 25. ab wurde auch der Nachtschlaf unruhig, Morgens

einerseits das Auffinden, das Anstechen des Abscesses auf Schwierigkeiten stösst, wie sich dies in dem von Dr. Kappeler veröffentlichten, so lehrreichen Falle zutrug, andererseits durch die Aspiration, wie in dem Falle von Pingaud, Veranlassung zu Blutungen, schweren apoplektischen Erscheinungen (Anfüllung eines Seitenventrikels und der 4. Hirnkammer) gegeben werden kann.

wurden ganz kurze Zeit andauernde Zuckungen in Armen und Beinen beobachtet, denen ein anhaltender tiefer Schlaf folgte. Die Haut und Conjunctiva erschien leicht ikterisch gefärbt. Nächsten Tages stellten sich beim Verbandwechsel kurze Convulsionen der Oberextremitäten, Schielen und vorübergehender Verlust des Bewusstseins von Neuem ein, dabei waren die Kräfte sehr verfallen, zugleich Kopfweh, das am 29. in Coma übergeht. Dabei verschlechterte sich das Aussehen der Wunde; das Coma nimmt zu und am 30. tritt der Tod ein.

Obduction. Schädelhöhle: Auf der rechten Seite des Hinterhauptbeins circa 2 Finger breit hinten und in der Höhe des äusseren Gehörganges befindet sich ein fünf Groschenstückgrosser Hautdefect, dessen Ränder am Knochen anliegen. Nach Entfernung der Haut zeigt sich daselbst ein zehngroschenstückgrosser Defect in der Tabula externa mit zum Theil gezacktem Rande; die Tabula interna liegt weissgefärbt vor und zeigt sich zerrissen, in drei Stücke eingebogen nach innen. Von diesen Bruchstücken aus verbreiten sich mehrere Sprünge durch den Knochen, nach dessen Rändern hin sich erstreckend. Die Schädelhaube ist überall adhärent; Schädelkapsel von mässiger Dicke. — Die Dura mater, sonst normal, erscheint an der dem Knochendefect entsprechenden Stelle leicht verdickt an der Aussenfläche; auf der Innenfläche ist sie auf der Höhe des Schädeldgewölbes an mehreren Stellen mit der Pia verwachsen; die Sinus sind stark mit Blut gefüllt, die Pia blutreich und zerreisst leicht bei dem Versuche, sie vom Gehirn abzuziehen. Im Subarachnoidealraume findet sich circa ein Esslöffel voll gelber Eiter, auf dessen Oberfläche klare wässrige Flüssigkeit ist. Das Grosshirn ist von normaler Consistenz, auf dem Durchschnitte treten wenig Blutpunkte hervor, die Ventrikel sind leer, die rechte Hälfte des kleinen Hirns fühlt sich weicher an, als das linke, auf dem Durchschnitte zeigt sich etwa in der Mitte ein wallnussgrosser Herd von dickem zum Theil blutig gefärbtem Eiter, die nächste Umgebung des Herdes ist erweicht und dunkelroth gefärbt.

Der letale Ausgang wurde hier durch die Bildung eines Hirnabscesses, welcher wesentliche intracranielle Circulationsstörungen mit eiterigem Erguss in die Hirnhüllen und einen sich stetig ausbreitenden Hirndruck zur Folge hatte, herbeigeführt. Der Abscess mit zum Theil blutigem Inhalte entwickelte sich aus einem hämorrhagischen Herde, welcher beim Sturze durch die Erschütterung, durch Gefässruptur und Zertrümmerung von Hirnsubstanz verursacht wurde, nicht aus einer directen Quetschung, da die oberflächlichen Partien des kleinen Gehirns keine Spuren einer Läsion, keine Producte einer Contusion nachwiesen. Die eingedrückte Tabula vitrea selbst bewirkte keinen localen Hirndruck, denn ein solcher fehlte anfangs gänzlich, was nicht hätte sein können, wenn die Infractio directen Schaden veranlasste; sie verursachte auch keine eigentliche Meningitis purulenta durch Reizung, da sich an der Stelle des Einbruches die Dura auf der

Aussenseite nur mässig verdickt zeigte, sich auf ihrer inneren Fläche keine Eiterablagerung fand.

L. Nr. 79. II. 2. E. b. f. F. b. H. b.

Gefreiter Waibel geht am 20. Januar 1873 im Lazareth zu mit einer starken Contusion des Auges mit Blutunterlaufung. Sehvermögen gut, ebenso das Allgemeinbefinden. Patient gibt an, mit einem Stockgriffe auf das Auge geschlagen worden zu sein. Unter strenger Antiphlogose (Kälte, Blutegel, Laxantien) gelingt es die äusseren Entzündungserscheinungen zu mässigen, Röthung und Spannung des Augapfels bestehen aber noch fort und scheint sich die Entzündung auf die Orbita zu verbreiten. 29. Januar. Puls klein, langsam, Brechreiz, Augapfel ziemlich starr, Pupille langsam, Sehen herabgesetzt. Eisblase und Laxantien. — Bis zum 4. Februar war das Befinden leidlich, dann stellten sich Kopfschmerz und Stuhlverhaltung ein; Patient sieht verfallen aus. Puls langsam, 60 Schläge, Kopf heiss, Urin trübe, Körperzittern, Unvermögen die Zunge heraus zu strecken. — Calomel. — Abends ist der Zustand besser; es sind keine Lähmungserscheinungen vorhanden. Temperatur 39,3, Puls 70. Mehrmaliger Stuhl.

Dieser Zustand zieht sich bis zum 9. hin, bessert sich allmählich bis zum 12., so dass die ophthalmoskopische Untersuchung des Auges vorgenommen werden konnte, welche neblige Trübung des Glaskörpers und zwei kleine Pigmenthäufchen auf der Netzhaut, letztere von Extravasaten wahrscheinlich herrührend, ergibt. Am 13. Februar stellt sich wieder Kopfweh ein unter gleichzeitigem Erbrechen. Das Fieber hält sich in sehr mässigen Grenzen, wenn auch einmal ein Ansteigen erfolgt. Behandlung rein symptomatisch. Seit dem 28. Februar ist Patient sehr verfallen, theilnahmslos, lässt den Urin ins Bett gehen; am 3. März Frost, Zucken und Zittern im ganzen Körper. Patient bietet zu dieser Zeit das Bild eines Blödsinnigen. Diese Erscheinungen bessern sich aber wieder bis zum 30. März, dann treten sie in früherer Stärke wieder ein, um am 4. April einem Excitationsstadium Platz zu machen, welches bis zum 17. dauert. Sein Zustand macht in dieser Zeit einen besseren Eindruck, da Patient isst und trinkt, von Beschäftigung spricht, das Bett zu verlassen wünscht. Am 17. aber tritt wieder Erbrechen ein, die Apathie, Somnolenz nimmt zu, die Lähmungserscheinungen werden deutlicher, unter Steigerung des Sopor tritt am 19. April der Tod ein.

Sectionsbefund. Nirgends am Kopfe eine Verletzung sichtbar. Kopfschwarte blutleer, blass, Schädeldach mitteldick; die harte Haut nicht abnorm mit dem Schädel verwachsen, die Windungen des Grosshirns abgeplattet, aneinander gepresst, so dass die Furchen kaum wahrzunehmen sind, die Blutgefässe der weichen Hirnhaut nicht übermässig mit Blut gefüllt, die letztere selbst schwach getrübt, glanzlos. Auf der linken Stirnhälfte, oberhalb der Stelle des linken Stirnhöckers ist eine taubeneigrosse 3 Cm. im Durchmesser haltende, sichtlich abgeplattete, fast eingesunkene und mit harten Rändern umgebene Stelle wahrzunehmen, deren Dichtigkeit um ein beträchtliches geringer ist, als die der umgebenden Hirnmasse. Auf dem Durchschnitt der rechten Hirnhälfte zeigt sich das Hirnmark trocken, blutarm. Die rechte Hirnhöhle ist ums Dreifache erweitert und

zwar gleichmässig nach dem vorderen und hinteren absteigenden Horn, ihre Auskleidung und Adergeflechte sind blass und blutarm. Bei ihrer Eröffnung ergiessen sich etwa 50 Grm. klarer, farbloser Flüssigkeit, auch der rechte Ventrikel enthält etwa 30 Grm. wasserhellen Serums. In der gleichen Höhe mit dem Dache dieser Höhle und zwar in der Richtung nach vorn befindet sich ein haselnussgrosser Eiterherd, von oblonger Form, verdickten, schaaalenförmigen Wandungen, dickem grünem Inhalt; die umgebende Hirnmasse im Zustande der graugelblichen Erweichung: Hinten ist der Abscess durch eine 1½ Cm. breite Wand vom linken Seitenventrikel, vorn durch eine 1 Mm. dicke vom vorderen Rande der linken Hemisphäre getrennt. — An der Hirnbasis, da, wo dieselbe dem linken Orbitaldache aufliegt, ist ein Knochenstück von rhomboidaler Form, einem Längsdurchmesser von 2 Cm. und in einer Tiefe von 1 bis 2 Mm. in die Hirnmasse eingedrungen, und gelingt es von da mit der Sonde in den Abscess zu gelangen. Das Knochenstück passt genau in einen Defect des oberen Theils des Proc. orbit. oss. frontal. sin. Sonstige Verletzungen oder pathologische Veränderungen sind nicht vorhanden.

Belehrender Fall von protrahirtem, mit kurzen Latenzperioden verbundenem Verlaufe einer durch Reizung eines fremden Körpers verursachten localen Hirnvereiterung.

Wie spät oft Hirnabscesse sich erst bemerkbar machen, möge durch folgende Fälle bewiesen werden.

a) Verletzung in der Höhe des rechten Scheitelhöckers mittelst eines Nachtwächterspiesses. Stichwunde; umsichtige ärztliche Behandlung. Patient sollte schon für ganz geheilt erklärt werden, als 8 Monate später sich plötzlich die Erscheinungen von Hirndruck (Gefühl eines fremden Körpers im Gehirn, Gedächtnisschwäche, Schwindel, Sopor) einstellten, und der Tod im 9. Monate nach der Verwundung erfolgte. Bei der Obduction fand sich eine Loslösung der Glastafel, und von dieser Stelle aus drang ein Abscess trichterförmig bis gegen den Schädelgrund.

b) Sturz auf einer Treppe auf die rechte Scheitelgegend. Kurze Zeit nachher vermindertes Gefühl linkerseits, verminderte Bewegungsfähigkeit und Sprachstörungen. Diagnose apoplektischer, hämorrhagischer Herd in Folge Ruptur verkalkter Gefässe im Marklager. Scheinhare Rückbildung des Processes, die Functionsstörungen treten zurück. Nach Ablauf von 10 Monaten plötzliche Verschlimmerung: Schwindel, Eingenommensein des Kopfes, Verlust des Gedächtnisses, undeutliche Sprache, automatische Bewegung mit der Hand gegen das rechte Scheitelbein und Reiben dieser Stelle, da von hier aus die Schmerzen ausstrahlten. Steigerung der Erscheinungen, Unbesinnlichkeit, Durchfeuchtung des Gehirns, Hirndruck, Sopor, Tod. Bei der Obduction konnte ein nussgrosser Abscess im Mark-

lager über dem rechten Sehhügel nachgewiesen werden. Den Kern des Abscesses bildeten noch die Reste des früher extravasirten Blutes; in der Umgebung seröses Infiltrat und Erweichung. Hirnhäute verdickt, Gefässe grösstentheils verkalkt.

e) Zugang eines Unterofficiers in das Lazareth unter Erscheinungen einer Hirndurchfeuchtung, einer beginnenden Erweichung oder Abscessbildung. Schwindel, Stechen im Kopf, Brechreiz, Schlaflosigkeit, Puls, Respiration verlangsamt; keine Sensibilitäts- und Motilitätsstörungen. Bei der Forschung nach der Ursache des Leidens erfuhr ich, dass Patient einige Monate früher bei einem kurzen Aufenthalte in der Heimath einen starken Schlag mit einem grossen irdenen Krug auf die rechte Schläfen- und Hinterhauptsgegend erhalten habe. — Bald stellte sich Sopor ein und der Tod erfolgte nach einigen Tagen. Bei der Section ergab sich das Bestehen eines in eiterigem Zerfliessen begriffenen, bohnergrossen alten hämorrhagischen Herdes im Marklager der rechten Hälfte des kleinen Gehirns, ausgebreitetes Hirnödem, seröser Erguss in den Höhlen.

b) Gehirnerweichung.

Bei der unreinen Gehirnerschütterung habe ich einen Fall, bei dem als Folge oberflächlicher Hirnläsionen eine bestehende Erweichung der Hirnsubstanz angenommen werden muss, bereits mitgetheilt. Einen solchen, der auf dem Obductionstische die bezeichneten Veränderungen nachweisen liess, veröffentlichte ich in meinen Schädelverletzungen. Bei diesem letzten stürzte ein Geselle in trunkenem Zustande mit dem Kopfe auf die Treppe. Den folgenden Tag taumelte Patient wie ein Berauschter, erbrach sich, sprach unverständlich und lallend, blieb wie eine Statue in der ihm gegebenen Stellung, führte verschiedenartige automatische Bewegungen aus, schlug mit jedem Gegenstand Feuer etc. — Dieser dem Blödsinn ähnliche Zustand dauerte mehrere Wochen an, allmählich besserte sich die Sprache, es konnte Patient auch wieder arbeiten, aber seine geistige Thätigkeit blieb eine gestörte. Vier Jahre später stellten sich in Folge eines Rausches Convulsionen ein und starb Patient nach 3 Tagen. Es fand sich bei der Leichenöffnung eine geheilte und ausgebreitete Fractur des rechten Schläfen- und theilweise des Seitenwandbeins. Der inneren Fläche der Bruchstelle entsprechend war das Gehirn einen halben Zoll tief im Zustande der gelben Erweichung und zum Theil in einen sulzigen Brei verwandelt, besonders in der Nähe des Felsenbeins, wo die Dura sich missfarbig zeigte.

Hier bestanden jedenfalls an der Hirnoberberfläche Läsionen in Folge der Gefässruptur mit Hirnzertrümmerung; im weiteren Verlaufe kam es zur chronischen Erweichung, welche durch den schädlichen Einfluss des Alkohols weitere Störungen nach sich zog.

Aus der gesammten Casuistik, 245 Fälle, darunter 79 mit gleichzeitiger Betheiligung des Gehirns ¹⁾, ist ersichtlich, dass sich besondere Zufälle, sogen. Complicationen, zu den mitgetheilten verschiedenen Arten von Schädelverletzungen beinahe gar nicht gesellten, dass, abgesehen des Eintrittes von Wundfieber oder Rothlauf, in 8 Fällen von äusseren Beschädigungen, bei welchen namentlich Verhaltung des Wundsecretes, theils durch Anlage der Naht, theils durch ungeeignete Besorgung der Wunde bei beabsichtigter Verheimlichung derselben verursacht, nur in einem Falle die Bildung eines Lungenabscesses mit secundärer eiteriger Pleuritis ohne charakteristische Erscheinungen der Pyämie beobachtet wurde. — Die Entstehung dieser zuletzt genannten accidentellen Störung scheint mir, da Gerinnsel im Sichelblutleiter gefunden wurden, als Folge einer Thrombosirung, eines embolischen Infarktes in das Lungengewebe aufgefasst werden zu müssen, da anderweitige Anhaltspunkte mangeln und der Vorgang einer Alteration im vasomotorischen Nervensystem nicht leicht zugeschrieben werden kann, da der Sitz der Verletzung wie des Eiterherdes fern von jenem des automatischen vasomotorischen Centrums im verlängerten Marke war.

Aus dem Mangel wichtiger Complicationen, wie aus der verhältnissmässig geringen Zahl von Todesfällen (26 unter 245, darunter 10 aus der Privatpraxis), bei welchen der letale Ausgang in der Grossartigkeit der Störungen begründet war, geht in überzeugender

1) Unter den 79 Schädelverletzungen mit gleichzeitiger Betheiligung des Gehirns und seiner Hüllen befinden sich 45 reine und 11 unreine Gehirnerschütterungen, ferner 23 Fälle von Hirndruck und zwar 1 mal verursacht durch Infraction und Impression eines Stückes der Glastafel, 15 mal durch Gefässzerreissungen (11 mal mit gleichzeitiger Continuitätsstörung des Gehäuses, 4 mal ohne dieselbe), 3 mal durch Zertrümmerung der Hirnmasse (darunter 1 wahre Hirnquetschung und 2 gequetschte Hirnwunden), endlich 4 mal durch Circulations- und Ernährungsstörungen, Reizung und diffuse Entzündung der Hirnhüllen etc. — Elf Verletzungen waren durch scharfe Instrumente, die übrigen durch stumpfe Gewalt gesetzt. In 26 Fällen trat der Tod ein (5 mal bei Hirnerschütterung, 21 mal bei Hirndruck). Bleibender Schaden wurde 2 mal und zwar bei unreiner Hirnerschütterung beobachtet.

Weise hervor, dass den verschiedenen Verletzungen von Anfang an die richtige Ueberwachung und Pflege zu Theil wurde.

Wie ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten betonte, ist es bei den Schädelverletzungen die Hauptaufgabe des Wundarztes: den Verletzten allen Schädlichkeiten zu entziehen und dafür Sorge zu tragen, dass bei vollkommen geistiger wie körperlicher Ruhe, bei einfacher flüssiger Nahrung, blander Kost, kühlenden Getränken, Aufenthalt in reiner Luft, bei beständiger Ueberwachung durch eine einfache aber subtile Besorgung der Wunde, einfachen zweckmässigen Deckverband, durch den Umständen und individuellen Verhältnissen entsprechende Anwendung der Kälte, durch innerlich ableitender Mittel, reizende Klystiere, nöthigenfalls durch locale Blutentziehungen die lebensgefährlichen Hirnzufälle ab- oder in Schranken gehalten werden können. Von Anfang an müssen die zur Heilung nöthigen Bedingungen berücksichtigt werden, da Vernachlässigungen schwer gebüsst werden. Eine ärztliche Beaufsichtigung ist bis zur perfecten Heilung immer nothwendig, weil Zwischenfälle so leicht entstehen und rasch einen nicht mehr zu bekämpfenden Höhepunkt erreichen.

Zur Stellung der Diagnose ist ein umsichtiges, fürsorgliches Verfahren unbedingt nöthig, da durch rohes Eingreifen oft schwerer Schaden verursacht wird. Ohne besonderen Grund bewaffne der Chirurg seine Finger nicht, er suche mittelst des Gesichtssinnes und mittelst richtiger Beurtheilung der beobachteten Erscheinungen eine klare Anschauung von den gesetzten Veränderungen zu gewinnen. In das Detail des ärztlichen Handelns hier einzugehen, liegt dem Zwecke der Arbeit fern; ich mache hier nur von Neuem darauf aufmerksam, dass das in neuerer Zeit wieder empfohlene schablonenartige Nähen aller Schädelwunden zu verwerfen ist.

Wenn sich auch bei reinen Schnitt- und Hiebwunden ohne jegliche Quetschung die Naht ohne Schaden erweist und deshalb zu einer ersten Vereinigung, die übrigens auch bei einfachem Deckverband erfolgt, das Ihrige beiträgt, so ist dies aber nicht der Fall: wie die tiefer gelegenen Gebilde eine Zerrung, Beleidigung durch das Trauma erfahren haben, sich bei der Lockerheit des filamentösen tieferen Zellgewebes unter der Galea, blutiger Erguss, Infiltration in diesen Gewebsschichten, mit Verhalt des Wundsecrets und entsprechenden bekannten gefährlichen Folgen wegen oberflächlicher Verklebung der Ränder entwickeln kann. Sehr rasch gestaltet sich dann oft eine einfache Verletzung zu einer complicirten durch Auftritt von Rose, hochgradigem Wundfieber, Ergriffensein des Schädeldaches, Thrombosirung der Diploegefässe, welchen accidentellen Störungen, suppurative

Eiterung, Nekrose, namentlich Pyämie hin und wieder folgen. Be-
findet sich der Verwundete in einem Lazareth, wird er mehrmals
im Tage vom Arzte besucht, so kann allerdings bei den ersten
schlimmen Erscheinungen, durch richtiges Erkennen der Ursache,
durch sofortige Entfernung der Nähte den Complicationen die Spitze
gebrochen werden, wenn aber, wie dies häufig der Fall, der Patient
auf dem Lande oder überhaupt in ungünstigen Verhältnissen lebend,
nach Ablauf von Tagen erst wieder den Arzt sieht, so kann in dieser
Zeit Ursache zu einem letalen Verlaufe gegeben werden.

Wie unzuverlässig die Wirkung der blutigen Naht bei in die
Tiefe gehenden Wunden, bei welchen der Wundgrund immer con-
tundirt wird, ist, dürfte aus folgender Zusammenstellung hervor-
gehen: Gegen meine allgemeinen Vorschläge bezüglich der Behand-
lung der Schädelwunden wurde dennoch in 66 Fällen (ohne Cere-
bralerscheinungen) die blutige Naht angelegt; nur in 8 erfolgte eine
erste Vereinigung, in allen übrigen musste die Naht wegen Eintritt der
Eiterung in der Tiefe mit ihren Folgen entfernt werden; desgleichen
legte man in 14 Fällen (mit Cerebralerscheinungen) die Naht an
und erzielte nur 2 mal bei ganz oberflächlichen Rissen die Heilung
per primam, 12 mal dagegen war auch die frühe Entfernung der
Fäden dringend geboten. Im Laufe der Zeit haben sich manche
Collegen überzeugt, wie nicht allein unnütz, sondern sogar direct
schädlich das schablonenmässige Nähen sei.

Die blutige Naht ist nach meinen Erfahrungen vorzugsweise
nur bei den Lappenwunden, bei weitgehender Ablösung der Galea
angezeigt. Hier ist wegen völliger Trennung des Zellgewebes zwi-
schen Galea und Periost eine Spannung und Infiltration nicht mög-
lich, und kann sich das Secret nöthigenfalls, den Lappen an einer
Stelle emporhebend, Ausfluss zu verschaffen suchen, ohne die Um-
gebung durch Infiltration in Mitleidenschaft zu ziehen. In ganz über-
raschender Weise gelingt dann oft hier die erste Vereinigung, weil
die anatomische Beschaffenheit der verwundeten Theile eine solche
unterstützt. Sammelt sich an einer Stelle mehr Secret an, zieht
dasselbe nicht zwischen zwei Nähten ab, wie dies sich selten zwar
an der Basis des Lappens findet, so muss alsdann eine Incision gesetzt
werden. Bei allen Einschnitten empfehle ich immer die Benutzung
des Scalpells und schichtenweises Eindringen von aussen nach innen,
nie jene der Lanzette und Trennung der Gewebe von innen nach
ausssen von der Stichwunde aus. Ich habe nämlich bei letzterem
unsicheren Verfahren schon Verletzungen von Schlagadern beobachtet.
Wenn auch für einen geübten Chirurgen die Stillung einer solchen

Blutung nicht von besonderem Belang ist, so kann dieselbe bei einem unerfahrenen Collegen auf Hindernisse stossen; überhaupt soll von jedem Chirurgen grundsätzlich jegliche arterielle Blutung wegen ihrer oft nicht zu berechnenden Folgen vermieden werden.

Bezüglich des Verbandes hat sich meine alte einfache Methode: Gittercharpie, feuchte geschabte Charpie, geordnete Charpie, Compressen, Watte, Kopfnetz immer bewährt. Hin und wieder glaubte man Carbolöl oder den antiseptischen Verband in Gebrauch ziehen zu müssen. Auffallend war, dass gerade unter einem solchen eine Verjauchung des Secrets in der Tiefe der Wunde erfolgte, wogegen bei einfach deckendem Verband mit Benutzung des kalten Wassers oder Oels, selbst eine ausgedehnte Galeaablösung, wie ich dies zwar auch schon früher wiederholt beobachtete, per primam innerhalb weniger Tage heilte.

In keinem Falle kam die Trepanation als operatives Hilfsmittel in Frage. Die Stellung, welche ich dieser Operation gegenüber einnehme, ist noch immer dieselbe wie früher, ich halte die Trepanation nämlich für angezeigt in besonderen seltenen Fällen, in welchen die Natur ohne operativen Eingriff nichts mehr zu leisten, die Entfernung der lebensgefährlichen Potenzen nicht mehr zu bewirken im Stande ist, die Verhältnisse aber relativ noch so günstige sind, dass der Arzt mit einem gewissen Grade von Sicherheit und einiger Hoffnung auf Erfolg zur Ausführung derselben schreiten kann. Von der Umsichtigkeit des Wundarztes, von dessen klarer Beurtheilung der bestehenden Veränderungen, von dessen scharfem Blicke hängt allein ab, ob die Indicationen hierzu richtig gestellt werden oder nicht. Statistische Zusammenstellungen können deshalb über den Werth der Trepanation keinen Aufschluss geben; nur dann, wenn von einem erfahrenen, ruhig beobachtenden Chirurgen über eine grössere Zahl von ihm selbst für wirklich nöthig erachteten und von ihm ausgeführten Trepanationen in umfassendster Weise, mit Schilderung aller Umstände und Präcisirung der Indicationen berichtet wird, kann ein entsprechender Gewinn erwartet werden. Bei einem sehr reichlichen Material ist es mir leider nicht immer während meines wundärztlichen Wirkens gestattet gewesen, die einzelnen gebotenen Fälle ununterbrochen zu beobachten, deren Behandlung anhaltend zu leiten und im geeigneten Momente einzugreifen; öfters ward deshalb der günstige Augenblick versäumt und verlief ein oder der andere Fall letal, in welchem vielleicht die Trepanation noch Hülfe geschafft hätte.

Zum Schlusse der Arbeit lasse ich hier, gleichsam als Anhang,

noch einen sehr seltenen Fall von Zerreissung des Rückenmarks, durch Hyperflexion des Körpers verursacht, folgen, weil man bei demselben zuerst eine Fractur der Schädelbasis vermuthete. — In den Memorabilien, Jahrgang 1873, hat Betz zuerst einen sehr lehrreichen Vorgang dieser Art veröffentlicht und dabei darauf aufmerksam gemacht, wie sich nur eine Ruptur des Rückenmarks, welche er bei seinem Falle annahm, denken liesse, wenn ein Zug und Gegenzug auf dasselbe einwirkt, wie sich aber auch diese beiden Momente bei der Hyperflexion des Körpers als vorhanden erwiesen. Kopf und Hals übermässig flectirt, erfahren nämlich eine übermässige Dehnung, aber auch der untere Theil des Rumpfes geräth dabei in Hyperflexion. Es bilden sich so an den zwei Enden des Rückenmarks Zug und Gegenzug aus; die Medulla bildet gleichsam eine spannende Saite über eine ungewöhnlich starke Curve und die Folge davon ist, dass dem höchsten Punkt des Bogens, wo die Spannung am grössten, eine Ruptur eintritt. Einen überzeugenden Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht liefert unser Fall.

L. Strittmarter, Gefreiter im 2. bad. Dragonerregiment, stürzte beim Voltigiren über das Pferd, wobei die Wirbelsäule sehr flectirt war, auf den Kopf. Kurze Zeit Bewusstlosigkeit, dann vollständige Lähmung der unteren Gliedmassen und theilweise solche der oberen. Am folgenden Tag fand sich Sensibilität und Motilität an Händen und Armen mehr gestört, an den Beinen vollkommen aufgehoben. Pupillen reagirten gleichmässig. Die Zunge wurde gerade herausgestreckt. Patient äussert starken Schmerz beim Druck in der Gegend des 1. bis 6. Halswirbels. Schröpfköpfe. Den 24. Mittags heftige Athembeschwerden, Sensorium frei; am 25. früh 5 Uhr erfolgte der Tod.

Obductionsbefund. Nach Entfernung der Schädeldecke, an welcher sich keine Abnormitäten zeigten, sah man die an der Oberfläche des Gehirns verlaufenden Gefässe strotzend gefüllt. Bei der Herausnahme des Hirns und der Trennung der Medulla oblongata floss aus dem Halswirbelkanal eine etwa 120—150 Grm. betragende Blutmasse in die Schädelhöhle hinein. Weder in den Ventrikeln des Gehirns, noch in sonstigen Theilen desselben fanden sich pathologische Erscheinungen. An der Schädelbasis war nirgends eine Fractur zu erkennen. Als behufs Herausnahme der Halswirbelsäule ein Schnitt auf die Dornfortsätze geführt wurde, fand sich in den den 5. Halswirbel umgebenden Weichtheilen ein Blutextravasat. Bei näherer Freilegung des hinteren Theiles der Wirbelsäule stellte sich heraus, dass man den Processus spinosus des 5. Halswirbels nach beiden Seiten hin bewegen konnte. An der hierauf herausgenommenen Halswirbelsäule konnte man deutlich erkennen, dass der Wirbelbogen vom Körper an beiden Enden abgebrochen war und rechts noch durch Weichtheile mit seiner Umgebung zusammenhing. An den beiden Seiten war die Verbindung vollständig gelöst. In dem

Rückenmarkskanal befand sich eine beträchtliche Menge fest coagulirten Blutes, welches das Rückenmark dicht umgab.

Als mir das Präparat behufs näherer Untersuchung zugesandt war, forschte ich gleich nach der Beschaffenheit des Rückenmarks selbst. Ich löste somit den gebrochenen Wirbelbogen ab, dass man von rückwärts nach Trennung der nicht zerrissenen harten Haut einen guten Ueberblick über die Medulla an der verletzten Stelle gewinnen konnte. Es stellte sich nun hierbei heraus, dass die hinteren Stränge beinahe ganz abgerissen waren; die einzelnen freien zertrümmerten Bündelchen flottirten, von erweichten Massen umgeben, in dem gesetzten beträchtlichen Substanzverluste des Rückenmarks.

Die ursächlichen Momente für die während des raschen Verlaufes beobachteten Erscheinungen waren nun klar gestellt. Durch die enorme Spannung der Wirbelsäule beim Sturze auf den Kopf in hyperflectirter Stellung, kam es an der Stelle der grössten Spannung, nämlich in der Höhe des 5. Halswirbels, zu einer Continuitätsstörung des Wirbelbogens selbst, derselbe war an beiden Enden losgerissen, ferner zu einer Ruptur der Gefässe im Rückenmarkskanal, durch welche ein ganz beträchtlicher Bluterguss verursacht wurde, endlich zu einer Zerreißung der hinteren Stränge der Medulla selbst.

Die Verletzung des Rückenmarks veranlasste, dem anatomischen Sitze entsprechend, alsogleich vollständige Lähmung der unteren Gliedmassen und theilweise der oberen, der kolossale Bluterguss, welcher bis in die Schädelhöhle reichte, übte einen intensiven Druck auf die Medulla, namentlich auf das verlängerte Mark und somit auf die wichtigen automatischen Centren, namentlich das Respirationscentrum, aus, führte deshalb den raschen Tod herbei.

NACHTRAG.

Während des Druckes vorliegender Arbeit kam noch folgender Fall von Hirnerschütterung und Hirnreiz wie -Druck, durch Einbruch und Depression des rechten Scheitelbeins bewirkt, in der Garnison Karlsruhe zur Beobachtung.

Kanonier Sebastian Reiss vom 1. bad. Feldartillerieregiment Nr. 14, 7. Batterie, warf sich den 4. April 1877 Abends 6 Uhr, zwischen Gottesaue

und Durlach beim Herannahen des Zuges, in der Absicht seinem Leben ein Ende zu machen, von der Böschung des Bahndammes aus auf die Schienen. Da derselbe hierbei die Entfernung nicht gut bemessen hatte, so kam er mit dem Kopfe nicht über die Schienen zu liegen, weshalb ihn nur der Schienenreiniger der Locomotive an der rechten Kopfseite traf und ihn derart zur Seite schleuderte, dass er wie todt auf der Bahn liegen blieb und erst später vom Bahnwärter entdeckt und auf dessen Anzeige hin von Gottesaue aus in noch bewusstlosem Zustande in die Kaserne und von da in das Garnisonslazareth transportirt wurde.

Zwei Stunden nach erfolgter Verletzung fand ihn der Truppenarzt noch ganz unbesinnlich; der soporöse Zustand hielt auch bei der Ankunft im Lazareth noch einige Zeit an. Das Aussehen des kräftig gebauten Patienten war blass und etwas collabirt, die Augenlider geschlossen, die Respiration ziemlich regelmässig, von mittlerer Tiefe (20 Athemzüge in der Minute), der Puls klein, ziemlich gespannt (110), Spitzenstoss des Herzens sichtbar. Auf äussere Reize, besonders bei Untersuchung der Wunden, reagirt Patient mit Stöhnen und kräftigen Bewegungen; Lähmungen wie Convulsionen fehlen.

Bei der Untersuchung finden sich folgende Verletzungen:

1) Die rechte Hand ist vom Vorderarm beinahe völlig getrennt, steht nur durch einige Hautbrücken mit demselben in Verbindung, die Handwurzel- und Mittelhandknochen sind beinahe vollständig zermalmt, mehrere Sehnenenden hängen frei aus der Wunde heraus; die Haut des Vorderarms ist bis zur Mitte desselben abgerissen, dessen Muskeln im unteren Theile zerfetzt. Die Wunde hatte ziemlich stark geblutet.

2) In der rechten Scheitelbeingegegend, gleich hinter der vorderen Grenze des Haarwachses beginnend und 3 Cm. von der Sagittalnaht entfernt, findet sich eine der letzteren parallel laufende 4 Cm. lange tiefe Wunde vor, in deren Grunde der Knochen entblösst liegt. Eine wegen der lebhaften Reaction des zur Besinnung kommenden Patienten nur oberflächliche und vorsichtige Untersuchung ergibt unter dem oberen Wundrande, diesem etwa gleichverlaufend eine ziemlich ausgedehnte Infractio und starke Depression des blossliegenden Knochens, so dass eine völlige Continuitätsstörung des Schädeldaches in der ganzen Dicke des Knochens angenommen werden muss; ein Defect wie bewegliche Knochenfragmente, lose Splitter etc. sind nicht zu fühlen.

3) In der Daumengegend des linken Handrückens sind zwei gerissene, nicht bedeutende Wunden der Haut, jede etwa 2 Cm. lang, sichtbar.

Von dem Stationsarzt der chirurgischen Abtheilung (Oberstabsarzt Steinam) wird gegen 10 Uhr Nachts die Amputation des rechten Vorderarmes an der Grenze des mittleren und oberen Dritttheils in der Chloroformnarkose ausgeführt. Amputationsmethode: Doppelzeitiger Zirkelschnitt. Bei Nachlass der Compression der Art. brachialis spritzt nur die Radialis, welche wie die Ulnaris und Interossea mit Seidenfäden unterbunden wird. Blutverlust bei der Operation minimal; Wundränder durch zwei Hefte vereinigt, deckender Verband. Im Befinden des Patienten nach der Operation keine Aenderung.

Während der Nacht lag Patient anscheinend ruhig schlafend; zuweilen

phantasirte er vor sich hin, verlangte aber auch zu trinken. Er klagt über Schmerzen im Kopfe, im rechten Arm und rechten Bein, an welchen letzteren sich aber keine Beschädigung constatiren lässt. Er erkennt seine Umgebung, nennt den einen Wärter beim Namen und sagt, dass er viel Bier getrunken habe. Die Augenlider sind meistens geschlossen, nur zuweilen öffnet er sie langsam beim Angeredetwerden und nur auf kurze Zeit. Es zeigt sich hierbei, dass das rechte obere Augenlid nicht ganz soweit gehoben werden kann, als das linke.

Als ich den 5. April, Vormittags 9 Uhr, den Verletzten zum ersten Mal sah, konnten an ihm keine Erscheinungen von Hirndruck wahrgenommen werden. Beide Pupillen reagirten gut (von mittlerer Weite), Unterschied besteht keiner. Im Bereiche des Nerv. facialis liessen sich keine Funktionsstörungen erkennen, desgleichen keine Sensibilitäts- und Motilitäts-Alterationen an den Extremitäten; Tasteindrücke werden beiderseits richtig localisirt, Bewegungen activ und passiv vollführt, Convulsionen wie Lähmungen fehlen. Patient gibt auf die an ihn gestellten Fragen richtige Antwort, streckt die Zunge in gerader Richtung ohne jegliche Seitenabweichung aus der Mundhöhle hervor. Da mir von dem ordinirenden Arzte über die Beschaffenheit der Schädelwunde berichtet ward, ich grundsätzlich ohne besondere Veranlassung nicht gern eine schon mehrere Stunden geschlossene, verklebte Wunde durch abermalige Einführung des Fingers insultire, nicht gern zu neuen Blutungen etc. Veranlassung gebe, jegliche Cerebralerscheinungen fehlten, so verzichtete ich auf eine eigene Exploration der Wunde und hielt auch einen sofortigen operativen Eingriff, eine primäre sogenannte fürsorgliche Trepanation im Momente nicht für angezeigt, machte jedoch darauf aufmerksam, dass gleich beim Eintritt intensiver Hirnsymptome zur Trepanation gegriffen werden müsse, da bei dem heftigen Insulte gewiss die Knochenbeschädigung eine bedeutende sei. Consequent durchgeführte Antiphlogose, ununterbrochene Einwirkung der Kälte auf den Schädel etc. sollten möglichst den Auftritt schlimmer Zufälle verhüten. Die sorgfältigste Beobachtung und Berücksichtigung aller sich kundgebenden cerebralen Erscheinungen wurden dem ärztlichen Personale anempfohlen.

Im Laufe des Tages stellte sich Harndrang ein, welcher aber gegen Abend durch spontane Entleerung von etwa 400 Ccm. ziemlich dunkelgefärbten klaren Urins beseitigt wird. Specifisches Gewicht 1024, frei von Eiweiss. Patient ist etwas unruhiger, wirft sich öfters im Bett umher, klagt über Schmerzen im Kopf, im rechten Arm und Bein, sowie im Kreuz. Es fällt auf, dass er namentlich mit der rechten Seite agitirt. Körpertemperatur: 37,8, Puls 90.

In der Nacht vom 5. auf den 6. April schläft Patient zeitweise ruhig. Morgens keine wesentliche Aenderung; Sensorium ziemlich frei. Es wird der Verband des Stumpfes gewechselt, wobei der Verletzte heftige Bewegungen mit demselben ausführt. Aussehen des Stumpfes ganz befriedigend. Aus der Schädelwunde, welche mit geschabter Charpie ausgefüllt war, werden beim Wechsel des Verbandes verschiedene Haarbüschel, die zwischen den Knochenfragmenten eingekeilt sind, entfernt, einzelne haften aber noch in den Spalten fest. Die Wunde selbst zeigt keine wesentliche Veränderung, sie ist nur fortwährend mit einer serösen, etwas klebrigen Flüssigkeit erfüllt, die dem Pulse isochrone Bewegungen zeigt, und die auch den

Kopf benetzt. Sie muss als Liquor cerebro-spinalis angesehen werden. Während der Nacht hat Patient keinen Urin gelassen, vergebens versuchte er zu pissen. Da die Blase sehr gefüllt ist, wird der Katheter eingeführt und eine grosse Quantität Urin entleert. Die Application des Instruments ist nicht leicht, weil sich der Blasenhalshals krampfhaft contrahirt erweist. Puls ziemlich voll und regelmässig. Den Tag über abwechselnd Ruhe und stürmische Bewegungen, wobei das rechte Bein prävalirt. Patient hat viel Durst, klagt über Schmerzen im Halse und Nacken, besonders aber im ganzen Kopfe, wünscht immer mehr Eis in Anwendung gebracht. Urin wird wiederholt spontan entleert. Körpertemperatur Abends 39,8, Puls 108.

In der Nacht vom 6. auf den 7. April ist Patient sehr unruhig gewesen, hat sich fortwährend hin und her geworfen, phantasirt auch zeitweise. Urin und Stuhl ins Bett gelassen. — Benachrichtigt von dem Auftritte der bezeichneten Erscheinungen, namentlich von jenem heftiger Convulsionen, begab ich mich (leider war ich dazumal durch äussere Umstände verhindert öfters nach dem Verletzten zu sehen) in das Lazareth, um mich von den inzwischen eingetretenen Veränderungen zu überzeugen, und den behandelnden Arzt mit meinem Rathe zu unterstützen. Als ich an das Bett des Verwundeten trat, lösten sich ununterbrochen heftige Convulsionen von ganz aussergewöhnlicher Stärke, welche sich nicht nur auf die Extremitäten beschränkten und dieselben klonisch bewegten, sondern auch den Stamm und Nacken erfassten, aus. Wie beim Starrkrampf war der Kopf rückwärts gezogen und bäumte sich beim Beginn der Zuckungen der Rumpf auf. Die Masseteren wie die Kopfnicker waren aber weich anzufühlen, auch konnte der Unterkiefer leicht abgezogen, die Zunge gut herausgestreckt werden. Patient, dessen Gesicht sich sehr geröthet zeigte, war zwar noch vorübergehend bei Besinnung, wollte sich zeitweise verständlich machen und Antwort geben, wurde aber stets durch heftige Zuckungen daran verhindert und fiel bald in einen mehr soporösen Zustand. Bei den Convulsionen bemerkte ich, dass die rechte Seite in viel intensiverer Weise agitire als die linke, dass die letztere sich nicht in so hohem Grade innervirt zeige. Da sich somit das Bild einer heftigen Hirnreizung mit beginnendem Hirndrucke verbunden in instructivster Weise darbot, so fand ich mich veranlasst die Schädelwunde einer gründlichen Besichtigung zu unterziehen. Es ergab sich nun hierbei, dass gegen den oberen, hinteren Winkel hin im Grunde der Wunde das rechte Seitenwandbein fracturirt, dass in der Richtung gegen den vorderen und unteren Winkel verlaufend ein Theil des Knochens, eine breite und tiefe Rinne bildend und mehrere parallel ziehende Sprünge, in welchen Haarbüschel fest eingekleidet waren, erkennen lassend, in beträchtlichem Grade eingedrückt sei. An der Stelle, an welcher der Knochen eingestossen, deshalb aus dem Zusammenhange mit der höher stehenden Partie gebracht war, quoll milchig getrübbte, pus-haltige Cerebrospinalflüssigkeit aus der Tiefe ununterbrochen hervor.

Die Ursache der Convulsionen, überhaupt der so bedenklichen Erscheinungen konnte nicht, wie anderweitig vermuthet ward, in einer Erschütterung des Rückenmarks, in einer Spinalirritation allein, sondern vorzugsweise nur in einer, durch in die Schädelhöhle eingedrungenen und die Hirnhäute und das Gehirn selbst insultirenden Knochenstücke hervorgerufene hochgradige Gehirnreizung, beziehungsweise circumscripte Entzündung der

Hirnhüllen und der Hirnoberfläche selbst, sowie in einem durch die vorausgegangene schwere Hirnerschütterung mit ihren Folgen sich bereits entwickelnden und rasch zunehmenden, durch die Circulationsstörungen, deshalb durch erhöhte Absonderung, seröse Durchfeuchtung veranlassten intracerebralen Hirndruck gesucht werden.

Da eine energische Antiphlogose bisher nichts gefruchtet hatte, die Erscheinungen sich in rapider Weise steigerten, sich Sopor einstellte, so konnte hier nur noch von der Trepanation, wenn auch mit sehr geringer Aussicht auf günstigen Erfolg, eine Wendung zum Besten erwartet werden. Ich bestimmte deshalb die Ausführung dieser Operation auf den Mittag und liess hiervon die Collegen der Garnison in Kenntniss setzen. Um die Convulsionen einigermaassen zu beschwichtigen, ward ein Morphimpulver (0,01) gereicht. Die Zuckungen und Krämpfe dauerten dessungeachtet ununterbrochen an, sie beschränkten sich aber immer mehr auf die rechte Seite, wogegen sich die linke als paretisch erwies, namentlich blieb das linke Bein ruhig liegen, wenn sich auch sonst die heftigsten Convulsionen auslösten. Nur selten wurden die Augen geöffnet, und immer mehr färbte sich das Gesicht dunkelroth. Puls 90, noch kräftig, Athmung frei.

Als ich Mittags 3 Uhr zur Operation schritt, hatten die Druckerscheinungen noch mehr zugenommen, befand sich Patient in einem wirklich soporösen Zustande. Die Convulsionen rechterseits dauerten noch fort, weshalb die Chloroformirung für nöthig erachtet werden musste. — Durch einen die bestehende Wunde kreuzenden Schnitt von entsprechender Länge konnte nach Ablösung der Weichtheile die verletzte Knochenpartie in ihrem ganzen Umfange freigelegt werden. Bei eingehender Besichtigung stellte sich heraus, dass ausser dem schon beschriebenen Einbruch auch auf der unteren Seite nach vornhin eine beinahe kreisförmige Fissur bestehe, dass hier, wie überhaupt gegen den vorderen Winkel hin, der Knochen im Bereiche der Diploe gespalten und nach einwärts gebogen sei. Am oberen Rande des eingedrückten Stückes zeigte sich die Corticalsubstanz lamellenartig auseinander gerissen. An keinem Punkte war ein loser Splitter, ein nachgiebiges Fragment zu entdecken; die infracturirte Masse war fest in einander gekeilt. Nur von der Stelle aus, an welcher der Einbruch am tiefsten war und sich eine Lücke, aus der die getrübe Flüssigkeit beständig hervorsickerte, befand, liess sich ein geeigneter Zugang behufs Hebung und Entfernung der dislocirten Knochenstücke herstellen. Ich setzte deshalb eine Krone von mittlerer Grösse am Rande der Fractur im oberen Winkel auf den intacten Knochen auf und sägte in vorsichtiger Weise eine Scheibe von 2 Cm. aus. Nach Entfernung derselben kam die Dura unverletzt zum Vorschein. Jetzt führte ich ein geeignetes Elevatorium sorgfältig unter die niedergedrückte Partie und hob dieselbe bei Benutzung des Stahlbügels als Hypomochlion nicht ohne Anwendung von Kraft in die Höhe, wonach sie, in zwei grössere Stücke zerlegt, mit der Kornzange entfernt werden konnte. Bei diesem Vorgang drang dünne, eiterige, weisslich gefärbte Flüssigkeit aus einer Lücke in der Dura, welche das infracturirte Knochenstück bewirkt hatte, hervor, auch blutete ein bei der Verletzung selbst abgerissenes Gefässchen der Hirnhaut von Neuem. Beim Befühlen erkannte man deutlich das in die Dura gescheuerte Loch, welches die Grösse einer Linse darbot. In die Hirnmasse selbst eingedrungene Splitter

konnten nicht wahrgenommen werden, auch zeigte sich nirgends unter der harten Haut Fluctuation; dieselbe lag dicht auf der Hirnoberfläche auf.

Obleich nun ein grosser Theil des eingedrückten Knochens beseitigt war, so fand sich doch noch gegen den vorderen Wundwinkel hin in der ganzen Circumferenz die Glastafel von der Corticalsubstanz abgedrängt und gegen das Cavum hin eingebogen, aber nicht eingebrochen, abgelöst, sondern noch in fester Verbindung; es zeigte sich im Bereiche der Diploe ein beträchtlicher Abstand zwischen den beiden Tafeln. Um diese Partie nun zu entfernen, musste ich zuerst den eingebogenen Rand der Rindensubstanz in entsprechender Ausdehnung abmeisseln, dann wieder ein breites Elevatorium unter die Glastafel schieben und zur Beseitigung der letzteren, weil sie sich nicht aufrichten liess, gleichfalls den Hohlmeissel benutzen. Mit Geduld und vorsichtigem Gebrauche gelangte ich auch derart zum Ziele, dass in der ganzen Ausdehnung der Infractio kein Knochentheil mehr tiefer als die Umgebung stand. Eine Beleidigung der Hirnhüllen ward sorgfältigst vermieden.

Der Defect, in Form eines unregelmässigen Vierecks, ergab, abgesehen der durch die Trepankrone gesetzten Lücke, folgende Maasse: die obere Kante ist $2\frac{3}{4}$ Cm. lang und reicht bis zur Kronennaht, ihr vorderes Ende ist 3 Cm., ihr hinteres 4 Cm. von der Medianlinie entfernt; die untere Kante besitzt die Länge von 3 Cm., reicht ebenfalls bis zur Coronalnaht hin und ist von der oberen Kante vorn 2, hinten $2\frac{1}{2}$ Cm. entfernt. Als ich mich überzeugt hatte, dass nirgends mehr lose Splitter und Knochenspähne zu fühlen seien, wurde die Knochenwunde mit in Carbolöl getauchter, zarter geschabter Charpie ausgefüllt, darüber nach partieller Vereinigung der seitlichen Schnitte durch zwei Hefte, beölte Gittercharpie, ferner eine feuchte Leinwandcompreßse nebst Kopfnetz aufgelegt. Eine grössere, den ganzen Kopf umfassende Eiscompreßse nebst Eisbeutel kam alsogleich in Gebrauch.

Nach der Operation liegt der Patient, welcher sich während der Trepanation nur bei der Entfernung der tiefgelegensten Knochenpartie bewegte und dabei etwas stöhnte, ganz ruhig in somnolentem Zustande bis gegen 8 Uhr Abends. Man konnte sich dabei überzeugen, dass die Ruhe übrigens nicht allein von der Wirkung des Chloroforms, sondern auch von dem zunehmenden Hirndruck, der Hirndurchfeuchtung herrühre. Mit Beginn der Nacht traten wieder Convulsionen im rechten Bein und Arm auf, die Athmung wird stertorös, es entwickelt sich ein ausgeprägtes Stokes'sches Respirationsphänomen, indem in ziemlich regelmässigen Zwischenräumen kurze Respirationspausen eintreten, dann flache, allmählich stärker werdende bis zur völligen Dyspnoe gesteigerte Respirationen eintreten und nachher in gleicher Weise der Abfall erfolgt. Mit Beginn der Nacht ist Patient nicht mehr im Stande zu schlucken; allmählich lassen auch die Zuckungen nach. Gegen 11 Uhr zeigt sich in beiden Beinen eine mässige Starre, die alle Bewegungen zulässt, aber dabei einen geringen Widerstand erkennen lässt. Linker Arm ganz schlaff, im rechten noch vereinzelte Contractionen. Temperatur 40, Puls 180, in dem Augenblicke der stärksten Dyspnoe nicht mehr deutlich zu fühlen. Augenbindehaut vollständig unempfindlich, ebenso äussere Haut. Die Pupillen reagiren noch auf Lichtreiz, Weiteverhältniss nicht geändert. Die Athmung wird immer stertoröser,

starkes Trachealrasseln, kurze, seltene, krampfhaft inspiratorische mit gedehnter, stossweiser Expiration. In diesem Zustande erfolgt der Tod Nachts 1 Uhr. Kurz vor demselben steigt die Temperatur von 40 rasch auf 42. Die Temperaturverhältnisse während des Wundverlaufes waren überhaupt folgende: 5. April Abends 37,8, 6. April Morgens 37,8, Abends 39,8, 7. April Morgens 39,2, Abends 40,6.

Obduction 30 Stunden nach erfolgtem Tode.

Nach Wegnahme des Schädeldaches, welches sich als ganz normal gebaut und gehöriger Dicke erweist, nimmt man auf der inneren Fläche von dem vorderen Winkel ausgehend, der Stelle der kreisförmigen Fissur entsprechend, noch ein unbedeutend niedergedrücktes aber horizontal gestelltes, fest mit dem übrigen Knochen zusammenhängendes Stück der Glastafel wahr, welches aber wegen seiner günstigen Richtung und Lage keinenfalls einen weiteren Insult veranlassen konnte. Der Knochendefect ist sonst als rein zu bezeichnen, und konnte man sich an ihm überzeugen, dass durch die Trepanation die schädlich wirkenden Knochenfragmente alle entfernt waren.

Das Gehirn füllt die Schädelkapsel prall aus. Die harte Hirnhaut ist an der Verletzungsstelle in Folge abgerissener Gefässen blutig tingirt und dunkler gefärbt als die Umgebung, sie ist, wie schon früher angegeben, an einer Stelle von dem infracturirten Knochen durchstossen. Auflagerungen auf der äusseren Fläche finden sich keine, auch ist die Färbung mit Ausnahme der schon bezeichneten Partie vollkommen normal. Bei dem Einschneiden der Dura fliesst eine dünne, eiterig seröse Flüssigkeit, welche sich zwischen ihr und der Pia befindet, in geringer Quantität ab. Die innere Fläche der Dura ist glatt, bietet nichts Pathologisches. Die Pia dagegen ist in der Ausbreitung von 4 Cm. im Durchmesser trübe, theilweise lichtgelblich gefärbt, sie haftet am Cortex des Hirns überall in dieser Ausdehnung fest an, lässt sich nicht abziehen, da eine zarte, faserstoffige Masse in gleichem Umfang die Furchen der Hirnwindungen ausfüllt. Ueber diese Grenzen hinaus fehlt jegliche pathologische Veränderung in der Gefässhaut. An der Stelle, an welcher sich der Defect in der Dura findet, ist die Gefässhaut auch blutig tingirt, aber nicht, wie ich vermuthete, zerstört. Bei der Trennung der Pia und Hirnrinde an verschiedenen Punkten lässt sich auf der Schnittfläche ganz deutlich die abgelagerte, die beiden Gebilde innig zusammenkittende Exsudatschicht, ferner eine dunkelrothe Färbung der insultirten Stelle des Cortex erkennen. Die graue Masse ist gegen die Pia hin nicht im Zusammenhange gestört, ist derb, fest, verdichtet, dunkler gefärbt, die darin sich vorfindenden capillären Extravasate weisen coagulirtes Blut nach, an keiner Stelle ist Detritus, Erweichung, Verfettung und Vereiterung der Nerven Elemente zu bemerken. Da und dort ziehen auch von der entzündeten Stelle aus thrombosirte Pia-gefässe in das Marklager ein. Das Gehirn hat im Ganzen an Volumen zugenommen, ist auffallend schwer und namentlich in der rechten Hälfte stark durchfeuchtet. Die Substanz ist an und für sich zähe, mit Ausnahme der beschriebenen Partie der Rindenschicht, aber ohne eigentliche Entzündungsproducte. Die seitlichen Kammern sind erweitert und wie auch der 3. und 4. Hirnventrikel, mit trübem Serum reichlich gefüllt. Das kleine Gehirn ist sehr wässerig infiltrirt; im Pons finden sich mehrere stechnadelkopfgrosse, auch einzelne beinahe die Grösse eines Apfelmehlkornes

erreichende disseminirte hämorrhagische Herde mit coagulirtem Inhalt. An der Basis des Schädels, in den Schädelgruben, den Blutleitern Alles in Ordnung.

Der Sectionsbefund ergab somit das Bestehen einer eigentlich unbedeutenden, ganz circumscribten Entzündung der Pia und der Hirnrinde (Meningitis et Encephalitis traumatica) im Bereiche des Verletzungsbezirkes und etwas über denselben hinaus mit secundärer Durchfeuchtung der Hirnsubstanz selbst, mit Oedem des Gehirns vorzugsweise der rechten grossen Hemisphäre und des kleinen Gehirns, sowie die Anwesenheit von Läsionen, von kleinen Blutextravasaten im Pons. Eine wirkliche Meningitis purulenta mit Betheiligung der Dura und reichlicher, ausgebreiteter Eiterablagerung war nicht mehr zu Stande gekommen, denn es hatte sich im letzten Stadium nur eine unbedeutende Ansammlung von milchiger, eitriger Cerebrospinalflüssigkeit zwischen den Häuten gebildet; in der Hirnoberfläche und dem Cortex selbst fehlte jegliche Eiterproduction und war das Exsudat von fester Consistenz.

Diese pathologischen Störungen waren namentlich durch das bis zur Hirnrinde dringende, die harte Hirnhaut durchscheuernde, eingestossene Knochenstück bewirkt; dasselbe rief eine entsprechende Reizung der beleidigten Gebilde, im weiteren Verlaufe eine wirkliche Entzündung derselben hervor. In aussergewöhnlich rapider Weise betheiligte sich aber das ganze Gehirn daran, was gewiss nur als die Folge der durch den intensiven Insult verursachten hochgradigen Commotion des Centralorgans (mit lange andauernder Bewusstlosigkeit und stets geschwächtem Sensorium) angesehen werden muss. Die durch die Erschütterung herbeigeführte beträchtliche Schwächung des Tonus der Hirngefässe unterstützte sicherlich und wesentlich bei den verursachten Circulationsstörungen die Ausscheidung seröser Flüssigkeit, bewirkte deshalb eine hochgradige Infiltration der Hirnsubstanz selbst und hierdurch den Auftritt eines rasch um sich greifenden intracerebralen Hirndruckes, der, wie er seinen Einfluss auf den Pons und das verlängerte Mark ausübte, auch dem Leben ein Ende machte.

In dem vorliegenden Falle wurde der Hirndruck nicht auf rein mechanische Art direct durch das infracturirte Knochenstück, durch den tiefen Stand desselben herbeigeführt, d. h. kein Hirngebilde war durch die Depression des Knochens in seiner Function derart gestört, dass sich, wie ich es schon oft beobachtete, eine Alteration derselben, z. B. Parese, wirkliche Lähmung, Beeinträchtigung der Sensibilität und Motilität etc. augenblicklich nach dem Insulte zu

erkennen gibt, sondern der Hirndruck gesellte sich zur Hirnreizung, welche durch den beleidigenden qu. fremden Körper an der Hirnrinde verursacht war, und gewann rasch die Oberhand über die letztere, da bei den durch die Commotion geschwächten Gefässen des Gesamtgehirns eine totale Durchfeuchtung desselben, namentlich in der Umgebung des Verletzungsherdes wesentlich ermöglicht war. Man beobachtete deshalb auch während des Lebens zuerst nur die Folgen einer starken Hirnerschütterung (getrübtes benommenes Sensorium, blande Delirien etc.), dann nachher jene von intensiver Hirnreizung, mit welcher sich aber baldigst auch die des Druckes verbanden.

Mit der allgemeinen Erregung des Gehirns stellten sich, nicht allein als Folge der Reizung der Hirnrinde, der localen Affection derselben, sondern gewiss auch in Folge jener des Krampfcentrums im Pons durch die Extravasate daselbst bewirkt, nach vorausgegangenen Zuckungen die heftigsten Convulsionen ein; wie im weiteren Verlaufe die Circulationsstörungen im Gehirn ihre Producte immer mehr setzten, so trat auch dem entsprechend nun der Sopor in den Vordergrund und zeigten sich alsdann die linken Gliedmassen, welche anfangs in gleicher heftiger Stärke wie die rechten agitirten, in Folge der stärkeren Durchfeuchtung der dem Verletzungsherde näher gelegenen Bezirke der rechten Hirnhälfte weniger innervirt, später sogar paretisch, dem Hirndrucke mehr preisgegeben. Dieser letztere konnte, als durch Kreislaufsstörungen namentlich bewirkt, nicht localisirt bleiben, sondern musste sich als ein intracerebraler immer mehr ausbreiten und deshalb zum Coma führen, das Leben vernichten.

Ueber den Einfluss der Trepanation, welche unter so schlimmen Verhältnissen gewiss als letztes Rettungsmittel in Anwendung gebracht werden musste, kann ich mich nur dahin äussern, dass dieselbe keinesfalls geschadet hat. Leider war der Process im Gehirn selbst schon so weit gediehen, dass auch die Entfernung der ursächlichen Momente nichts mehr zu leisten im Stande war. Würde es mir möglich gewesen sein, den Patienten mehrmals täglich zu besuchen und zu beobachten, so hätte ich mich wahrscheinlich schon beim ersten Auftritte der Erscheinungen von intensivem Hirnreiz in Anbetracht der schweren Schädelverletzung veranlasst gefühlt, auf operativem Wege Hülfe zu schaffen und deshalb die Trepanation um 24 Stunden früher auszuführen; ob mit besserm Erfolge, ist übrigens nach dem Sectionsergebniss sehr zu bezweifeln, kaum anzunehmen.

Carlsruhe, 10. April 1877.

Tabelle I.

I.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Schädelverletzungen ohne gleichzeitige Beteiligung des Gehirns und seiner Hüllen, beziehungsweise ohne Cerebralerschütterungen.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A. Trennung der Weichteile	a. oberflächlich. b. bis auf die Dura	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
B. Störungen der Continuität der Knochen	a. Verletzung des Pericr. b. oberflächliche Verletzungen (Wunden, Contusionen oder Infraktionen der Corticalis). c. tiefen Knochenverletzungen (Wunden, Fracturen an Fracturen).	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
C. Auftritt von Blutungen	a. scharfes Instrument (Schädel-Hieb- und Stiehswunden). b. stumpfe Gewalt (Schlag, Stoss, Fall, Schuss, Biss).	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D. Direkte Ursache der Verletzung	a. ohne Aeth. mittelst Verwundmittel. b. ohne Aeth. mittelst Verwundmittel.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
E. Behandlungsweise	a. mit Näh. b. ohne Näh. mittelst Verwundmittel.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
F. Verlauf	a. Complicationen: Wundheiser, Rohlrauf, diphtheritischer Nekr., Pyämie, Pteritis, Pneumonie, Abscessbildung in inneren Organen, Diabetes, Albuminurie, Tetanus, Delirium tremens etc. etc. b. Heilung c. bleibender Schaden d. Tod	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Anzahl der Befallene		16	11	39	11	10	7	16	14	12	13	16	7	11	12	27	20	16	14	11	13	4	9	22	10	4	29	24	4	22	9	18	12	17	13	12	20	2	22	8	42	11	13	10	26	38	12	15	4	31	13	4	8	22	29	39	30	5	15	22	15	23	21	26	5	25	45	11	11	17	20	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31	17	29	19	11	13	61	13	14	31

I.

Schädelverletzungen ohne gleichzeitige Behinderung
des Gehirns und seiner Hüllen, beziehungsweise ohne
Gehirnerscheinungen.

A. Trennung der Wunde theils	{ a. oberflächlich:									
	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
b. bis auf die Gehirnhaut										
B. Störungen der Continuität der Knochen, beziehungsweise Verletzungen des Schädelsinneren	{ a. Verletzung des Periostes									
	{ b. Verletzung der Knochen									
	{ c. Verletzung der Gehirnhaut									
	{ d. Verletzung des Gehirns									
C. Auftritt von Blutungen	94	95	96	{ (65)						
	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
D. Direkte Ursache der Verletzung, Benennung des mechanischen Factors	{ a. scharfe Instrumente (Schnitt, Stich, etc.)									
	{ b. stumpfe Gegenstände (Schlag, Stoss, etc.)									
E. Behandlungsmethode	{ a. mit Nadel									
	{ b. ohne Nadel									
F. Verlauf	{ a. Complicationen: Wundfieber, Eitelfieber, etc.									
	{ b. Heilung									
G. Resultat	{ a. per primam intentionem									
	{ b. durch Eiterung									
H. Anzahl der Behandlungstage	{ a. bei heilender Schädelsverletzung									
	{ b. bei tödlichem Ausgange									

Tabelle II.

III.

Schädelverletzungen mit gleichzeitiger Betheiligung des Gehirns und seiner Hüllen, beziehungsweise mit Cerebral-Erscheinungen.

4. Hirnerschütterung:

- A. reine, wahre Gehirnerschütterung, d. h. ohne jegliche gleichzeitige Verletzung der Hirnmasse und ihrer Hüllen:
- a. leichten Grades
 - b. schweren Grades
 - c. höchsten Grades

- B. unreine, d. h. solche mit gleichzeitiger Hirn-
lähmung, mit capillären Apoplexien, disseminierten hä-
morrhagischen Herden, abgegrenzter Hirnver-
mehrung verbunden**

2. *Hirndruck:*

- A.* in Folge von Anwesenheit fremder, in die Solidität eingetragener Körper,
- B.* in Folge von Infektion und Impression des Soliditäts, mit oder ohne Abkling der Glaskörper und ohne anderweitige Complication,
- C.* in Folge von Gefäßzerstörungen (Schlaganfall, Blutergüsse, Ymen und kleinen Gefäßen) und hiedurch erfolgte Blutversorgung in die Schallkammer und in das Gehör selbst, mit oder ohne gleichzeitigen Dertus von Hirnstamm:

- a. mit gleichzeitiger Continuitätsstörung des Schädeldachhäutes und zwar verbunden mit aussrer Wunde und hierdurch ermöglichten Austritt des Blutes nach aussen, oder ohne aussrer Wunde

- b. ohne gleichzeitige Continuitätsstörung des Schädelgehäuses; die Blutung bleibt intracranell.

- α. Blutung zwischen Schädelgehäuse und

- Hirnhallen
- β. Blutung innerhalb der Hirnhallen . .

- γ. ohne gleichzeitige Insultation der Hirn-
substanz

- substanz
 ♂. mit gleichzeitiger Insultation derselben,

- deshalb mit Blutung in das Gehirn selbst
e. mit Dinstage der Nihilis conflict

- L. Infraktion des Schädeldaches und gleich-

- zeitige Ablösung der Glutafel, oder isolierter Glutafelbruch.

7. Fissuren und Brüche des Schädeldaches

[illegible]

D. in Folge von Zerkleinerung der Hirnmasse durch Druck (Hirnscheidungsmitteleingliederung):

- a. wahre Hirnscheidungsmitteleingliederung:
- b. harte Hirnhaut:
- c. mit Trennung der Hirnhäuten, also ge-
quetschte Hirnwunde:

E. in Folge von Circulations- und Ernährungsstö-
rungen, Reizung und diffuser Entzündung der
Hirnhäuten und des Gehirns mit nachfolgender
Erweichung (meningitis purulenta, cerebriale
Hirne, Abscess):

- a. ohne Beteiligung der Hirnschinn selbst
- b. mit gleichzeitiger Beteiligung derselben
- c. als Folge der Ablösung der harten Hirnhaut
- d. durch Pressen des Gehirns oder
Einklemmung der Dura auf die Dura
- e. als Folge infundierter Knochenstücke, von
stehender oder abgebrochener Knochensplinter
und sekundärer Osteophytenbildung, welche
die Dura bedecken
- f. in Folge einer Hirnblutung selbst

F. Direkte Ursachen der Verletzungen überhaupt, Be-
zeichnung des mechanischen Insultes:

- a. scharfes Instrument
- b. stumpfe Gewalt

G. Behandlungsverfahren:

- a. mit Nahl
- b. ohne Nahl mittelst Verbandmittel

H. Verlauf:

- a. Complicationen: Wundfieber, Rothlauf, di-
phtherische Beuge, Pueria, Pleuritis, Pneumonie,
Abscessbildung in inneren Organen,
Epilepsie, Manie, Paranoia, Tetanus, Delirium
tremens etc.
- b. Heilung:
α per primam intentionem
β durch Einnahme
c. heilsame Schläge
d. Tod

Anzahl der Beobachtungen:

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66																																		