H₂O oder einen anderen Elektrolyten, der dann seinerseits der Ionisierung unterliegt.

Die Koagulation der Kolloide und Suspensionen ist nur ein Spezialfall des Vorganges der Ausfällung eines unlöslichen Körpers überhaupt, und wahrscheinlich spielen elektrische Kräfte und auch die Gravitation eine wichtige Rolle dabei. Wenn auch Whet ham's Formel für die ausfällende Kraft der Ionen, die abhängig von ihrer Valenz gesetzt ist, für vierwertige Ionen nicht stimmt, so sollte man doch eine Beziehung in dieser Hinsicht auch nach dem periodischen System erwarten, zumal auch die sauren und basischen Eigenschaften der Elemente mit der Valenz variieren, so daß der Vorgang der Ausflockung der Neutralisation einer Säure durch eine Base zum mindesten ähnlich erscheint. Der Vortragende vergleicht die Wirkung eines negativen auf ein positives Kolloid mit der einer durch KOH unvollkommen gefällten Chromchloridlösung auf eine andere, in der der Niederschlag im Ueberschuß des Fällungsmittels gelöst ist, so daß Neutralisation und Ausflockung des Hydroxyds eintritt. Weiter zieht er die Vorgänge beim Färben durch Sulfosäurensalze heran, wobei diese gespalten werden, der Säurerest adsorbiert wird und die Base in Lösung bleibt; ganz ebenso verhält sich das Eisenoxychloridhydrat beim Füllen durch Sulfate. Wahrscheinlich hat auch die Hydrolyse ihren Anteil bei den Vorgängen der Adsorption und Ausflockung, wobei unter Hydrolyse der allgemeine Prozeß verstanden werden soll, bei dem ein Körper in zwei oder mehr Teile zerfällt, um durch Anlagerung einer oder mehrerer Komponenten des Lösungs- oder Suspensionsmittels neue Komplexe zu bilden. Nach erfolgter Hydrolyse tritt bei der Berührung mit Kolloidpartikeln Adsorption auswählender Natur ein, das vorgezogene Hydrolyseprodukt wird an das Kolloid gebunden, die anderen bleiben in Lösung. Der Körper oder die Verbindung wird im ganzen adsorbiert, wenn keine Hydrolyse eintritt. Es erscheint dann begreiflich, daß verschiedene Kolloide verschiedene Mengen adsorbieren, ehe sie ausflocken, und beim Auswaschen wieder in Lösung gehen.

Die Ladung, die die Kolloidteilchen erhalten, ist mit der zu vergleichen, die sich während

der Elektrolyse an den Elektroden zeigt. Die Oberfläche eines Teilchens wirkt ähnlich wie eine Elektrode, zersetzt infolge ihrer starken Adsorptionskraft den in Lösung befindlichen Körper, bindet einen Teil und erhält so eine positive oder negative Ladung; ein Vorgang, der sich in jedem Lösungsmittel abspielen kann. Da auch bei der Zerteilung eines festen Körpers in einer Flüssigkeit die Teilchen sich laden werden, weil schon beim Durchströmen einer Flüssigkeit durch kleinste Teilchen eines unlöslichen Körpers Spannungen bis zu 6 Volt beobachtet worden sind, bestehen auf diese Weise zwei Quellen für die Ladung kleinster Teilchen, unabhängig von der Annahme eines vorherigen Bestehens von Ionen in der Lösung.

Die Ausflockung eines negativ geladenen Partikels durch positiv geladene kolloide Teilchen braucht nicht eine Folge der Neutralisation der Ladungen zu sein, weil sonst eine Beziehung zwischen den Dielektrizitätskonstanten des Lösungsmittels und des suspendierten Körpers bestehen müßte.

Wie Globulin, das als Aminosäure mit Säuren als Base und mit Basen als Säure reagiert und mit beiden kolloide Lösungen gibt, verhalten sich auch die Hydroxyde von Zink, Aluminium und Chrom, die bei ungenügender Alkalifällung kolloide Suspensionen bilden und aus ihrer Lösung in überschüssigem Alkali durch Säuren gefällt werden. Das Eisenhydroxyd, das von Linder und Picton als positives Kolloid klassifiziert worden ist, weil es bei der Fällung durch Neutralsalze das Säureradikal mitreißt und gegen den negativen Pol wandert, adsorbiert bei der Fällung durch einen Ueberschuß von Alkali die Base und ist so auch dem Globulin vergleichbar.

Man kann also die Wanderung suspendierter Teilchen unter dem Einfluß des elektrischen Stromes als Folge einer auswählenden Adsorption ansehen, die unter ähnlichen Verhältnissen wie bei der Bildung einer chemischen Verbindung eintritt, wobei es von den im Gegensatz zum Adsorbens sauren oder basischen Eigenschaften des Radikals abhängt, ob Adsorption eintritt oder nicht, und wobei die Wanderungsrichtung von dem dabei erhaltenen Vorzeichen der Ladung abhängig ist. Eggeling (Wesel).

Arbeiten physiologisch-chemischen Inhalts.

Oker-Blom, M., Ueber einige Gleichgewichtsbedingungen im Organismus. Die osmotischen Eigenschaften der Serumeiweiß-

körper. (Skandin. Arch. f. Physiol. 15, 114, 1903.)

Ein aus Gelatine und destilliertem Wasser

bereitetes Gelee nimmt, wenn es mit enteweißtem Rinderserum in Berührung gebracht wird, mehr an Gewicht zu als in Berührung mit dem normalen; die vorhandenen Serumkolloide beeinträchtigen den Eintritt von Salzen und besonders von Wasser in die Gelatine. Es kann sogar, wenn seine Konzentration soweit vermindert wird, daß seine Wasseranziehungskraft sehr gering wird und man es dann

dem Einfluß des eiweißhaltigen Serums aussetzt, an Gewicht abnehmen. Eine Kombination eines solchen Gelees mit dem normalen Serum vermag aus einer NaCl- oder KJ-Lösung mehr Salz aufzunehmen als das bloße Gelee. Man kann daraus schließen, daß den Eiweißkörpern des normalen Blutserums eine osmotische Wirkung zukommt, ein Umstand, der bei der Resorption eine Rolle spielen kann.

Hans Handovsky.

Arbeiten technischen Inhalts.

Porter, John F., **Untersuchungen über Fullererde**¹⁾. (Nach „Seifenfabrikant“, Nr. 38 bis 40, 1908.)

Das Bergamt in Washington hat durch den Verf. Versuche über die Bleichkraft der Walkerde (Fuller's earth) anstellen lassen, deren Wesen bisher noch nicht klar ist. Verfasser untersucht zunächst zahlreiche Erden der verschiedensten Herkunft und gibt eingehende Tabellen über ihre Zusammensetzung. Alle sind sekundären Ursprungs, und zwar sind die bleichkräftigen Erden Zersetzungsprodukte der Augite und Hornblendes im Gegensatz zu gewöhnlichen Tonen, die aus Feldspaten stammen. Er berichtet dann über praktische Versuche über die Bleichkraft bei Kottonöl und benutzt dazu außer getrockneter, mit verschiedenen Säuren, mit Alkalien behandelter Bleicherde zum Vergleiche noch Röhrenton, Tone, künstliche Aluminiumoxyde, künstliche Kieselerden, aus Na_2SiO_3 gefällt oder durch Zersetzung mit H_2SO_4 erhalten, gepulvertes Glas, Knochenasche, gefälltes Kalziumphosphat und andere fein verteilte Materialien.

¹⁾ Contribution to Economic Geology 1906, T. 268 bis 290. Bulletin Nr. 315. United States Geological Survey, Washington.

Auf Grund dieser Analysen und Versuche stellt er folgende Theorie auf, die er eingehend begründet.

1. Fullererde besitzt als Basis eine Reihe von wässrigen Aluminiumsilikaten.

2. Die Silikate unterscheiden sich in ihrer chemischen Zusammensetzung.

3. Sie sind einander darin ähnlich, daß sie alle eine amorphe kolloide Struktur besitzen.

4. Die kolloide Struktur ist von ziemlich beständiger Form und geht beim Trocknen bei einer Temperatur von 130°C und vielleicht noch darüber nicht verloren.

5. Diese kolloiden Silikate besitzen die Fähigkeit, organische Farbstoffe zu adsorbieren und festzuhalten und auf diese Weise Öle und Fette zu bleichen.

Er glaubt auf Grund dieser Theorie den Bleichwert einer Fullererde für bestimmte Zwecke bestimmen zu können durch die Analysierung. Hierzu gibt er eine Tabelle über die „rationelle“ Zusammensetzung der Bleicherde auf Grund seiner zahlreichen Analysen. Er hält es für möglich, die Bleichkraft durch geeignete Behandlung mit Säuren und ähnlichen Mitteln zu erhöhen und vielleicht auch durch noch aufzufindende organische Kolloide gewöhnliche Tone zu „aktivieren“.

P. Werner.

Arbeiten agrikultur-chemischen Inhalts.

Whitney, M., **Einige physikalische Eigenschaften des Bodens in ihrer Beziehung zu Feuchtigkeit und Ernte Verteilung**. (Vereinigte Staaten-Departement für Landwirtschaft, Wetter-Bureau. Bulletin Nr. 4, 1892).

Verf. weist auf die unzureichenden Ergebnisse der chemischen Bodenuntersuchung hin und erwartet größere Erfolge von der bisher der Praxis vorbehaltenen Beurteilung des Bodens nach physikalischen Grundsätzen. Er bespricht

zunächst die Zirkulation des Wassers im Boden und macht dabei Angaben über die Oberflächenspannung verschiedener Düngerlösungen und Bodenauszüge.

Es folgt dann ein Kapitel über die Wirkung von Düngemitteln auf das Bodengefüge. Zunächst wird das Phänomen der Flockung auf Oberflächenspannung (bei Berührung zwischen Luft und Wasser) und Oberflächendruck (bei Berührung zwischen festen Körpern und Wasser)