Sur quelques formules générales dans le calcul des opérations.

(Par M. Spottiswoode à Londres.)

Dans un mémoire qui vient de paraître dans les *Philosophical Transactions* de Londres j'ai développé la théorie du symbole opératif

$$y \frac{d}{dx} + x \frac{d}{dy},$$

et j'y ai ajouté quelques formules relatives au symbole plus général:

$$x_{i_1} \frac{d}{dx_1} + x_{i_2} \frac{d}{dx_2} + \dots$$

Je me propose d'indiquer dans les pages suivantes la méthode par laquelle je suis arrivé aux formules dont il s'agit.

Soit $i_1, i_2, \dots$ une permutation quelconque de la série $1, 2, \dots$; et représentons cette permutation par l'équation symbolique

$$i_1, i_2, \dots = P_i(1, 2, \dots).$$

De la même manière une seconde permutation quelconque P_j de la série $i_1, i_2, \dots$ sera représenté par $j_{i_1}, j_{i_2}, \dots$, ou, plus simplement, par $j\dot{i}_1, j\dot{i}_2, \dots$ ce qui sera une permutation nouvelle de la série primitive $1, 2, \dots$. Ecrivons d'une manière symbolique

$$\begin{aligned} j\dot{i}_1, j\dot{i}_2, \dots &= P_{ji}(1, 2, \dots) \\ &= P_j(i_1, i_2, \dots) = P_j P_i(1, 2, \dots) \end{aligned}$$

ou d'une façon plus abrégée

$$P_{ji} = P_j P_i.$$

Cette notation pourra être étendue à un nombre quelconque de permutations employées successivement.

Soient $x_1, x_2, \dots$ des variables quelconques; et soit.

$$\nabla_i = x_{i_1} \frac{d}{dx_1} + x_{i_2} \frac{d}{dx_2} + \dots,$$

$$\nabla_j = x_{j_1} \frac{d}{dx_1} + x_{j_2} \frac{d}{dx_2} + \dots,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$D_i = x_{i_1} \frac{d'}{dx_1} + x_{i_2} \frac{d'}{dx_2} + \dots,$$

$$D_j = x_{j_1} \frac{d'}{dx_1} + x_{j_2} \frac{d'}{dx_2} + \dots,$$

$$\dots \dots \dots$$

Les notations $\frac{d'}{dx_1}, \frac{d'}{dx_2}, \dots$ qui se trouvent dans $D_i, D_j, \dots$ signifient que les différentiations dont il s'agit, s'exécutent bien sur les fonctions que l'on s'est abstenu d'écrire et auxquelles s'appliquent les opérations $D_i, D_j, \dots$, mais que ces différentiations ne s'exécutent point sur les variables $x_1, x_2, \dots$ en tant qu'elles entrent explicitement comme coefficients dans les expressions $D_i, D_j, \dots$. Au contraire les différentiations $\frac{d}{dx_1}, \frac{d}{dx_2}, \dots$ qui se trouvent dans $\nabla_i, \nabla_j, \dots$ s'exécutent indistinctement. Cela posé on trouve

$$\begin{aligned} D_j D_i &= \nabla_j \nabla_i - \nabla_{ji}, \\ D_k D_j D_i &= \nabla_k \nabla_j \nabla_i - \nabla_{kj} \nabla_i - \nabla_j \nabla_{ki} - \nabla_k \nabla_{ji} + \nabla_{kji} + \nabla_{jki}, \\ D_l D_k D_j D_i &= \nabla_l \nabla_k \nabla_j \nabla_i - \nabla_{lk} \nabla_j \nabla_i - \nabla_k \nabla_{lj} \nabla_i - \nabla_k \nabla_j \nabla_{li} \\ &\quad - \nabla_l \nabla_{kj} \nabla_i - \nabla_l \nabla_j \nabla_{ki} - \nabla_l \nabla_k \nabla_{ji} \\ &\quad + \nabla_{lkj} \nabla_i + \nabla_j \nabla_{lki} + \nabla_k \nabla_{lji} + \nabla_l \nabla_{jki} \\ &\quad + \nabla_{klj} \nabla_i + \nabla_j \nabla_{kli} + \nabla_k \nabla_{jli} + \nabla_l \nabla_{kji} \\ &\quad + \nabla_{kj} \nabla_{li} + \nabla_{lj} \nabla_{ki} + \nabla_{lk} \nabla_{ji} \\ &\quad - \nabla_{lkji} - \nabla_{klji} - \nabla_{kjl i} - \nabla_{ljki} - \nabla_{jlki} - \nabla_{jkli} \end{aligned}$$

et ainsi de suite pour un nombre quelconque de D 's et de ∇ 's. Il y a des cas particuliers dans lesquels ces expressions prennent une forme plus symétrique. Si les permutations satisfont à la seconde équation du système

$$P(j, k) = P(k, j), \quad P(k, i) = P(i, k), \quad P(i, j) = P(j, i),$$

le groupe $\nabla_{kj}, \nabla_{ki}, \nabla_{ji}$ pourra être remplacé par le groupe $\nabla_{kj}, \nabla_{ik}, \nabla_{ji}$, dans lequel les indices se trouvent rangés selon l'ordre cyclique. Si les permutations satisfont à la première et à la troisième équation du système écrit, le groupe dont il s'agit pourra au contraire être remplacé par le groupe $\nabla_{jk}, \nabla_{ki}, \nabla_{ij}$. Si de plus les permutations satisfont à la première équation du système

$$\begin{aligned} P\{i(j, k)\} &= P\{(j, k)i\}, \\ P\{j(k, i)\} &= P\{(k, i)j\}, \\ P\{k(i, j)\} &= P\{(i, j)k\}, \end{aligned}$$

l'expression pour $D_k D_j D_i$ s'écrira de la manière suivante:

$$\nabla_k \nabla_j \nabla_i - \nabla_i \nabla_{kj} - \nabla_j \nabla_{ik} - \nabla_k \nabla_{ji} + 2\nabla_{kji}$$

ou de celle-ci:

$$\nabla_k \nabla_j \nabla_i - \nabla_i \nabla_{jk} - \nabla_j \nabla_{ki} - \nabla_k \nabla_{ij} + 2\nabla_{kji}$$

selon que ou la seconde, ou la première et la troisième condition du premier système auront lieu. Si la seconde et la troisième condition du second système sont remplies, la même expression prend l'une ou l'autre des formes

$$\nabla_k \nabla_j \nabla_i - \nabla_{kj} \nabla_i - \nabla_{ik} \nabla_j - \nabla_{ji} \nabla_k + 2 \nabla_{jik}$$

ou

$$\nabla_k \nabla_j \nabla_i - \nabla_{jk} \nabla_i - \nabla_{ki} \nabla_j - \nabla_{ij} \nabla_k + 2 \nabla_{jik}.$$

Dans le cas de $D_l D_k D_j D_i$ il serait presque nécessaire de particulariser les conditions auxquelles on assujettit les permutations.

En revenant au cas de $D_j D_i$, on établit immédiatement le système quadratique

$$\begin{aligned} D_i^2 &= \nabla_i^2 - \nabla_i^2, \\ D_j D_i &= \nabla_j \nabla_i - \nabla_{ji}, \\ D_j^2 &= \nabla_j^2 - \nabla_j^2 \end{aligned}$$

et on en compose la relation plus générale

$$(abc) \widehat{(D_j \nabla_i)^2} = (abc) \widehat{(\nabla_j \nabla_i)^2} - (abc) \widehat{(\nabla_j' \nabla_i')^2}$$

dans laquelle

$$(abc) \widehat{(\nabla_j' \nabla_i')^2} = a \nabla_j^2 + 2b \nabla_{ji} + c \nabla_i^2.$$

Ne perdons pas de vue d'ailleurs que dans une équation quelconque que l'on écrit les symboles j, i devront toujours suivre le même ordre dans les deux parties de l'équation.

Pour le troisième degré on trouve

$$\begin{aligned} D_j^3 &= \nabla_j^3 - 3 \nabla_j \nabla_j^2 + 2 \nabla_j^3, \\ D_j^2 D_i &= \nabla_j^2 \nabla_i - \nabla_j^2 \nabla_i - 2 \nabla_j \nabla_{ji} + 2 \nabla_j^2 i \\ &= \nabla_j \nabla_i \nabla_j - \nabla_{ji} \nabla_j - \nabla_i \nabla_j^2 - \nabla_j \nabla_{ij} + \nabla_{ji} + \nabla_{ij}^2 \\ &= \nabla_i \nabla_j^2 - \nabla_{ij} \nabla_j - \nabla_j \nabla_{ij} - \nabla_i \nabla_j^2 + \nabla_{ij}^2 + \nabla_{ji} \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

d'où l'on tire le système cubique

$$\begin{aligned} D_j^3 &= \nabla_j^3 - 3 \nabla_j \nabla_j^2 + 2 \nabla_j^3, \\ 3D_j^2 D_i &= \nabla_j^2 \nabla_i + \nabla_j \nabla_i \nabla_j + \nabla_i \nabla_j^2 \\ &\quad - \nabla_{ji} \nabla_i - \nabla_{ji} \nabla_j - \nabla_{ij} \nabla_j - 2 \nabla_i \nabla_j^2 - 2 \nabla_j \nabla_{ij} - 2 \nabla_j \nabla_{ji} \\ &\quad + 2 \nabla_{ji} + 2 \nabla_{ji} + 2 \nabla_{ij}^2, \\ 3D_j D_i^2 &= \nabla_j \nabla_i^2 + \nabla_i \nabla_j \nabla_i + \nabla_i^2 \nabla_j \\ &\quad - \nabla_{ia} \nabla_j - \nabla_{ij} \nabla_i - \nabla_{ji} \nabla_i - 2 \nabla_j \nabla_{ia} - 2 \nabla_i \nabla_{ji} - 2 \nabla_i \nabla_{ij} \\ &\quad + 2 \nabla_{ji} + 2 \nabla_{ji} + 2 \nabla_{ia} j, \\ D_i^3 &= \nabla_i^3 - 3 \nabla_i \nabla_{ia} + 2 \nabla_{ia}^2. \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned}
(ab\hat{c})(\nabla_j \nabla_i)^2 &= a\nabla_j^2 + b(\nabla_j \nabla_i + \nabla_i \nabla_j) + c\nabla_i^2, \\
(abcd)(\nabla_j \nabla_i)^3 \\
&= a\nabla_j^3 + b(\nabla_j^2 \nabla_i + \nabla_j \nabla_i \nabla_j + \nabla_i \nabla_j^2) + c(\nabla_j \nabla_i^2 + \nabla_i \nabla_j \nabla_i + \nabla_i^2 \nabla_j) + d\nabla_i^3, \\
(abcd)(\nabla_j \nabla_i)(\nabla_j' \nabla_i')^2 \\
&= a\nabla_j \nabla_{j^2} + b(\nabla_j \nabla_{ji} + \nabla_j \nabla_{ij} + \nabla_i \nabla_{j^2}) + c(\nabla_i \nabla_{ji} + \nabla_i \nabla_{ij} + \nabla_j \nabla_{i^2}) + d\nabla_i \nabla_{i^2}, \\
(abcd)(\nabla_j' \nabla_i')^2(\nabla_j \nabla_i) \\
&= a\nabla_{j^2} \nabla_j + b(\nabla_{ji} \nabla_j + \nabla_{ij} \nabla_j + \nabla_{j^2} \nabla_i) + c(\nabla_{ji} \nabla_i + \nabla_{ij} \nabla_i + \nabla_{i^2} \nabla_j) + d\nabla_{i^2} \nabla_i, \\
(abcd)(\nabla_j' \nabla_i')^3 \\
&= a\nabla_{j^3} + b(\nabla_{j^2} \nabla_{ij} + \nabla_{ij^2}) + c(\nabla_{ji^2} + \nabla_{ij^2} + \nabla_{i^2} \nabla_j) + d\nabla_{i^3}
\end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned}
&(abcd)(\nabla_j \nabla_i)^3 \\
&= (abcd)(\nabla_j \nabla_i)^3 - 2(abcd)(\nabla_j \nabla_i)(\nabla_j' \nabla_i')^2 - (abcd)(\nabla_j' \nabla_i')^2(\nabla_j \nabla_i) + 2(abcd)(\nabla_j' \nabla_i')^3
\end{aligned}$$

équation que l'on peut écrire symboliquement ainsi:

$$(abcd)(\nabla_j \nabla_i)^3 = (abcd) \begin{vmatrix} (\nabla_j \nabla_i) & 1 & 0 \\ (\nabla_j' \nabla_i')^2 & (\nabla_j \nabla_i) & 2 \\ (\nabla_j' \nabla_i')^3 & (\nabla_j' \nabla_i')^2 & (\nabla_j \nabla_i) \end{vmatrix}.$$

En se bornant au cas de deux facteurs opératifs, on a les formules suivantes:

$$\begin{aligned}
(abcd)(\nabla_j \nabla_i)^3 &= aD_j D_j^2 + b(\nabla_i D_{j^2} + \nabla_j D_{ji} + \nabla_j D_{ij}) + c(\nabla_i D_{ij} + \nabla_i D_{ji} + \nabla_j D_{i^2}) + d\nabla_i D_i^2 \\
&\quad - 2a\nabla_j' D_j^2 - 2b(\nabla_i' D_{j^2} + \nabla_j' D_{ji} + \nabla_j' D_{ij}) - 2c(\nabla_i' D_{ij} + \nabla_i' D_{ji} + \nabla_j' D_{i^2}) \\
&\quad - 2d\nabla_i' D_i^2 \\
&= (abcd)(\nabla_j \nabla_i)(\nabla_j \nabla_i)^2 - 2(abcd)(\nabla_j' \nabla_i')(\nabla_j \nabla_i)^2,
\end{aligned}$$

de même:

$$(abcd)(\nabla_j \nabla_i)^4 = (abcde)(\nabla_j \nabla_i)(\nabla_j \nabla_i)^3 - 3(abcd)(\nabla_j' \nabla_i')(\nabla_j \nabla_i)^3$$

et pour le $n^{\text{ième}}$ degré:

$$(ab\dots)(\nabla_j \nabla_i)^n = (ab\dots)(\nabla_j \nabla_i)(\nabla_j \nabla_i)^{n-1} - (n-1)(ab\dots)(\nabla_j' \nabla_i')(\nabla_j \nabla_i)^{n-1}$$

ou

$$(ab\dots)(\nabla_j \nabla_i)^n = (ab\dots) \begin{vmatrix} (\nabla_j \nabla_i) & 1 & 0 & \dots & 0 \\ (\nabla_j' \nabla_i')^2 & (\nabla_j \nabla_i) & 2 & \dots & 0 \\ (\nabla_j' \nabla_i')^3 & (\nabla_j' \nabla_i')^2 & (\nabla_j \nabla_i) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\nabla_j' \nabla_i')^{n-1} & (\nabla_j' \nabla_i')^{n-2} & (\nabla_j' \nabla_i')^{n-3} & \dots & (\nabla_j \nabla_i) \end{vmatrix}.$$

Pour montrer que la même loi a lieu dans le cas de plusieurs facteurs opératifs, introduisons un troisième facteur D_k ; et, pour abréger les formules, nous n'écrivons que les indices, de sorte que dans les calculs suivants on écrira ijk au lieu de $\nabla_i \nabla_j \nabla_k$; $i'j'k$ au lieu de $\nabla_i' \nabla_j' \nabla_k$ ou $\nabla_{ij'} \nabla_k$; et ainsi de suite. Cela posé on aura

$$\begin{aligned} D_k D_j D_i &= kji - k'j'i - jk'i' - kj'i' + k'j'i' + j'k'i' \\ &= jki - j'k'i - kj'i' - jk'i' + j'k'i' + k'j'i' \\ &= ijk - i'j'k - j'i'k' - ij'k' + i'j'k' + j'i'k' \\ &= kij - k'i'j - ik'j' - ki'j' + k'i'j' + i'k'j' \\ &= ikj - i'k'j - ki'j' - ik'j' + i'k'j' + k'i'j' \\ &= jik - j'i'k - ij'k' - ji'k' + j'i'k' + i'j'k' \end{aligned}$$

d'où l'on tire le système cubique

$$\begin{aligned} 6 D_k D_j D_i &= kji + jki + ijk + kij + ikj + jik \\ &\quad - k'j'i - j'k'i - 2ik'j' - 2ij'k' \\ &\quad - i'k'j - k'i'j - 2ji'k' - 2jk'i' \\ &\quad - j'i'k - i'j'k - 2kj'i' - 2ki'j' \\ &\quad + 2(k'j'i' + j'k'i' + i'j'k' + k'i'j' + i'k'j' + j'i'k'), \\ 3 D_k^2 D_j &= k^2j + kjk + jk^2 + 2(j'^2k' + j'k'j' + k'j'^2) \\ &\quad - k'^2j - k'j'k - j'k'j - 2(jk'^2 + kj'k' + kk'j'), \\ 3 D_k D_j^2 &= kj^2 + jkj + j^2k + 2(k'j'^2 + j'k'j' + j'^2k') \\ &\quad - j'^2k - j'k'j - k'j'j - 2(kj'^2 + jk'j' + jj'k'), \\ 3 D_i^2 D_k &= i^2k + iki + ki^2 + 2(i'^2k' + i'k'i' + k'i'^2) \\ &\quad - i'^2k - i'k'i - k'i'i - 2(ki'^2 + ik'i' + ii'k'), \\ 3 D_i D_k^2 &= ik^2 + kik + k^2i + 2(i'k'^2 + k'i'k' + k'^2i') \\ &\quad - k'^2i - k'i'k - i'k'k - 2(ik'^2 + ki'k' + kk'i'), \\ 3 D_j^2 D_i &= j^2i + jij + ij^2 + 2(j'^2i' + j'i'j' + i'j'^2) \\ &\quad - j'^2i - j'i'j - i'j'j - 2(ij'^2 + j'i'j' + jj'i'), \\ 3 D_j D_i^2 &= ji^2 + jji - i^2j + 2(j'i'^2 + i'j'i' + i'^2j') \\ &\quad - i'^2j - i'j'i - j'i'i - 2(ji'^2 + ij'i' + ii'j'), \\ D_k^3 &= k^3 - 3kk'^2 + 2k'^3, \\ D_j^3 &= j^3 - 3jj'^2 + 2j'^3, \\ D_i^3 &= i^3 - 3ii'^2 + 2i'^3. \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned}
 & (ab c f f_1 g g_1 h h_1 e) \widehat{(ij k)} \widehat{(i' j' k')}^2 \\
 & = a k k'^2 + b j j'^2 + c i i'^2 \\
 & + f(j i'^2 + i j' i' + i i' j') + f_1(i j^2 + j i' j' + j j' i') \\
 & + g(i k'^2 + k i' k' + k k' i') + g_1(k i'^2 + i k' i' + i i' k') \\
 & + h(k j'^2 + j k' j' + j j' k') + h_1(i k'^2 + k j' k' + k k' j') \\
 & + e(i j' k' + i k' j' + j k' i' + j i' k' + k i' j' + k j' i')
 \end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned}
 & (ab c f f_1 g g_1 h h_1 e) \widehat{(D_k D_j D_i)}^3 \\
 & = (ab \dots) \widehat{(\nabla_k \nabla_j \nabla_i)}^3 - 2(ab \dots) \widehat{(\nabla_k \nabla_j \nabla_i)} \widehat{(\nabla'_k \nabla'_j \nabla'_i)}^2 \\
 & \quad - (ab \dots) \widehat{(\nabla'_k \nabla'_j \nabla'_i)}^2 \widehat{(\nabla_k \nabla_j \nabla_i)} + 2(ab \dots) \widehat{(\nabla'_k \nabla'_j \nabla'_i)}^3
 \end{aligned}$$

et comme les formules, que nous avons établies dans le cas de deux facteurs opératifs $D_j D_i$, peuvent s'étendre au cas de trois, on conclut qu'en général on a la formule

$$(ab \dots) (\dots D_j D_i)^n = (ab \dots) \widehat{\left(\begin{array}{cccc} (\dots \nabla_j \nabla_i) & 1 & 0 & \dots & 0 \\ (\dots \nabla'_j \nabla'_i)^2 & (\dots \nabla_j \nabla_i) & 2 & \dots & 0 \\ (\dots \nabla'_j \nabla'_i)^3 & (\dots \nabla'_j \nabla'_i)^2 & (\dots \nabla'_j \nabla'_i) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\dots \nabla'_j \nabla'_i)^n & (\dots \nabla'_j \nabla'_i)^{n-1} & (\dots \nabla'_j \nabla'_i)^{n-2} & \dots & (\dots \nabla_j \nabla_i) \end{array} \right)}$$

Pour calculer l'effet des opérations ∇_i sur une fonction donnée, soit proposée la suivante

$$u = \Sigma(1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots) x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots$$

dans laquelle $(1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots)$ représente une seule quantité, et où l'on a

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots = n.$$

Cela posé on trouve

$$\begin{aligned}
 \nabla_i u & = \Sigma(1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots) \left\{ \alpha_1 x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2} \dots x_i^{\alpha_i+1} \dots \right. \\
 & \quad + \alpha_2 x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2-1} \dots x_i^{\alpha_i+1} \dots \\
 & \quad \left. + \dots \right\} \\
 & = \Sigma \left\{ (\alpha_1+1) (1^{\alpha_1+1} 2^{\alpha_2} \dots i_1^{\alpha_i-1} \dots) \right. \\
 & \quad + (\alpha_2+1) (1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2+1} \dots i_2^{\alpha_i-1} \dots) \\
 & \quad \left. + \dots \right\} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots \\
 & = \Sigma \left\{ (\alpha_1+1) e^{\frac{d}{d\alpha_1}} - \frac{d}{d\alpha_1} + (\alpha_2+1) e^{\frac{d}{d\alpha_2}} - \frac{d}{d\alpha_2} + \dots \right\} (1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots) x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots
 \end{aligned}$$

De la même manière on s'élève aux formules plus générales

$$\nabla_i^p u = \sum \left\{ \sum (\alpha_r + 1) e^{\frac{d}{d\alpha_r} - \frac{d}{d\alpha_{i_r}}} \right\}^p (1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots) x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots$$

et

$$F(\dots \nabla_j \nabla_i) u = \sum F \left\{ \dots, \sum (\alpha_s + 1) e^{\frac{d}{d\alpha_s} - \frac{d}{d\alpha_{j_s}}}, \sum (\alpha_r + 1) e^{\frac{d}{d\alpha_r} - \frac{d}{d\alpha_{i_r}}} \right\} (1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \dots) x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots$$

où il est toujours essentiel de conserver inaltéré l'ordre des multiplications.

Considérons le cas où les symboles de simple différentiation sont multipliés par des fonctions linéaires des variables. Soient

$$\begin{aligned} u_{11} &= \alpha_{11} x_1 + \beta_{11} x_2 + \dots, & u_{12} &= \alpha_{12} x_1 + \beta_{12} x_2 + \dots, & \dots \\ u_{21} &= \alpha_{21} x_1 + \beta_{21} x_2 + \dots, & u_{22} &= \alpha_{22} x_1 + \beta_{22} x_2 + \dots, & \dots \\ \dots & \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \end{aligned}$$

$$\nabla_1 = u_{11} \frac{d}{dx_1} + u_{12} \frac{d}{dx_2} + \dots$$

$$\nabla_2 = u_{21} \frac{d}{dx_1} + u_{22} \frac{d}{dx_2} + \dots$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$$

Alors

$$\begin{aligned} D_2 D_1 &= \nabla_2 \nabla_1 - \{ (\alpha_{11} \alpha_{21} + \beta_{11} \alpha_{22} + \dots) x_1 + (\alpha_{11} \beta_{21} + \beta_{11} \beta_{22} + \dots) x_2 + \dots \} \frac{d}{dx_1} \\ &\quad - \{ (\alpha_{12} \alpha_{21} + \beta_{12} \alpha_{22} + \dots) x_1 + (\alpha_{12} \beta_{21} + \beta_{12} \beta_{22} + \dots) x_2 + \dots \} \frac{d}{dx_2} \\ &\quad \dots \end{aligned}$$

Or, les coefficients des x sont tous compris dans le produit

$$\left| \begin{array}{ccc} \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{array} \right| \left| \begin{array}{ccc} \alpha_{11} & \beta_{11} & \dots \\ \alpha_{12} & \beta_{12} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{array} \right|$$

et les termes de chaque ligne et de chaque colonne correspondent de sorte qu'en posant

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc} a & b & \dots \\ a_1 & b_1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{array} \right) (\widehat{x x_1 \dots}) (\widehat{y y_1 \dots}) &= (a x + b x_1 + \dots) y \\ &\quad + (a_1 x + b_1 x_1 + \dots) y_1 \\ &\quad + \dots \end{aligned}$$

on peut écrire

$$D_2 D_1 = \nabla_2 \nabla_1 - \begin{vmatrix} \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \beta_{11} & \dots \\ \alpha_{12} & \beta_{12} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \widehat{x_1 x_2 \dots} \widehat{\left(\frac{d}{dx_1} \frac{d}{dx_2} \dots \right)}$$

De la même manière on trouve

$$\begin{aligned} D_3 D_2 D_1 &= \nabla_3 \nabla_2 \nabla_1 - \begin{vmatrix} \alpha_{31} & \alpha_{32} & \dots \\ \beta_{31} & \beta_{32} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \alpha_{21} & \beta_{21} & \dots \\ \alpha_{22} & \beta_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \widehat{x_1 x_2 \dots} \widehat{\left(\frac{d}{dx_1} \frac{d}{dx_2} \dots \right)} \nabla_1 \\ &\quad - \nabla_2 \begin{vmatrix} \alpha_{31} & \alpha_{32} & \dots \\ \beta_{31} & \beta_{32} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \beta_{11} & \dots \\ \alpha_{12} & \beta_{12} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \widehat{x_1 x_2 \dots} \widehat{\left(\frac{d}{dx_1} \frac{d}{dx_2} \dots \right)} \\ &\quad - \nabla_3 \begin{vmatrix} \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \beta_{11} & \dots \\ \alpha_{12} & \beta_{12} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \widehat{x_1 x_2 \dots} \widehat{\left(\frac{d}{dx_1} \frac{d}{dx_2} \dots \right)} \\ &\quad + 2 \begin{vmatrix} \alpha_{31} & \alpha_{32} & \dots \\ \beta_{31} & \beta_{32} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \beta_{11} & \dots \\ \alpha_{12} & \beta_{12} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \widehat{x_1 x_2 \dots} \widehat{\left(\frac{d}{dx_1} \frac{d}{dx_2} \dots \right)}. \end{aligned}$$

En se servant d'une notation symbolique dont la signification est manifeste, on peut mettre cette expression sous la forme

$$\nabla_3 \nabla_2 \nabla_1 - \nabla_3' \nabla_2' \nabla_1 - \nabla_2' \nabla_3' \nabla_1 - \nabla_3 \nabla_2' \nabla_1 + 2 \nabla_3' \nabla_2' \nabla_1.$$

Rélativement aux produits symboliques $\nabla_3' \nabla_2'$, $\nabla_3' \nabla_1'$, $\nabla_2' \nabla_1'$, $\nabla_3' \nabla_2' \nabla_1'$, il est essentiel de se souvenir que quand on forme les produits de déterminants tels que le suivant

$$\begin{vmatrix} \alpha_{31} & \alpha_{32} & \dots \\ \beta_{31} & \beta_{32} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots \\ \beta_{11} & \alpha_{12} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

les lignes verticales doivent remplacer les lignes horizontales et vice versa dans le dernier déterminant de chaque produit. De plus, si l'on convient de remplacer dans le développement des produits chaque terme de la forme

$\nabla'_3 \nabla'_2 \nabla'_1$ par le suivant $\nabla_2 \nabla'_3 \nabla'_1$, on peut écrire

$$D_3 D_2 D_1 = \begin{vmatrix} \nabla_3 & \nabla'_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_3 & \nabla_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_3 & \nabla'_2 & \nabla_1 \end{vmatrix}.$$

Cette dernière formule peut aussi être déduite de celle pour $D_2 D_1$ et de la considération que (D'_3, D'_2, D'_1) , étant des symboles analogues à $\nabla'_3, \nabla'_2, \nabla'_1$ on a

$$\begin{aligned} D_3 D_2 D_1 &= \nabla_3 D_2 D_1 - D'_3 D'_2 D_1 - D'_3 D_2 D'_1 \\ &= \nabla_3 (\nabla_2 \nabla_1 - \nabla'_2 \nabla'_1) - \nabla'_3 (\nabla_2 \nabla_1 - \nabla'_2 \nabla'_1) - \nabla'_3 (\nabla_2 \nabla'_1 - \nabla'_2 \nabla_1). \end{aligned}$$

De la même manière on trouve aussi

$$\begin{aligned} D_4 D_3 D_2 D_1 &= \nabla_4 D_3 D_2 D_1 - D'_4 D'_3 D_2 D_1 - D'_4 D_3 D'_2 D_1 - D'_4 D_3 D_2 D'_1 \\ &= \nabla_4 \begin{vmatrix} \nabla_3 & \nabla'_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_3 & \nabla_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_3 & \nabla'_2 & \nabla_1 \end{vmatrix} - \nabla'_4 \begin{vmatrix} \nabla'_3 & \nabla'_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_3 & \nabla_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_3 & \nabla'_2 & \nabla_1 \end{vmatrix} - \nabla'_4 \begin{vmatrix} \nabla_3 & \nabla'_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_3 & \nabla'_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_3 & \nabla_2 & \nabla'_1 \end{vmatrix} - \nabla'_4 \begin{vmatrix} \nabla_3 & \nabla'_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_3 & \nabla_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_3 & \nabla'_2 & \nabla_1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \nabla_4 & \nabla'_3 & \nabla'_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_4 & \nabla_3 & \nabla'_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_4 & \nabla'_3 & \nabla_2 & \nabla'_1 \\ \nabla'_4 & \nabla_3 & \nabla'_2 & \nabla_1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

et en général

$$\begin{aligned} D_n D_{n-1} \dots D_2 D_1 &= \nabla_n D_{n-1} \dots D_2 D_1 - D'_n D'_{n-1} \dots D_2 D_1 - \dots - D'_n D_{n-1} \dots D_2 D'_1 - D'_n D_{n-1} \dots D_2 D_1' \\ &= \nabla_n \begin{vmatrix} \nabla_{n-1} & \nabla'_{n-2} & \dots & \nabla'_1 \\ \nabla'_{n-1} & \nabla_{n-2} & \dots & \nabla'_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \nabla'_{n-1} & \nabla'_{n-2} & \dots & \nabla_1 \end{vmatrix} - \nabla'_n \begin{vmatrix} \nabla'_{n-1} & \nabla'_{n-2} & \dots & \nabla'_1 \\ \nabla'_{n-1} & \nabla_{n-2} & \dots & \nabla'_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \nabla'_{n-1} & \nabla'_{n-2} & \dots & \nabla_1 \end{vmatrix} - \dots - \nabla'_n \begin{vmatrix} \nabla_{n-1} & \nabla'_{n-2} & \dots & \nabla'_1 \\ \nabla'_{n-1} & \nabla_{n-2} & \dots & \nabla'_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \nabla'_{n-1} & \nabla'_{n-2} & \dots & \nabla_1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \nabla_n & \nabla'_{n-1} & \dots & \nabla'_1 \\ \nabla'_n & \nabla_{n-1} & \dots & \nabla'_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \nabla'_n & \nabla'_{n-1} & \dots & \nabla_1 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

On peut aussi comme dans le cas de deux variables déterminer les expressions pour les opérations de la forme

$$s_1 s_2 \dots s_m \frac{d^m}{dx^p dy^q \dots}$$

où

$$s = \alpha x + \beta y + \dots,$$

$$m = p + q + \dots$$

c. à d. les calculer en termes de $s_1 \frac{d}{dx}$, $s_1 \frac{d}{dy}$, Mais, en égard à mon mémoire ci-dessus cité, il suffira de rappeler les formules sans les démontrer. Dans le cas de trois variables et de trois fonctions s on a :

$$\begin{aligned} & 6 s s_1 s_2 \frac{d^3}{dx dy dz} \\ &= s \frac{d}{dx} \left(s_1 \frac{d}{dy} - \beta_1 \right) \left(s_2 \frac{d}{dz} - 2\gamma_2 \right) + s \frac{d}{dx} \left(s_1 \frac{d}{dz} - \gamma_1 \right) \left(s_2 \frac{d}{dy} - 2\beta_2 \right) \\ &+ s \frac{d}{dy} \left(s_1 \frac{d}{dz} - \gamma_1 \right) \left(s_2 \frac{d}{dx} - 2\alpha_2 \right) + s \frac{d}{dy} \left(s_1 \frac{d}{dx} - \alpha_1 \right) \left(s_2 \frac{d}{dz} - 2\gamma_2 \right) \\ &+ s \frac{d}{dz} \left(s_1 \frac{d}{dx} - \alpha_1 \right) \left(s_2 \frac{d}{dy} - 2\beta_2 \right) + s \frac{d}{dz} \left(s_1 \frac{d}{dy} - \beta_1 \right) \left(s_2 \frac{d}{dx} - 2\alpha_2 \right) \end{aligned}$$

ou bien

$$\begin{aligned} &= \left(s \frac{d}{dx} - 2\alpha \right) \left(s_1 \frac{d}{dy} - \beta_1 \right) s_2 \frac{d}{dz} + \left(s \frac{d}{dx} - 2\alpha \right) \left(s_2 \frac{d}{dy} - \beta_2 \right) s_1 \frac{d}{dz} \\ &+ \left(s_1 \frac{d}{dx} - 2\alpha_1 \right) \left(s_2 \frac{d}{dy} - \beta_2 \right) s \frac{d}{dz} + \left(s_1 \frac{d}{dx} - 2\alpha_1 \right) \left(s \frac{d}{dy} - \beta \right) s_2 \frac{d}{dz} \\ &+ \left(s_2 \frac{d}{dx} - 2\alpha_2 \right) \left(s \frac{d}{dy} - \beta \right) s_1 \frac{d}{dz} + \left(s_2 \frac{d}{dx} - 2\alpha_2 \right) \left(s_1 \frac{d}{dy} - \beta_1 \right) s \frac{d}{dz}. \end{aligned}$$

Lorsque s , s_1 , s_2 ne sont plus des fonctions linéaires mais des fonctions quelconques de x , y , z on a la formule plus générale

$$\begin{aligned} & 6 s s_1 s_2 \frac{d^3}{dx dy dz} \\ &= \left(s \frac{d}{dx} - 2 \frac{ds}{dx} \right) \left(s_1 \frac{d}{dy} - \frac{ds_1}{dy} \right) s_2 \frac{d}{dz} + \left(s \frac{d}{dx} - 2 \frac{ds}{dx} \right) \left(s_2 \frac{d}{dy} - \frac{ds_2}{dy} \right) s_1 \frac{d}{dz} \\ &+ \left(s_1 \frac{d}{dx} - 2 \frac{ds_1}{dx} \right) \left(s_2 \frac{d}{dy} - \frac{ds_2}{dy} \right) s \frac{d}{dz} + \left(s_1 \frac{d}{dx} - 2 \frac{ds_1}{dx} \right) \left(s \frac{d}{dy} - \frac{ds}{dy} \right) s_2 \frac{d}{dz} \\ &+ \left(s_2 \frac{d}{dx} - 2 \frac{ds_2}{dx} \right) \left(s \frac{d}{dy} - \frac{ds}{dy} \right) s_1 \frac{d}{dz} + \left(s_2 \frac{d}{dx} - 2 \frac{ds_2}{dx} \right) \left(s_1 \frac{d}{dy} - \frac{ds_1}{dy} \right) s \frac{d}{dz}. \end{aligned}$$

Je prends pour exemple de la théorie précédente le cas de trois variables x , y , z .

Soit

$$P = x, y, z,$$

$$P_1 = x, z, y,$$

$$P_2 = z, y, x,$$

$$P_3 = y, x, z,$$

$$P_4 = y, z, x,$$

$$P_5 = z, x, y,$$

$$\nabla = x \frac{d}{dx} + y \frac{d}{dy} + z \frac{d}{dz},$$

$$\nabla_1 = x \frac{d}{dx} + z \frac{d}{dy} + y \frac{d}{dz},$$

$$\nabla_2 = z \frac{d}{dx} + y \frac{d}{dy} + x \frac{d}{dz},$$

$$\nabla_3 = y \frac{d}{dx} + x \frac{d}{dy} + z \frac{d}{dz},$$

$$\nabla_4 = y \frac{d}{dx} + z \frac{d}{dy} + x \frac{d}{dz},$$

$$\nabla_5 = z \frac{d}{dx} + x \frac{d}{dy} + y \frac{d}{dz}.$$

Au lieu de P_i , symbole de l'une quelconque des permutations, j'écris, pour abréger, le seul indice i , alors la composition des permutations s'exprimera par les équations symboliques:

$$1^2 = 0 \quad 2^2 = 0 \quad 3^2 = 0 \quad 4^2 = 5 \quad 5^2 = 4$$

$$23 = 4 \quad 31 = 4 \quad 12 = 4$$

$$32 = 5 \quad 13 = 5 \quad 21 = 5$$

$$14 = 2 \quad 24 = 3 \quad 34 = 1$$

$$41 = 3 \quad 42 = 1 \quad 43 = 2$$

$$15 = 3 \quad 25 = 1 \quad 35 = 2$$

$$51 = 2 \quad 52 = 3 \quad 53 = 1$$

$$45 = 0 \quad 54 = 0$$

d'où

$$D_1^2 = \nabla_1^2 - \nabla \quad D_2^2 = \nabla_2^2 - \nabla \quad D_3^2 = \nabla_3^2 - \nabla \quad D_4^2 = \nabla_4^2 - \nabla_5 \quad D_5^2 = \nabla_5^2 - \nabla_4$$

$$D_2 D_3 = \nabla_2 \nabla_3 - \nabla_4 \quad D_3 D_1 = \nabla_3 \nabla_1 - \nabla_4 \quad D_1 D_2 = \nabla_1 \nabla_2 - \nabla_4$$

$$= \nabla_3 \nabla_2 - \nabla_5 \quad = \nabla_1 \nabla_3 - \nabla_5 \quad = \nabla_2 \nabla_1 - \nabla_5$$

$$D_1 D_4 = \nabla_1 \nabla_4 - \nabla_2 \quad D_2 D_4 = \nabla_2 \nabla_4 - \nabla_3 \quad D_3 D_4 = \nabla_3 \nabla_4 - \nabla_1$$

$$= \nabla_4 \nabla_1 - \nabla_3 \quad = \nabla_4 \nabla_2 - \nabla_1 \quad = \nabla_4 \nabla_3 - \nabla_2$$

$$\begin{aligned}
 D_1 D_5 &= \nabla_1 \nabla_5 - \nabla_3 & D_2 D_5 &= \nabla_2 \nabla_5 - \nabla_1 & D_3 D_5 &= \nabla_3 \nabla_5 - \nabla_2 \\
 &= \nabla_5 \nabla_1 - \nabla_2 & &= \nabla_5 \nabla_2 - \nabla_3 & &= \nabla_5 \nabla_3 - \nabla_1 \\
 D_4 D_5 &= \nabla_4 \nabla_5 - \nabla \\
 &= \nabla_5 \nabla_4 - \nabla.
 \end{aligned}$$

De là on déduit

$$\begin{aligned}
 & (abcdefghf_1g_1h_1f_2g_2h_2k) \widehat{(D_1 D_2 D_3 D_4 D_5)^2} \\
 &= (abcdefghf_1g_1h_1f_2g_2h_2k) \widehat{(\nabla_1 \nabla_2 \nabla_3 \nabla_4 \nabla_5)^2} \\
 &\quad - (a + b + c + 2k) \nabla \\
 &\quad - (g_1 + h_1 + g_2 + h_2) \nabla_1 \\
 &\quad - (h_1 + f_1 + h_2 + f_2) \nabla_2 \\
 &\quad - (f_1 + g_1 + f_2 + g_2) \nabla_3 \\
 &\quad - (f + g + h + e) \nabla_4 \\
 &\quad - (f + g + h + d) \nabla_5.
 \end{aligned}$$

Pour le troisième ordre on trouve

	$1^3 = 1$	$2^3 = 2$	$3^3 = 3$	$4^3 = 0$	$5^3 = 0$	
$2^2 3 = 3$	$232 = 1$	$32^2 = 3$	$3^2 2 = 2$	$323 = 1$	$23^2 = 2$	
$3^2 1 = 1$	$313 = 2$	$13^2 = 1$	$1^2 3 = 3$	$131 = 2$	$31^2 = 3$	
$1^2 2 = 2$	$121 = 3$	$21^2 = 2$	$2^2 1 = 1$	$212 = 3$	$12^2 = 1$	
$4^2 1 = 2$	$414 = 1$	$14^2 = 3$	$1^2 4 = 4$	$141 = 5$	$41^2 = 4$	
$4^2 2 = 3$	$424 = 2$	$24^2 = 1$	$2^2 4 = 4$	$242 = 5$	$42^2 = 4$	
$4^2 3 = 1$	$434 = 3$	$34^2 = 2$	$3^2 4 = 4$	$343 = 5$	$43^2 = 4$	
$5^2 1 = 3$	$515 = 1$	$15^2 = 2$	$1^2 5 = 5$	$151 = 4$	$51^2 = 5$	
$5^2 2 = 1$	$525 = 2$	$25^2 = 3$	$2^2 5 = 5$	$252 = 4$	$52^2 = 5$	
$5^2 3 = 2$	$535 = 3$	$35^2 = 1$	$3^2 5 = 5$	$353 = 4$	$53^2 = 5$	
$4^2 5 = 4$	$454 = 4$	$54^2 = 4$	$5^2 4 = 5$	$545 = 5$	$45^2 = 5$	
$145 = 1$	$451 = 1$	$514 = 3$	$415 = 2$	$154 = 1$	$541 = 1$	
$245 = 2$	$452 = 2$	$524 = 1$	$425 = 1$	$354 = 3$	$542 = 3$	
$345 = 3$	$453 = 3$	$534 = 2$	$435 = 1$	$354 = 3$	$543 = 3$	
$234 = 5$	$342 = 4$	$423 = 5$	$324 = 0$	$243 = 0$	$432 = 0$	
$314 = 5$	$143 = 4$	$431 = 5$	$134 = 0$	$341 = 0$	$413 = 0$	
$124 = 5$	$241 = 4$	$412 = 5$	$214 = 0$	$142 = 0$	$421 = 0$	
$235 = 0$	$352 = 0$	$523 = 0$	$325 = 4$	$253 = 5$	$532 = 4$	
$315 = 0$	$153 = 0$	$531 = 0$	$135 = 4$	$351 = 5$	$513 = 4$	
$125 = 0$	$251 = 0$	$512 = 0$	$215 = 4$	$152 = 5$	$521 = 4$	
$123 = 2$	$231 = 3$	$312 = 1$	$213 = 1$	$132 = 3$	$321 = 2$	

Introduisons des signes abrégés pour les coefficients de manière que la lettre qui forme la seconde partie d'une quelconque des équations ci-dessous écrites soit le coefficient de l'expression qui en forme la première partie :

$$1^3 = a \quad 2^3 = b \quad 3^3 = c \quad 4^3 = d \quad 5^3 = e$$

$$2^2 3 = f \quad 3^2 1 = g \quad 1^2 2 = h$$

$$23^2 = f_1 \quad 31^2 = g_1 \quad 12^2 = h_1$$

$$1^2 4 = l \quad 2^2 4 = m \quad 3^2 4 = n$$

$$14^2 = l_1 \quad 24^2 = m_1 \quad 34^2 = n_1$$

$$1^2 5 = p \quad 2^2 5 = q \quad 3^2 5 = r$$

$$15^2 = p_1 \quad 25^2 = q_1 \quad 35^2 = r_1$$

$$4^2 5 = k \quad 45^2 = k_1$$

$$145 = s \quad 245 = t \quad 345 = u$$

$$234 = s_1 \quad 314 = t_1 \quad 124 = u_1$$

$$235 = s_2 \quad 315 = t_2 \quad 125 = u_2$$

$$123 = v$$

on aura, après toutes reductions

$$\begin{aligned} & (abcdefghf_1g_1h_1lmnl_1m_1n_1pqr p_1q_1r_1stus_1t_1u_1s_2t_2u_2v)(\widehat{D_1D_2D_3D_4D_5})^3 \\ &= ax^3 + (c+d+3u+3u_1)y^3 + (b+e+3q+3q_1)z^3 \\ &+ 3(f_1+m_1+r+k+2u+2s_1)y^2z + 3(f+m+r_1+k_1+2t+2s_2)yz^2 \\ &+ 3(h_1+p_1+2u)z^2x + 3(h+p)zx^2 \\ &+ 3(q_1+l)x^2y + 3(q+l+2t_1)xy^2 \\ &+ 6(s+u_1+t_2+v)xyz \\ &+ (f_1+n+q_1+k_1+2u+2s_2)x^3 + (h_1+q)y^3 + (q_1+u_1+t_1)z^3 \\ &+ (f+2h+2t+2u+2u_2)y^2z + (a+2l+l_1+p+k+2s+2s_1+2v)yz^2 \\ &+ (d+2g+h+l+2n+2l_1+m_1+2u+2u_1+2t_2)z^2x \\ &+ (c+2n+2r+r_1+2k+2s+2t+2s_1+2t_1+2u_2+2v)zx^2 \\ &+ (e+2f+g+2q+r+p_1+2r_1+2t+2s_1+2t_2)x^2y \\ &+ (b+m+2q_1+2s_2+2u_2+2v)xy^2 \\ &+ 2(f_1+g_1+h_1+m+m_1+p+p_1+k_1+s+u+t_1+u_1+s_2+t_2)xyz \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \frac{d^3}{dx^3} + \dots \\ 3 \frac{d^3}{dy^3 dx} + \dots \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}
& + (s+t_1+u_2+v)x^3 + (t+u_1+s_2+v)y^3 + (u+s_1+t_2+v)z^3 \\
& + (f_1+g_1+h_1+l+l_1+q+q_1+k+s+u+s_1+t_1+t_2+u_2)y^2z \\
& + (f+g+h+n+n_1+p+p_1+k_1+s+t+t_1+u_1+s_2+u_2)yz^2 \\
& + (f_1+g_1+h_1+m+m_1+r+r_1+k+s+t+t_1+u_1+s_2+u_2)z^2x \\
& + (f+g+h+l+l_1+q+q_1+k_1+t+u+s_1+u_1+s_2+t_2)zx^2 \\
& + (f_1+g_1+h_1+n+n_1+p+p_1+k+t+u+s_1+u_1+s_2+t_2)x^2y \\
& + (f+g+h+m+m_1+r+r_1+k_1+s+u+s_1+t_1+t_2+u_2)xy^2 \\
& + (a+b+c+d+e+l+m+n+l_1+m_1+n_1+p+q+r+p_1+q_1+r_1 \\
& \quad + s+t+u+s_1+t_1+u_1+s_2+t_2+u_2+v)xyz \Bigg\} 6 \frac{d^3}{dx dy dz} \\
& = a\nabla_1^3 + b\nabla_2^3 + c\nabla_3^3 + d\nabla_4^3 + e\nabla_5^3 \\
& + f(\nabla_2^2\nabla_3 + \nabla_2\nabla_3\nabla_2 + \nabla_3\nabla_2^2) + g(\nabla_3^2\nabla_1 + \nabla_3\nabla_1\nabla_3 + \nabla_1\nabla_3^2) + h(\nabla_1^2\nabla_2 + \nabla_1\nabla_2\nabla_1 + \nabla_2\nabla_1^2) \\
& + f_1(\nabla_2^2\nabla_3^2 + \nabla_3^2\nabla_2\nabla_3 + \nabla_3^2\nabla_2^2) + g_1(\nabla_3^2\nabla_1^2 + \nabla_1^2\nabla_3\nabla_1 + \nabla_1^2\nabla_3^2) + h_1(\nabla_1^2\nabla_2^2 + \nabla_2^2\nabla_1\nabla_2 + \nabla_2^2\nabla_1^2) \\
& + l(\nabla_1^2\nabla_4 + \nabla_1\nabla_4\nabla_1 + \nabla_4\nabla_1^2) + m(\nabla_2^2\nabla_4 + \nabla_2\nabla_4\nabla_2 + \nabla_4\nabla_2^2) + n(\nabla_3^2\nabla_4 + \nabla_3\nabla_4\nabla_3 + \nabla_4\nabla_3^2) \\
& + l_1(\nabla_1\nabla_4^2 + \nabla_4\nabla_1\nabla_4 + \nabla_4^2\nabla_1) + m_1(\nabla_2\nabla_4^2 + \nabla_4\nabla_2\nabla_4 + \nabla_4^2\nabla_2) + n_1(\nabla_3\nabla_4^2 + \nabla_4\nabla_3\nabla_4 + \nabla_4^2\nabla_3) \\
& + p(\nabla_1^2\nabla_5 + \nabla_1\nabla_5\nabla_1 + \nabla_5\nabla_1^2) + q(\nabla_2^2\nabla_5 + \nabla_2\nabla_5\nabla_2 + \nabla_5\nabla_2^2) + r(\nabla_3^2\nabla_5 + \nabla_3\nabla_5\nabla_3 + \nabla_5\nabla_3^2) \\
& + p_1(\nabla_1\nabla_5^2 + \nabla_5\nabla_1\nabla_5 + \nabla_5^2\nabla_1) + q_1(\nabla_2\nabla_5^2 + \nabla_5\nabla_2\nabla_5 + \nabla_5^2\nabla_2) + r_1(\nabla_3\nabla_5^2 + \nabla_5\nabla_3\nabla_5 + \nabla_5^2\nabla_3) \\
& + k(\nabla_4^2\nabla_5 + \nabla_4\nabla_5\nabla_4 + \nabla_5\nabla_4^2) + k_1(\nabla_4\nabla_5^2 + \nabla_5\nabla_4\nabla_5 + \nabla_5^2\nabla_4) \\
& + s(\nabla_1\nabla_4\nabla_5 + \nabla_4\nabla_5\nabla_1 + \nabla_5\nabla_1\nabla_4 + \nabla_4\nabla_1\nabla_5 + \nabla_1\nabla_5\nabla_4 + \nabla_5\nabla_4\nabla_1) \\
& + t(\nabla_2\nabla_4\nabla_5 + \nabla_4\nabla_5\nabla_2 + \nabla_5\nabla_2\nabla_4 + \nabla_4\nabla_2\nabla_5 + \nabla_2\nabla_5\nabla_4 + \nabla_5\nabla_4\nabla_2) \\
& + u(\nabla_3\nabla_4\nabla_5 + \nabla_4\nabla_5\nabla_3 + \nabla_5\nabla_3\nabla_4 + \nabla_4\nabla_3\nabla_5 + \nabla_3\nabla_5\nabla_4 + \nabla_5\nabla_4\nabla_3) \\
& + s_1(\nabla_2\nabla_3\nabla_4 + \nabla_3\nabla_4\nabla_2 + \nabla_4\nabla_2\nabla_3 + \nabla_3\nabla_2\nabla_4 + \nabla_2\nabla_4\nabla_3 + \nabla_4\nabla_3\nabla_2) \\
& + t_1(\nabla_3\nabla_1\nabla_4 + \nabla_1\nabla_4\nabla_3 + \nabla_4\nabla_3\nabla_1 + \nabla_1\nabla_3\nabla_4 + \nabla_3\nabla_4\nabla_1 + \nabla_4\nabla_1\nabla_3) \\
& + u_1(\nabla_1\nabla_2\nabla_4 + \nabla_2\nabla_4\nabla_1 + \nabla_4\nabla_1\nabla_2 + \nabla_2\nabla_1\nabla_4 + \nabla_1\nabla_4\nabla_2 + \nabla_4\nabla_2\nabla_1) \\
& + s_2(\nabla_2\nabla_3\nabla_5 + \nabla_3\nabla_5\nabla_2 + \nabla_5\nabla_2\nabla_3 + \nabla_3\nabla_2\nabla_5 + \nabla_2\nabla_5\nabla_3 + \nabla_5\nabla_3\nabla_2) \\
& + t_2(\nabla_3\nabla_1\nabla_5 + \nabla_1\nabla_5\nabla_3 + \nabla_5\nabla_3\nabla_1 + \nabla_1\nabla_3\nabla_5 + \nabla_3\nabla_5\nabla_1 + \nabla_5\nabla_1\nabla_3) \\
& + u_2(\nabla_1\nabla_2\nabla_5 + \nabla_2\nabla_5\nabla_1 + \nabla_5\nabla_1\nabla_2 + \nabla_2\nabla_1\nabla_5 + \nabla_1\nabla_5\nabla_2 + \nabla_5\nabla_2\nabla_1) \\
& + v(\nabla_1\nabla_2\nabla_3 + \nabla_2\nabla_3\nabla_1 + \nabla_3\nabla_1\nabla_2 + \nabla_2\nabla_1\nabla_3 + \nabla_1\nabla_3\nabla_2 + \nabla_3\nabla_2\nabla_1) \\
& - 3(t_1+u_1+t_2+u_2)\nabla_1^2 - 3(u_1+s_1+u_2+s_2)\nabla_2^2 - 3(s_1+t_1+s_2+t_2)\nabla_3^2 - 3(s_1+t_1+u_1)\nabla_4^2 \\
& \quad - 3(s_2+t_2+u_2)\nabla_5^2 \\
& - 3(a+g+h_1+2s)\nabla\nabla_1 - 3(b+h+f_1+2t)\nabla\nabla_2 - 3(c+f+g_1+2u)\nabla\nabla_3 \\
& \quad - 3(l+m+n)\nabla\nabla_4 - 3(p+q+r)\nabla\nabla_5 \\
& - (2m+2q+n+r+t_1+2u_1+t_2+2u_2)\nabla_2\nabla_3 - (m+q+2n+2r+2t_1+u_1+2t_2+u_2)\nabla_3\nabla_2 \\
& - (l+p+2n+2r+2s_1+u_1+2s_2+u_2)\nabla_3\nabla_1 - (2l+2p+n+r+s_1+2u_1+s_2+2u_2)\nabla_1\nabla_3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & - (2l + 2p + m + q + s_1 + 2t_1 + s_2 + 2t_2) \nabla_1 \nabla_2 - (l + p + 2m + 2q + 2s_1 + t_1 + 2s_2 + t_2) \nabla_2 \nabla_1 \\
 & - (2h + 2p_1 + 2g_1 + m_1 + n_1 + t + u + 2v) \nabla_1 \nabla_4 - (h + p_1 + 2m_1 + g_1 + 2n_1 + 2t + 2u + v) \nabla_4 \nabla_1 \\
 & - (2f + 2h_1 + l_1 + 2q_1 + n_1 + u + s + 2v) \nabla_2 \nabla_4 - (f + h_1 + 2l_1 + q_1 + 2n_1 + 2u + 2s + v) \nabla_4 \nabla_2 \\
 & - (2f_1 + l_1 + m_1 + 2r_1 + 2v + s + t + 2g) \nabla_3 \nabla_4 - (f_1 + 2l_1 + 2m_1 + r_1 + v + 2s + 2t + g) \nabla_4 \nabla_3 \\
 & - (2g_1 + 2h + 2l_1 + q_1 + r_1 + t + u + 2v) \nabla_1 \nabla_5 - (g_1 + h + l_1 + 2q_1 + 2r_1 + 2t + 2u + v) \nabla_5 \nabla_1 \\
 & - (2f + 2h_1 + p_1 + 2m_1 + r_1 + u + s + 2v) \nabla_2 \nabla_5 - (f + h_1 + 2p_1 + m_1 + 2r_1 + 2u + 2s + v) \nabla_5 \nabla_2 \\
 & - (2g + p_1 + q_1 + 2n_1 + 2f_1 + s + t + 2v) \nabla_3 \nabla_5 - (g + 2p_1 + q_1 + n_1 + f_1 + 2s + 2t + v) \nabla_5 \nabla_3 \\
 & \quad - 3(d + e + s_1 + t_1 + u_1 + s_2 + t_2 + u_2) \nabla_4 \nabla_5 \\
 & + 2(d + e + 3s_1 + 3t_1 + 3u_1 + 3s_2 + 3t_2 + 3u_2) \nabla \\
 & + 2(a + f + f_1 + 2g + 2h_1 + l + m + n + p + q + r + 4s + t + u + 2v) \nabla_1 \\
 & + 2(b + 2f_1 + g + g_1 + 2h + l + m + n + p + q + r + s + 4t + u + 2v) \nabla_2 \\
 & + 2(c + 2f + 2g_1 + h + h_1 + l + m + n + p + q + r + s + t + 4u + 2v) \nabla_3 \\
 & + 2(2l_1 + 2m_1 + 2n_1 + p_1 + q_1 + r_1 + s_1 + t_1 + u_1 + 2s_2 + 2t_2 + 2u_2) \nabla_4 \\
 & + 2(l_1 + m_1 + n_1 + 2p_1 + 2q_1 + 2r_1 + 2s_1 + 2t_1 + 2u_1 + s_2 + t_2 + u_2) \nabla_5.
 \end{aligned}$$

Londres, 1861.