Oesterreichische BOTANISCHE ZEITSCHRIFT.

Gemeinnütziges Organ

für

Die Oesterreichische
botanische Zeitschrift
erscheint

den Ersten jeden Monats.
Man pränumerirt auf selbe
mit 5 fl. 25 kr. Oest. W.

(3 Thlr. 10 Ngr.)
ganzjährig, oder
mit 2 fl. 63 kr. Oest. W.
halbjährig.

Inserate
die ganze Petitzeile
10 kr. Oest. W.

Botanik und Botaniker,

Gärtner, Oekonomen, Forstmänner, Aerzte,

Apotheker und Techniker.

N^o. 12.

Exemplare,
die frei durch die Post be-
zogen werden sollen, sind
blos bei der Redaktion

(Wieden, Neumann, Nr. 7)
zu pränumeriren.
Im Wege des
Buchhandels übernimmt
Pränumeration
C. Gerold's Sohn
in Wien,
so wie alle übrigen
Buchhandlungen.

XIV. Jahrgang.

WIEN.

December 1864.

INHALT: *Pinus leucodermis*. Von Antoine. — *Descriptiones salicum*. Von Dr. Kerner. — Ueber *Pleospora* und *Puccinia* des Spargels. Von Haszlinzsky. — Skizzen aus Istrien. Von Löser. — Die europäischen *Poa*-Arten. Von Janka. — Correspondenz. Von Uechtritz, Schiller, Andorfer. — Kryptogamischer Reiseverein. — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literarisches. — Sammlungen. — Botanischer Tauschverein. — Mittheilungen. — Inserat.

Einladung zur Pränumeration

auf den XV. Jahrgang (1865) der

Oesterreichischen

Botanischen Zeitschrift.

(Oesterr. botan. Wochenblatt.)

Auf die „Oesterreichische botanische Zeitschrift“ pränumerirt man mit 5 fl. 25 kr. ö. W. (3. Rthlr. 10 Ngr.) auf den ganzen Jahrgang oder mit 2 fl. 63 kr. ö. W. auf einen Semester und zwar auf Exemplare, die frei durch die Post bezogen werden sollen, nur bei der Redaktion: Wieden, Neumanngasse, Nr. 7 (331).

In diesem Falle werden dem Pränumeranten, der mit 5 fl. 25 kr. direkte bei der Redaktion auf ein ganzes Jahr pränumerirt, je nach seiner Wahl, entweder der 2. und 3. Jahrgang des botanischen Wochenblattes, oder eine halbe Centurie Pflanzen aus dem Bereiche der mitteleuropäischen Flora (wenn derselbe eine Desideraten-Liste von mindestens 200 Species einsendet) als Prämie offerirt.

Bei der Zusendung des Pränumerations-Betrages ersuchen wir um die genaue und deutlich geschriebene Adresse mit Angabe der letzten Post.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls Pränumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat Herr C. Gerold's Sohn in Wien, am Stephansplatz, übernommen.

Von den bereits erschienenen 14 Jahrgängen können noch vollständige Exemplare bezogen werden, und zwar gegen nachfolgende Preise: 1. Jahrgang 4 fl., — 2. bis 6. Jahrgang zu 2 fl., — 7. und 8. Jahrgang zu 4 fl., — 9. bis 12. Jahrgang zu 3 fl., — 13. und 14. Jahrgang zu 5 fl. — 1. bis 14. Jahrgang zusammen, aber blos bei der Redaktion, 30 fl. ö. W.

Dr. Alexander Skofitz,

Wieden, Neumannngasse Nr. 7 (331).

***Pinus leucodermis* Ant.**

Von Franz Antoine.

P. foliis gemminis, abbreviatis, erectis, profunde canaliculatis, margine laevibus v. vix scabriusculis, vaginis foliorum juniorum (11^u) longis, scariosis, vetustiorum brevissimis corrugatis. Strobili horizontaliter patenti, gemmini vel terni, sessiles, ovoideo-conici; squamarum apophysi quadrangulati incrassata, transversaliter acute-carinata, umbone elevato in spinulam obtusam producto. Semina magna, ala securiformi.

Arbor 90—110 ped. alta, corona nunc angustato - pyramidata nunc late ovoidea. Truncus a basi oblique adscendens, deinde rectus, aequalis, diametro 2—3 pedalis, usque ad altitudinem 20—30 pedum ramis orbatus, ligno grosse fibroso, atrorubro, resina turgidissimo, alburno ochroleuco. Cortex albo - cinerea in laminas rumpente crassas, irregulares, trapezoideas v. 5-6-gonas, superficies squamulis copiosis plerisque ovalibus, nitidulis tectas. Ramis albicantes crassiusculi apice cum foliis pennicilliformis congestis erecti, pulvinis spiraliter dispositis centro cicatrice transverse elliptica immersae notatis. Gemmae foliiferae longe ovoideae, producte, acuminatae, dilute badiae, lucidae.

Folia gemmina, viridia, 2½ 3½ poll. longa, ½—¾ lin. lata, curviuscula, apicem versus plus minusve divergentia, intus profunde canaliculata, extus convexa, utrinque stomatibus minutissimis, albis, seriatim dispositis obsessa, apice mutica, mucrone cartilaginea lutescente, marginibus rotundatis, laevia v. minutissime ac obsolete serrulato. Vagina foliorum juniorum 10—11 lin. longa, e squamis longis lanceolatis formata, quorum squama superior tenuissima,