einhergehen. In der Mehrzahl der Fälle wird nicht ein Moment allein, sondern das Zusammentreffen verschiedener für die Abmagerung verantwortlich zu machen sein.

Bei der großen Bedeutung, die eine fortschreitende Gewichtsabnahme im Leben des Menschen spielt — häufig ist sie die einzige Klage, die den Patienten veranlaßt, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen — und bei der Erkenntnis, daß eine Besserung, soweit eine solche überhaupt möglich ist, von der richtigen Deutung und Behandlung der Grundursache abhängig ist, beansprucht jeder Fall von Abmagerung eine eingehende Würdigung der Anamnese, eine sorgfältige Berücksichtigung der Lebensgewohnheiten und Ernährungsweise des Kranken und eine gründliche, alle Organe und das Verhalten des Stoffwechsels in Betracht ziehende Untersuchung des Patienten.

Selbstverständlich kann ich hier nicht auf die verschiedenen endogenen und exogenen Ursachen eingehen, die überhaupt zur Abmagerung führen können. Im Rahmen der mir gesteckten Aufgabe werde ich das vorliegende Thema nur so weit behandeln, als es zu den Erkrankungen des Darms in Beziehung steht; dabei wird es sich nicht umgehen lassen, einige Fragen von allgemeiner Bedeutung zu berühren.

Die Berechtigung zur speziellen Behandlung der Frage, unter welchen Umständen Darmkrankheiten Veranlassung zur Abmagerung geben können, erblicke ich in der Tatsache, daß Darmaffektionen eine häufige Veranlassung zu fortschreitender bedrohlicher Gewichtsabnahme geben und daß nach meinen Erfahrungen die hierfür in Betracht kommenden Ursachen oft nicht oder wenigstens nicht richtig gewürdigt und bewertet werden.

Liegt ein Verdacht vor, daß der Darm Ausgangspunkt der bestehenden Abmagerung sein kann, so pflegen in erster Linie zwei Erkrankungen in Frage gezogen zu werden: maligne Tumoren und Tuberkulose. In einem Teil der Fälle wird eine solche Annahme auch berechtigt sein. Tatsächlich führt ein gewisser Prozentsatz der bösartigen Tumoren des Darms — in der bei weitem überwiegenden Mehrzahl der Fälle sind es ja Karzinome — infolge des stark erhöhten Gesamtstoffwechsels, vor allem aber wegen der durch die Erkrankung sehr eingeschränkten Nahrungsaufnahme zu einer erheblichen Abmagerung. Ja, es ist bekannt, daß gar nicht so selten Darmkarzinome nur unter Allgemeinsymptomen — Abmagerung, Kräfteverfall, Anämie, Fieber — in Erscheinung treten und gerade deswegen übersehen werden, weil in diesen Stadien der Erkrankung auf die Darmaffektion hinweisende lokale Krankheitszeichen fehlen. Deswegen läßt man sich unter solchen Umständen leicht von der richtigen Diagnose „Karzinom“ abbringen und diagnostiziert fälschlicherweise eine Tuberkulose, und zwar, auch wiederum wegen Mangels an Darmsymptomen, eine Lungen- oder Drüsentuberkulose. Man sollte es sich deswegen zur Regel machen, in den hier gekennzeichneten Krankheitsbildern auf das Bestehen eines Darmkarzinoms zu fahnden, auch wenn keine ausgesprochenen Darmsymptome vorhanden sind. Ich werde in einem späteren Vortrage „Ueber Darmkarzinome“ auf alle dieses Kapitel betreffenden Fragen ausführlicher einzugehen haben.

Noch häufiger als auf maligne Tumoren wird fortschreitende Abmagerung bei dunklen Darmerscheinungen, zumal wenn gleichzeitig Temperatursteigerungen nachweisbar sind, auf eine Darmtuberkulose bezogen, nach meinen Erfahrungen in einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Fällen mit Unrecht. Gewiß wird man an die Möglichkeit einer Darmtuberkulose denken müssen, aber man hüte sich, eine so alarmierende Diagnose zu stellen, wenn sie durch den objektiven Untersuchungsbefund nicht genügend gestützt werden kann. Bei genauer Prüfung der Darm- und zweckmäßig auch der Magenfunktionen lassen sich die allgemeinen und lokalen Krankheitserscheinungen in einem nicht unerheblichen Teil dieser unter der Diagnose „Darmtuberkulose“ geführten Fälle auf entzündliche Darmerkrankungen oder auf nur rein funktionelle Darmstörungen zurückführen.

Ich rechne hier zu den entzündlichen Darmaffektionen auch die dysenterische Dickdarmentzündung. Die chronische Ruhr und alle auf diese zurückzuführenden Dickdarmerkrankungen können zu hochgradiger Abmagerung, bedrohlichem Kräfteverfall, schwerer Anämie und unregelmäßigem Fieber führen und den Eindruck einer tuberkulösen oder karzinomatösen Darmerkrankung machen. Solche Fehldiagnosen liegen besonders nahe, wenn es sich um Kranke handelt, die nie Symptome von akuter Dysenterie gezeigt haben, bei denen sich die Krankheit mehr schleichend entwickelt hat. Mit dem gehäuftem Auftreten dysenterischer Erkrankungen in den letzten Jahren habe ich öfters, besonders bei alten Leuten, letal verlaufende Krankheitsfälle beobachtet, wo die Differentialdiagnose: chronische Dysenterie, Tuberkulose oder Karzinom des Darms auf große, zuweilen sogar auf unüberwindliche Schwierigkeiten stieß. Die genaueste Untersuchung sämtlicher Organe, des Stuhls, des Blutes, die Rektoskopia und die Röntgenuntersuchung können im Stich lassen; man bleibt im Zweifel, bis die Autopsie post mortem die wahre Natur der Erkrankung aufdeckt.

Aber auch auf andere Ursachen zurückzuführende gutartige Darm-entzündungen können Abmagerung mehr oder weniger hohen Grades zur Folge haben.

Unter den funktionellen Darmstörungen, die zu Entkräftigung und Abmagerung Veranlassung geben können, sind an erster

Praktische Ratschläge für die Diagnose und Behandlung der Verdauungskrankheiten.

Von L. Kuttner in Berlin.

IV.

Abmagerung bei Darmkrankheiten.

Es ist begreiflich, daß gewisse Darmerkrankungen das Kräftebefinden mehr oder weniger beeinträchtigen und zu einer entsprechenden Abmagerung führen können. Im allgemeinen wird eine solche Mitbeteiligung des Allgemeinbefindens im Sinne einer Gewichtsabnahme zu erwarten sein bei denjenigen Darmerkrankungen, die zu einer Steigerung des Gesamtstoffwechsels mit ungenügender Nahrungsaufnahme führen oder mit mangelhafter Ausnützung der Nahrung

Stelle zu nennen: die „gastrogene“ Darmdyspepsie, die Gärungs- und Fäulnisdyspepsie und die bei Hyperthyreosen vorkommenden Diarrhöen.

Die „Achyilia gastrica“ braucht bekanntlich den allgemeinen Ernährungszustand in keiner Weise zu beeinträchtigen; zu einer beachtenswerten Mitbeteiligung des Gesamtorganismus kommt es erst, wenn zur Sekretionsanomalie eine Herabsetzung in der Entleerungsfähigkeit des Magens eintritt, oder wenn — was uns hier zu beschäftigen hat — gleichzeitig die Darmtätigkeit in bezug auf Sekretion und Resorption geschädigt ist. Treten dann periodisch rezidivierende oder chronische Durchfälle auf, so machen sich schwere Rückwirkungen auf das Allgemeinbefinden — Gewichtsverluste und Blutarmut (perniziöse Anämie) — bemerkbar, und zwar um so intensiver, je mehr die Dünndarm- und die pankreatische Verdauung an der Erkrankung mitbeteiligt sind.

Ebenso können hartnäckige Zustände von Fäulnis- und Gärungsdyspepsie zu einer Abnahme des Körpergewichtes führen. Mit Recht betont v. Noorden, daß die Ernährung solcher Kranken besonders leiden wird und muß, wenn es sich — wie es häufig zutrifft — um Neuropathen handelt, die aus Furcht vor Beschwerden die Nahrungszufuhr noch unnötig stark beschränken.

Viel ernster und schwerer als bei der Gärungs- und Fäulnisdyspepsie können die Gewichtsverluste und Schwächezustände der Kranken werden bei der Form von Durchfällen, die wir als „thyreotoxische“ Diarrhöen bei Hyperthyreose auffassen. Hierbei wirkt die Hyperthyreose schon als Ursache endogener Abmagerung, dazu kommt der Gewichtsverlust infolge der Diarrhöen, der am größten sein wird, wenn es sich um Fettdiarrhöen handelt, recht beachtenswert aber auch schon ist, wenn die Diarrhöen nur wäßrige Beschaffenheit haben oder als „gastrogene“ Diarrhöen auftreten (vgl. den vorangehenden Vortrag).

Selbstverständlich können längere Zeit anhaltende Diarrhöen, die aus anderen als den angeführten Veranlassungen hervorgehen, ebenfalls zu Abmagerungen Veranlassung geben. Ich habe nur die wichtigsten und häufigsten erwähnt.

Viel weniger bekannt und oft viel zu wenig gewürdigt sind Gewichtsverluste im Anschluß an funktionelle, mit habitueller Obstipation einhergehende Darmstörungen. Ich brauche nicht erst hervorzuheben, daß solche Vorkommnisse durchaus nicht die Regel bilden. Im Gegenteil ist bei sehr vielen an chronischer Stuhlverstopfung leidenden Patienten der Ernährungszustand dauernd sehr gut, ja, gar nicht so selten kommt es zu einer erheblichen Zunahme des Körpergewichtes, und vielfach besteht nebenbei sogar ausgesprochene Fettleibigkeit. Andererseits aber habe ich, besonders bei jungen anämischen, chlorotischen Mädchen und Frauen Zustände von Abmagerung beobachtet, die so beängstigend waren, daß von den verschiedensten Seiten eine Darmtuberkulose als Ursache angenommen wurde. Und doch handelte es sich nur um hartnäckige Formen habitueller Verstopfung; allerdings müssen in solchen Fällen, die zu so ernsten Ernährungsstörungen führen, noch besondere Verhältnisse hinzutreten, die der schweren Beeinträchtigung der Körperernährung Vorschub leisten. Begünstigend in diesem Sinne wirken Störungen in der Funktion der Schilddrüse, evtl. auch anderer endokriner Drüsen und neuropathische Disposition. Besonders werden solche Kranke von dem Gedanken beherrscht, daß sie nichts essen können, weil sie keinen Stuhlgang haben. Infolge der dadurch bedingten, sehr kargen und unzumutbaren, auf eine sehr schlackenarme Kost sich beschränkende Nahrungsaufnahme wird die Stuhlverstopfung wegen Stuhlmangels immer mehr gefördert, sodaß selbst stärkere Abführmittel keine oder nur eine geringe Wirkung haben. Das führt zu einer noch stärkeren Einschränkung der Ernährung, zur Steigerung der nervösen Beschwerden und zu einem immer weiteren Fortschreiten der Abmagerung. Daß unter solchen Umständen, zumal wenn möglicherweise gleichzeitig geringe Veränderungen der Lungen vorliegen, der Gedanke an Tuberkulose aufkommen kann, ist begreiflich, und ebenso ist es verständlich, daß tatsächlich bei einer so schweren Beeinträchtigung des Ernährungszustandes sekundär, wie ich das wiederholt beobachtet habe, Tuberkulose hinzutreten kann. Auf diese Weise kann sich die Abmagerung bei Obstipation zu einem schweren Krankheitsbilde entwickeln, und es gehört das volle Verständnis des Arztes und seine ganze Autorität dazu, den Kranken von seiner vorgefaßten falschen Vorstellung abzubringen und ihn zu einer ausreichenden und zweckmäßigen Ernährung zu zwingen.

In verschiedenen Fällen dieser Art habe ich die diätetische, physikalische und psychische Behandlung erfolgreich unterstützt durch Verabreichung von Organpräparaten. Im übrigen wird für die Behandlung der Abmagerung bei Darmkrankheiten stets der jeweilige Befund maßgebend sein. Eine einheitliche Therapie gibt es nicht. Aufgabe des Arztes muß es sein, zu ermitteln, welcher Art die Darmkrankheit bzw. die krankhaften Vorgänge der Darmtätigkeit sind, die zur Abmagerung geführt haben. Die nötigen Unterlagen hierfür liefert neben der üblichen klinischen Untersuchung, die nicht nur auf das Verhalten des Darms, sondern auch auf das der übrigen Verdauungsorgane, der Lungen, der Konstitution des Nervensystems, des Stoffwechsels usw. Rücksicht zu nehmen hat, die exakte Untersuchung des Probediätstuhls in dem Sinne, wie wir es in unserem ersten Vortrage besprochen haben. Die Richtlinien zur Behandlung des Einzelfalles sind aus den verschiedenen Aufsätzen dieser Vortragsreihe zu entnehmen.