oder schwach paramagnetischen Körper wirken soll, die ja beide keine Aenderung in der Vertheilung des Magnetismus im Eisenkern hervorrufen können. Aus diesem Grunde ist die Construction, wie Ruhmkorff sie seinem Elektromagnete giebt, wobei die Spirale an das äußerste Ende des Kerns verlegt wird, durchaus zu billigen.

III. *Ein einfaches Gesetz für die Entwicklung und die Gruppierung der Krystallzonen;* *von Dr. Gustav Junghann in Perleberg.*

Die folgende Mittheilung lehnt sich an die von Herrn G. vom Rath in diesen Annalen Bd. 147, S. 22 ff. veröffentlichte Abhandlung über den Anorthit und setzt die Vergleichung der dort auf Tafel II gegebenen Abbildungen Fig. 1 bis 8 und besonders der Fig. 23, welche alle an den vesuvischen Krystallen beobachteten Flächen in einer schematischen Projection darstellt, voraus. Das hier mitzutheilende auf mathematischem Wege *a priori* gefundene Gesetz fand an diesen bildlichen Darstellungen des an Flächen und Zonen reichen Krystalles eine treffliche Gelegenheit zur empirischen Prüfung und soll daher hier mit steter Beziehung auf jene Figuren dargestellt werden. Demgemäß schloßen wir uns auch der Wahl des dort zu Grunde gelegten Axensystemes an, wonach wir die — bei horizontal liegender Papierfläche — gegen den Beschauer gerichtete Axe als die positive erste, die nach rechts gerichtete als die positive zweite, die nach oben gerichtete als die positive dritte Axe nehmen. Dagegen weichen wir in der Bezeichnung der Lage der Flächen von der dort gewählten Weifs'schen und Naumann'schen ab und wählen aus leicht erkennbarem Grunde die Miller'schen „Symbole“ ($\mu\nu\rho$), worin μ , ν , ρ *Divisoren* der

Grundparameter bedeuten und die der positiven entgegengesetzte Lage eines Flächenparameters durch ein dem betreffenden Index übergesetztes Minuszeichen, z. B. $(\bar{u}\bar{v}\bar{\rho})$ bezeichnet wird.

(Siehe „Lehrbuch der Krystallographie von Professor W. H. Miller, übersetzt und erweitert von Dr. J. Graulich. Wien 1856, §. 4.“ — Auf dies Buch wird im Folgenden mehrfach Bezug genommen werden.)

Wenn wir im tesserale System der Zone zweier Hexaëderflächen

$$100 \quad 010 \quad \bar{1}00 \quad 0\bar{1}0$$

die Flächen einreihen, durch welche die Kanten der Zone gerade abgestumpft werden, also die in der Zone liegenden Dodekaëderflächen, so erhalten wir die Zone

$$100 \quad 110 \quad 010 \quad \bar{1}10 \quad \bar{1}00 \quad \bar{1}10 \quad 010,$$

an welcher bemerkenswerth ist, *dass das Symbol jedes Gliedes durch Addition der gleichstelligen Indexe der beiden benachbarten Symbole erhalten wird.*

Die geraden Abstumpfungen der Kanten dieser vollständigten Zone sind krystallonomisch nicht möglich, denn die gerade Abstumpfung von 100 , 110 würde das Symbol $(\sqrt{2} + 1, 1, 0)$, die gerade Abstumpfung von 110 , 010 das Symbol $(1, \sqrt{2} + 1, 0)$ usw. haben, was dem krystallographischen Grundgesetze widerspricht, dass die Parameter jeder Fläche zu den Grundparametern des Krystalles in rationellen Verhältnissen stehen, die Indexe der Symbole also immer ganze Zahlen seyn müssen.

Die den geraden Abstumpfungen nächsten krystallonomisch möglichen Abstumpfungen (wir wollen sie als die *krystallonomischen Abstumpfungen* bezeichnen) sind die Tetrakishehexaëder-Flächen 210 , 120 , $\bar{1}20$, usw., durch deren Einschaltung in die obige Zone sich die folgende ergibt:

I	III	II	III	I	III	II	III	I
100	210	110	120	010	$\bar{1}20$	$\bar{1}10$	$\bar{2}10$	$\bar{1}00$ usw.

worin wir wieder bemerken, daß die Symbole der neu eingeschalteten (mit III überschriebenen) Flächen sich durch Addition der gleichstelligen Indexe der beiden benachbarten Flächen I und II ergeben.

Diese Zonenentwicklung durch fortgesetzte Addition der gleichstelligen Indexe zweier Flächensymbole ist, wie hier gezeigt werden soll, auf alle Zonen aller trimetrischen Krystallsysteme anwendbar.

Sind $(u\ v\ \rho)$, $(u'\ v'\ \rho')$ die Symbole zweier Flächen A , B , so bildet die Fläche $(u + u',\ v + v',\ \rho + \rho') = c$ die erste *krystallonomische Abstumpfung ihrer Kante* und die Zone ACB ist die *erste* aus der Zone AB *abgeleitete* Zone. Die krystallonomischen Abstumpfungen der Zone ACB , nämlich die Flächen $2u + u',\ (2v + v',\ 2\rho + \rho') = D$ und $(u + 2u',\ v + 2v',\ \rho + 2\rho') = E$ bilden die *zweiten* Abstumpfungen der Zone AB , durch welche diese in der Folge $ADCEB$ vervollständigt wird. Die in gleicher Weise zu bestimmenden ersten Abstumpfungen der Kanten AD , DC , CE , EB sind die *dritten* Abstumpfungen von AB usw.

Die Thatsache, daß die Kante zweier Flächen $(u\ v\ \rho)$, $(u'\ v'\ \rho')$ durch die Fläche $(u + u',\ v + v',\ \rho + \rho')$ krystallonomisch abgestumpft wird, ist auf dem mathematischen Wege gefunden worden, der am Schluß dieses Aufsatzes nachgewiesen wird. Zunächst aber wollen wir jetzt am Anorthit empirisch untersuchen, ob auch *alle* Flächen der an ihm beobachteten Zonen nach dieser Formel gefunden werden.

Die von Hrn. G. vom Rath am Anorthit beobachteten Flächen sind — nach der Bezeichnung durch Miller'sche Symbole:

$P = 001$	$n = 0\bar{2}1$	$z = \bar{1}30$	$\nu = \bar{2}\bar{4}1$
$h = 100$	$r = 061$	$m = 111$	$\mu = \bar{4}21$
$M = 010$	$c = 0\bar{6}1$	$a = 1\bar{1}1$	$\alpha = \bar{4}\bar{2}1$
$t = 201$	$\gamma = 013$	$p = 1\bar{1}1$	$s = \bar{4}23$
$x = \bar{1}01$	$k = 013^1)$	$o = \bar{1}\bar{1}1$	$i = \bar{4}\bar{2}3^2)$

1) Die im Verzeichniß des Hrn. G. vom Rath stehende Bezeichnung

$\frac{2}{3}'P_\infty$ ist offenbar ein Druckfehler statt $\frac{1}{3}'P_\infty$, welche letztere so-

$$\begin{array}{llll}
y = \bar{2}01 & l = 110 & q = \bar{2}21 & \pi = \bar{1}\bar{3}1 \\
q = \bar{2}03 & T = 1\bar{1}0 & u = \bar{2}21 & \beta = 241 \\
e = 021 & f = 130 & w = \bar{2}41 & b = 2\bar{4}1
\end{array}$$

wozu noch die Fläche $\alpha = \bar{1}\bar{1}2$ kommt, die nach S. 24 Hr. von Kokscharow an finnischen Krystallen beobachtet hat, während sie an vesuvischen sich nicht vorfindet.

Entwickeln wir nun nach der angegebenen Methode z. B. die Zone $MflhTzM'$ aus den Flächen Mh , so ergibt sich

$$\begin{array}{llll}
I\ 010 = M & I\ 010 = M & I\ 010 = M & I\ 010 = M \\
I\ 100 = h & II\ 110 = l & III\ 120 & IV\ 130 = f \\
I\ 0\bar{1}0 = M' & I\ 100 = h & II\ 110 = l & III\ 120 \\
& II\ 1\bar{1}0 = T & III\ 210 & IV\ 230 \\
& I\ 0\bar{1}0 = M' & I\ 100 = h & II\ 110 = l \\
& & III\ 2\bar{1}0 & IV\ 320 \\
& & II\ 1\bar{1}0 = T & III\ 210 \\
& & III\ 1\bar{2}0 & IV\ 310 \\
& & I\ 0\bar{1}0 = M' & I\ 100 = h \\
& & & IV\ 3\bar{1}0 \\
& & & III\ 2\bar{1}0 \\
& & & IV\ 3\bar{2}0 \\
& & & II\ 1\bar{1}0 = T \\
& & & IV\ 2\bar{3}0 \\
& & & III\ 1\bar{2}0 \\
& & & IV\ 1\bar{3}0 = z \\
& & & I\ 0\bar{1}0 = M'
\end{array}$$

In dieser Tabelle enthält die erste Columne die beiden Flächen, aus denen die Zone abgeleitet ist und die wir die

wohl der daneben stehenden ($\infty a : b : \frac{1}{2}c$) als auch der aus dem Folgenden sich ergebenden $0\bar{1}3$ entspricht.

- 2) Statt ($a : 2b' : \frac{1}{2}c$) ist zu lesen ($a' : 2b' : \frac{1}{2}c$), wie schon die Anschauung aus Fig. 23 oder Fig. 7 ergibt.

Kernflächen der Zone nennen oder mit I bezeichnen wollen. Die zweite Columnne enthält dieselben Flächen I mit den eingeschalteten ersten krystallonomischen Abstumpfungen II; in der dritten Columnne sind der vorigen die zweiten Abstumpfungen (Flächen III) eingeschaltet (deren keine am Krystall vorkommt); die vierte Columnne endlich läßt die beiden noch fehlenden Flächen f, z als dritte Abstumpfungen (Flächen IV) erkennen.

Die Zonen des Anorthites gehen im Allgemeinen nicht über die zweiten Abstumpfungen (III) der Kernflächen hinaus. Dritte, vierte ... Abstumpfungen (IV, V ...) kommen nur vereinzelt oder paarweis da vor, wo die Zonen von anderen Zonen geschnitten werden, in denen dieselben Flächen dann Abstumpfungen geringerer Ordnung sind. So ist z. B. die Zone $p q a n z w' p'$ mit den III-Flächen erschöpft:

$$\begin{array}{lll}
 \text{I } \bar{1}11 = p & \text{I } \bar{1}11 = p & \text{I } \bar{1}11 = p \\
 \text{I } \bar{0}21 = n & \text{II } \bar{1}\bar{1}3 = \alpha & \text{III } \bar{2}03 = q \\
 \text{I } 1\bar{1}\bar{1} = p' & \text{I } 0\bar{2}1 = n & \text{II } \bar{1}\bar{1}2 = \alpha \\
 & \text{II } 1\bar{3}0 = z & \text{III } \bar{1}\bar{3}3 \\
 & \text{I } \bar{1}\bar{1}1 = p' & \text{I } 0\bar{2}1 = n \\
 & & \text{III } 1\bar{5}1 \\
 & & \text{II } 1\bar{2}0 = z \\
 & & \text{III } \bar{2}\bar{4}1 = w' \\
 & & \text{I } \bar{1}\bar{1}1 = p'
 \end{array}$$

Dagegen enthalten die Zonen hn, he , je eine, die Zonen My, Mt je ein Paar vierte Abstumpfungen (V-Flächen); die Zone $MreykncM'$ sogar zwei sechste Abstumpfungen (VII-Flächen), r und c , wie diese Entwicklung zeigt:

$$\begin{array}{llll}
 \text{I } 010 = M & \text{I } 010 = M & \text{I } 010 = M & \text{I } 010 = M \\
 \text{I } 001 = P & \text{II } 011 & \text{III } 001 = e & \text{IV } 031 \\
 \text{I } 0\bar{1}0 = M' & \text{I } 001 = P & \text{II } 011 & \text{III } 021 = e \\
 & \text{II } 0\bar{1}1 & \text{III } 012 & \text{IV } 032 \\
 & \text{I } 0\bar{1}0 = M & \text{I } 001 = P & \text{II } 011
 \end{array}$$

III $0\bar{1}2$	IV 023
II $01\bar{1}$	III 012
III $0\bar{2}1=n$	IV $013=\gamma$
I $0\bar{1}1=M$	I $001=P$
	IV $0\bar{1}3=k$
	III $0\bar{1}2$
	IV $0\bar{2}3$
	II $0\bar{1}1$
	IV $0\bar{3}2$
	III $0\bar{2}1=n$
	IV $0\bar{3}1$
	I $0\bar{1}0=M'$

In dieser Zone (worin ungewöhnlicher Weise die II-Flächen nicht auftreten) vermissen wir auch in der vierten (bis zu den dritten Abstumpfungen vervollständigten) Columne noch inner die beiden Flächen $061=r$ und $0\bar{6}1=c$ und finden sie erst als sechste Abstumpfungen (VII), indem wir die Symbole von M und M' zu den nächst stehenden noch dreimal addiren: $3(010)+031=061=r$
 $3(0\bar{1}0)+0\bar{3}1=0\bar{6}1=c$.

An den drei Zonen, die hier nach dem Gesetze der krystallonomischen Abstumpfung entwickelt sind, (sowie an allen anderen) fällt nun noch eine bemerkenswerthe Erscheinung in die Augen. Wir finden nämlich unter den vorhandenen Flächen jeder Zone immer ein Paar, die *Kernflächen* (I), gewöhnlich aber zwei Paar (I und II) (die dann für die Entwicklung der Zone auch mit einander vertauscht werden können), deren Symbole die Summen je zweier in der vervollständigten Zone von ihnen gleichweit abstehender Symbole sind, so daß die Kante je zweier solcher Flächen durch die Kernfläche krystallonomisch abgestumpft wird. Verstehen wir unter dem Ausdruck $A=B+C$ die Worte: die Fläche A ist die krystallono-

mische Abstumpfung der Kante der Flächen B und C , so sehen wir in der

$$\text{Zone } Mh: h = l + T = f + z, M = f + z' = l + T'$$

$$\text{Zone } pn: n = \alpha + z = q + w', p = q' + w = \alpha + z'$$

$$\text{Zone } MP: P = \gamma + k = e + n = r + c,$$

$$M = r + c' = e + n' = \gamma + k'.$$

Wir wollen hinfür zwei Flächen, deren Kante von einer dritten krystallonomisch abgestumpft wird, als *conjugirte Flächen* in Bezug auf die abstumpfende bezeichnen.

Hr. G. vom Rath hat unter den 33 Flächen des *Anorthits* dreizehn Zonen von je fünf bis acht Flächen aufgefunden. Diese, sowie auch die übrigen vier- und dreiflächigen Zonen lassen sich in Gruppen ordnen, je nach den Flächen, in welchen sich mehrere derselben schneiden. Solche Durchschnittsflächen von *Zonengruppen* sind

1. Die drei Hexaëdrflächen $100 = h$, $010 = M$, $001 = P$,
2. die beiden Dodekaëdrfläche $110 = l$ und $1\bar{1}0 = T$,
3. die vier Oктаëdrflächen $\bar{1}\bar{1}1 = o$, $\bar{1}11 = p$, $1\bar{1}1 = a$, $111 = n$.

Die Fläche, welche allen Zonen einer Gruppe gemeinsam ist, möge die *Polfläche der Zonengruppe* heißen und nach ihr möge auch die Gruppe benannt werden, so daß z. B. alle die Zonen, welche sich in der Hexaëdrfläche $100 = h$ schneiden, die *Gruppe h* bilden.

Betrachten wir nun zunächst die drei Gruppen h , M , P , so finden wir, daß die Polfläche in jeder der einzelnen Zonen eine der Kernflächen ist. Die zweiten Kernflächen der Zonen einer Gruppe bilden zusammen wieder eine Zone und zwar bilden die zweiten Kernflächen der Gruppe h die Zone MP , die der Gruppe M die Zone Ph und die der Gruppe P die Zone hM . Die von den zweiten Kernflächen einer Gruppe gebildete Zone möge der *Gürtel* der Gruppe heißen. In diesem *Gürtel* unterscheiden sich nun wieder Kernflächen, erste, zweite . . . krystallonomische Abstumpfungen (Flächen I, II, III . . .) und je nach dem Range dieser Flächen können wir auch den durch sie hin-

durchgehenden Zonen der Gruppe ihren Rang *A, B, C...* anweisen. Die folgende Tabelle stellt in dieser Weise die vervollständigte *h*-Gruppe des Anorthites dar.

Tabelle I.

	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
I	$\bar{1}00 h'$	$\bar{1}00 h'$ $\bar{4}21 d$	$\bar{1}00 h'$	$\bar{1}00 h'$	$\bar{1}00 h'$	$\bar{1}00 h'$	$\bar{1}00 h'$	$\bar{1}00 h'$ $\bar{4}21 \mu$	$\bar{1}00 h'$
III	$\bar{2}\bar{1}0$	$\bar{2}\bar{2}1 u$	$\bar{2}\bar{1}1$	$\bar{2}\bar{1}2$	$\bar{2}01 y$	$\bar{2}\bar{1}2$	$\bar{2}\bar{1}1$	$\bar{2}\bar{2}1 g$	$\bar{2}\bar{1}0$
II	$\bar{1}\bar{1}0 t'$	$\bar{1}\bar{2}1$	$\bar{1}\bar{1}1 o$	$\bar{1}\bar{1}2 \alpha$	$\bar{1}01 x$ $\bar{2}03 q$	$\bar{1}\bar{1}2$	$\bar{1}\bar{1}1 p$	$\bar{1}\bar{2}1$	$\bar{1}\bar{1}0 T'$
III	$\bar{1}\bar{2}0$ $\bar{1}\bar{3}0 f'$	$\bar{1}\bar{4}2$	$\bar{1}\bar{2}2$	$\bar{1}\bar{2}4$	$\bar{1}02$	$\bar{1}\bar{2}4$	$\bar{1}\bar{2}2$	$\bar{1}\bar{4}2$	$\bar{1}\bar{2}0$ $\bar{1}\bar{3}0 z'$
I	$0\bar{1}0 M'$ $\bar{1}\bar{3}0 z$	$0\bar{2}1 n$	$0\bar{1}1$	$0\bar{1}2$	$001 P$	012	011	$021 e$	$010 M$ $\bar{1}\bar{3}0 f$
III	$\bar{1}\bar{2}0$	$\bar{1}\bar{4}2$	$\bar{1}\bar{2}2$	$\bar{1}\bar{2}4$	102	124	122	142	120
II	$\bar{1}\bar{1}0 T$	$\bar{1}\bar{2}1$	$\bar{1}\bar{1}1 a$	$\bar{1}\bar{1}2$	101	112	$111 m$	121	$110 l$
III	$\bar{2}\bar{1}0$	$\bar{2}\bar{2}1$	$\bar{2}\bar{1}1$	$\bar{2}\bar{1}2$	$\bar{2}01 t$	$\bar{2}\bar{1}2$	$\bar{2}\bar{1}1$	$\bar{2}\bar{2}1$	$\bar{2}\bar{1}0$
I	$100 h$	$100 h$	$100 h$	$100 h$	$100 h$	$100 h$	$100 h$	$100 h$	$100 h$

Diese Tafel enthält in ihren vertikalen Columnen die Symbole der vervollständigten Zonen der Gruppe *h*. Die oberste und unterste wagerechte Zeile enthalten das Symbol der gemeinsamen Kernfläche *h', h*, die mittelste mit I bezeichnete Zeile aber der Reihe nach die zweiten, in den einzelnen Zonen zu *h* gehörigen Kernflächen. Um die Tabelle zu construiren, füllt man zuerst diese mittelste Zeile

aus, indem man in der Mitte zwischen die Kernflächen M' , P , M die ersten Abstumpfungen, dann zwischen diese und die Kernflächen die zweiten Abstumpfungen setzt. In derselben Weise werden dann die Zonen von oben und unten vervollständigt: Die II-Flächen finden sich durch Addition der darüber und darunter stehenden Symbole der I-Flächen und die III-Flächen ebenso aus den darüber und darunter stehenden Symbolen der I- und II-Flächen. Die am Anorthit in dieser Gruppe vorkommenden IV-Flächen f , z , q , sind auf die Linien gesetzt, welche die Fächer der I-, II-, III-Flächen trennen, und die beiden V-Flächen d , μ in die Fächer der ihnen zunächst liegenden Flächen mit hineingesetzt.

Die beiden folgenden Tabellen stellen in derselben Weise die Gruppen M und P mit den Gürtelzonen Ph und hM dar. Doch sind der besseren Uebersicht wegen die Symbole der am Anorthit nicht vorkommenden Flächen weggelassen.

Tabelle II.

	A	C	B		A		B	C	A
I	010M'	010M' 241w	010M'		010M' 061r		010M'	010M' 241β	010M'
	130z'		131(π)						130f
III		221g			021e				
II	110T'		111p				111m		110l
					013γ				
I	100k'	201y	101x		001P 013k			201z	100h
II	110l'		111o				111α		110T
III		221u			021n				
	130f'		131π						130z
I	010M'	241v 010M'	010M'		061c 010M'		010M'	241b 010M'	010M'

In diesen beiden Tabellen deuten die doppelten Striche, welche die Fächer für M von den nächsten oberen und unteren trennen, an, daß $061 = r$ und $0\bar{6}1 = c$ sechste Abstumpfungen (VII-Flächen) sind. Ueber die Symbole $\bar{1}31 = (\pi)$ und $1\bar{1}\bar{2} = (\alpha')$ wird weiter unten Auskunft gegeben werden.

Es wird sich nun zeigen, daß die drei bis zu den zweiten Abstumpfungen vervollständigten Zonengruppen der drei Hexaëdflächen *in ihrer Vereinigung* ein Netz bilden, welches als das allgemeine Schema für alle trimetrischen Krystalle angesehen werden kann und welches alle übrigen Zonen als secundäre in sich schließt.

Dies erkennen wir durch eine Construction auf einer *Kugelfläche*.

Da nämlich die Zonen nach der dargestellten Methode sich aus den Miller'schen *Symbolen* allein entwickeln lassen, und diese von den Verhältnissen und den Winkeln der Axen unabhängig sind, so müssen die Zonen, die an irgend einem Krystalle eines klineödrischen Systems vorkommen, sich mit denselben Symbolen auch im Tesseral-systeme verfolgen lassen. Denken wir uns einen Krystall, an dem sämtliche Flächen der bis zu den zweiten Abstumpfungen vervollständigten Zonengruppen der Hexaëdflächen gleichmäßig ausgebildet wären, so würden dieselben im triklinen Systeme als Facetten auf der Oberfläche eines Ellipsoides mit schiefwinkligen ungleichen Axen erscheinen. Im Tesseral-systeme aber würden die mit denselben Symbolen bezeichneten Flächen in derselben Folge der Zonen und Zonengruppen auf der Oberfläche einer Kugel erscheinen und die vom Centrum auf die Flächen gefällten Lothe deren Mittelpunkte treffen. Was also aus den Symbolen allein hergeleitet werden kann, läßt sich vom tesseralen System auf jedes klineödrische übertragen und umgekehrt und man kann daher die Zonen und Zonengruppen aller trimetrischen Krystalle an Constructionen auf der Kugelfläche studiren. Wir wollen die Verzeichnung der Zonen irgend eines klineödrischen Krystalles auf

der Kugelfläche seine *Reduction auf das Tesseralssystem* nennen.

Man verzeichne auf einer Kugelfläche (s. Fig. 1, Taf. IV) drei größte Kreise, die sich unter rechten Winkeln schneiden, und bezeichne ihre Durchschnittspunkte mit den Symbolen der Hexaëderflächen: 100 , 010 , 001 , $\bar{1}00$, $0\bar{1}0$, $00\bar{1}$; man halbire deren rechte Winkel durch sechs andere größte Kreise. Die Durchschnittspunkte derselben mit den drei ersten bekommen die (durch Addiren der gleichstelligen Indexe der je zwei benachbarten jener ersten sechs Symbole zu findenden) Symbole der bezüglichen Dodekaëderflächen: 110 , 011 , $\bar{1}01$ usw. Die Durchschnittspunkte je dreier dieser letzteren sechs Kreise werden mit den Symbolen der Oktaëderflächen 111 , $\bar{1}\bar{1}1$, $1\bar{1}\bar{1}$ usw. signirt. Dann nehme man mit jedem Quadranten der drei ersten Kreise die folgende Construction vor.

Man verbinde jeden der beiden Halbierungspunkte D , E (Fig. 2, Taf. IV) der beiden Radien mit dem Endpunkte B , A des je anderen Radius und ziehe die beiden auf dieser Verbindungslinie senkrechten Radien. Die Endpunkte dieser Radien signire man mit den Symbolen der Tetrakis-Hexaëder, welche sich aus der Summirung der je zwei benachbarten Symbole (Hexaëder- und Dodekaëderflächen) ergeben. Legt man nun durch diese Punkte und die Durchschnittspunkte der ersten drei Kreise wieder größte Kreise, so überzieht man die Kugelfläche mit einem Netze, dessen Knotenpunkte die Stellen angeben, wo die Flächen eines Idealkrystalles, dessen Hexaëdergruppen bis zu den zweiten Abstumpfungen gleichmäfsig ausgebildet wären, die Kugel berühren würden.

Fig. 1, Taf. IV ist die Projection eines solchen Halbkugelnetzes auf die Ebene eines der drei ersten Kreise, speciell auf den Zonenkreis der Hexaëderflächen 100 , 010 . Die Signirung der Knotenpunkte durch die bezüglichen Symbole geschieht nach demselben mechanischen Verfahren, welches soeben für die drei Tabellen beschrieben ist,

indem für die Gruppe jeder Hexaëderfläche die Zone der beiden anderen der Gürtel ist. Die in Fig. 1, Taf. IV den Symbolen beigesetzten Buchstaben geben die krystallographische Bedeutung der bezüglichen Flächen an:

<i>h</i>	bedeutet:	Hexaëder,
<i>d</i>	„	Dodekaëder,
<i>o</i>	„	Oktaëder,
<i>t</i>	„	Tetrakishexaëder,
<i>i</i>	„	Ikositetraëder,
<i>tr</i>	„	Triakisoktaëder,
<i>ho</i>	„	Hexakisoktaëder.

Für die Fälle, in denen dieser Mechanismus in Zweifel läßt (z. B. für die Durchschnittspunkte nur *zweier* Zonen des Netzes), kann man folgende drei Regeln benutzen:

1. Wenn zwei Flächen $(\mu\nu\rho)$, $(\mu'\nu'\rho')$ (im tesserale System) senkrecht aufeinander stehen, ihre Pole auf der Kugelfläche also um 90° von einander entfernt sind, so ist $\mu\mu' + \nu\nu' + \rho\rho' = 0$. Dies ergibt sich aus der unten wiedergegebenen Formel (20) für den Winkel zweier Flächen, wenn man darin $a = b = c$, $\alpha = \beta = \gamma = 0$, $\cos(e'e'') = 0$ setzt.

2. Um das Symbol $(\mu_1\nu_1\rho_1)$ des Poles der Zone zu finden, welche durch die beiden Flächen $(\mu\nu\rho)$, $(\mu'\nu'\rho')$ bestimmt ist, hat man nach 1):

$$\mu\mu_1 + \nu\nu_1 + \rho\rho_1 = 0 \text{ und } \mu'\mu_1 + \nu'\nu_1 + \rho'\rho_1 = 0,$$

woraus folgt:

$$\mu_1 : \nu_1 : \rho_1 = \nu\rho' - \nu'\rho : \rho\mu' - \rho'\mu : \mu\nu' - \mu'\nu.$$

3. Um das Symbol (mnr) der Fläche zu finden, in welcher die beiden Zonen sich schneiden, deren eine durch die Flächen $(\mu\nu\rho)$, $(\mu'\nu'\rho')$, die andere durch die Flächen $(\mu''\nu''\rho'')$, $(\mu'''\nu'''\rho''')$ bestimmt ist, suche man zunächst die Symbole $(\mu_1\nu_1\rho_1)$ und $(\mu_2\nu_2\rho_2)$ der Pole dieser Zonen. Es ist nach 2):

$$\begin{aligned} \mu_1 : \nu_1 : \rho_1 &= \nu\rho' - \nu'\rho : \rho\mu' - \rho'\mu : \mu\nu' - \mu'\nu \\ \mu_2 : \nu_2 : \rho_2 &= \nu''\rho''' - \nu''' \rho'' : \rho''\mu''' - \rho''' \mu'' : \mu''\nu''' - \mu''' \nu''. \end{aligned}$$

Dann suche man wieder den Pol der Zone $(\mu_1 \nu_1 \rho_1)$, $(\mu_2 \nu_2 \rho_2)$ nämlich:

$$m : n : r = \nu_1 \rho_2 - \nu_2 \rho_1 : \rho_1 \mu_2 - \rho_2 \mu_1 : \eta_1 \nu_2 - \mu_2 \nu_1.$$

Das Symbol des Durchschnittes der beiden Zonen ist dann (mnr) .

Das in der beschriebenen Weise construirte Kugelnetz scheint nun ein allgemeines Schema für alle Krystalle der trimetrischen Systeme zu seyn, in welchem man jeder Fläche jedes (resp. reducirten) Krystalles ihre relative Stelle entweder in den Knotenpunkten oder auf den dieselben verbindenden Bogen mit Leichtigkeit bestimmen und die dadurch sich bildenden Zonen und Zonengruppen übersehen kann.

Fig. 3, Taf. IV stellt die Vertheilung der Flächen des Anorthites dar, wobei der Krystall in derselben Lage gedacht ist, wie in der schematischen Fig. 23, in der Abhandlung des Hrn. G. vom Rath.

Da die Projection einer Kugelfläche auf einen ihrer größten Kreise es mit sich bringt, daß die gegen die Peripherie hin gelegenen Punkte sich in einer die Uebersicht störenden Weise zusammendrängen, so kann man sich leicht in dasselbe Schema die Flächenstellen so einzeichnen, wie sie bei einer anderen Lage des Krystalles erscheinen. Fig. 4, Taf. IV stellt sie in der relativen Lage dar, wie sie erscheinen, wenn der Krystall aus der vorigen Lage um die Axe hh' so gedreht wird, daß $M\ 0\ 1\ 0$ oben, und $P\ 0\ 0\ 1$ links liegt; Fig. 5, Taf. IV, wenn der Krystall aus der ursprünglichen Lage um die Axe MM' so gedreht wird, daß $h\ 1\ 0\ 0$ oben, P und P' nach hinten und vorn liegen.

Die Figg. 3 und 5 Taf. IV lassen eine auffallende Symmetrie in der Lagerung der Flächen in Beziehung auf die Zone hPh' erkennen. Sie würde vollständig seyn, wenn noch zwei Flächen vorhanden wären, nämlich $\bar{1}\ 1\ 2$ zwischen P und p als symmetrische Gegenfläche von $\bar{1}\ \bar{1}\ 2 = \alpha$ und $\bar{1}\ 3\ 1$ zwischen M und p als Gegenfläche von $\bar{1}\ \bar{3}\ 1 = \pi$.

Hr. G. vom Rath berichtet in seiner Abhandlung S. 24, daß auch die Fläche $\beta = 241$ von Hrn. von Kokscharow an finnischen Krystallen entdeckt worden ist, als sie an vesuvischen noch nicht beobachtet war. Wenn sie noch heute fehlte, so würde sie als symmetrische Gegenfläche von $b = 2\bar{4}1$ eben so vermißt werden, wie jene beiden $\bar{1}12$ und $\bar{1}31$. Es ist daher nicht ganz unwahrscheinlich, daß auch diese einmal an noch aufzufindenden Krystallen sich vorfinden werden. Ohne der Eventualität dieser Beobachtungen durch Speculation vorgreifen zu wollen, werden wir im Folgenden (der bequemerem Darstellung wegen) diese beiden problematischen Flächen oder vielmehr ihre Stellen, mit den eingeklammerten Buchstaben $(\alpha) = \bar{1}12$ und $(\pi) = \bar{1}31$ bezeichnen.

Bei aufmerksamer Betrachtung des Schemas Fig. 1 der drei Zonengruppen, deren Polflächen die Hexaëdrflächen sind, finden wir nun darin noch andere Zonen und Zonengruppen, die am Anorthit und anderen Krystallen zum Theil entwickelt sind, zum Theil nicht. Wir wollen diese als *secundäre* Zonen und Zonengruppen bezeichnen.

So fallen am Anorthit zunächst die beiden stark entwickelten Gruppen der beiden Dodekaëdrflächen $110 = l$ mit dem Gürtel PT und $1\bar{1}0 = T$ mit dem Gürtel IP ins Auge, deren Darstellung wir in den beiden Tabellen IV und V folgen lassen:

Tabelle IV.

	<i>A</i>		<i>B</i>		<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
I	$\bar{1}\bar{1}0l'$		$\bar{1}\bar{1}0l'$		$\bar{1}\bar{1}0l'$		$\bar{1}\bar{1}0l'$	$\bar{1}\bar{1}0l'$	$\bar{1}\bar{1}0l'$
			$\bar{2}\bar{4}1v$				$\bar{4}\bar{2}1d$		
III			$\bar{1}\bar{3}1\pi$		$\bar{2}\bar{2}1u$				
	$\bar{1}\bar{3}0f'$								
II	$0\bar{1}0M'$		$0\bar{2}1n$		$\bar{1}\bar{1}1o$		$\bar{2}01y$		$\bar{1}00h'$
	$\bar{1}\bar{3}0z'$				$\bar{1}\bar{1}2\alpha$				
							$\bar{4}23s$		
I	$\bar{1}\bar{1}0T$		$\bar{1}\bar{1}1a$		$001P$	$\bar{1}\bar{1}2(\alpha)$	$\bar{1}\bar{1}1p$	$\bar{2}21g$	$\bar{1}\bar{1}0T''$
									$\bar{1}\bar{3}0z$
II	$100h$		$201t$		$111m$		$021e$	$\bar{1}\bar{3}1(\tau)$	$010M$
									$\bar{1}30f$
							241β		
I	$110l$		$110l$		$110l$		$110l$	$110l$	$110l$

Tabelle V.

	A	C	B		A		B		A
I	$\bar{1}10T'$	$\bar{1}10T'$	$\bar{1}10T'$		$\bar{1}10T'$		$\bar{1}10T'$		$\bar{1}10T'$
			$\bar{4}21\mu$				$\bar{2}41w$		
III					$\bar{2}21g$		$\bar{1}31(\pi)$		
									$\bar{1}30z'$
II	$\bar{1}00h'$		$\bar{2}01y$		$\bar{1}11p$		$021e$		$010M$
									$130f$
					$\bar{1}12(\alpha)$				
			$\bar{4}23i$						
I	$\bar{1}\bar{1}0l'$	$\bar{2}\bar{2}1u$	$\bar{1}\bar{1}1o$	$\bar{1}\bar{1}2\alpha$	$001P$		$111m$		$110l$
	$\bar{1}30f'$								
II	$0\bar{1}0M'$	$\bar{1}\bar{3}1\pi$	$0\bar{2}1n$		$1\bar{1}1a$		$201t$		$100h$
	$\bar{1}30z$								
			$2\bar{4}1b$						
I	$1\bar{1}0T$	$1\bar{1}0T$	$1\bar{1}0T$		$1\bar{1}0T$		$1\bar{1}0T$		$1\bar{1}0T$

Diesen beiden Zonengruppen, deren Polflächen Dodekaëdflächen sind, würden nun noch zwei Paare von Gruppen entsprechen, nämlich

1. Die Gruppe x mit dem Gürtel $101 - M$
2. die Gruppe 101 mit dem Gürtel $x - M$
3. die Gruppe $\bar{0}11$ mit dem Gürtel $011 - h$
4. die Gruppe 011 mit dem Gürtel $0\bar{1}1 - h$

Diese vier Gruppen sind aber am Anorthit nicht entwickelt. Die wenigen ihnen angehörigen Zonen sind schon in den anderen Gruppen enthalten.

Außer diesen beiden Gruppen treten als secundäre die Gruppen der vier Oktaëdflächen o, p, a, m hervor.

Betrachten wir zunächst *eine* von diesen, z. B. die Gruppe $p = \bar{1}11$. Sie umfaßt die Zonen

$$psydl'\beta'e'p', \quad piv'r'p', \quad pxo\pi M'p', \quad pqanxwp', \\ p(\alpha)PaTg'p', \quad pmhp'.$$

Ihr Gürtel (d. h. die Zone der im reducirten Krystall gegen p senkrecht stehenden Flächen) würde nach Analogie der vorigen Gruppen seyn die Zone:

$$\begin{array}{cccccccc} \text{I} & \text{III} & \text{II} & \text{III} & \text{I} & \text{III} & \text{II} & \text{III} & \text{I} \\ l' & \bar{1}\bar{2}1 & 0\bar{1}1 & 1\bar{2}3 & 1\bar{1}2 & 2\bar{1}3 & 101 & 211 & l. \end{array}$$

Von dieser Zone ist aber außer l keine Fläche am Anorthit vorhanden und außerdem steht dieselbe in keiner Weise mit der p -Gruppe in der Beziehung, welche bei den bisher betrachteten fünf Gruppen augenscheinlich zwischen den Einzelzonen und dem Gürtel besteht, daß nämlich *beide sich gegenseitig bedingen*. In dieser Beziehung stehen vielmehr die Zonen der p -Gruppe mit der Zone $l'v\pi natl$, welche, obgleich ihre Flächen auch vom reducirten Krystalle nicht zu der Fläche p senkrecht stehen, den Gürtel der Zone p bildet. Demnach wäre die Gruppe p so darzustellen, wie die folgende Tabelle zeigt:

	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
I	$\bar{1}11p$	$\bar{1}11p$	$\bar{1}11p$	$\bar{1}11p$	$\bar{1}11p$	$\bar{1}11p$	$\bar{1}11p$	$\bar{1}11p$
	$\bar{4}23s$							
		$\bar{4}23i$	$\bar{1}01x$	$\bar{2}03q$	$\bar{1}12(\alpha)$			
II	$\bar{2}01y$		$\bar{1}\bar{1}1o$	$\bar{1}\bar{1}2\alpha$	$001P$		$111m$	$021e$
	$\bar{4}\bar{2}1d$							241β
I	$\bar{1}\bar{1}0l'$	$\bar{2}41v$	$\bar{1}\bar{3}1\pi$	$0\bar{2}1n$	$\bar{1}\bar{1}1a$	$201t$	311	$110l$
	$\bar{2}4\bar{1}\beta$							$42\bar{1}d'$
II	$0\bar{2}\bar{1}e'$		$0\bar{1}0M'$	$\bar{1}\bar{3}0z$	$\bar{1}\bar{1}0T$		$100h$	$20\bar{1}y'$
		$0\bar{6}\bar{1}r'$		$24\bar{1}w'$	$2\bar{2}\bar{1}g'$			
								$4\bar{2}\bar{3}s'$
I	$1\bar{1}\bar{1}p'$	$1\bar{1}\bar{1}p'$	$1\bar{1}\bar{1}p'$	$1\bar{1}\bar{1}p'$	$1\bar{1}\bar{1}p'$	$1\bar{1}\bar{1}p'$	$1\bar{1}\bar{1}p'$	$1\bar{1}\bar{1}p'$

In dieser Tabelle bemerken wir aber, daß die beiden *C*-Zonen nicht hinein gehören, da die an Stelle der Kernflächen stehenden Flächen nicht die Kanten der je zwei von ihnen gleich weit abstehenden Flächen krystallonomisch abstumpfen. In der That haben wir auch schon oben erkannt, daß für die Zone $p\pi$ nicht die Flächen p und π , sondern M und x und für die Zone p , 311 nicht p und 311 , sondern h und 011 die Kernflächen sind,

Tabelle VIII.

	A	D	B	C	D	A	B	D	A
I	$\bar{1}\bar{1}\bar{1}a'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1}a'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1}a'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1}a'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1}a'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1}a'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1}a'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1}a'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1}a'$
III		.						$06\bar{1}c'$	
II	$\bar{2}0\bar{1}t'$			$\bar{4}21\mu$		$\bar{1}10T'$	$\bar{1}30z'$		$02\bar{1}n'$
III						$\bar{2}21g$			$13\bar{1}\pi'$ $24\bar{1}v'$
I	$\bar{1}\bar{1}0t'$	$\bar{4}21d$	$\bar{2}01y$	$\bar{3}12$	$\bar{4}23s$	$\bar{1}11p$	$021e$	241β	$110l$
	$\bar{2}4\bar{1}v$								
III	$\bar{1}\bar{3}1\pi$								
II	$0\bar{2}1n$		$\bar{1}\bar{1}2a$	$\bar{2}03q$		$001P$			$201t$
I	$1\bar{1}\bar{1}a$	$1\bar{1}\bar{1}a$	$1\bar{1}\bar{1}a$	$1\bar{1}\bar{1}a$	$1\bar{1}\bar{1}a$	$1\bar{1}\bar{1}a$	$111a$	$1\bar{1}\bar{1}a$	$1\bar{1}\bar{1}a$

Bei dem Ueberblick über die neun am Anorthit ausgebildeten Zonengruppen bestätigt sich die schon oben ausgesprochene Bemerkung, daß die Zonenentwicklung durch krystallonomische Abstumpfungen nicht über die *zweiten* Abstumpfungen (III-Flächen) der Kanten der Kern-

Tabelle IX.

	A	D	B	A	D	C	B	D	A
I	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m'$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m'$
III		$0\bar{6}\bar{1} r'$							
II	$0\bar{2}\bar{1} e'$		$\bar{1}\bar{3}0 f'$	$\bar{1}\bar{1}0 t'$		$\bar{4}\bar{2}1 d$			$\bar{2}0\bar{1} t'$
III	$\bar{1}\bar{3}1(\pi)$			$\bar{2}\bar{2}1 u$					
	$\bar{2}\bar{4}\bar{1} w'$								
I	$\bar{1}\bar{1}0 T$	$\bar{2}\bar{4}1 b$	$0\bar{2}\bar{1} n$	$\bar{1}\bar{1}1 o$	$\bar{4}\bar{2}3 i$	$\bar{3}\bar{1}2$	$\bar{2}01 y$	$\bar{4}21 \mu$	$\bar{1}\bar{1}0 T'$
III									$\bar{2}\bar{4}1 w'$
									$\bar{1}\bar{3}1(\pi)$
II	$\bar{2}01 t$			$001 P$		$\bar{2}03 q$	$\bar{1}\bar{1}2(\alpha)$		$021 e$
I	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m$	$\bar{1}\bar{1}\bar{1} m$

flächen hinausgeht. Es findet sich nämlich keine höhere Abstumpfung (IV — VII-Fläche) in einer Zone, die nicht in irgend einer andern entwickelten Zone als zweite, erste Abstumpfung oder Kernfläche aufträte und dadurch gewissermaßen motiviert erschiene. Um dies nachzuweisen,

wollen wir uns der folgenden Abkürzung in der Schreibweise bedienen: Der Ausdruck „ d ist hCV “ bedeute: Die Fläche d ist in der Zonengruppe h in einer C -Zone eine vierte Abstumpfung usw.

$\bar{4}\bar{2}1d$ ist hCV , $lBIV$, $pAIV$ und zugleich $PCIII$, $mCII$

$\bar{4}21\mu$ ist hCV , $TBIV$, $oAIV$ und zugleich $PCIII$, $aCII$

$\bar{4}\bar{2}3i$ ist $PCIV$, $oAIV$, und zugleich $pDIII$, mDI

$\bar{4}23s$ ist $PCIV$, $pAIV$ und zugleich $oDIII$, aDI

$\bar{2}03q$ ist $hAIV$, $PAIV$ und zugleich $oBIII$, $pBIII$, $aCII$, $mCII$

$\bar{2}\bar{4}1v$ ist MCV , $aAIV$ und zugleich $PCIII$, $oBIII$, pDI

$241w$ ist MCV , $mAIV$ und zugleich $PCIII$, $pBIII$, oDI

$130f$ ist $hAIV$ ($MAIV$) und zugleich $oBII$, $mBII$

$1\bar{3}0z$ ist $hAIV$ ($MAIV$) und zugleich $pBII$, $aBII$

$\bar{1}\bar{3}1\pi$ ist $MBIV$ und zugleich $lBIII$, $TCII$, $aAIII$, $pDIII$

$\bar{1}31(\pi)$ ist $MBIV$ und zugleich $TBIII$, $lCII$, $mAIII$, $pDIII$

$2\bar{4}1b$ ist MCV , $TBIV$, $oAIV$ und zugleich $PCIII$, mDI

241β ist MCV , $lBIV$, $pAIV$ und zugleich $PCIII$, aDI

$061r$ ist $MAVII$ und zugleich $pDIII$, $mDIII$

$0\bar{6}1c$ ist $MAVII$ und zugleich $oDIII$, $aDIII$

Nur die beiden Flächen k und γ entziehen sich dieser Regel, ohne ihr doch direct zu widersprechen, da man sie als zwei Flächen ansehen kann, welche in der Gruppe h für sich zwei D -Zonen constituiren, in welchen sie dann Kernflächen (I) sind. In den Gruppen der Oktaëdflächen haben wir ja mehrere Flächen als für sich Zonen constituirend anzuerkennen. Uebrigens nehmen die Flächen k und γ auch sonst eine Ausnahmestellung ein, da Hr. G. vom Rath von ihnen S. 27 sagt, „dafs k vorläufig nur auf der linken, γ nur auf der rechten Seite bekannt ist“.

Dafs nun das beschriebene Kugelnetz, dessen Projection durch die Figg. 1, 3, 4, 5, Taf. IV dargestellt ist, nicht allein für den Anorthit, sondern wahrscheinlich für

alle auf das reguläre System reducirten trimetrischen Krystalle ein Schema ist, davon kann man sich leicht überzeugen, indem man für die Flächen beliebiger Krystalle die Miller'schen Symbole nach dem Princip der krystallonomischen Abstumpfungen in dasselbe einträgt. Als Beispiel möge Fig. 6, Taf. IV dienen, in welcher die im Miller-Grailich'schen Lehrbuche für den *Axinit* entworfene Fig. 101 auf unser Schema übertragen ist.

Die geometrische Betrachtung, welche den Begriff der krystallonomischen Abstumpfung vermittelt, knüpft sich an die Resultate des Aufsatzes: „Krystallometrische Formeln“ von G. Junghann, welcher in der „Zeitschrift für Mathematik und Physik“ herausgegeben von A. Schlömilch etc. XVII, 6 erschienen ist¹⁾. Sie ist eine erst nach dem Erscheinen jener „Formeln“ aufgefundene Ergänzung derselben und die hier folgende Darstellung setzt die dort mitgetheilten Resultate, auf welche sie sich stützt, voraus.

Sind auf den drei (rechtwinkligen oder schiefwinkligen) Axen einer Krystallgestalt $OA = p_1$, $OB = p_2$, $OC = p_3$, die Längen der drei Grundparameter und bezeichnet man die *Parameterdreiecke*

$\frac{1}{2}p_2p_3 \sin(p_2p_3) = a$, $\frac{1}{2}p_3p_1 \sin(p_3p_1) = b$, $\frac{1}{2}p_1p_2 \sin(p_1p_2) = c$
und das *Schlussdreieck*

$$ABC = d,$$

ferner die Cosinus der Flächenwinkel, unter welchen die Parameterdreiecke gegen einander geneigt sind:

$$\cos(bc) = \alpha, \cos(ca) = \beta, \cos(ab) = \gamma,$$

so ist nach „Krystallometrische Formeln“ (10):

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2bca - 2ca\beta - 2ab\gamma.$$

Sind ferner auf denselben Axen OA' , OB' , OC' die Parameter einer besonderen Fläche $A'B'C'$, und haben a' , b' , c' , d' für dieselben die entsprechenden Bedeutungen, so ist

$$d'^2 = a'^2 + b'^2 + c'^2 - 2b'c'\alpha - 2c'a'\beta - 2a'b'\gamma.$$

1) Die zu den „Krystallometrischen Formeln“ gehörige Figurentafel ist durch irgend ein Versehen erst dem folgenden Hefte XVIII, 1 der „Zeitschrift etc.“ beigefügt.

Bekanntlich sind nun für jede Krystallfläche die Verhältnisse $0A:0A'$, $0B:0B'$, $0C:0C'$ rationale. Nach der Miller'schen Bezeichnungsweise einer Fläche durch das Symbol $(\mu\nu\rho)$, worin μ , ν , ρ positive oder negative ganze Zahlen bedeuten, hat man sich zu denken

$$0A' = \frac{1}{\mu} 0A, \quad 0B' = \frac{1}{\nu} 0B, \quad 0C' = \frac{1}{\rho} 0C$$

und jede mit dem Schlufsdreieck $A'B'C'$ parallele Fläche wird durch das Symbol $(\mu\nu\rho)$ bezeichnet. Für dieses Schlufsdreieck $A'B'C'$ hat man nun

$$a' = \frac{a}{\nu\rho}, \quad b' = \frac{b}{\mu\rho}, \quad c' = \frac{c}{\mu\nu},$$

und der Flächeninhalt desselben ist daher

$$d' = \frac{1}{\mu\nu\rho} \sqrt{(\mu^2 a^2 + \nu^2 b^2 + \rho^2 c^2 - 2\nu\rho b c \alpha - 2\rho\mu c a \beta - 2\mu\nu a b \gamma)}.$$

Offenbar stellt nun auch die mit $e' = \mu\nu\rho d'$ bezeichnete Wurzelgröße den Flächeninhalt eines mit $A'B'C'$ parallelen Schlufsdreiecks dar, dessen Parameter $\frac{p_1}{\mu} \sqrt{\mu\nu\rho}$, $\frac{p_2}{\nu} \sqrt{\mu\nu\rho}$, $\frac{p_3}{\rho} \sqrt{\mu\nu\rho}$ sind, und dessen Symbol also

$$\left(\sqrt{\frac{\mu}{\mu\nu\rho}} \sqrt{\frac{\nu}{\mu\nu\rho}} \sqrt{\frac{\rho}{\mu\nu\rho}} \right),$$

also auch $(\mu\nu\rho)$ ist.

Es ist nun ferner in „Krystallometrische Formeln (20)“ gezeigt, daß der Winkel zweier Flächen, deren Symbole $(\mu'\nu'\rho')$, $(\mu''\nu''\rho'')$ sind, ausgedrückt wird durch die Gleichung:

$$-e'e'' \cos(e'e'') = \mu'\mu'' a^2 + \nu'\nu'' b^2 + \rho'\rho'' c^2 - (\nu'\rho'' + \nu''\rho') b c \alpha - (\rho'\mu'' + \rho''\mu') c a \beta - (\mu'\nu'' + \mu''\nu') a b \gamma \quad (20).$$

Addiren wir diese Gleichung verdoppelt zu

$$\begin{aligned} e'^2 &= \mu'^2 a^2 + \nu'^2 b^2 + \rho'^2 c^2 - 2\nu'\rho' b c \alpha - 2\rho'\mu' c a \beta \\ &\quad - 2\mu'\nu' a b \gamma \\ e''^2 &= \mu''^2 a^2 + \nu''^2 b^2 + \rho''^2 c^2 - 2\nu''\rho'' b c \alpha - 2\rho''\mu'' c a \beta \\ &\quad - 2\mu''\nu'' a b \gamma, \end{aligned}$$

so ergibt sich durch leichte Reduction

$$\begin{aligned} e'^2 + e''^2 - 2e'e'' \cos(e'e'') &= (\mu' + \mu'')^2 a^2 + (\nu' + \nu'')^2 b^2 \\ &\quad + (\varrho' + \varrho'')^2 c^2 - 2(\nu' + \nu'')(\varrho' + \varrho'') b c \alpha \\ &\quad - 2(\varrho' + \varrho'')(\mu' + \mu'') c a \beta - 2(\mu' + \mu'')(\nu' + \nu'') a b \gamma. \end{aligned}$$

Es sey $e'^2 + e''^2 - 2e'e'' \cos(e'e'') = e'''^2$; dann ist $2e''$ in dem dreiseitigen Prisma, welches durch die Parallelogramme $2e'$ und $2e''$ und ihren Flächenwinkel $(e'e'')$ bestimmt wird, das dritte Seitenparallelogramm, liegt also in der Zone $e'e''$, und ist die Fläche, welche in dem vorstehenden Aufsatze als die *krystallonomische Abstumpfung* der Kante der Flächen e' , e'' bezeichnet worden ist. Ihr Symbol ist nach dem Obigen: $(\mu' + \mu'', \nu' + \nu'', \varrho' + \varrho'')$.

Anmerkung. Der Verfasser des vorstehenden Aufsatzes bekennt sich als Laien in der Krystallographie. Er hat sich nur aus Lehrbüchern (Naumann, Miller) mit den Hauptaufgaben der Krystallographie bekannt gemacht, um den Krystallographen die Hülfsmittel nachweisen zu können, die für sie in der von ihm entwickelten „Tetraëdrometrie“ zu liegen schienen. In diesem Sinne sind sowohl die oben citirten „Krystallogometrischen Formeln“, als der vorliegende Aufsatz aufzufassen.

IV. Ueber den Widerstand der Luft gegen Planscheiben, die in normaler Richtung gegen ihre Ebenen bewegt werden; von G. Hagen.

Der Apparat, mit dem die Beobachtungen angestellt wurden, bestand in zwei auf einer vertikalen Axe ruhenden dünnen Flügeln. Auf die Axe war eine cylindrisch abgedrehte Spindel aus Elfenbein gekittet, um welche zwei