L'image de Mars.

Par V. Cerulli.

Depuis dix ans que j'étudie Mars, je me suis convaincu que l'aréographie intéresse l'optique physiologique tout autant que l'astronomie et fournit à ces deux sciences un champ commun de travail. Mars va nous revenir bientôt. Il conviendrait que, lors de sa prochaine réapparition, physiologistes et astronomes s'unissent pour l'étudier. Ils pourraient le faire un peu de partout, même avec des moyens modestes. Ce serait une erreur de croire que cette étude n'est possible que dans des climats très favorables, ou avec des télescopes spéciaux. Ces deux conditions particulières ne seront nécessaires qu'à l'avenir, lorsque l'aréographie aura reconnu tout l'élément physiologique qui la gêne aujourd'hui, et découvert les moyens de le réduire à l'impuissance. Mais, pour le moment, comme il s'agit surtout de se rendre compte de cet élément physiologique lui-même, et d'en déterminer la juste valeur, n'importe quel télescope dans n'importe quelles conditions atmosphériques peut suffire, pourvu qu'il permette d'apercevoir quelques taches sur la planète. Une lunette de dimensions ordinaires, un climat médiocrement favorable, nous donneront des amas de taches, grossiers; une lunette plus puissante, une atmosphère plus tranquille nous donneront des amas plus fins; mais ces amas plus fins ne seront qu'une réduction à une échelle moindre, des amas plus grossiers, et ils seront soumis tous aux mêmes lois, soit de conformation, soit de variations. Il sera donc possible d'étudier ces lois dans un cas comme dans l'autre, et même le parallélisme des résultats en augmentera la probabilité. Pour mon compte, toutes les fois que j'ai observé Mars, j'y ai trouvé quelque chose à apprendre, quelles qu'aient été les conditions atmosphériques, à moins qu'on n'ait observé par un vent du midi, assez fort pour donner au disque de l'astre des vibrations trop prononcées et en effacer toute tache. C'est même des images les plus pauvres en détails que j'ai pu déduire le procédé physiologique qui en règle la formation, et qui dans les images plus riches se manifeste moins nettement. Ce procédé une fois reconnu, j'ai vu s'écrouler tout l'échafaudage des systèmes physiques que les aréographes avaient étayé sur le simple témoignage de leur vue, et j'en suis arrivé à la conviction que nous ne connaissons pas encore la forme vraie, la figure naturelle des taches de Mars; tout ce que nous savons c'est que ces taches abondent en certains points et sont rares en d'autres. Les célèbres planisphères de Schiaparelli ne représentent pas les taches vraies de Mars, ils ne donnent que les maxima de leur répartition. Du reste, si le côté astronomique du problème perd à cette constatation, le côté physiologique y gagne beaucoup. Toute l'aréographie moderne en est venue

à m'apparaître comme un merveilleux chapitre de physiologie, que l'on pourrait intituler »la vision naissante« c'est-à-dire, la vision de choses placées aux limites de la visibilité et, par conséquent, indéfinies, mais que l'œil s'efforce, néanmoins, de saisir sous une forme définie. C'est aux physiologistes qu'il appartient de juger quelle est la dynamique de ces efforts de l'œil, mais un astronome peut bien, même sans être physiologiste, tenter quelques expériences, comme j'ai essayé de le faire depuis 1896, c'est-à-dire depuis le jour où j'ai commencé à soupçonner l'existence de certains éléments subjectifs dans l'image de Mars. Ces soupçons m'ont mis sur la bonne voie, en me poussant à étudier avec plus de soin les rapports qui existent entre la première image de Mars, obtenue confusément au commencement de l'examen télescopique, et l'image définitive qui vient se dessiner ensuite, plus ou moins rapidement, selon l'expérience aréoscopique acquise par l'œil. A la suite de cet examen, j'ai pu me rendre compte de ce que l'œil fait pour obtenir une figure définie parmi des objets indistincts. Au lieu d'un groupe de taches très faibles, il est porté à n'en voir qu'une seule et bien marquée. Pour atteindre ce but, il ne se contente pas de supprimer les intervalles entre une tache et l'autre, ce qui importerait peu, mais il s'aventure à une opération bien plus fatale. Il additionne les intensités de toutes les taches du groupe et la somme qui en résulte, il la localise en un barycentre. Voilà l'illusion qui commence. La tache unique résultante apparaît en un point qui n'a aucun rapport physique avec les taches du groupe et peut même se trouver hors de toute tache. En d'autres mots, un point mathématique, idéal, le barycentre, devient sensible, devient lui-même une tache, tandis que les taches vraies disparaissent. Que le lecteur saisisse bien toute la portée de cette opération de l'œil. Quant à la forme que prend la tache fictive ainsi obtenue, ou plutôt sa ligne périphérique, il est clair qu'elle est déterminée par les quatre facteurs suivants: 1° forme vraie des taches cachées sous la tache fictive. 2° éclairage solaire plus ou moins favorable à la tendance qu'ont les taches vraies à apparaître. 3° puissance du télescope. 4° facilité relative de l'œil à superposer des formes simples sur des objets aussi délicats ou, comme on pourrait même le dire, aussi élastiques que les taches naturelles de Mars. Ce dernier facteur étant de beaucoup le plus efficace, il s'ensuit que la ligne terminale de la tache fictive prend le plus souvent un aspect géométrique facile à retenir, celui, par exemple d'un segment de droite, d'un arc de cercle, ou quelque autre figure simple.

L'opération fondamentale que nous venons de décrire,

l'œil la répète systématiquement pour tous les groupes de taches naturelles de la planète. Nous verrons bientôt comment et jusqu'à quel point l'image de Mars en est dénaturée. Mais je voudrais qu'avant d'aller plus loin le lecteur eût déjà bien remarqué qu'il ne s'agit pas ici de simples hypothèses, mais bien de faits d'observation. Je le répète: ce qui m'a aidé à les constater ce fut cette vision indistincte des premiers moments, que j'ai mentionnée plus haut, vision précieuse, dont malheureusement les efforts inconscients de l'œil tendent à abrégier la durée. Elle subsiste plus longtemps chez l'observateur novice que chez l'aréographe expérimenté. Lorsque l'on est arrivé à s'en débarrasser, on croit généralement d'avoir appris à observer Mars. Mais c'est à tort. Le peu que nous pouvons saisir de Mars est tout dans la vision indistincte. C'est en me complaisant à la faire se reproduire souvent, que j'ai pu, à de nombreuses reprises, observer le phénomène de la formation des barycentres, quelquefois même avec une telle évidence qu'il ne semblait assister à une concentration de matière très rapide, en un point où j'ai vu se former comme une sorte de protubérance à la surface de la planète.

L'illusion des barycentres pointiformes (lacs) devient plus dangereuse encore s'il s'agit de leurs analogues, les barycentres linéaires (canaux). C'est dans l'hémisphère nord, où les taches naturelles sont très faibles et agglomérées suivant certaines directions, que le phénomène se produit de préférence. Ces directions ne sont que des lignes idéales, mais aussitôt que s'est formée l'image précise, le télescope ne tarde pas à en faire des lignes sensibles, c'est-à-dire des taches linéaires, et cela grâce au même procédé d'assemblage qui produit les barycentres pointiformes. Souvent j'ai vu un canal se former sous mes yeux, là où une première perception ne m'avait indiqué que des ombres éparses sur une zone de longue étendue; l'axe de la zone semblait attirer à lui tous les éléments obscurs environnants, après les avoir fait sortir de leur position véritable. Par contre, en quelques circonstances très rares, où ma puissance de vision se trouvait d'une exceptionnelle intensité, j'ai pu observer le phénomène inverse: un canal que j'avais sous les yeux, a disparu, et à sa place je n'ai plus aperçu (pendant quelques moments) que trois ou quatre taches informes. J'ai vu, ainsi, que les éléments obscurs, dont la concentration le long d'une ligne produit la sensation d'un canal, ne forment pas une zone continue, ou, en d'autres termes, que la vision d'un canal n'est pas la sensation réduite d'une bande; elle résulte, au contraire, de la réaction physiologique de divers barycentres pointiformes grossièrement alignés. Enfin, il m'est arrivé parfois d'observer la formation d'un canal entre deux barycentres pointiformes, qui tous les deux présentaient le phénomène de la protubérance, c'est-à-dire semblaient se trouver en relief sur le disque; dans ce cas le canal semblait soulevé lui aussi, comme un arc-en-ciel.

Cette «réaction des barycentres» ou, pour le dire en plus de mots, cette «action réciproque des barycentres pointiformes» est la seconde opération fondamentale que l'œil accomplit sur Mars. Nous lui sommes redevables de cette broderie merveilleuse que nous voyons se dessiner sur le disque de la planète. Supposons un groupe de taches naturelles éparses sur une superficie plutôt vaguement ronde

qu'allongée. La première opération de l'œil dans le but d'obtenir une vision précise, sera de réunir ces taches en quelques barycentres qui naturellement ne seront pas placés sur une même ligne et auront des intensités et des étendues inégales. Mais dès qu'ils commencent à réagir l'un sur l'autre, la scène change. Les barycentres s'égalisent. Le plus vaste cède une partie de soi au plus petit et tous finissent par disparaître, tandis qu'une belle courbe, parfaitement régulière, vient occuper leur place. La réaction des barycentres très foncés de l'hémisphère sud engendre des rubans arqués d'un effet surprenant, tels, p. e. que le Golfe de l'Aurore, le Sinus Sabaeus etc. Dans l'hémisphère nord, la réaction entre les lacs Acidale et Niliacque et le lac de la Lune donne origine à un bel arc semblable au croissant turc, que l'on trouve déjà indiqué dans les dessins de M. Terby. Il est fort instructif de se rendre compte comment, durant la période du raccordement, le Niliacque et l'Acidale, taches d'une étendue pourtant assez considérable, s'affinent et perdent peu à peu leurs contours, c'est-à-dire ceux de leurs éléments qui ne sauraient entrer dans la formation de l'arc de Terby. Pour celui qui a appris à provoquer l'apparition de cet arc, l'uniformité si parfaite et presque géométrique des canaux, n'a plus rien d'étonnant.

Les barycentres, soit pointiformes, soit linéaires, étant des formations subjectives, il n'est pas difficile de comprendre ce que c'est qu'une «gémiation». Si plusieurs taches, groupées autour d'un même point se concentrent en lui et se fondent dans la sensation d'un barycentre, il est clair qu'une moitié des taches du groupe est renforcée par l'autre moitié. Pour saisir quelque chose de concret, l'œil doit étendre son intégration à toutes les taches du groupe. Mais, viennent les conditions d'observation à être changées, soit à cause d'une plus grande intensité d'éclairage solaire, soit par suite d'une puissance pénétrative plus considérable chez l'observateur, chacune des deux moitiés du groupe pourra gagner l'intensité nécessaire pour apparaître indépendamment de l'autre. L'œil ne sera plus contraint à une seule intégration; il en fera deux, et il verra deux taches fictives accouplées. La gémination des canaux est parfaitement analogue. Elle se produit pour les canaux d'une certaine largeur, au moment où les barycentres, dont la réaction engendre le canal, se dédoublent eux-mêmes. Voici l'ordre des sensations tel qu'il arrive ordinairement. Au premier temps: une longue traînée d'ombres, presque imperceptibles; au deuxième, un seul canal le long de l'axe de la traînée; au troisième, deux canaux parallèles. Dans une quatrième phase à laquelle je n'ai pu assister que très peu de fois, les deux lignes se sont évanouies, non pas pour me redonner, comme d'habitude, la sensation indécise du premier temps, mais bien celle de trois ou quatre larges taches ne ressemblant en rien à des figures géométriques. J'ai cru pouvoir comparer ces taches à la «Mer du Nectar, de la Tranquillité et de la Serenité» de la Lune, qui donnent, à celui qui regarde cet astre à l'œil nu, la sensation d'un large canal rectiligne. Ici l'illusion ne saurait aller plus loin, vu le calme parfait de l'image lunaire, contemplée sans agrandissement, et la grande intensité des taches de la Lune, mais, certainement, si celles-ci ne commençaient à se révéler que dans le télescope et sous des grossissements de 200-300 diamètres, le large canal

dont nous venons de parler, ne serait pas moins géminable que son analogue martien : le Gange.

La genèse des canaux doubles est donc la suivante. Qu'on ait un système de taches naturelles échelonnées sur une longue étendue, de manière à former grossièrement une zone. Celle-ci est divisée par sa ligne axiale en deux moitiées, qui n'ont ordinairement pas la force d'apparaître chacune pour son compte, de sorte que l'œil doit les intégrer ensemble le long de l'axe de la zone. Mais, dans des circonstances plus favorables, chacune des deux moitiées peut être à même de nous donner une sensation : alors l'œil les intégrera séparément, l'une à côté de l'autre, et il verra deux lignes sensiblement parallèles. Un barycentre linéaire unique se sera coupé en deux, s'éclaircissant au milieu.

Cet éclaircissement est une caractéristique propre des géminations, même quand il s'agit de barycentres pointiformes. Entre les deux noyaux d'ombre, accouplés, d'une gémination, l'effet de la réaction entre barycentres, dont nous avons parlé plus haut, manque totalement. Cela vient de ce que la gémination n'est, en réalité, qu'un surplus de vision, bien que ce surplus doive forcément rentrer lui-même dans les lois physiologiques de la vision naissante. Si un seul barycentre suffit, en un cas donné, à nous représenter en bloc un groupe de taches, en tel autre cas il ne suffira plus, et un second barycentre devra se former ; quelquefois même on en obtiendra un troisième, comme j'ai pu l'observer moi-même à propos du lac du Soleil. C'est en multipliant ces barycentres que l'œil procède vers la découverte de l'image vraie, car chacune des taches fictives sera d'autant plus près de représenter une tache naturelle, que la surface sur laquelle l'œil a dû étendre son intégration, a été plus petite.

A n'en pas douter, l'étude de Mars fournira donc à la physiologie optique un nouveau champ de recherches précieuses, tandis que le côté du problème qui intéresse les astronomes, c'est-à-dire la découverte de l'image naturelle en deviendra plus ardue et plus noble. Une telle découverte ne peut, en effet, résulter de la simple vision effectuée moyennant nos télescopes actuels. Placer dans le réseau de Mercator ou de Mollweide les résultats directs de nos observations aréoscopiques, ce n'est pas faire la carte de Mars. Ces résultats ne sont pas l'expression fidèle de l'effet produit par la distance sur la vision de choses très lointaines ; mais ce sont des fantômes qui viennent, en vertu de la distance, se substituer aux choses réelles. C'est une sorte de langage conventionnel entre Mars et l'œil, dont l'aréographie physiologique devra essayer l'interprétation.

Si j'affirme que l'image de Mars, telle qu'elle nous sera donnée par cette nouvelle science, différera toto genere des images consacrées par nos planisphères d'aujourd'hui, je ne crains pas, après tout ce que je viens de dire, de tomber dans l'exagération. En effet, si l'on fait abstraction de ce que ces planisphères ont de subjectif, c'est-à-dire les points et les lignes (lacs et canaux) qu'y reste-t-il de réel ? Peut-être les grandes taches ? Mais les lignes terminales de ces taches, celles qui en déterminent la configuration et en donnent, pour ainsi dire, la physionomie, ne sont elles-mêmes que des lignes fictives. Une grande tache est le produit de

la contiguïté de quelques barycentres non-alignés. Sa ligne terminale devra forcément résulter du raccordement des lignes terminales des barycentres eux-mêmes. Or, nous le savons, ces lignes sont subjectives. Toutes les figures, donc, que nous voyons dessinées sur les planisphères de Mars, sont des produits éphémères de la vision naissante, et, comme tels, destinés à disparaître avec les progrès de l'optique, c'est-à-dire au fur et à mesure que la vision gagnera en objectivité. La seule chose qui demeurera debout, ce sera l'indication des endroits où les taches naturelles de la planète sont le plus ramassées.

Certainement, quelques-uns trouveront étrange que dans l'avenir il puisse exister des cartes de Mars sur lesquelles ne figurera plus la Grande Syrte, qui a toujours figuré depuis le temps de Huygens, et que l'on a toujours considérée comme une des taches les plus caractéristiques de la planète. Mais, les taches naturelles qui donnent lieu au phénomène de la Grande Syrte, je les ai entrevues au 15.5 inch. de Cooke dans quelques rares moments de vision privilégiée ; elles s'étendaient jusqu'au méridien de l'Euphrate, pour le moins. Je puis donc affirmer que le contour de la Syrte est une création de l'œil, qui apparaît là où les taches naturelles deviennent plus rares et cessent, par conséquent, d'avoir part à la formation de la grande tache fictive. Ainsi je m'explique pourquoi lorsque Mars nous tourne son pôle sud, la Syrte paraît si vaste qu'elle réussit quelquefois à occuper presque toute l'étendue du disque, tandis que, lorsque la planète nous présente son pôle nord, la Syrte, apparaissant dans le haut du disque, nous semble beaucoup plus réduite que les lois de la perspective ne le comporteraient. La raison de ce phénomène c'est que la ligne terminale de la grande tache n'est pas la même dans le premier cas que dans le second. Lorsque la Syrte nous apparaît dans le bas du disque, elle s'est annexé des ombres latérales qui n'en font plus partie lorsque nous la voyons dans le haut, c'est-à-dire dans le segment méridional du disque.

La transformation que devra subir l'image de Mars avec les progrès de l'optique, ce serait une erreur de se la représenter comme quelque chose d'analogue au développement que les taches de la Lune reçoivent dans le passage de l'œil nu au télescope. Car, si la grande intensité des taches lunaires, vues à l'œil nu, laisse possible la formation des barycentres (je puis moi-même la provoquer facilement, et substituer, à volonté, une Lune rayée à la Lune vraie), elle en supprime, du moins, la nécessité. Mais pour Mars c'est autre chose. Les taches naturelles de la planète, répétons-le, n'offrent pas à l'œil des sensations finies, mais seulement des sensations infinitésimales, des différentielles de sensation, de telle sorte que l'œil est contraint pour la reconnaissance de Mars à un travail d'intégration, dont il est parfaitement dispensé s'il s'agit de la Lune. L'image, donc, de la Lune, à l'œil nu, est déjà une image naturelle et l'agrandissement télescopique ne fait que nous en révéler les détails. Au contraire, l'image actuelle de Mars, avec le secours d'instruments plus puissants que ceux dont dispose à présent l'Astronomie, devra commencer par se dépouiller de toutes les formations subjectives, de sorte que l'agrandissement ira, en définitive, s'appliquer à une image tout autre que celle que nous connaissons.

Qu'il me soit permis, en terminant, de prévenir une question. Si Mars a une célidographie physiologique, les autres planètes en auront une aussi. Pourquoi donc Mars seul est-il signalé à l'attention des physiologistes, et non pas les autres planètes, telles que Jupiter et Saturne, Mercure et Vénus? C'est que dans Mars on retrouve tous les phénomènes observables sur les disques planétaires, sans même en

excepter l'apparition, tout éventuelle qu'elle soit, de bandes parallèles à l'équateur, semblables à celles de Jupiter et de Saturne. En nous aidant, donc, à déchiffrer les signes de Mars, la physiologie rencontrera toute entière la classe des sensations célidographiques, dont c'est à elle de nous dévoiler le mécanisme.

Teramo, Observatoire Collurania, Janvier 1905.

V. Cerulli.

Observations de la comète 1904 I

faites à l'équatorial coudé (0.32 m) de l'observatoire de Lyon, par MM. J. Guillaume et P. Lagrula.

1904	T. m. Paris	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cp.	Obs.	α app.	$\log p.\Delta$	δ app.	$\log p.\Delta$	Red. ad l. app.	*
Avril 22	13 ^h 0 ^m 53 ^s	-0 ^m 30 ^s 80	+6' 3" 3	12.12	G	16 ^h 41 ^m 18 ^s 30	9.360 _n	+47° 49' 32" 5	8.368 _n	+1 ^s 77 — 6" 2	1
26	10 15 48	-0 4.64	+3 27.3	8.8	G	16 28 8.45	9.725 _n	+50 0 9.3	0.047	+1.92 — 5.0	3
27	10 47 55	-0 8.72	-1 41.0	10.10	G	16 24 25.34	9.669 _n	+50 32 36.4	9.841	+1.96 — 4.7	5
28	11 40 45	+0 3.92	+2 9.5	12.12	G	16 20 34.55	9.527 _n	+51 4 32.2	9.227 _n	+1.99 — 4.3	7
28	12 22 29	-0 2.47	+3 2.1	12.12	L	16 20 28.16	9.360 _n	+51 5 24.8	9.740 _n	+1.99 — 4.3	7
29	10 47 24	+0 23.00	+1 45.7	12.12	G	16 16 54.36	9.649 _n	+51 33 21.2	9.530	+2.02 — 3.9	8
30	12 9 4	-0 45.60	-2 21.9	12.12	G	16 12 46.61	9.358 _n	+52 3 56.8	9.852 _n	+2.05 — 3.6	10
Mai 4	9 30 55	+0 9.95	+4 14.4	12.12	G	15 56 49.83	9.737 _n	+53 47 0.8	9.795	+2.16 — 2.0	12
4	10 1 44	+0 4.24	+4 46.5	12.12	G	15 56 44.12	9.683 _n	+53 47 32.9	9.095	+2.16 — 2.0	12
4	11 51 59	-0 15.01	+6 37.0	12.12	L	15 56 24.87	9.289 _n	+53 49 23.4	0.031 _n	+2.16 — 2.0	12
5	9 52 3	+0 40.67	+1 22.9	12.12	G	15 52 28.12	9.690 _n	+54 11 16.3	8.977	+2.18 — 1.5	14
9	9 25 46	-0 17.63	+1 12.9	12.12	G	15 34 47.47	9.691 _n	+55 35 14.2	9.302 _n	+2.24 + 0.2	16
9	9 51 58	-0 22.50	+1 34.3	12.12	L	15 34 42.60	9.630 _n	+55 35 36.1	9.756 _n	+2.24 + 0.2	16
10	9 17 1	+0 8.31	-0 58.7	12.12	G	15 30 15.04	9.695 _n	+55 53 21.8	9.375 _n	+2.25 + 0.6	18
10	9 36 44	+0 5.00	-0 46.1	12.12	L	15 30 11.73	9.651 _n	+55 53 34.4	9.718 _n	+2.25 + 0.6	18
11	12 11 51	-0 29.41	+2 24.8	12.12	G	15 25 5.33	8.650	+56 12 22.4	0.210 _n	+2.25 + 1.2	19
11	12 39 19	-0 34.50	+2 45.7	12.12	L	15 25 0.24	9.124	+56 12 43.3	0.190 _n	+2.25 + 1.2	19
13	11 19 7	-0 34.38	-1 55.6	12.12	G	15 15 57.11	8.855 _n	+56 42 15.5	0.226 _n	+2.25 + 2.1	21
13	11 43 49	-0 38.73	-1 40.7	12.12	L	15 15 52.76	8.135	+56 42 30.4	0.242 _n	+2.25 + 2.1	21
16	9 52 33	-0 20.21	-3 17.4	12.12	G	15 2 11.47	9.431 _n	+57 18 30.8	0.165 _n	+2.22 + 3.4	23
16	11 33 26	-0 39.57	-2 32.2	12.12	L	15 1 52.11	8.783	+57 19 16.0	0.251 _n	+2.22 + 3.4	23
21	9 4 19	+0 44.41	+2 15.9	12.12	G	14 39 9.32	9.466 _n	+57 57 37.2	0.179 _n	+2.11 + 5.4	25
21	9 57 6	+0 34.45	+2 27.6	12.12	L	14 38 59.36	9.079 _n	+57 57 48.9	0.263 _n	+2.11 + 5.4	25
24	9 45 13	-0 15.44	-2 4.9	12.12	G	14 25 32.44	8.879 _n	+58 8 56.0	0.278 _n	+2.02 + 6.5	27
24	10 13 58	-0 20.59	-2 2.6	12.12	L	14 25 27.29	8.349	+58 8 58.3	0.284 _n	+2.02 + 6.5	27
28	10 4 48	-0 15.40	+6 1.7	10.12	G	14 8 22.03	9.011	+58 10 42.5	0.275 _n	+1.85 + 7.7	28
28	10 58 57	-0 24.79	+5 59.7	10.12	L	14 8 12.64	9.449	+58 10 40.5	0.197 _n	+1.84 + 7.7	28
30	9 57 11	+0 42.67	+9 49.6	10.12	G	14 0 10	9.116	+58 6	0.266 _n	+1.76 + 8.2	30
31	9 29 43	-0 22.39	-6 33.5	14.12	G	13 56 23.79	8.805	+58 3 35.0	0.277 _n	+1.72 + 8.5	31
31	10 20 30	-0 30.51	-6 39.3	14.12	L	13 56 15.67	9.367	+58 3 29.2	0.223 _n	+1.72 + 8.5	31
Juin 4	9 50 39	+0 51.95	+5 51.5	10.12	G	13 41 28.27	9.367	+57 44 18.1	0.209 _n	+1.52 + 9.3	33
4	10 46 46	+0 43.63	+5 40.5	10.12	L	13 41 19.95	9.607	+57 44 7.1	0.035 _n	+1.52 + 9.3	33
6	10 11 7	+0 34.54	-4 55.6	10.12	G	13 34 29	9.533	+57 31	0.109 _n	+1.42 + 9.6	35
6	10 30 28	+0 31.43	-4 59.9	10.12	L	13 34 26	9.600	+57 31	0.030 _n	+1.42 + 9.6	35
7	9 43 52	+0 31.83	+6 29.2	10.12	G	13 31 17.52	9.445	+57 24 2.9	0.162 _n	+1.35 + 9.7	36
7	10 3 34	+0 29.67	+6 23.4	10.12	L	13 31 15.36	9.530	+57 23 57.1	0.104 _n	+1.35 + 9.7	36
14	9 30 33	-1 35.21	+1 13.4	10.12	G	13 10 48.95	9.571	+56 21 52.9	9.984 _n	+1.07 + 10.3	37
14	9 59 41	-1 38.41	+1 0.4	10.12	L	13 10 45.75	9.654	+56 21 39.9	9.778 _n	+1.07 + 10.3	37
16	9 59 33	+0 55.72	-6 25.6	10.12	G	13 5 41	9.680	+56 0	9.569 _n	+0.96 + 10.3	38
16	10 26 48	+0 52.96	-6 36.4	10.12	L	13 5 39	9.733	+56 0	8.729	+0.96 + 10.3	38
18	10 33 3	-0 35.67	+6 11.9	10.12	G	13 0 56.99	9.760	+55 39 30.2	9.622	+0.90 + 10.3	39
20	9 42 42	+1 8.92	+5 53.8	10.12	G	12 56 38.69	9.689	+55 17 46.1	9.197 _n	+0.81 + 10.3	41