die Erfahrung für einen derartigen Einfluß von Waldungen aus.

Die unausgesetzten Forschungen der neuen Zeit werden uns auch noch hierüber aufklären, diese Naturerscheinung wird das für uns jetzt Wunderliche verlieren, wenn es uns vergönnt seyn wird, mehr auf ihren Anfang zurückzugehen, und vielleicht finden sich auch in diesem Phänomen die schönen Worte Humboldt's bestätigt: „Dafs die Meteorologie ihr Heil und ihre Wurzel in der heißen Zone suchen müsse!“

XIII. Ueber den Talkspath; von August Breithaupt.

Als ich den *Talkspath* oder *Carbonites hystaticus* in meinem vollst. Handb. d. Mineralogie Bd. 2. S. 240 bestimmt hatte, vermochte ich von der chemischen Beschaffenheit nur im Allgemeinen anzugeben, dafs der Körper die reinste kohlensaure Magnesia sey, welche man von krystallisirten Mineralien habe. Man kennt ihn sehr ausgezeichnet aus Norwegen, wo er beim Hofe Lofthuus unweit Suarum in Begleitung von Serpentin, sogen. Titaneisen, Hydrotalkit und einem *Phengit-Glimmer*, in einer lagerartigen Zone im Urgneise vorkommt. Hier wird er meist von grobkörniger marmorähnlicher Beschaffenheit, seltener in gröfseren homogen krystallischen Partien angetroffen.

Diesen Talkspath habe ich in drei Spaltungsgestalten gemessen und, bei schöner Spiegelung, den stumpfen Rhomboëder-Winkel, wie früher an anderen Varietäten = $107^{\circ} 28\frac{1}{2}'$ gefunden, nämlich $107^{\circ} 28'$, $107^{\circ} 28\frac{1}{2}'$, $107^{\circ} 29'$. Das spezifische Gewicht = 3,017.

Hr. Prof. Th. Scheerer, dem ich auch die obige geognostische Notiz verdanke, fand die chemische Zusammen-

setzung im Durchschnitte von vier sehr nahe miteinander übereinstimmenden Analysen so, wie unter *a* folgt; *b* giebt die Bestandtheile nach der Formel Mg C:

	<i>a.</i>	<i>b.</i>
Kohlensäure	51,447	52,768
Magnesia	47,296	47,232
Eisenoxydul	0,786	
Wasser	0,470.	

Hierbei ist das Atomgewicht der Magnesia zu 251,5 angenommen.

Von den Säuren wird auch dieser Talkspath bedeutend schwieriger angegriffen als die amorphe kohlensaure Magnesia, der Magnesit. Den Magnesit von Frankenstein in Schlesien fand der nur genannte Chemiker als eine ganz vorzüglich reine Magnesia.

XIV. Ueber den Aigirin; von August Breithaupt.

Unter dem Namen *Aigirin* oder *Aegyirin* hat man bisher zweierlei von Hrn. Esmark entdeckte und benannte Mineralien, einen *Pyroxen* und einen *Amphibol* begriffen. Hr. Plantamour hat von dem einen *Aigirin* folgende Mischung bekahnt gemacht:

Kieselsäure	56,57
Titansäure	2,01
Thonerde	3,41
Kali	7,79
Natron	2,06
Kalkerde	5,91
Magnesia	5,87
Eisenoxydul	21,38

Der andere Aigirin soll sich hingegen chemisch wie ein Amphibol verhalten haben.