ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

No. 878.

Tagbeobachtungen des Cometen von *Klinkerfues*.

Ueber die Sichtbarkeit grosser Cometen am Tage haben wir aus früheren Jahrhunderten verschiedene mehr oder weniger beglaubigte Nachrichten. Was von dem berühmten Cometen des Jahres 1744 erzählt wird, ist nicht zu bezweifeln *), und noch weniger die Tagbeobachtung des grossen März-Cometen von 1843, so wie die des telescopischen am 30^{sten} März 1847. Alle, mit Ausnahme des Letzten, waren sehr grosse und glänzende Erscheinungen, und wurden zufällig am Tage gesehen. Bei dem *Hind'schen* Cometen gab die sehr geringe Periheldistanz, und die im Voraus berechnete ausserordentliche Zunahme der Intensität, die Veranlassung, den Cometen zur Zeit seines Perihels neben der Sonne aufzusuchen, welcher Versuch völlig gelang. Bei dem diesjährigen von *Klinkerfues* entdeckten Cometen, liess die berechnete höchst bedeutende Zunahme des Glanzes einen ähnlichen Erfolg hoffen, und wenn ich auch an sehr vielen heitern Tagen mich zu früh bemühte, den Cometen mit Sicherheit am Tage zu erblicken, so bin ich doch endlich so glücklich gewesen, ihn nicht nur im hellen Sonnenlichte des Mittages zu sehen, sondern ich habe den Cometen, was, so viel mir bekannt, bis jetzt noch ohne Beispiel ist, fast eine ganze Woche lang am Tage astronomisch beobachten können. In Rücksicht auf die Seltenheit, und wenn ich mich nicht irre, auf die vermuthete Brauchbarkeit dieser Beobachtungen, darf ich mir wohl erlauben, den Astronomen hierüber mit der erforderlichen Ausführlichkeit Bericht zu erstatten.

Seit dem 19^{ten} August habe ich fast täglich mit dem Refractor, und auch mit dem Fernrohre des Meridiankreises, den Cometen am Tage, aber stets ohne sichern Erfolg gesucht; ich sah ihn nicht früher, als am Nachmittage des 30^{sten} August um 3^h, beobachtete ihn dann täglich bis Sept. 4 Abends, und war am 6^{ten} und 7^{ten} Sept. nicht im Stande, ungeachtet aller Vorkehrungen, den Cometen im Tageslichte wieder aufzufinden. Ehe ich aber die Versuche, die Positionen des Cometen am Tage durch Aequatorealeinstellungen zu bestimmen, mittheile, hielt ich es zu einer richtigen Beurtheilung der folgenden Beobachtungen für nöthig, alle Umstände zu erwähnen, von denen ich glaube, dass sie einen merklichen

Einfluss ausüben konnten. Um das Auffinden des Cometen möglich zu machen, wurde ein 15 Zoll langes geschwärztes Rohr vor das Objectivende des Fernrohrs gesetzt; ein ähnliches aber längeres Rohr bekam das Fernrohr des Meridiankreises, um das seitwärts einfallende Sonnenlicht vom Objectivglase abzuhalten. Für den 30^{sten} und 31^{sten} Aug. war gedachtes Rohr am Refractor hinreichend, allein am Morgen des 2^{ten} Sept. machte das Erkennen des Cometen die grössten Schwierigkeiten, so dass ich schon alle Hoffnung aufgab, als ich noch zur rechten Zeit bemerkte, dass die Sonne ungeachtet des vorgesetzten Rohrs $\frac{1}{3}$ vom Objectivglase bescheinen konnte. Ich machte nun ein zweites viel längeres, inwendig dunkles Rohr, welches mit dem erstern verbunden, mit seiner Oeffnung gegen 3 Fuss vom Objective abstand. Dabei war es freilich nicht zu vermeiden, dass es weit aus dem Thurme in's Freie hinausragte, und vom Winde zuweilen merklich erschüttert wurde. So wie diese Einrichtung angebracht war, zeigte sich der Comet in überraschender Klarheit, und so hell, dass ich ihn, wenn er längst das Gesichtsfeld verlassen hatte, gar nicht mehr am Stundenkreise einzustellen für nöthig fand, sondern ich bewegte nur die Schraube, und sah ohne Mühe den Cometen schon bei seinem Eintreten. Am 2^{ten} und 3^{ten} Septbr. fand ich ihn so hell und scharf, dass, wenn ein sichtbarer Stern ganz in der Nähe gewesen wäre, ich eine vollständige und scharfe Kreismikrometerbeobachtung am Tage erlangt hätte, denn der Comet war ebensowohl durch die Glasplatte des Kreismikrometers als durch sehr dünnes Nebelgewölk sichtbar.

Für die Tagbeobachtungen, wenn man sich, was unzureichend wäre, blos an die Uebereinstimmung der einzelnen Ablesungen halten wollte, sind aber noch folgende Nebenumstände in Erwägung zu ziehen:

1) Als ich am Nachmittage des 30^{sten} August um 3 Uhr den Cometen auffand, war es mir keineswegs Ernst, durch Einstellungen in die Mitte des Gesichtsfeldes wirkliche Ortsbestimmungen zu ermitteln. Einmal waren mir für diesen Fall die Leistungen dieses Refractors, (seine technische Vollendung) noch völlig unbekannt, während die Instrumentalfehler leicht zu bestimmen wären, und andererseits war die Schwierigkeit, den Cometen zu sehen, noch mehr aber, ihn genügend

*) Vergl. *Hind* in Astr. Nachr. Nr. 633.

sicher einzustellen, so gross, dass ich, nur mehr der Merkwürdigkeit wegen einige beiläufige Einstellungen versuchte, ohne daran zu denken, sie zu benutzen. Ausserdem fehlten damals noch verschiedene Einrichtungen, um bequem für die Ablesung der Nonien zum Deklinationskreise zu gelangen, und endlich war am 30^{sten} und 31^{sten} Aug. in der engen eisernen Drehkuppel die Temperatur von mehr als 23° Réaumur, so beschwerlich, dass ich glaubte, auf scharfe Ortsbestimmungen ganz verzichten zu müssen.

2) Ein anderer Umstand ist aber von grösserer Bedeutung. So lange sich nämlich das kürzere 15 zöllige Rohr vor dem Objective befand, bildeten sich durch Spiegelung im Objectivglase 1 bis 3 sehr feine glänzende Punkte, die nahezu die Mitte des Feldes bezeichneten. Es war nicht zu vermeiden, dass ich mich nicht jedes Mal bei der Einstellung des Cometen über den wahren Ort der Mitte täuschte. Zuletzt beobachtete ich die Passage des Cometen oberhalb dieser Punkte, allein ich fand am 31^{sten} Mittags, dass diese Punkte keineswegs im Mittelpunkt des Kreismikrometers lagen. Hierdurch können also constante Fehler an den genannten beiden Tagen entstanden sein, die sich nicht verbessern lassen, und dass ihre Existenz einige Wahrscheinlichkeit habe, geht mir daraus hervor, dass die locale Instrumentalcorrection, welche ich derzeit durch den nahen Stern β Leonis erhielt, von der später für diesen Punkt ermittelten, verschieden war.

3) Nachdem ich am 31^{sten} Aug. Mittags gefunden hatte, dass die am Vormittage erhaltenen Einstellungen eine unerwartete Uebereinstimmung zeigten, beschloss ich, für die nächsten Tage Alles anzuwenden, um diese Beobachtungen so genau als möglich anzustellen. Das längere Rohr am Objective erleichterte ausserdem die Sichtbarkeit des Cometen, und brachte die gedachten Lichtreflexe im Glase zum Verschwinden. Diese Nachtheile waren nun zwar beseitigt; dagegen aber haben alle Beobachtungen seit Sept. 2. früh, wegen der Verlängerung des Rohres ausserhalb der Kuppel, vom Winde möglicherweise etwas gelitten.

Ich werde nun, da ich einige Hoffnung habe, dass der grössere Theil dieser Tagbeobachtungen für die Bahnbestimmung selbst nicht ohne Nutzen sein möge, Alles in soweit im Detail mittheilen, als es die Seltenheit dieser Ortsbestimmungen, und eine richtige Beurtheilung ihres Werthes zu fordern scheint. Das Verfahren, die Instrumentalfehler zu bestimmen, werde ich zuletzt darlegen und zu rechtfertigen versuchen. Nenne ich T die uncorrigirte Sternzeit der Uhr Nr. 49, t den nur wegen Refraction verbesserten, an 1 oder 2 Nonien abgelesenen Stundenwinkel, δ die nur von Refraction befreite, ebenfalls an 1 oder 2 Nonien abgelesene Declination, so gebe

ich im Folgenden: T , $(T-t)$ und δ , damit man die Uebereinstimmung der Beobachtungen jeder einzelnen Gruppe von Einstellungen klar vor Augen habe. Alles Uebrige wird in der Folge besprochen werden.

Die Tage der Ueberschriften zähle ich nach bürgerlicher Weise; in den Zeitangaben setze ich aber Alles nach astronomischer Zählung. Jedem Mittel $(T-t)$ und δ , also jeder uncorrigirten AR. u. δ , die nur von der Wirkung der Refraction befreit ist, füge ich den wahrscheinlichen Fehler ε'' bei, der nur sehr beiläufig berechnet ist.

August 30.

Die schon früher erwähnten Umstände liessen nicht mehr als 5 mangelhafte Einstellungen zu. t wurde nur an Nonius I, δ nur an Nonius II. abgelesen. Die Beobachtungen sind folgende:

	Stzt. Nr. 49.	$(T-t) =$	$\delta =$
Aug. 30	14 ^h 38 ^m 20 ^s	11 ^h 31 ^m	+14° 4' 28
	14 41 15	11 31	14 3,86
	14 57 45	11 31 6 ^s 40	14 —
	15 7 8	11 31 10,40	14 1,26
	15 12 55	11 31 3,38	14 0,05
Mittel. . .	14 54 54,5	11 31	+14 2,36 (4)
	15 5 56,0	11 31 6,72	-14 (3)
$\varepsilon'' = \pm 1^s 26 \cos \delta \quad \varepsilon'' = \pm 6'' 7$			

Anm. Nur bei diesen Beob. ist bei $(T-t)$ der Uhrstand τ schon eingeschlossen.

August 31.

Sehr heiterer, tiefblauer Himmel und stille Luft. Schon vor 10^h Morgens hatte ich den Cometen deutlich im Gesichtsfelde. Ich brauchte stets nur die 40malige Vergrösserung des Doppelkreismikrometers. Stärkere Oculare vertrug der ϕ nicht, und in dem des Fadenmikrometers war er nie zu sehen. Die folgenden Beobachtungen sind nur an je einem Nonius abgelesen worden.

	Sternzt. Nr. 49	$(T-t) =$	$\delta =$
Aug. 30	9 ^h 15 ^m 48 ^s 4	11 ^h 28 ^m 51 ^s 17	+12° 14' 58
	9 20 9,2	50,97	14,68
	9 28 54,4	52,17	13,19
	9 32 52,4	49,17	12,99
	9 34 55,2	47,97	12,60
	9 36 51,6	11 28 49,37	+12 12,00
Mittel . . .	9 28 15,2	11 28 50,19	+12 13,34 (6)
$\varepsilon'' = \pm 0^s 30 \cos \delta \quad \varepsilon'' = \pm 6'' 1$			

	Sternzt. Nr. 49.	$(T-t) =$	$\delta. =$
Aug. 30	10 ^h 31 ^m 42 ^s 4	11 ^h 28 ^m 44 ^s 10	+12° 6' 98
	33 22,4	41,10	6,88
	34 58,4	39,69	6,98
	36 7,6	37,29	6,68
	37 21,2	39,89	6,68
— 31	38 18,8*)	39,48	6,28
	40 19,6	37,28	6,48
	41 26,0	39,68	6,08
	43 8,4	42,07	6,48
	10 47 5,6	11 28 39,27	+12 5,28
Mittel	10 38 23,0	11 28 39,98	+12 6,48 (10)

$$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 41 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 3'' 1$$

Die mit (*) bez. Beob. ist während der Culmination der Sonne am 31^{sten} August.

September 1.

Den ganzen Tag hindurch war der Himmel sehr trübe; Abends vertheilten sich die Wolken, und ich beobachtete den Cometen in 9° Höhe so lange, bis er am Dache der westlich gelegenen Caserne verschwand. Er war unter diesen Umständen schwieriger als am Mittage des 31^{sten} August zu sehen. Heute waren Einrichtungen getroffen, um für die Ablesung der Nonien bequem zu den Kreisen gelangen zu können; es wurde noch das kurze Objectivrohr gebraucht. Die sehr schwierigen Einstellungen in die Mitte des Feldes am Kreisnikrometer ergaben Folgendes; die letzte Einstellung geschah bei 8° 37' Höhe des Cometen.

	Sternzt. Nr. 49.	$(T-t) =$	$\delta. =$
Sept. 1	17 ^h 2 ^m 2 ^s 2	11 ^h 24 ^m 41 ^s 13	+8° 52' 44
	3 49,6	39,46	51,93
	5 34,0	41,31	51,95
	7 4,8	39,12	51,71
	8 31,6	37,46	51,58
	9 57,2	39,22	51,58
	11 12,0	39,70	51,39
	12 49,6	37,41	51,23
	17 14 59,6	11 24 36,89	+8 50,97
Mittel	17 8 26,7	11 24 39,08	+8 51,64 (9)

$$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 25 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 5'' 0$$

Es wurden jedesmal beide Nonien gelesen, und dies gilt für alle folgenden Beobachtungen.

September 2.

Bei sehr heiterem Himmel sah ich den Cometen schon Morgens um 9^h. Indessen bald darauf kam schnell ziehendes Nebelgewölk, welches die Beobachtungen häufig unterbrach. Noch wurde das kleinere Objectivrohr gebraucht. Die Beobachtungen gehören wegen des blendenden Glanzes im Gesichtsfelde, und wegen der Hitze in der Kuppel, zu den beschwerlichsten, die ich jemals gemacht habe. Von Mittags 1^h bis in die Nachthinein war der Himmel durch grosse Gewitter verfinstert.

	Sternzt. Nr. 49.	$(T-t) =$	$\delta. =$
Sept. 1	8 ^h 24 ^m 7 ^s 2	11 ^h 22 ^m 4 ^s 70	+7° 8' 96
	8 32 22,0	6,50	7,84
Mittel	8 28 14,6	11 22 5,60	+7 8,40 (2)

	Sternzt. Nr. 49	$(T-t) =$	$\delta. =$
Sept. 1	9 ^h 35 ^m 58 ^s 4	11 ^h 21 ^m 54 ^s 53	+6° 61' 02
	9 41 57,6	54,13	60,02
	9 43 53,2	49,96	59,97
	9 45 57,6	52,06	59,87
	9 49 1,6	52,51	59,58
	9 50 52,0	50,63	59,59
	9 52 52,4	11 21 51,74	+6 59,65
Mittel	9 45 47,5	11 21 52,37	+6 59,97 (7)

$$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 33 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 4'' 9$$

	Sternzt. Nr. 49	$(T-t) =$	$\delta. =$
Sept. 1	10 ^h 17 ^m 9 ^s 2	11 ^h 21 ^m 46 ^s 67	+6° 56' 52
	18 52,8	46,74	56,58
	22 50,4	43,79	56,18
	30 29,2	42,97	54,94
	32 16,0	42,74	54,69
	33 45,2	42,41	55,14
	35 42,4	44,08	54,44
	37 2,0	41,66	54,39
	38 23,6	41,24	54,35
	39 43,6	41,22	54,35
	41 6,4	43,00	53,90
	42 28,4	40,48	53,75
	10 44 31,6	11 21 40,65	+6 53,60
Mittel	10 33 24,6	11 21 42,90	+6 54,83 (13)

$$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 18 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 2'' 0$$

Die Beob. um 10^h 44^m 5 ist wenige Minuten vor der Culmination der Sonne, also kurz vor dem wahren Mittage des 2^{ten} Sept. beobachtet.

	Sternzt. Nr. 49.	$(T-t) =$	$\delta. =$
Sept. 2	10 ^h 50 ^m 3 ^s 6	11 ^h 21 ^m 40 ^s 57	+6° 53' 21
	10 51 46,8	39,25	52,81
	10 53 20,8	39,23	52,76
	10 55 0,0	39,66	52,61
	10 56 43,2	40,59	52,21
Wolk.	10 58 20,0	38,87	52,16
Wolk.	11 3 41,2	40,50	51,27
	11 5 41,6	38,88	51,02
	11 6 49,2	38,95	51,22
	11 8 11,2	37,41	51,12
Wolk.	11 10 48,8	11 21 37,97	+6 50,87
Mittel	11 0 2,4	11 21 39,26	+6 51,93 (11)

$$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 21 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 2'' 7$$

Die Nebeldünste haben diese Beobachtungen eigentlich fortwährend gestört; bei den besonders durch „Wolken“ bezeichneten Beobachtungen war der Comet stets nur 3—8 Sekunden sichtbar, in welcher Zeit die Einstellung eilig gemacht werden musste.

September 3.

Um 8^h Morgens fing der Himmel an sich aufzuheitern; es verfloss aber viel Zeit, bevor ich mich für die Beobachtungen vollständig eingerichtet hatte. Diesmal wurde zuerst das lange Objectivrohr von 3 Fuss gebraucht, wodurch denn der Comet sich in grosser Klarheit erkennen, und besser beobachten liess. Der Wind erschütterte das Fernrohr merklich; doch waren die Einstellungen weniger schwierig.

	Sternzt. Nr. 49.	(T-t) =	δ. =	
Sept. 2	8 ^h 5 ^m 34 ^s .8	11 ^h 17 ^m 51 ^s .46	+4° 26' 59	(1)
Sept. 2	9 ^h 38 ^m 38 ^s .8	11 ^h 17 ^m 23 ^s .36	+4° 16' 09	
	9 40 13,2	23,73	15,99	
	9 41 32,0	24,51	15,40	
	9 42 36,8	23,79	15,75	
	9 43 36,8	22,77	15,30	
	9 44 48,8	21,25	15,25	
	9 46 26,0	20,93	14,86	
	9 48 47,2	20,61	14,71	
	9 50 0,0	18,88	14,56	
	9 51 3,2	11 17 19,55	+4 14,77	
Mittel	9 44 22,3	11 17 21,94	+4 15,27 (10)	
$\varepsilon = \pm 0^{\circ} 25 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 2'' 2$				

	Sternzt. Nr. 49.	(T-t) =	δ. =	
Sept. 3	9 ^h 59 ^m 42 ^s .0	11 ^h 17 ^m 17 ^s .21	+4° 13' 58	
	10 1 22,0	19,18	13,33	
	10 2 29,6	19,26	13,08	
	10 3 33,6	17,73	12,69	
	10 4 34,8	17,92	12,99	
	10 7 10,0	15,09	12,24	
	10 8 18,8	18,87	12,19	
	10 9 36,8	18,34	12,34	
	10 10 50,4	16,41	12,34	
	10 11 52,0	14,69	12,24	
	10 13 27,2	11 17 17,18	+4 11,95	
Mittel	10 6 37,9	11 17 17,44	+4 12,64 (11)	
$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 28 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 2'' 5$				

	Sternzt. Nr. 49.	(T-t) =	δ. =	
Sept. 2	10 ^h 18 ^m 5 ^s .8	11 ^h 17 ^m 13 ^s .71	+4° 11' 50	
	19 9,2	13,59	11,30	
	20 11,2	15,08	11,25	
	21 14,0	16,86	11,00	
	22 15,6	13,95	10,90	
	23 16,8	14,63	10,62	
	24 23,6	14,42	10,45	
	25 24,4	13,20	10,81	
	26 38,4	14,18	10,76	
	27 44,0	13,77	10,26	
	28 47,2	11,45	10,16	
	29 50,8	13,52	10,11	
	10 31 4,0	11 17 10,69	+4 9,96	
Mittel	10 24 28,1	11 17 13,77	+4 10,70 (13)	
$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 19 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 1'' 6$				

	Sternzt. Nr. 49.	(T-t) =	δ. =	
Sept. 3	11 ^h 23 ^m 47 ^s .2	11 ^h 16 ^m 63 ^s .13	+4° 4' 18	
	25 16,0	62,89	4,08	
	26 24,8	64,63	3,68	
	27 36,8	63,11	3,33	
	28 38,4	62,69	2,93	
	29 47,6	62,88	3,03	
	31 1,2	61,46	2,73	
	33 59,2	61,94	2,23	
	39 46,4	58,59	1,98	
	11 40 48,8	11 16 59,48	+4 1,87	
Mittel	11 30 42,6	11 17 2,08	+4 3,00 (10)	
$\varepsilon = \pm 0^{\circ} 19 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 3'' 5$				

September 4.

Erst gegen Mittag trat die Sonne zwischen dicken Wolken hervor, und sogleich war auch der noch gut sichtbare Comet aufgefunden. Es blieb aber bei lebhaftem Winde die starke Bewölkung vorherrschend, so dass ich keine Einstellung bei völlig klarer Luft erhalten konnte, und endlich, ermüdet vom vielstündigen vergeblichen Warten, nach 5 Uhr Nachmittags die Beob. aufgab.

	Sternzt. Nr. 49.	(T-t) =	δ. =	
Sept. 3	10 ^h 32 ^m 8 ^s .8	11 ^h 12 ^m 12 ^s .86	+1° 21' 85	
	33 49,6	12,16	21,40	
	35 58,8	13,36	21,30	
	37 18,0	13,55	20,95	
	39 20,0	16,05	20,91	
	41 46,8	11,35	20,91	
	42 48,6	9,64	20,91	
	43 52,4	10,34	20,76	
	44 52,8	10,34	20,37	
	10 46 2,4	11 12 7,94	+1 19,87	
Mittel	10 39 47,8	11 12 11,76	+1 20,90 (9)	
$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 38 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 3'' 0$				

	Sternzt. Nr. 49.	(T-t) =	δ. =	
Sept. 4	11 ^h 53 ^m 33 ^s .6	11 ^h 11 ^m 54 ^s .46	+1° 11' 80	
	11 55 27,0	55,38	12,65	
Mittel	11 54 27,8	11 11 54,92	+1 12,22 (2)	
$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 43 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 21''$				

	Sternzt. Nr. 49.	(T-t) =	δ. =	
Sept. 4	14 ^h 0 ^m 55 ^s .2	11 ^h 11 ^m 30 ^s .09	+0° 57' 38	
	14 3 42,4	28,77	57,32	
Mittel	14 2 18,8	11 11 29,43	+0 57,35 (2)	
$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 10 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 5''$				

	Sternzt. Nr. 49.	(T-t) =	δ. =	
Sept. 4	14 ^h 52 ^m 26 ^s .0	11 ^h 11 ^m 17 ^s .83	+0° 51' 3	
	14 53 52,4	17,22	51,2	
	14 54 49,2	19,51	51,3	
Mittel	14 53 39,2	11 11 18,19	+0 51,2 (3)	
$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 53 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 6''$				

	Sternzt. Nr. 49.	$(T-t) =$	$\delta =$
Sept. 4	15 ^h 58 ^m 1 ^s 6	11 ^h 11 ^m 7 ^s 20	+0° 43' 88
	16 0 36,8	3,86	43,53
	16 3 51,2	11,47	43,28
Mittel . . .	16 0 49,8	11 11 7,51	+0 43,56 (3)

$$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 69 \cos \delta. \quad \varepsilon'' = \pm 2'' 5$$

Am 5^{ten} Sept. war es trübe. Am 6^{ten} und 7^{ten} war der Comet bei ziemlich heller Luft nicht mehr aufzufinden.

Aus 116 einzelnen Einstellungen des Cometen in die Mitte des Gesichtsfeldes, und ohne Hülfe eines Fadenkreuzes, finde ich, wenn ich zwar die Refraction vollständig, die Aenderung der Parallaxe aber gar nicht berücksichtige, für $(T-t)$ den mittleren Fehler einer Einstellung $= \varepsilon = \pm 1^{\circ} 52 \cos \delta$; für δ aber $= \pm 13'' 7$ und für $(T-t)$ den wahrscheinlichen Fehler eines Mittels aus 10 Beobachtungen

$$\varepsilon'' = \pm 0^{\circ} 22 \cos \delta \quad \varepsilon'' = \pm 2'' 9.$$

Hieraus ersieht man, dass ich unter den mehrfach erwähnten Umständen nach dem Augenmaasse etwa bis auf $\frac{1}{4}$ Bogenminute in Decl., in AR. etwa aber auf $\frac{1}{3}$ Bogenminute sicher einstellen konnte; ich bin aber überzeugt, dass bei der damaligen Lage des Fernrohrs der Wind mehr Einfluss auf die AR. als auf die δ . ausüben konnte. Ausserdem zeigten beide, den Stunden- und Declinationskreis bewegende Schlüssel deutliche Nachwirkungen nach vollbrachter Drehung, welche ich dadurch möglichst zu verkleinern suchte, dass ich diese Schlüssel nicht frei herunterhängen liess, sondern sie schwebend durch Bindfaden in solche Lage brachte, dass sie in der Verlängerung der, unmittelbar die Kreise bewegenden Schrauben lagen.

Ermittlung der Instrumentalfehler und Reduction der Beobachtungen.

Allgemein betrachtet, wäre es am einfachsten und leichtesten gewesen, die bekannten, die Untersuchung der Aufstellung des Aequatoreals betreffenden Methoden auch für diese Beobachtungen anzuwenden. Diese Untersuchung würde ich schon zwischen dem 30^{sten} Aug. und 4^{ten} Sept. meist am Tage ausgeführt haben, wenn ich mich hätte entschliessen können, die Cometenbeobachtungen zu unterbrechen, und wenn mich nicht andere Gründe davon abgehalten hätten. Jedes Instrument ist aber ein Individuum mit besondern Eigenthümlichkeiten, resp. periodischen und localen Fehlern, und dies gilt von dem unsrigen in Betreff seines Baues als Aequatoreal im hohen Grade. Wenn ich jetzt in den Fall komme, von den erheblichen Fehlern des Instrumentes zu reden, dessen Fernrohr sonst zu den vorzüglichsten seiner Art gehört, so geschieht dies nicht im entferntesten, um gegen den stets so

genau arbeitenden *Starke* in Wien irgend einen Tadel auszusprechen. Wie sehr viele Aequatoreale, ist auch dieses, in der Rücksicht gebaut worden, dass man heutzutage so gut wie gar keine Aequatorealeinstellungen beobachtet, sondern zur Ermittlung der Oerter viel besser auf dem Wege von Differenzmessungen nach verschiedenen Methoden gelangt. Ich kann aber hier nicht umhin, Alles mitzutheilen, was mich veranlasste, die gewöhnliche Art, nämlich die Abweichung des Instrumentes vom Pole $= \lambda$, und die vom Aequator $= D$, ferner die Index- und Nonienfehler etc., aus der Beobachtung nördlicher und südlicher Sterne zu finden, für diesen Fall aufzugeben, und mich ganz auf die Findung partieller Instrumentalfehler, also auf die Darstellung localer Fehler im Stunden- und Declinationskreise zu beschränken. Die beiden Kreise von etwa 10 Zoll Radius sind nur in soweit eingetheilt, um bequem und sicher einstellen zu können. Ihre Theilung selbst ist aber nicht der Art, um sich darauf verlassen zu können. Am Declinationskreise sehe ich ohne alle Messung, durch den blossen Anblick mit der Loupe, Theilungsfehler im Limbus und in beiden Nonien, die sehr beträchtlich sind; am Stundenkreise ist die Differenz beider Nonien nirgends constant, sie wechselt in kurzen Intervallen mitunter zwischen $+4^{\circ}$ und -1° , und in einzelnen Lagen ist der Rand des 2^{ten} Nonius von dem des Limbus durch einen starken Zwischenraum so weit geschieden, dass die Ablesung dadurch sehr erschwert wird. Das Fernrohr war nicht gehörig balancirt, und ich vermied es, irgend Etwas zu ändern, nachdem ich mit den Cometenbeobachtungen schon begonnen hatte. Von der Biegung und deren Aenderung war nichts bekannt, und da ich einige Unregelmässigkeiten im Schraubengange beider Kreise schon kannte, so war nicht zu erwarten, dass die im Allgemeinen ermittelten Instrumentalfehler nach ihrer Reduction für jede einzelne Beobachtung dort ihre Gültigkeit haben würden. Ich beschloss daher folgendes Verfahren. Für jede Gruppe von Cometenbeobachtungen war die Lage des Fernrohrs, also t u. δ bekannt; es sollte nun durch nächtliche Beobachtung bekannter Sterne am betreffenden Orte, die Summe sämmtlicher Instrumentalfehler in t und δ gefunden werden. Diese Beobachtung schon zwischen August 30 und Sept. 4 anzustellen, war mit Ausnahme von $\frac{1}{2}$ Stunde in der Nacht des 1^{ten} Sept. wegen trüben Himmels nicht möglich. Ich verliess mich also auf die (später bestätigte) unwandelbare Stellung des Instruments, und erreichte meinen Zweck erst in den Nächten des 4, 7, 9, 10, 11, 12 und 13^{ten} Sept.; in denen ich die gedachten Correctionen durch etliche Hundert Einstellungen bekannter Sterne ermittelte. Hierzu waren aber noch folgende Vorkehrungen nöthig. Da in der Dunkelheit das Kreismikrometer nur schwierig zu erkennen war, und

deshalb die Pointirung der Mitte zweifelhaft ausfiel, befestigte ich am Objectivende ein halbcylindrisches Stück Papier, welches seitlich beleuchtet, durch seinen Reflex das Gesichtsfeld genügend erhellte. Bei dieser Einrichtung konnte aber das am Tage vor das Objectiv gesetzte Rohr nicht gebraucht werden, weshalb ich genöthigt war, um der Biegung wegen dasselbe Uebergewicht an jener Stelle zu lassen, das Rohr dort unterhalb des Objectivendes zu befestigen.

Wegen der grossen Anzahl der Beobachtungen kann ich sie hier des Raumes wegen nicht im Einzelnen mittheilen. Ich gebe also nur die Resultate nebst ihren wahrscheinlichen Fehlern. Die Sternörter wurden aus *Piazzi*, *Lalande* u. *Bessel* genau auf den scheinbaren Ort gebracht, dabei aber die Aenderung des scheinbaren Ortes zwischen der Zeit dieser Beobachtungen und jener des Cometen, als unbedeutend ausser

Acht gelassen. Die Refraction ist in aller Schärfe berechnet. Setze ich die Summe aller localen Fehler an einer bestimmten Stelle des Stundenkreises $= \xi$, also $= (\alpha' - \alpha)$, wo α' die scheinbare AR. des Sterns, α die von Refraction u. Uhrstand befreite Differenz ($T - t$) ist, und die Summe aller localen Fehler an einer bestimmten Stelle des Declinationskreises $= \psi = (\delta' - \delta)$ indem δ' die scheinbare Decl. des Sterns, δ die von Refraction befreite abgelesene Decl. bedeutet, so hat man im Folgenden die, der jedesmaligen Lage des Fernrohrs während der Tagbeobachtungen entsprechenden Correctionen mit dem Zeichen, welche zu ($T - t$) und δ hinzugelegt, die scheinbaren AR. und δ . des Cometen darstellen. Des Raumes wegen stelle ich hier ξ und ψ , nach t und δ geordnet, zusammen; t bedeutet das Mittel der Stundenwinkel für jegliche Gruppe von Beobachtungen.

$t = 20^h 50^m$	$\xi = +1^m 49^s 22$	$\pm 0^s 09$	$\cos$	4^06	$\delta = +13^08$	$\psi = -1' 859$	$\pm 0' 039$
21 11	49,86	0,34	$\cos$	7,2	12,3	2,178	0,004
(*) ₁ 21 59	49,58	0,30	$\cos$	12,3	11,5	1,831	0,064
22 11	49,98	0,22	$\cos$	7,0	9,1	1,912	0,029
(*) ₂ 22 21	50,13	0,29	$\cos$	11,4	8,9	1,749	0,047
22 29	49,45	0,18	$\cos$	4,4	7,2	2,110	0,029
22 50	49,85	0,25	$\cos$	4,4	7,1	2,045	0,038
23 6	49,58	0,21	$\cos$	7,1	7,0	2,069	0,020
23 8	49,99	0,17	$\cos$	4,2	4,6	1,540	0,019
23 23	50,56	0,18	$\cos$	1,6	4,4	1,444	0,005
0 13	50,86	0,18	$\cos$	4,2	4,2	2,189	0,052
0 41	50,41	0,15	$\cos$	1,2	4,1	2,198	0,054
2 52	49,44	0,19	$\cos$	1,0	1,6	2,132	0,021
3 7	49,89	0,24	$\cos$	13,9	1,2	2,225	0,053
3 38	48,83	0,17	$\cos$	0,7	1,0	2,048	0,023
3 42	48,45	0,20	$\cos$	1,0	1,0	2,177	0,028
4 42	47,35	0,41	$\cos$	0,5	0,7	1,870	0,025
5 38	47,55	0,23	$\cos$	9,1	+ 0,5	-1,890	$\pm 0,064$
(*) ₃ 5 41	+1 48,78	$\pm 0,21$	$\cos$	8,9			

Betrachtet man zuerst die Werthe ξ , so lässt sich ohne erheblichen Zwang durch sie eine regelmässige krumme Linie darstellen, deren Annahme ich für die definitiven Werthe von ξ zur Correction der Cometenörter vorgezogen habe. Durch diese Curve spricht sich die Aenderung aus, welche durch die allgemeinen Fehler des Instruments im Pole und im Aequator, in den einzelnen Stundenwinkeln hervorgerufen wird. Durch die Werthe ψ aber lässt sich keine derartige Curve bestimmen. Der Sprung bei $\delta = 4\frac{1}{2}^0$ ist in den folgenden Nächten wiederholt auf's Schärfste untersucht worden; es wird aber in obigen Werthen nichts geändert. ξ bei $t = 21^h 59^m$ (*)₁ gilt nur für einen Nonius (*)₂ und (*)₃ sind bei dunklem Gesichtsfelde beobachtet und unsicher; sie sind für die Darstellung der Curve nicht benutzt worden. Diese Curve verliert bei $t = 4^h 30^m$ schon ihre Regelmässigkeit, weshalb ich ξ für $5\frac{1}{2}$ Uhr besonders bestimmt habe. Unter den Werthen ψ gilt der zweite nur für Nonius 2. Gehörigen

Ortes ist der Unterschied beider Nonien berücksichtigt worden.

Indem ich der Kürze wegen, die Tafel für die Werthe ξ nach der Curve, deren Argumente die Stundenwinkel von 10 zu 10 Zeitminuten sind, nicht mittheile, beschränke ich mich darauf, die definitiven Correctionen zusammenzustellen. Ich setze sonach: $(\xi + \tau) = \text{Instrumentalfehler} + \text{Uhrstand}$ für die AR., und $\psi = \text{der Correction der Declination}$, wie ich sie angewandt habe, folgendermaassen:

	Sternzt.	$(\xi + \tau) =$		$\psi =$
Aug. 30	15 ^h 0 ^m	+1 ^m 50' 20	+0 ^m 0' 00	-1' 86
30	9 28	1 52,20	0 29,81	2,18
31	10 38	1 52,62	0 30,21	2,18
Sept. 1	17 8	1 47,96	0 40,92	1,83
1	8 28	1 49,52	0 45,13	2,05
1	9 46	1 50,01	0 45,70	2,07
1	10 33	1 50,76	0 46,39	2,07
2	11 0	+1 50,38	+0 46,56	-2,07

	Sternzeit.	$(\xi + \tau) =$		$\psi =$
Sept. 2	8 ^h 0 ^m	+1 ^m 49 ^s 43	+0 ^m 54 ^s 10	-1'45
2	9 44	50,03	0 54,71	2,19
2	10 7	50,15	0 54,87	2,19
2	10 24	50,26	0 54,98	2,19
3	11 31	50,48	0 55,40	2,20
3	10 40	50,35	1 2,94	2,13
4	11 54	50,32	1 3,43	2,22
4	14 2	49,55	1 4,28	2,05
4	14 54	48,72	1 4,59	2,18
4	16 1	+1 47,35	+1 5,01	-1,88

Werden diese Werthe an die Mittel der oben mitgetheilten $(T-t)$ und δ . angebracht, so erhält man endlich die folgenden scheinbaren Cometenörter, bei denen ich auch die Bruchtheile der Secunde mit hinsetze, weil es einmal Gebrauch ist.

	M. Olm. Zt.	AR. ☞	δ . ☞	
Aug. 30	4 ^h 20 ^m 25 ^s 1	173 ^o 14'	+14 ^o 0' 1 ^s 8	(4)
30	4 31 25,0	173 14 13 ^s 8	—	(3)
30	22 50 52,2	172 48 3,0	12 11 9,6	(6)
31	0 0 49,4	172 45 42,1	12 4 18,0	(10)
Sept. 1	6 25 59,9	171 46 59,4	8 49 48,6	(9)
1	21 43 22,9	171 10 3,7	7 6 21,0	(2)
1	23 0 43,1	171 7 1,2	6 57 54,0	(7)
1	23 48 13,1	171 4 53,2	6 52 45,6	(13)
2	0 14 46,7	171 4 3,0	6 49 51,6	(11)
2	21 16 59,3	170 8 44,8	4 25 8,4	(1)
2	22 55 31,2	170 1 40,2	4 13 4,8	(10)
2	23 17 43,3	170 0 36,9	4 10 27,0	(11)
2	23 35 30,7	169 59 45,1	4 8 30,6	(13)
3	0 41 34,8	169 56 59,4	4 0 48,0	(10)
3	23 46 59,7	168 46 15,7	1 18 46,2	(10)
4	1 1 28,0	168 42 12,1	1 10 0,0	(2)
4	3 8 58,8	168 35 48,9	0 55 18,0	(2)
4	4 0 11,1	168 32 52,5	0 49 8,4	(3)
4	5 7 11,1	168 29 58,0	+ 0 41 40,8	(3)

Zwischen Aug. 30 und September hat man nach *Bruhns* zweiter Ephemeride ungefähr

(Rechn. — Beob.)

in AR. von -15° bis -27° , in Decl. von $-8'$ bis zu $+2'$.

Anmerkung.

Von diesen 18 Positionen ist die erste unsicher; die einzelne Einstellung Septbr. 2. 21^h16^m ist, wie ich aus der Vergleichung mit der Ephemeride sehe, um 2 Bogenminuten falsch. Die andere lassen mich hoffen (wenigstens die auf 6—13 Einstellungen beruhenden Positionen), dass ihr absoluter Fehler nur um 10" bis 25" herum liegen werde. Erwägt man, dass bei den gewöhnlichen Methoden, und bei zuverlässigen Beobachtern unter Umständen 10—20" nicht jedesmal

geradezu unvermeidlich sind, so geht meine Meinung dahin, dass diese Tagbeobachtungen, wenn ihrer mehrere zu einem Mittel vereinigt werden, und man diesem sodann ein verhältnissmässig geringeres Gewicht beilegt, für die Bahnbestimmung von Nutzen sein können.

Da es für diesen Fall einiges Interesse hat, zu wissen, wie nahe bei der Sonne der Comet beobachtet worden ist, so habe ich noch folgende Rechnung gemacht. Es war der scheinbare Abstand des Cometen vom nächsten Sonnenrande:

Aug. 30	4 ^h 5 = 14 ^o 9
31	0,0 = 13,1
Sept. 1	6,4 = 10,7
2	0,2 = 9,4
3	0,7 = 7,9
4	1,0 = 7,8

Woraus man ersieht, dass ich den Cometen nahe um die Zeit seines kleinsten scheinbaren Abstandes von der Sonne gesehen habe.

Beobachtungen des Cometen am Meridiankreise.

Diese sind von dem Herrn Prälaten v. *Unkrechtsberg* versucht, aber jedesmal durch Gewölk gerade um die Zeit der Culmination gestört worden. Die beiden Rectascensionen, vollständig reducirt, sind folgende:

Aug. 31. AR. ☞ = 11^h30^m54^s56. Es konnte nur der erste Faden, und zwar mangelhaft beobachtet werden; gerade in diesem Moment trat auch der Rand einer sehr kleinen dünnen Wolke, der Einzigen am ganzen Himmel, an den Faden, und verliess den 7^{ten} kurz nachher, als diesen auch der Comet verlassen hatte. Der Ort kann durch Interpolation mit meiner letzten nahe um diese Zeit angestellten Beobachtungen nur etwa bis auf 2^s übereinstimmend dargestellt werden, wobei noch zu bemerken, dass der Fehler auch auf meiner Seite liegen kann.

Sept. 3. AR. ☞ = 11^h19^m30^s13. 5 Fäden bei wolkegem Himmel beobachtet, wodurch die Sichtbarkeit des Cometen sehr erschwert wurde. Nehme ich an, dass hier die Uhr 20^s unrichtig abgelesen worden sei, so würde die Position mit meiner Beobachtung 10 Minuten später, völlig übereinkommen, wenn man mit der bekannten Bewegung die eine auf die andere reducirt.

Olmütz 1853, Sept. 28.

J. F. Jul. Schmidt.