DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinalwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Begründet von Dr. Paul Börner.

Zweiundzwanzigster Jahrgang.

Redaction: Prof. Dr. A. Eulenburg und Dr. J. Schwalbe, Berlin. — Verlag: Georg Thieme, Leipzig.

Lichtensteinallee 3.

Am Karlsbad 5.

Seeburgstr. 31.

INHALT.

- Originalartikel:** I. Aus der gynäkologischen Universitätsklinik in Freiburg i. B.: Brüste und Stillen. Von Geh. Rath Prof. Dr. A. Hegar.
II. Zum jetzigen Stand der Frage nach der Verwerthbarkeit der Röntgen'schen Strahlen für medicinisch-chirurgische Zwecke. Von Ober-Stabsarzt I. Classe Dr. Schjerning und Stabsarzt Dr. Kranzfelder in Berlin.
III. Aus dem Regierungshospital für Farbige in Kamerun: Wundheilung bei der schwarzen Rasse. Von Dr. Albert Plehn, Regierungsarzt.
IV. Aus der inneren Poliklinik des israelitischen Krankenhauses in Hamburg: Beitrag zur Barlow'schen Krankheit. Von Assistenzarzt Dr. Pinner.
V. Aus der inneren Abtheilung des städtischen Krankenhauses am Friedrichshain in Berlin: Beitrag zur bacteriologischen Diagnose

- der epidemischen Genickstarre mittels der Lumbalpunktion. Von Assistenzarzt Dr. W. Holdheim.
VI. Eine einfache Methode der Gegenfärbung bei Bacterienuntersuchungen. Von Assistenzarzt I. Classe Dr. Knaak in Itzehoe.
VII. **Aus der ärztlichen Praxis:** Operative Heilung eines frei in die Bauchhöhle perforirten Ulcus ventriculi. Von Dr. Strauch in Braunschweig.
VIII. **Standesangelegenheiten:** Zum Entwurf einer neuen Prüfungsordnung. Von Dr. O. Mankiewicz in Berlin. — Der Fall Asch in Eisenach.
IX. Nachtrag zu dem Aufsatz „Kugeln im Gehirn“ in No. 33 dieser Wochenschrift. Von Prof. Dr. A. Eulenburg.
X. **Kleine Mittheilungen.**

I. Aus der gynäkologischen Universitätsklinik in Freiburg i. B.

Brüste und Stillen.¹⁾

Von Prof. Dr. Alfred Hegar.

Das Vorkommen überzähliger Brüste und Warzen hat neuerdings grosse Aufmerksamkeit erregt. Bei Männern hat man nicht nur Rudimente, sondern selbst so gut ausgebildete Milchdrüsen vorgefunden, dass Kinder gestillt werden konnten. Nicht ganz selten ist eine euterähnliche Gestalt der Brüste, welche niederen Menschenrassen als Eigenthümlichkeit zukommt. Ich beabsichtige nicht, diese thierähnlichen Bildungen näher zu erörtern, und habe sie nur angeführt, weil sie beweisen, dass Keimanlagen sich erhalten können und zuweilen zur Entwicklung kommen, welche den frühesten Vorfahren des Menschengeschlechts angehört haben.

Die alltäglich vorkommenden Abweichungen in Grösse und Form der Brüste haben für uns ein viel grösseres, praktisches Interesse. Hierher gehören regelwidrige Kleinheit dieser Organe, Mangel an Drüsengewebe und ebenso abnorme Kleinheit der Warze, welche zuweilen nur die Grösse einer ganzen oder halben Erbse erreicht. Häufig sind fehlerhafte Formen, wie Theilung und Zerklüftung durch zahlreiche Furchen, so dass das Aussehen eines Condyloms entstehen kann und die Volksbezeichnung Dornwarze berechtigt erscheint. Ferner die platte Warze, welche sich nicht oder nur wenig über die Umgebung erhebt, und die Hohlwarze, welche unter deren Niveau bleibt. An diese schliessen sich die Zustände, bei welchen eine tiefe, trichterförmige Einsenkung auf der Spitze des Gebildes sichtbar ist oder ein mehr oder weniger breiter und tiefer quer verlaufender Graben sich vorfindet, welcher sehr ausgebildet die Warze in zwei Abschnitte zerlegt. Die Entstehung dieser Mängel und Gebrechen fällt theilweise in das extrauterine Leben. Beengende und zusammenschnürende Kleidungsstücke, wozu viele Volkstrachten gehören, schlechte Pflege der Haut und des Körpers überhaupt, unzureichende und unpassende Nahrung, schwere depascirende Erkrankungen bewirken in der Kindheit und Jugend eine mangelhafte Ausbildung jener wichtigen Organe.

Eine offenbar nicht geringe Zahl der Gebrechen hat aber ihren Ursprung schon im intrauterinen Leben; die Dornwarze scheint hierher zu gehören, und sicher ist dies von der Hohlwarze nebst den sich an sie anschliessenden Deformitäten. Bei dem Fötus liegen

die Warze und deren Hof unter dem Niveau der Umgebung und erheben sich erst allmählich gegen Ende der Schwangerschaft.

Die Zeit, in welcher ein Bildungsfehler oder eine Entwicklungshemmung für uns in die Erscheinung tritt, ist nun nicht immer die Zeit, in welcher der Grund zu dem Uebel gelegt wurde; das kann schon viel früher geschehen sein. Der Bau eines myopischen Auges documentirt sich erst ziemlich spät in der Kindheit oder gar in der Jugend, während doch häufig genug eine Vererbung vorliegt. Eine Entwicklungsstörung der Brust, welche im extrauterinen Leben sich zeigt, kann sehr wohl in der Embryonalzeit, und eine Entwicklungsstörung, welche sich in dieser bemerklich macht, ihre Quelle in den Keimanlagen haben. Diese sind ohne Zweifel häufig theilhaftig, wofür jene oben erwähnten thierähnlichen Bildungen, die Vererbung einer gewissen Beschaffenheit der Brüste in Familien, das Auftreten besonderer Eigenthümlichkeiten bei einzelnen Stämmen und Rassen den Beweis liefern.

Die grosse Verschiedenheit in dem anatomischen Bau der Brüste bei verschiedenen Individuen, Völkern und Klassen ist schon lange bekannt. Man trifft auch nicht selten in Gegenden, in welchen die Bevölkerung sich sonst nicht durch eine gute Beschaffenheit jener Organe auszeichnet, einen Bezirk, wie eine Insel eingesprengt, aus welcher zahlreiche und gute Ammen bezogen werden. Leider besitzen wir keine grösseren und genaueren Untersuchungen über diesen Gegenstand und sind mehr auf gelegentliche Wahrnehmungen und Beobachtungen beschränkt, welche wohl ein im allgemeinen richtiges Bild verschaffen mögen, einen tieferen Einblick in diese Verhältnisse jedoch nicht gewähren können.

Um diesen wenigstens für das badische Oberland zu erhalten, habe ich seit mehreren Jahren in meiner Klinik Untersuchungen über Brüste und Stillgeschäft vorgenommen. Auch Fehling hat in Stuttgart, Basel und Halle ähnliche Beobachtungsreihen zusammengestellt.

Ich werde Sie hier nicht mit viel Zahlen und Statistik belästigen und theile Ihnen daher nur einige Hauptresultate mit, wobei ich wesentlich nur die Erfahrungen benütze, welche auf den geburtshülflichen Abtheilungen gemacht worden sind, auf welchen wir ein in Alter, Stand und Beschäftigung ähnliches Beobachtungsmaterial haben, grösstentheils Personen vom Lande, welche sich längere oder kürzere Zeit meist als Dienstmädchen in der Stadt aufgehalten hatten.¹⁾

¹⁾ Die Resultate dieser Untersuchungen sind bereits in extenso veröffentlicht: Wiedow, Beschaffenheit der Brüste und Stillgeschäft, Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie, sechster Congress in Wien 1895, S. 787. Töpfer, Statistisches zur Beschaffenheit der weib-

¹⁾ Vortrag, gehalten auf der Versammlung oberbayerischer Aerzte zu Freiburg i. B. am 15. Juli 1896.

Die Beschaffenheit der Brüste war in Freiburg eine gute, wobei freilich zu bedenken ist, dass in der Schwangerschaft diese Organe durch Hyperämie und Secretion stärker anschwellen und so leicht eine grössere Drüsenmasse vortäuschen, als vorhanden ist. Ausserdem haben aber auch derartige Schätzungen einen etwas subjectiven Charakter. Nur 11—12% eigentlich schlechte Brüste wurden notirt; dagegen waren die Warzen häufig recht mangelhaft, allein 3,6% Hohlwarzen und ausserdem noch 7,2% deforme Warzen, welche sich wenig oder nicht zum Stillen eigneten. In Halle fand Fehling mehr schlechte und weniger ganz gute Brüste, dagegen eine grössere Anzahl mittlerer Güte, ein Unterschied, welcher vielleicht der Subjectivität der Schätzung zuzuschreiben ist. Hohlwarzen waren zu 6,7% der Wöchnerinnen vorhanden. Der Beschaffenheit der Brüste entspricht im allgemeinen die Stärke der Secretion; grosse und gut gebildete Brüste geben meist ausreichend Milch, schlechte Brüste liefern fast keine oder keine genügende Milch.

Freilich giebt es Ausnahmen. Auch eine gute Brust schliesst Milchmangel nicht aus, und gelegentlich vermag auch einmal eine schlechte Brust hinreichend Nahrung für ein Kind zu bieten. Der feinere Bau der Drüse, die allgemeine Ernährung, welche das Material zu dem Secret herzustellen hat, und die Innervation, welche die Absonderung einleitet und unterhält, spielen ebenfalls eine Rolle. Uebrigens täuscht man sich auch zuweilen. Man hat eine grosse Brust vor sich mit viel Fettgewebe, aber wenig Drüsen-substanz oder ein kleines Organ, welches relativ viel der letzteren enthält. Bei der Warze entscheidet fast allein die anatomische Beschaffenheit. Eine fehlerhafte Grösse und Form dieses Gebildes macht das Stillen unmöglich oder erschwert es wenigstens in hohem Grade.

In Freiburg konnten nur ca. 54% der Wöchnerinnen etwa zehn Tage das Kind ausreichend mit Milch versorgen, die Verhältnisse gestalteten sich in Basel etwa ebenso, in Stuttgart lagen sie jedoch noch ungünstiger, hier betrug die Zahl jener Personen nur 25%; in Halle hatten 65% der Wöchnerinnen ausreichend Milch für jenen Zeitraum.

Nach einer ungefähren Schätzung nehme ich an, dass ungefähr 30% der Wöchnerinnen ihr Kind etwa sechs Monate hindurch ausschliesslich an der Brust zu ernähren vermögen, und ich glaube, dass diese Zahl für Freiburg nicht zu niedrig gegriffen ist.

Fehling nimmt für Halle einen Procentsatz von 50% an, indem er von den 66% Wöchnerinnen, welche bis zum zehnten Tag ausreichend Milch besaßen, etwas optimistisch, wie mir scheint, nur einen Abzug von 16% macht. Jedenfalls ist aber das Verhältniss in Halle entschieden besser als hier, wenn auch durchaus nicht befriedigend.

Von guten Brüsten mit Fähigkeit zum Stillen hängt zu einem grossen Theil das Leben und die Gesundheit der Nachkommen ab. In Norwegen und Schweden, wo fast alle Kinder lange Zeit hindurch an der Mutterbrust ihre ausschliessliche Nahrung finden, ist die Sterblichkeit des ersten Lebensjahres etwa 11%, während sie in Württemberg, wo die meisten Kinder aufgefüttert werden, schon bis zu 35% angestiegen ist. Aus französischen Berichten erfahren wir, dass die Kindersterblichkeit in einem Arrondissement, welches Paris mit Ammen versah, während der mit dem Aufhören dieses Geschäftsbetriebes verbundenen Belagerung auf die Hälfte herabsank. Weniger gewürdigt ist der Einfluss des Stillens auf die spätere Kraft und Gesundheit der Menschen. Auch hierüber haben wir eine aufklärende Mittheilung aus französischer Quelle. Ein Arrondissement, aus welchem viele Ammen nach auswärts gingen, hatte bei der ersten Musterung 30% Militärdienstuntaugliche, ein anderes Arrondissement, aus welchem keine Ammenauswanderung stattfand, nur 18%, und doch war das erste wesentlich von Ackerbautreibenden, das letztere grösstentheils von industrieller Bevölkerung bewohnt; sonst ist das Verhältniss zwischen ländlicher und industrieller Bevölkerung gerade umgekehrt.

Die Betrachtung der Brüste hat aber noch eine andere für den Arzt recht wichtige Bedeutung. Man kann aus der Beschaffenheit dieser Organe einen Schluss auf die Constitution einer Frau, speciell natürlich auf ihre Fähigkeit zum Fortpflanzungsgeschäft machen. Entschiedene Fehler der Brüste und Warzen sind geradezu als Degenerationszeichen anzusehen. Man hat mit dieser Bezeichnung viel Missbrauch getrieben und förmlich Reclamen damit gemacht. Sehr verschiedene Dinge wurden da in einen Topf zusammengeworfen, Bildungsfehler und Entwicklungsstörungen durch Krankheiten und Schädlichkeiten jeder Art im extrauterinen Leben hervorgebracht, dann die, welche in der Fötalperiode entstehen, und endlich die, welche in einer regelwidrigen Keimanlage ihre

Quelle finden. Die Bedeutung ist aber danach sehr verschieden und um so grösser, je früher der Ursprung liegt. Aber auch die Ursache ist zu berücksichtigen. Eine schiefe Nase, welche ja auch als Degenerationszeichen figurirt, ist sehr hoch anzuschlagen, wenn eine Asymmetrie des ganzen Skelets, oder auch nur des Schädels zugrunde liegt, während sie ganz unwichtig erscheint, wenn sie durch einen Schlag jene Gestalt angenommen hat. Das Degenerationszeichen hat um so mehr Werth, je mehr es der Ausdruck einer allgemeinen oder wenigstens einer ganzen Systeme oder wichtiger Körperabschnitte umfassenden Störung bildet, daher die Feststellung eines einzigen solchen Merkmals oft nichts besagt, während die Anwesenheit mehrerer solcher Zeichen ein Urtheil erlaubt. Mit einer sorgfältigen Kritik dieser Art können uns ungewöhnliche und fehlerhafte Bildungen und Entwicklungsstörungen, die der Brust, zu einem richtigen Urtheil über die Constitution eines Menschen verhelfen.

In alten barbarischen Zeiten war wohl jedes Kind, das nicht an der Brust lag, dem Tode verfallen. Dadurch, dass also alle Kinder, welche die für ihre erste Lebenszeit passende Nahrung entbehrten und die daher auch von der Mutter eine weniger gute Constitution erbten, starben, war eine vortreffliche Auslese hergestellt. Diese ist, wenn auch in abgeschwächtem Grade, in neuerer Zeit noch vorhanden. In Württemberg betrug bis vor kurzem die Kindersterblichkeit des ersten Lebensjahres 34%. Die Neugeborenen wurden zum bei weitem grössten Theil aufgefüttert, und zwar meist recht unzuweckmässig mit Mehlbrei und ähnlichen unpassenden Speisen. Die Mortalität der späteren Lebensperioden gestaltete sich günstig, z. B. besser als in Preussen. Das, sagte man, ist durch die Auslese bewirkt. Ein Kind, welches den Brei vertragen konnte, ist gegen alles gestählt. Nur die starken Schwaben sind übriggeblieben, und deshalb ist die Sterblichkeit bei den Erwachsenen verhältnissmässig gering. Diese Argumentation will mir nicht einleuchten. Eine so grobe Schädlichkeit, wie schlechte Ernährung in dem ersten Lebensjahre, geht auch bei kräftigen Naturen nicht ohne weitere Folgen vorüber. Viele werden dauernd leiden und nicht wenige sich nie ganz davon erholen, wenigstens sich nie so entwickeln, wie dies ohne jene nachtheiligen Umstände stattgefunden hätte.

Folgende Erklärung der geringeren Sterblichkeit in späteren Lebensperioden ist wohl richtiger. Eine, wenn auch nicht bedeutende Anzahl von Frauen in Württemberg, etwa 20 bis 25%, stillt ihre Kinder. Diese, welche also eine vortreffliche Nahrung erhalten und die im Durchschnitt kräftigere Natur ihrer Mutter geerbt haben, drücken dann die Mortalitätsquote der späteren Lebensperiode herab.

In neuester Zeit, wo die Surrogate der Muttermilch so sehr verbessert worden sind, tritt diese Auslese mehr und mehr in den Hintergrund, und es steht zu befürchten, dass, wie dies auch schon von anderer Seite ausgesprochen worden ist, die Brüste, wie andere ausser Gebrauch gesetzte Körpertheile, zu rudimentären Organen werden. Dies ist nun gewiss nicht wünschenswerth. Ganz abgesehen von ästhetischen Rücksichten kann doch der Soxhlet die Mutterbrust nicht vollständig ersetzen. Wie aber helfen? Vor noch nicht langer Zeit hat man, in der Annahme, die Frauen wollten nicht stillen, die Schwierigkeit damit kurz zu beseitigen gesucht, dass man ihnen das Stillen als Pflicht auferlegte. Von Leuten, die sich aus der Verhetzung der Gesellschaftsclassen ein Geschäft machen, ist sogar den Frauen aus dem Mittelstande und den gebildeten Classen vorgeworfen worden, sie suchten sich ihrer Mutterpflichten so rasch als möglich zu entledigen und sie auf eine proletarische Amme abzuschieben. Nie ist ein ungerechterer Vorwurf gemacht worden, welcher nur aus gänzlicher Unwissenheit und Unbekanntschaft mit den einschlägigen Verhältnissen hervorgegangen sein kann. Der Procentsatz der von Ammen ernährten Kinder ist minimal. Er beträgt im badischen Oberlande 0,2% der Kinder und selbst in Berlin nur 0,98, also nicht einmal ein Procent. Dann wählen die Aerzte aus guten Gründen prinzipiell keine Ammen aus dem Proletariat, wenigstens nicht aus der hier gemeinten Fabrikbevölkerung, und endlich würden die Frauen guter Stände mit wenig Ausnahmen gern stillen, wenn sie nur könnten. Eine kräftige, gesunde Frau, welche genügend Milch besitzt, hat viel weniger Mühe mit dem Säugen als mit dem Auffüttern, zumal das Kind bei letzterem leichter einmal an Verdauungsstörungen erkrankt und auch hierdurch Arbeit und Sorge macht. Der Vergleich zwischen Selbststillen und Ammen fällt für ersteres noch günstiger aus. Abgesehen vom Geldpunkt, machen der oft nothwendige Wechsel der Ammen, die zahlreichen Aerger-nisse und Scheerereien gerade diesen Ersatz für die Mutterbrust zu dem unangenehmsten. Mit dem Commando „stillt!“, welches man den Frauen zugerufen hat, ist es gerade so gegangen, wie mit dem Befehl, das Corset abzulegen. Schon vor etwa einem Jahrhundert hat der berühmte Anatom Semmering zwei Streitschriften gegen jenes Kleidungsstück veröffentlicht, und von ihm

rührt auch die Abbildung her, in welcher der Brustkorb der medicaischen Venus dem einer Modedame gegenübergestellt ist. Ihm sind bis in die neueste Zeit viele Aerzte in der öffentlichen Verdammung des Corsets nachgefolgt. Allein dieses ist geblieben, aus dem guten Grunde, weil die weibliche Bevölkerung, wenigstens die der Städte, es gar nicht entbehren kann. Die Frauen brauchen einen Apparat zur Stützung und zum Zusammenhalten ihres Oberkörpers, und man sollte, statt immer die Verwerflichkeit der Schnürbrust zu predigen, sich lieber mit der Construction eines Apparats beschäftigen, welcher einen Ersatz ohne die Nachtheile böte. Noch besser wäre es, den Frauen gute Knochen, Bänder und Muskeln zu verschaffen, in deren Besitz sie das Alles nicht nöthig hätten.

So wäre es auch das Beste, wenn man den Frauen zu guten Brüsten und reichlicher Milch verhelfen könnte; das Selbststillen fände sich dann von selbst.

Wir vermögen gegen die Schädlichkeiten anzukämpfen, welche im extrauterinen Leben die Ausbildung der Brüste und ihrer Function hemmen. Durch Vermeidung jeder festanschliessenden, einschnürenden, zu warmen Kleidung, passende Pflege der Haut und des ganzen Körpers, gute Ernährung, Bewegung, frische Luft lässt sich viel thun. Ob man aber bei dem Leben in den Städten und den heutzutage so sehr gesteigerten Ansprüchen an die Bildung der weiblichen Jugend sehr viel erreichen werde, ist mir zweifelhaft. Landluft und als Hauptbeschäftigung eine den Kräften angemessene körperliche Arbeit im Freien passen nicht zur Erziehung eines weiblichen Culturmenschen unserer Zeit.

Gegen die Einwirkungen, welche während des Fötallebens die Entwicklung der Brüste hemmen, vermögen wir nichts zu thun, da sie uns gänzlich unbekannt sind. Dagegen sind wir wohl imstande, den Folgen entgegenzutreten, welche aus regelwidrigen Keimanlagen für die Ausbildung der Brüste entstehen. Ich glaube jedoch nicht, dass die dazu erforderlichen Maassregeln dem allgemeinen Geschmack entsprechen. Man müsste eine mit schlechten Milchdrüsen versehene Bevölkerung mit einem Stamme zu kreuzen versuchen, welcher sich durch eine gute Ausbildung jener Organe auszeichnet. Noch besser wäre eine methodische Auslese. Die heirathsfähigen jungen Männer müssten sich verschwören, nur Mädchen mit vollem Busen zu heirathen. Freilich könnten die heutzutage so sehr emancipationslustigen Mitglieder des schönen Geschlechts auch den Spiess umkehren. Da Vererbung durch den Sohn von der Mutter auf die Enkelin stattfindet, so könnten sie sich verschwören, nur solche Männer zu erhören, welche an der Mutterbrust gesogen haben.