Ueber Manganoxydulsalze; von Zeller.

Der Verf. hat gesucht, aus den häufig als nutzlos weg-
geworfenen Rückständen der Sauerstoff- und Chlorbereitung
die Manganoxydulsalze zu gewinnen. Die entfernte Aussicht,
daß diese Salze in Leberkrankheiten von Anwendung seyn
könnten, möchte ein unzulänglicher Grund zu dieser Arbeit
seyn. Die Manganrückstände sind dreierlei Art:

- 1) von der Sauerstoffbereitung; man erhält schwefelsaures
Oxydul, mit Eisensalzen vermischt. Glühen und Aus-
laugen, längst bekannt.
- 2) Chlorrückstand von Kochsalz, Braunstein und Schwefel-
säure. Das Glaubersalz läßt sich meistens herauskry-
stallisiren, besonders in der Kälte. Wegen der vielen
freien Säure ist es nicht vortheilhaft mit kohlen-
sauren Alkalien zu fällen.
- 3) Chlorrückstand von Salzsäure und Braunstein. Eine
braune Flüssigkeit, entwickelt beim Kochen noch etwas
Chlor. Da er gewöhnlich nicht viel freie Säure enthält,
so kann man ihn am besten benutzen, um daraus koh-
len- saures Manganoxydul zu fällen, woraus dann alle
übrigen Salze dargestellt werden.

Vom gleichzeitig vorhandenen Eisen kann man die Lauge
befreien 1) durch Krystallisiren des Manganchlorürs, langwei-
lig, 2) durch schwaches Glühen und Auflösen, 3) durch par-
tielle Fällung. Man fällt mit ein wenig kohlen-
saurem Kali, und digerirt den Niederschlag mit der Flüssigkeit; das örtlich
gefällte kohlen- saure Manganoxydul löst sich wieder auf, und
fällt das Eisenoxyd; man prüft zuweilen auf Eisen mit Rea-
gentien, und wenn die Anzeigen ausbleiben, filtrirt man und
fällt vollends aus.

(Journ. für pract. Chem. Bd. 7. S. 137.)