Beobachtungen auf der Bilker Sternwarte, von Herrn Dr. Brünnow.

E u n o m i a.

1851	M. Bilker Zt.	α .	δ .
Sept. 19	8 ^h 50 ^m 7 ^s 5	274° 41' 25 ^u 6	-22° 35' 28 ^u 2
24	7 59 23,2	275 41 48,0	22 18 19,6
26	7 53 3,9	276 8 2,7	22 11 30,4
Octb. 13	7 21 7,5	280 37 57,1	21 11 36,6
15	7 40 10,5	281 14 48,3	21 3 55,3
18	7 3 59,0	282 10 59,9	20 52 36,2
18	7 56 39,4	282 11 16,1	-20 52 35,1

Comet von d'Arrest.

1851	M. Bilker Zt.	α .	δ .
Sept. 23	14 ^h 30 ^m 46 ^s 7	65° 45' 59 ^u 8	-1° 55' 55 ^u 0
24	14 40 55,9	65 50 12,8	-2 10 2,6
27	14 55 20,2	65 57 22,2	-2 51 27,3

Alle Oerter sind scheinbare, und wegen der Refraction corrigirt.

Dr. Brünnow.

Beobachtungen der Sonnenfinsterniss am 28^{ten} Juli 1851 in Rixhöft.

Ich erlaube mir, einige Nachrichten über die Beobachtungen der totalen Sonnenfinsterniss für die Astr. Nachr. mitzuthellen.

Um den grösstmöglichen Erfolg den Beobachtungen zu sichern, schien es wünschenswerth, mit den reichlich vorhandenen Hilfsmitteln der Sternwarte nicht nur verschiedene Beobachtungspunkte auszurüsten, sondern dieselben auch so zu wählen, dass die Wahrscheinlichkeit einer, durch die Ungunst des Wetters bewirkten Störung am kleinsten wäre, mithin die Entfernung der Beobachtungspunkte innerhalb der totalen Zone in Preussen die möglich grösste sei. Die beiden in dieser Beziehung von Herrn Prof. Peters und mir auserwählten Beobachtungsorter, waren Rixhöft und Kuglick in der Nähe von Johannisburg. Nach ersterem ging ich mit Herrn Fearnley, Observator an der Sternwarte in Christiania, nach letzterem Herr Prof. Peters mit Herrn Studiosen Schumacher.

Der Ort Rixhöft liegt hart an der sich dort bis zu einer Höhe von 160 bis 170 Fuss erhebenden Ostseeküste, etwa $\frac{1}{2}$ Meile N. O. von dem Punkte, an welchem die Halbinsel Hela mit dem festen Lande zusammenhängt. Ausser dem dortigen Leuchthurne und dem dazu gehörigen Wärterhause bietet sich dem Auge, auf dem dort weit ausgedehnten mit Haidekraut spärlich bewachsenem Sandboden, keine Abwechselung dar. Der Horizont von N. O. durch N. bis N. W. vom Meere gebildet, wurde nach der Landseite hin durch ferne Hügelketten begrenzt.

Die Instrumente, welche wir für die Beobachtungen mitgenommen hatten, waren:

- 1) Ein Fernrohr von *Fraunhofer*, von 34 Lin. Oeffnung.
- 2) Ein Passage-Instrument von *Repsold*.
- 3) Einen Spiegelkreis von *Pistor*, nebst Quecksilberhorizont.
- 4) Ein Reisebarometer von *Newmann*.

5) Ein Thermometer.

6) Ein Chronometer von *Winnerl*.

7) Ein Chronometer von *Kessels*.

Das letztere hatte Herr Navigations-Schuldirektor *Albrecht* in Danzig die Güte mir zu leihen.

Am 21^{ten} Juli trafen wir in Rixhöft ein, das Wetter war bis zum 26^{ten} Juli für unsere Zeit- und Breitenbestimmungen ziemlich günstig, deren definitive Resultate ich Ihnen später gleichfalls mittheilen werde. Die Herren Professoren *v. Littrow* und *Ragona* aus Palermo, die mich schon früher durch die Nachricht erfreut hatten, nach dem von mir erwähnten Beobachtungsort zu kommen, trafen beide am 24^{ten} Juli in Rixhöft ein. Die Erfahrungen, welche der erste der beiden genannten Herren schon bei der totalen Sonnenfinsterniss 1842 in Wien gemacht hatte, waren durch die mündlichen Mittheilungen desselben, für uns von vielfachem Nutzen. Am 27^{ten} Juli war das Wetter den ganzen Tag hindurch unfreundlich und trübe und gab der Hoffnung wenig Raum, am folgenden Tage günstig für die Beobachtung zu werden. Dennoch war ganz unerwartet am 28^{ten} Juli, schon von 9 Uhr Morgens ab, die Sonne unausgesetzt von Wolken frei. Die einzige Störung, die noch zu fürchten, war der heftig wehende Wind, weshalb ich, um so viel als möglich die Erschütterungen des Fernrohres zu beseitigen, meinen Standpunkt in einer tief gegrabenen Sandgrube nahm und das Fernrohr auf den Erdboden selbst hinstellte.

Meine Aufmerksamkeit richtete ich nun zuerst auf denjenigen Punkt des Sonnenrandes, an dem der Mond eintreten musste, konnte jedoch kurz vor dem Beginn der Finsterniss keine Veränderung, weder in der Atmosphäre noch an dem Sonnenrande, bemerken.

Um 3^h27' 39" 8 mittl. Zeit in Rixhöft beobachtete ich den Anfang der Finsterniss und verfolgte nun mit dem *Fraunhofer*-schen Fernrohre und mit einer 20maligen Vergrösserung unausgesetzt ihre Zunahme, wobei ich mich eines von Herrn *Plüssl* gefertigten, weisses Licht gebenden Blendglases bediente. Nachdem ich einige Notizen aufgeschrieben und darauf wieder in das Fernrohr sah, bemerkte ich, etwa um 3^h57', dass der noch kurz vorher schwarz erscheinende Mondrand mit einem Saume von orangerother Farbe umgeben war, und dass etwa 10 bis 15 Sekunden später, der bis dahin ebenfalls farblos gewesene Sonnenrand einen Anflug von Violett annahm. Dieses violette Licht wurde nach und nach am Sonnenrande immer dunkler und verbreitete sich, in den feinsten Abstufungen, bis zur Mitte der Sonnensichel, wo es dann in ganz schwaches Gelb überging. Der farbige schmale Ring um den sichtbaren Mondrand war mit der Mondscheibe concentrisch, dagegen erschien das violette Licht sichelförmig ohne sich bis zu den Hörnerspitzen der Sonnensichel auszudehnen. Diese letzteren glaubte ich zu dieser Zeit abgerundet zu sehen, allein bei näherer und aufmerksamerer Betrachtung, sah ich, dass sie in feine Spitzen ausliefen, auf jeder aber ein glänzender Punkt wie eine Perle vorhanden war, die nach einigen Sekunden erst an der unteren, dann an der oberen Hornspitze verschwanden.

Um 4^h0' wurde das violette Licht am Sonnenrande merklich schwächer, dasselbe schien sich gleichsam in einem Punkte des westlichsten Sonnenrandes zu concentriren um dort allmählig zu verschwinden, worauf an derselben Stelle sogleich ein im grauen Lichte schimmernder runder Flecken, an Grösse etwa der Jupiterscheibe gleich, sichtbar wurde. Dieser Flecken nahm nach und nach an Grösse zu, ohne jemals scharf begränzt zu sein, sein Licht verschwand allmählig mit dem hellgelben Lichte der Sonnensichel. Innerhalb dieses Fleckens bildeten sich sehr kleine runde Flecken, welche das Ansehen von kleinen Bläschen oder glänzenden Fischschuppen hatten. Der Mondrand der nun, 4^h20' etwa, seinen farbigen Ring verloren hatte, bedeckte nach und nach diese Bläschen, und erst 30 bis 40 Sekunden vor der Totalität konnte ich, von dem Glanze der Sonnensichel überstrahlt, dieselben nicht mehr wahrnehmen.

Zur Zeit als der Mond schon mehr als die Hälfte der Sonnenscheibe bedeckt haben mochte, fiel mir das stärkere Gelb und die grössere Intensität des Sonnenlichtes in der Nähe der beiden Hörnerspitzen auf, und dieses um so mehr, als ich sah, dass dieses Licht nicht gleich hell blieb, sondern bald stärker, bald schwächer wurde. Etwas später sah ich das Licht nicht strahlenförmig, sondern flammenartig aus den beiden Hörnerspitzen hervorzucken, sich aber nicht bis zur

Mitte der Sichel erstrecken, woselbst das Sonnenlicht fortwährend im matten Gelb ruhig glänzte. Dieses Aufflammen hörte, nachdem die Sichel schon sehr schmal geworden war, zuerst in dem unteren Horne auf, wurde dagegen auf kurze Zeit in dem oberen noch sehr glänzend. Um mich zu versichern, ob die eine oder die andere Erscheinung meinem Fernrohre oder auch dem Blendglase zuzuschreiben war, habe ich sowohl den Mond- als auch den Sonnenrand abwechselnd in die Mitte und an den Rand des Objectivglases gebracht, so wie auch durch Drehung des Blendglases, demselben eine andere Stellung gegeben, konnte durch beides aber keine Veränderung wahrnehmen. Nach beendeter Totalität habe ich dieses Flammen der Hörnerspitzen in umgekehrter Weise sich wiederholen sehen, dasselbe nahm nach und nach mit der Zunahme der Sonnensichel ab, und hörte endlich ganz auf. Von farbigen Rändern wie vorher, habe ich jedoch nichts bemerkt.

Um 3^h51' bemerkte ich zuerst deutlich die Abnahme der Beleuchtung irdischer Gegenstände, nach 4^h1' war die vor mir liegende Ebene schon in einem eigenthümlichen Dufte eingehüllt, über dem Meere, nach W. zu, schien ein Nebel wie Höhenrauch zu liegen, durch den sich die entfernten höheren Meeresufer noch erkennen liessen, der Meereshorizont war jedoch nicht mehr vom Himmel zu trennen, beide flossen scheinbar zusammen. In N.O. und O. erschien der Horizont dunkelblau und scharf begrenzt. Gegen 4^h10' sah ich in N.W. bis über N. hinaus, über dem Horizont in 10° bis 15° Höhe, einen hellen mattgelben Lichtbogen liegen, der scharf gegen das dunkle Meer abstach. Weisses Papier hatte ein mattes, dem Auge angenehmes Licht, auf dem der scharf begrenzte Schatten des Bleistiftes ein Blau von Indigo zeigte. Der heftige Wind hatte bereits bedeutend nachgelassen, so dass um 4^h13' ungefähr schon völlige Windstille eingetreten war. Nach 5 Minuten verkündete das Knarren der Windfahne auf dem Leuchthurme, das Herannahen des Finsternisswindes, der einige Sekunden später mit Heftigkeit heranstürmte und nur kurze Zeit währte. Die darauf folgende Windstille hielt bis zum späten Abende an.

Zu der Zeit, als schon die ganze vor mir liegende Gegend, namentlich die Haide, einen tief dunkelbraunen Ton angenommen hatte, bemerkte ich, dass weisser Sand, der etwa in einer halben Meile Entfernung an verschiedenen höher gelegenen Stellen des Meeresufers zu Tage trat, in einem so glänzenden, nicht ruhigen, sondern zitternden Lichte leuchtete, dass es schien, als würde das Licht von grossen Eisstücken reflectirt. Um 4^h21' sah ich, dass beide Hörner der Sonnensichel durch feine schwarze Linien getheilt waren, und dass das untere in zwei, das obere in drei äusserst feine Spitzen

auslief. Von dem nicht auf der Sonne sich projecirenden Theil des Mondes, habe ich nichts mit völliger Ueberzeugung wahrnehmen können.

Von jetzt ab richtete ich meine ganze Aufmerksamkeit auf das Verschwinden des Sonnenlichtes, wenige Augenblicke vor diesem Moment, der um $4^h 29' 19''$ eintrat, schien sich die zarte Lichtlinie durch 2 oder 3 schwarze Punkte zu theilen und die Corona trat sogleich darauf in ihrer vollen Pracht hervor.

Von einem glänzenden, den schwarzen Mondrand umgebenden Ringe, dessen Glanz nicht blendete und dem Lichte, mit welchem Saturn an schönen Abenden sich zeigt, ähnlich war, verbreitete sich fast concentrisch ein Lichtschein, der schwächer, wie der Ring, sich allmählig in das Grau des Himmels verlor. Die ganze Glorie schien in vollkommener Ruhe zu sein, einzelne ein wenig gekrümmte Strahlenbüschel traten in derselben bemerkbar hervor, deren Lage nicht ganz in der Richtung der Radien zu liegen schien. An derjenigen Stelle, wo ich früher einige Flecken und Fackeln auf der Sonne wahrgenommen hatte, bemerkte ich zuerst eine helle Hervorragung in einem farbigen Lichte glänzen, das in der Mitte zwischen rosaroth und carmin lag, über und unter dieser Stelle sah ich deren noch zwei von gleicher Farbe, kleiner und weniger hell. Indem ich einige Notizen aufschrieb und das Auge vom Fernrohr abwandte, bot sich demselben, in der ganz unerwarteten Farbenpracht des Himmels, ein überraschender Anblick dar, der mich unwiderstehlich hinzog, mehrere Sekunden hindurch mit blossen Augen das nie Gesehene und nie Gesehene zu schauen. Grosse, mit dem Horizonte parallel laufende Strichwolken schienen sich mit dem Verschwinden des letzten Lichtfunkens plötzlich gebildet zu haben, die theils violett, theils braunröthlich gefärbt, einen Hintergrund zeigten, der im reinsten gesättigsten Gelb glänzte, und der ganzen Gegend eine Beleuchtung gaben, die weder mit der schönsten Morgen- noch Abenddämmerung einen Vergleich aushält.

Königsberg 1851. October 1.

Ein flüchtiger Blick zeigte mir Venus, Merkur, Jupiter, Spica und α Bootis, und das Meer in tief schwarzblauer Färbung, auf dem ich in weitem Umkreise das Kräuseln der Wellen und in N. O. die Segel eines entfernten Schiffes wahrnehmen konnte. Als ich hierauf das Auge wieder an das Fernrohr brachte, sah ich, dass die mittlere Hervorragung an Grösse zugenommen hatte und nach oben sichelförmig gekrümmt war. So sehr ich es wünschte jetzt eine stärkere Vergrösserung zu haben, so wagte ich es doch nicht die Okulare zu wechseln.

Mit dem Hervorbrechen des ersten Sonnenstrahles, um $4^h 32' 31''$, verschwanden nicht nur diese Hervorragungen nebst der Corona, sondern auch ebenso plötzlich hörte die Farbenpracht des Himmels auf, von dem Gewölk war jede Spur verschwunden, und statt dessen nahm zuerst der Himmel eine graue Färbung an, die nach und nach in das reinste Blau überging.

Noch an demselben Abende wurden die Instrumente eingepackt und wir verliessen am folgenden Morgen Rixhöft, uns Allen sagend, dass es kaum einen günstigeren Ort für die Beobachtung der Finsterniss hätte geben können. Zum Schlusse erlaube ich mir, Ihnen noch die Mittheilung zu machen, dass die auf der Sternwarte selbst angestellten Versuche, mit Hülfe der Aufstellung des Heliometers ein Daguerresches Bild von der Corona zu erhalten, vortrefflich durch den geschickten Daguerreotypisten, Herrn *Berkawski*, gelungen sind. Die Protuberanzen sind so deutlich auf dem Lichtbilde zu erkennen, dass Herr Observator Dr. *Wichmann* sich versucht fühlte, ihre gegenseitige Lage daraus zu bestimmen. Sobald der Kupferstich dieses interessanten Bildes, im vergrösserten Maassstabe, fertig sein wird, werde ich Ihnen das Nähere darüber mittheilen.

Herrn *Fearnley's* Bericht, über die von ihm gemachten Beobachtungen in Rixhöft, mit welchem derselbe mich erfreut hat, lege ich dem meinigen für die Astronomischen Nachrichten bei.

Busch.

Beobachtung der totalen Sonnenfinsterniss am 28^{ten} Juli 1851, von Herrn *Fearnley*.

Mit Freuden hatte ich den gütigen Vorschlag des Herrn Dir. *Busch*, mit ihm nach Rixhöft zu gehen, angenommen, und habe in der That allen Grund gehabt damit wohl zufrieden zu sein, nicht nur, dass der gewählte Ort und die sonstigen Umstände so vortheilhaft wie möglich waren, sondern auch, weil unser 8tägiger, an sich schon angenehmer und interessanter Aufenthalt dort, nach der Ankunft der Herren Prof. *v. Littrow* und

Prof. *Ragona* ein erhöhtes Interesse, einen noch fröhlicheren Character annahm.

Die Zeichnungen, welche meinen gegenwärtigen Bericht begleiten sollten, werden erst später erscheinen, da sie Herr Director *Busch* für eine Abhandlung zu lithographiren wünscht, die unter anderem auch unsere astronomischen Beobachtungen zur Bestimmung der geographischen Lage von Rixhöft enthalten wird.