Zum Beleg dafür und zum Studium der Entwicklungsbedingungen jenes Ferments hat v. Tieghem eine Reihe von Versuchen angestellt, deren einige hier folgen. Es wurden 25 Grm. Harnstoff in 1 Liter Hefenwasser aufgelöst und nach Eintragen von ein wenig Ferment in verschlossener Flasche stehen gelassen. Nach 36 Stunden war aller Harnstoff verschwunden, die anfangs trübe Flüssigkeit hatte sich wieder geklärt und einen aus der *Torulacee* und Krystallen bestehenden Bodensatz gebildet.

Stellt man eine Harnstofflösung in Hefenwasser an die Luft, so entwickelt sich bisweilen das Harnstoffferment allein und dann geht die Zersetzung des Harnstoffs schnell vor sich, öfters aber entstehen Infusorien und zahlreiche *Mycodermen*, die *Torulacee* aber erscheint spät und in Folge dessen auch spätes Ammoniakalischwerden der Flüssigkeit. Ist in Hefenwasser einmal die Harnstoffgährung eingeleitet, dann kann man sie durch neuen Zusatz von Harnstoff mehrmals fortsetzen, ohne dass das Ferment leidet, bis etwa 8 Proc. Harnstoff zerlegt und etwa 13 Proc. kohlen-saures Ammoniak in der Flüssigkeit angehäuft sind.

Auch in reinem Wasser, ohne Anwesenheit eines Eiweissstoffes, kann die Gährung des Harnstoffs vermittelt jenes Ferments bewerkstelligt werden, doch geht sie langsam von statten und steht nach einigen Tagen still. In Gegenwart von Zucker und Phosphaten schreitet ebenfalls die Gährung langsam fort, aber sie beendet sich vollständig.

Die Behauptung, dass Bierhefe, indem sie eine Zuckerlösung in Gährung bringt, gleichzeitig anwesenden Harnstoff ebenfalls gähren mache, stellt v. Tieghem als irrig dar. Im Gegentheil kann man durch Zusatz von Zucker und Bierhefe zum Harne den Harnstoff längere Zeit gegen Zersetzung schützen, weil die Flüssigkeit dann sauer reagirt.

Die Hippursäure im Harn der Pflanzenfresser erleidet eine Zersetzung durch dasselbe Ferment in Glykoll und Benzoësäure. (*Journ. für prakt. Chem.* Bd. 93. 3.)

B.

Einwirkung des Oxalsäureäthers auf den Harnstoff.

H. Hlasiwetz theilt die Arbeit des Grafen A. Grabowski über diesen Gegenstand mit. Wäre der Harnstoff wirklich, wie z. B. Baeyer annimmt, C^2O^2, H^1N^2 ,

so müsste in ihm eine Substitution von H^2 durch das Radical der Oxalsäure Parabansäure liefern, nach der Gleichung:

Als jedoch Harnstoff mit einer entsprechenden Menge von Oxaläther in Glasröhren eingeschmolzen 1 Stunde lang auf 125^0 erhitzt worden war, wurden als Zersetzungsproducte Oxamid und Allophansäureäther, letzterer $= C^8H^8N^2O^6 = C^4H^5O, C^4H^3N^2O^5$ erhalten. Die Bildung dieser Producte geschieht nach der Gleichung:

Die Krystalle des Allophansäureäthers waren nadelförmig, in kaltem Wasser schwer, in heissem vollständig löslich, kaum löslich in kaltem, völlig löslich in siedendem Alkohol. Sie reagirten neutral und ihre Lösung wurde von Metallsalzen nicht gefällt. In einem Rohre erhitzt, sublimirte der Körper weiss und wollig. Auf Platinblech geschmolzen, entwickelt er einen mit röthlich-blauer Flamme verbrennenden Dampf. Mit Kalilauge im Destillirapparate gekocht, entwickelte er Alkohol und Ammoniak. (*Sitzungsber. der k. k. Akad. der Wissensch. Math.-naturw. Classe. L. Bd. 5. Heft. II. Abth. S. 524—526.*)

H. Ludwig.

Glykolursäure.

Diese neue Säure ist von Rheineck aus dem Allantoïn dargestellt worden. Bei der Behandlung mit Natriumamalgam in schwach saurer Lösung verwandelt sich nämlich das Allantoïn in farblose Krystalle von der Formel $C^6H^6N^4O^4$, welche sich von der Formel des Allantoïns durch einen Mindergehalt von 1 At. Sauerstoff unterscheidet. Durch Kochen mit Barytwasser erleidet dieses Reductionsproduct eine Zersetzung; die Lösung enthält ein Barytsalz, welches nach dem Ausfällen des Baryts mit Schwefelsäure die neue Säure in farblosen und durchsichtigen Krystallen von der Formel $C^6H^6N^2O^6$ liefert. Hiernach kann die Säure als eine der Oxalursäure analoge Substanz betrachtet werden, worin an der Stelle des Radicals der Oxalsäure das der Glykolsäure enthalten ist, weshalb sie als Glykolursäure zu be-