sowohl das Scleromucin wie die Sclerotinsäure einschliesst und so wenig wie möglich von wirksamen Bestandtheilen befreit ist, und wird unter stetem Umrühren im Dampfapparat zur dicken Extractconsistenz verdampft und sofort zweimal hintereinander mit höchst rectificirtem Weingeist, der vorher zum Sieden erhitzt ist, behandelt. Es geschieht dies erstens, um etwaige zurückgebliebene Harz- und Oelpartikel, zweitens, um das Extract so viel wie möglich von der in heissem Alkohol löslichen Mycose und den sog. acribus zu befreien.

Schliesslich trennt man den Alkohol durch Decantation. Diese spirituöse Lösung giebt beim Abdampfen einen körnigen Rückstand von scharfem, widerlichem Geschmack, während andererseits das rückständige Extract vom anhaftenden Spiritus befreit eine gleichmässige braune Masse darstellt von angenehmem Mutterkorngeschmack und Geruch. Es repräsentirt soviel wie möglich die wirksame Substanz des Secale und ist frei von leicht zersetzbaren und überflüssigen Extractivstoffen. Die wässrige Lösung ist gelb, höchst klar und von vorzüglicher Wirksamkeit. Dieses Extract ersetzt alle dialysirten und anderen Extracte, da es sowohl innerlich wie zu subcutanem Gebrauche gleich gut zu verwenden ist und verschiedene Präparate zu verschiedenen Zwecken vollständig unnöthig macht.

Ptomaine und ptomaineähnliche Substanzen.

Von Dr. Carl Arnold in Hannover.

In den letzten Jahren hatte ich sehr oft Veranlassung, die Cadaver von Thieren, auf den Verdacht der Vergiftung hin, einer chemischen Untersuchung zu unterwerfen. Ausser in 3 Fällen, wo sich Strychnin in grösserer Menge isoliren liess, und in 2 Fällen, wo Phosphorvergiftung vorlag, isolirte ich aus dem Magen- und Darminhalte von 5 Hunden und von 2 Pferden nach dem hinlänglich bekannten Verfahren von Stas-Otto jedesmal ein bräunliches, dickflüssiges Liquidum, von stark alkalischer Reaction, schwach aromatischem Geruche und kaum bitteren Geschmacke, welches nach dem Neutralisiren mit Salzsäure und vorsichtigem Verdunsten ein deutlich krystallisirendes Salz gab. Ich untersuchte späterhin noch 7 mal

den Mageninhalt von vor wenig Minuten mit Blausäure getödteten, ganz gesunden Hunden (die zur Tödtung unserer Anstalt überwiesen worden waren) und es gelang mir in 4 Fällen wiederum die Isolirung des erwähnten Körpers. Allerdings betrug in allen Fällen die Ausbeute stets nur 2—3 Centig. Es gelang in keinem Falle, die wässerige mit Kalilauge versetzte Lösung durch Schütteln mit Aether vollständig von dem betreffenden Körper zu befreien. Die isolirte Substanz zeigte die allgemeinen Reactionen der Alkalöide, z. B. mit Phosphorwolfrämsäure, Phosphormolybdänsäure, Quecksilberchlorid, Platinchlorid, Jodkaliumjodquecksilber, Pikrinsäure, Gerbsäure, Jod-Jodkaliumlösung, Metawolfrämsäure die bekannten Fällungen. Frösche zeigten nach der subcutanen Application der mit Salzsäure neutralisirten Substanz Lähmungserscheinungen, erholten sich jedoch nach einiger Zeit. Kaninchen blieben bei derselben Behandlung munter.

Auch bei Körpertemperatur vorgenommene künstliche Verdauungsversuche — 5 g. Pepsin, 100 g. frischbereitetes Fibrin, $2\frac{1}{2}$ Liter Wasser und 25,0 g. Salzsäure von 1,125 specifischem Gewicht wurden 30 Stunden bei $37-38^{\circ}$ C. macerirt — ergaben nach dem Stas-Otto'schen Verfahren 0,04 g. einer Substanz von dem erwähnten chemischen, physikalischen und physiologischen Verhalten. Weder aus dem Gehirne, der Milz, Leber und den sonstigen Organen der oben erwähnten Thiere konnte ich einen ähnlichen Stoff erhalten, dagegen erhielt ich in 2 Fällen aus dem Urin der Thiere, der vor dem Tödteten aufgefangen war und dann frisch aus der Blase entnommen, nach dem Stas-Otto'schen Verfahren beim Verdunsten des Aethers einige ölige Tröpfchen, die die allgemeinen Alkalöidreactionen gaben. Selbstverständlich waren alle zum Stas'schen Verfahren verwendeten Stoffe, sowie auch das Pepsin vorher auf ihre völlige Reinheit geprüft worden, auch ist bei Anwendung des Stas-Otto'schen Verfahrens eine Verwechslung mit Peptonen, welche ja auch die allgemeinen Alkalöidreactionen gaben, ausgeschlossen. Ferridcyankaliumlösung wurde von dem betr. Körper rasch reducirt.

Ptomaine selbst habe ich aus gefaulten Thiercadavern mit Leichtigkeit erhalten. Aus einer grossen Grube, in der an dem hiesigen Institute alle todtten Thiere aufbewahrt werden, entnahm ich von zwei mindestens 8 Tage in der Grube gelegenen Hunden, die schon in hohe Fäulniss übergegangen waren, im ganzen 500 g. Muskelfleisch und behandelte es genau nach Stas-Otto. Ich erhielt 1,6 g. eines flüssigen Alkaloids, das bei Kaninchen, subcutan beigebracht,

Starrkrampf mit nachfolgendem Tode herbeiführte. Auch bei einem zweiten Versuche erhielt ich aus 500 g. faulem Pferdefleische nahezu 0,5 g. derselben Substanz. Es scheint mir demnach keinem Zweifel zu unterliegen, dass aus jedem faulen Fleische grössere Mengen von Ptomainen dargestellt werden können. Leider hat es mir bis jetzt an Zeit gemangelt, die Untersuchungen fortzusetzen.

Hannover. chem. Laborat. d. k. Thierarzneischule.

Spektralanalytische Reactionen.

Von Karl Hock.

Die von mir im Januarhefte des Archivs für Pharmacie gemachten Mittheilungen über gefärbte ätherische Oele veranlassten Herrn C. H. Wolff im letzten Hefte hervorzuheben, dass das spektralanalytische Verhalten des Chamillenöls von ihm bereits im Jahre 1878 veröffentlicht wurde. Bei einem aufmerksamen Durchlesen meiner Mittheilung wird indess jeder Leser sofort ersehen, dass es sich hier gar nicht um die an und für sich sehr unbedeutende Prüfung eines einzelnen Oeles handelt, sondern um eine vergleichende spektroskopische Untersuchung speciell der blau gefärbten Antheile sehr verschiedener ätherischer Oele. Ich habe durch die Prüfung einer ganzen Anzahl der von mir selbst dargestellten blauen Oele und blauer Producte aus ätherischen Oelen den spektralanalytischen Nachweis geliefert, dass sie alle denselben blauen Farbstoff gemeinsam besitzen, eine Thatsache, welche durch die vorhergegangene vereinzelte Prüfung des Chamillenöls nicht berührt wird.

Was meine Mittheilung im Archiv der Pharmacie 1881. 19. pag. 358 betrifft, so handelt es sich dort um neue besonders charakteristische Spektralreaktionen von Belladonnin, Delphinin und Digitalin etc., welche in den mir wohlbekannten Arbeiten Pöhls nicht enthalten sind. Die erste Anwendung des Spektroskopes bei Ausmittlung der Gifte geschah übrigens, was Wolff nicht bekannt zu sein scheint, im Jahre 1862 durch Professor G. Valentin¹ in

1) Valentin, Gebrauch des Spektroskopes 1862. 102.