Schreiben des Herrn Collegienraths *Mädler*, Directors der Dorpater Sternwarte, an den Herausgeber.

Dorpat 1846. October 27.

Den *Le Verrier*'schen Planeten konnten wir der trüben Witterung wegen erst am 10^{ten} in einigen heitern Momenten aufsuchen, und erst am 20^{sten} war die Heiterkeit zur Zeit der Culminationen hinreichend, um gute Ortsbestimmungen zu erhalten.

Herr Dr. *Clausen* bestimmte ihn am Meridiankreise:

	AR. app.	Decl. app.
Octbr. 20	21 ^h 51' 39" 04	—13° 32' 40" 1
21	37,00	32 54,1
25	29,66	33 29,6
26	27,79	33 39,6

Am Refractor versuchte ich den Durchmesser zu bestimmen. Des tiefen Standes ungeachtet konnte ich doch schon mit 210 mal. Vergrößerung ziemlich deutlich eine Scheibe wahrnehmen. Mit 600 mal. erhielt ich folgende Messungen:

	Dorp. St.-Zt.			
Oct. 10	20 ^h 50'	2" 394	helle Fäden.	6 Ables.
10	21 20	2,300	helles Feld.	6 „
12	21 25	2,459	helles Feld.	6 „
20	21 0	2,347	helle Fäden	6 „
26	21 20	2,538	helles Feld.	12 „

Die Luftbeschaffenheit war am 26^{sten} die günstigste; der Planet ruhig und die Scheibe so gut begrenzt, als es bei nur 17° Höhe möglich ist.

Sollte die Benennung des neuen Planeten nach dem Namen des Entdeckers nicht zu manchen Inconvenienzen führen? Werden die Zusammensetzungen mit centrisch, graphisch und dergl. sich so bequem als bisher gestalten? und wie soll verfahren werden in dem doch schon vorgekommenen Falle, daß Ein Astronom mehrere Planeten findet? *Le Verrier*'s Name wird sicher auch dann nie untergehen, wenn sein Weltkörper einen Namen führt, der denen der übrigen Planeten analoger ist.

Mädler.

Anmerkung. Der Name des neuen Planeten ist (siehe Beilage zu Nr. 581) von Herrn *Arago* bestimmt, dem der Entdecker sein Recht den von ihm entdeckten Planeten zu benennen übertragen hatte. Mir scheinen die Zusammensetzungen mit centrisch und graphisch, deren der Herr Director der Dorpater Sternwarte erwähnt (abgesehen davon, daß sie wohl selten vorkommen werden) keine bedeutenden Schwierigkeiten der Einführung des gewählten Namens entgegenzusetzen, und sollte Herr *Le Verrier* noch einen zweiten Planeten entdecken, so steht ihm ja dann, wie jetzt, das Recht zu den Namen dieses zweiten Planeten zu bestimmen, bei welcher Bestimmung mag er sie selbst machen, oder einem Anderen übertragen, er gewiß jede mögliche Verwechslung mit dem jetzt entdeckten Planeten vermeiden wird.

S.

Schreiben des Herrn *Hackel*, Astronomen auf der Freiherrlich Senftenberg'schen Sternwarte, an den Herausgeber.

Senftenberg 1846. October 24.

Ich habe die Ehre, Ihnen einige Positionen des *Le Verrier*'schen Planeten zu übersenden, welche mit einem Kreismicrometer des parallaktisch montirten Fernrohrs erhalten wurden.

Die Beobachtungen beginnen mit dem 9^{ten} October, als dem ersten heiteren Abende, an welchem ich, gestützt auf Ihr Planeten-Circular und ein von mir entworfenes Kärtchen kleiner *Bessel*'schen Zonensterne, an der bezeichneten Stelle

einen Stern 8ter Größe wahrnahm, der, wie die fortgesetzte Beobachtung am folgenden Abende zeigte, sich sofort als der neue Wandelstern erwies.

Der *Le Verrier*'sche Planet wurde an jenem und den darauf folgenden Abenden mit mehreren Sternen, entnommen der Zone *Bessel*'s 119, mehrfach verglichen; deren mittlere Oerter für 1846 Jan. 0 folgende sind:

Vergleichssterne x...	(9.) Gr.	327° 44' 57" 85	—13° 41' 55" 9
— a...	(9.) Gr.	328 1 43,32	—13 35 21,4
— b...	(7.8) Gr.	328 11 43,58	—13 45 31,4
— c...	(9.) Gr.	327 57 4,39	—13 26 13,7

Hiemit sind die Beobachtungen:

		M. Senftenb. Zt.	AR.	Decl.	Beob.	
1846.	October 9	9 ^h 24' 26" ⁵	Pl. = x + 16' 35" ⁵⁵	Pl. = x + 11' 2" ⁶	5	Hackel.
			= b - 10 6,15	= b + 14 38,4	—	
		9 46 34,3	= b - 10 0,75	= b + 15 6,8	1	Baron Senftenberg
	— 10	10 44 19,2	= b - 11 11,70	= b + 15 16,8	3	H. Baron.
		11 27 38,8	= x + 15 39,90	= x + 11 10,2	6	Hackel.
			= b - 11 7,35	= b + 14 34,4	9	
	— 11	9 6 30,9	= x + 14 58,05	= x + 10 32,4	6	
			= b - 11 45,30	= b + 14 8,5	6	
	— 13	7 58 39,3	= x + 13 25,65	= x + 9 56,7	5	
			= b - 13 22,20	= b + 13 23,6	10	
			= a - 3 16,05	= a + 3 39,7	5	
	— 14	9 9 49,9	= x + 12 37,65	= x + 9 50,4	5	
			= b - 14 1,50	= b + 13 17,1	6	
			= a - 4 5,55	= a + 3 23,5	3	
			= c + 0 40,35	= c - 5 40,6	4	
	— 17	8 26 3,5	= x + 10 38,10	= x + 9 18,7	6	
			= b - 16 8,4	= b + 12 38,0	6	
			= a - 6 4,2	Mitte	6	
			= c - 1 24,6	= c - 6 28,3	5	
	— 21	8 29 46,1	= x + 8 17,96	= x + 8 8,2	7	
			= b - 18 26,89	= b + 11 47,4	7	
			= a - 8 25,99	= a + 2 11,8	7	
			= c - 3 46,26	= c - 7 12,8	7	
	— —	9 6 3,3	= b - 18 7,50	= b + 13 2,1	1	Baron
			= a - 8 37,50	= a + 3 1,9	1	Senftenberg.

Daraus ergeben sich folgende scheinbare Oerter des *Le Verrier'schen* Planeten.

		M. Senftenb. Zt.	AR. $\mathbb{L}$	Decl. $\mathbb{L}$	Stern x.	H.
1846.	October 9	9 ^h 24' 26" ⁵	328° 2' 29" ¹⁵	—13° 30' 29" ⁶	b.	H.
			33,27	29,2	b.	H.
		9 46 34,3	38,74	0,8	b.	Bar. S.
	— 10	10 44 19,2	328 1 27,60	—13 29 50,8	b.	H. Baron.
		11 27 38,8	33,28	30 22,1	x.	H.
			31,84	33,3	b.	„
	— 11	9 6 30,9	328 0 51,35	—13 30 59,9	x.	„
			53,81	59,3	b.	„
	— 13	7 58 39,3	327 59 18,56	—13 31 35,7	x.	„
			16,54	44,3	b.	„
			22,37	18,1	a.	„
	— 14	9 9 49,9	327 58 30,47	—13 31 42,1	x.	„
			37,05	50,8	b.	„
			32,78	34,4	a.	„
			39,92	30,8	c.	„
	— 17	8 26 3,5	327 56 30,25	—13 32 13,9	x.	„
			29,58	30,1	b.	„
			33,46	—	a.	„
			34,10	18,7	c.	„
	— 21	8 29 46,1	327 54 9,35	—13 33 24,7	x.	„
			10,33	20,9	b.	„
			10,91	32 46,5	a.	„
			11,68	33 3,4	c.	„
	— —	7 52 18,3	12,75	mittelst des Passagenrohrs	„	
	— —	9 6 3,3	29,72	—13° 32' 6" ²	b.	H. Baron.
			—0,60	31 56,4	a.	„

Bei allen diesen Beobachtungen gingen Planet und Stern *c* scheinbar unten; die Sterne *x* und *b* aber oben durch's Kreismikrometer, während *a* die Mitte des Sehfeldes einzuhalten schien.

Was die Beobachtung vom 10^{ten} October betrifft, so scheint sie sehr unsicher zu seyn, weil der Planet, nur 14°

vom Horizont entfernt, nur zwischen Wolken erhascht werden konnte.

Bei der Planetenbeobachtung vom 21^{sten} October durch Herrn Baron v. Senftenberg war der Himmel mit dünnen Cirrus bezogen.

P. Hackel.

Schreiben des Herrn J. R. Hind an den Herausgeber.
Mr. Bishop's Observatory, Regent's-Park, London 1846. November 2.

My dear Sir.

I send you the details of my calculations relating to the Comet of 1590, I think you will be of the same opinion as myself, that the resulting places are remarkably accordant, when we consider the means employed by *Tycho* in his observations.

I have not been able to see the comet found here on October 18. since that day: the weather has been uniformly cloudy in the morning. I hope you have had more success at Altona, and shall be very glad to receive your observations.

I have calculated the element of *De Vico's* Sixth Comet from the Rome observation of September 23, Mr. *Wichmann's* on October 15. and Mr. *Petersen's* on the 21. of the same month.

Time of Perihelion passage 1846. Oct. 29, 74708 Grw. M. T.
Longitude of perihelion $98^{\circ}35'49''9$ } True Equinox
Ascending Node 4 41 3,7 } Nov. 0.
Inclination 49 41 17,1
Log. least distance .. 9,9193956
Motion — Direct.

The error in long. $\times \cos \text{lat.}$ on October 15 = +12", Error in lat. = -5". The Co-ordinate constants for the true Equin. of November 0 are:

$$\begin{aligned} x &= r \cdot [9,9991563] \cdot \sin(\nu + 186^{\circ}56'50'') \\ y &= r \cdot [9,4735634] \cdot \sin(\nu + 108^{\circ}29'45'') \\ z &= r \cdot [9,9807954] \cdot \sin(\nu + 95^{\circ}51'36'') \end{aligned}$$

The following ephemeris is computed from my elements for Noon, mean time at Greenwich.

1846	R. A.	Decl.	Log. Δ
Octbr. 29	13 ^h 13 ^m 43 ^s	+31° 0' 8"	0,0375
Novbr. 1	13 20 12	28 22,2	0,0528
4	13 26 5	25 49,5	0,0673
7	13 31 29	23 22,3	0,0809
10	13 36 29	21 0,2	0,0936
13	13 41 10	18 43,0	0,1053
16	13 45 35	16 30,5	0,1161
19	13 49 46	14 22,5	0,1261
22	13 53 45	12 18,7	0,1352
25	13 57 33	10 19,0	0,1434
28	14 1 11	8 23,2	0,1510
Decbr. 1	14 4 39	6 31,1	0,1577

We have made the following observations of *Le Verrier's* planet.

	Greenw. M. T.	AR.	δ	
Oct. 18	9 ^h 25 ^m 58 ^s	327°55'50"8	-13°32'13"9	5 obs.
20	9 54 10	327 54 46,0	-13 32 37,7	6 „
30	8 1 37	327 50 41,9	-13 33 54,6	5 „

These places are obtained by micrometrical comparisons with the Berlin star, assuming *Encke's* mean place. I believe the observations are very accurate.

J. R. Hind.

On the Comet of 1590.

The Comet of 1590 was observed by *Tycho Brahe* at Uraniburg. Pingré has published a part of the observations in his *Cometography* t. I. p. 554 and it is this series that I have reduced and calculated. The table given by Pingré contains the apparent times of observation, the distances of the comet from the stars of comparison the comets declinations for the same times as the distances, its altitude for nearly every observation and frequently its Azimuth from the South towards the West. For the positions, I have employed the distances from stars duly corrected for refraction and pa-

rallax and the comet's declinations corresponding to these distances similarly corrected. Two observations were made on the meridian March 11 and 12, these I have reduced in the usual manner assuming the latitude of Uraniburg $55^{\circ}54'26''$ and applying the mean refraction and the parallax in Altitude.

I first calculated the following ephemeris from *Carlini's* Solar Tables 1833 supposing the difference of meridians between Milan and Uraniburg as given in the *Connaissance des Temps* for 1846.