ARCHIV DER PHARMACIE.

XCIII. Bandes zweites Heft.

Erste Abtheilung.

I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

Noch ein Wort über das Verhalten des Terpentins-
öls gegen basisch-essigsaures Bleioxyd und die
Färbung des Bleicerats;

von

Dr. Joh. Müller in Emmerich.

Die nachfolgenden Bemerkungen sind hervorgerufen durch die Schlussbemerkung in der höchst willkommenen Arbeit des Herrn Collegen Rud. Schindler in Ziegenhals, Archiv der Pharmacie. 1845. Februar-Heft.

Dass ein Gemisch von *Ol. terebinth.*, *Acet. plumbic.*, *Spir. camphorat.* und *Liq. amm. caust.* sich zuerst milchigt, alsdann schwefelgelb und zuletzt tiefroth färbt, ist eine alte Sache. Diese Mischung wird hier und da gegen Frostbeulen mit Erfolg gebraucht. Schon im Jahre 1837 wurde dieser Gegenstand im Archiv, zweite Reihe, Band XI. Heft 1. Seite 52. von mir zu allererst besprochen. In demselben Hefte findet man Seite 54. eine Abhandlung unsers verehrten Brandes über denselben Gegenstand, hervorgerufen durch meine Versuche und im Band XIII. Heft 1. Seite 13 von 1838 lesen wir, dass dieser Gegenstand unserm Brandes Veranlassung gab, denselben bei der Naturforscher-Versammlung in Prag den 20. September 1837 vorzutragen. Die pharmaceutische Zeitung von 1838

Seite 45. brachte uns eine Bestätigung meiner Aussagen von unserm verehrten Dr. Geiseler in Königsberg.

Fortgesetzte Versuche mit vielen ätherischen und fetten Oelen riefen die Notizen von mir im 2ten Hefte des XV. Bandes des Archivs von 1838 über die gelbe Färbung des Bleicerats hervor, denen die von Herrn Schindler erwähnte Notiz im Centralblatte 1839, Seite 63. entnommen ist.

Was Herr Schindler über die Färbung der verschiedenen von ihm angewandten ätherischen und fetten Oele bemerkt, kann ich aus Erfahrung vollkommen bestätigen, da ich fast mit allen angeführten Oelen damals selbst operirte. Herr Prof. Liebig in Giessen, dem ich meine Versuche damals persönlich mitzutheilen Gelegenheit hatte, war der Ansicht, dass die Erscheinung einer eigenthümlichen in den Oelen sich bildenden Säure zuzuschreiben sein dürfte, welche Bleioxyd aufnehme. Was die Färbung des Bleicerats selbst betrifft, so habe ich durch mehrere Versuche veranlasst, auch noch eine andere Methode, ein stets gleichförmiges und sich nicht färbendes Cerat zu erhalten, ermittelt, welche denen, die nicht immer reines, frisches, gut ausgewaschenes Schweinefett (welches nach meiner Ansicht die erste Bedingung zur Erlangung einer weissen Salbe ist und bleibt) erhalten oder sich selbst ausschmelzen können, was im Sommer häufig der Fall ist, willkommen sein dürfte. Die Vorschrift ist folgende:

Rec. Stearin. $\bar{\text{z}}$ IV

Ol. Olivar. depur. $\bar{\text{z}}$ X

Liquata et ab igne remota paullulum Aqua destillata
admiscendo agitentur, donec refrixerint
admisc.

Acet. plumbic. $\bar{\text{z}}$ j Scrup. IV.

Misce exactissime.

Das *Ol. Olivar. depurat.* bereitet man sich auf folgende Weise. Man bringt $\bar{\text{z}}$ XXIV *Ol. Olivarum* und $\bar{\text{z}}$ jj *Calcar. ust.* in einem Glasgefässe ins Sandbad und schüttelt dieses Gemenge fleissig um. Nachdem man dasselbe 6 Stunden gelinde warm erhalten, entfernt man dasselbe aus dem

Sandbade, lässt den Kalk absetzen, giesst das Oel in eine andere Flasche, worin sich eine verdünnte Sodalösung befindet und digerirt wiederum in der Wärme einige Stunden unter öfterm Umschütteln. Nun trennt man die Sodalösung von dem Oele und wäscht dasselbe so lange mit Wasser fleissig aus, bis das Wasser nicht mehr alkalisch reagirt, worauf das Oel geschieden wird. Das so von allen wässerigen Theilen getrennte Oel ist ganz wasserhell und giebt mit Stearin und der entsprechenden Menge nach der Pharmakopöe genau bereiteten Bleiessig eine schöne weisse Salbe, welche nichts zu wünschen übrig lässt und nie gelb wird.

Ueber Bereitung der Butter aus süsser gekochter Milch;

von

Dr. L. Aschoff.

Die fette Substanz, welche in der Milch in Form kleiner durchsichtiger Kügelchen schwebt, und abgesondert unter dem Namen »Butter« bekannt ist, sammelt sich, da sie leichter, als die wässerigen Theile der Milch ist, nach einigen Tagen auf der Oberfläche derselben und bildet dann, vermengt mit etwas Käsestoff und einer Molken ähnlichen Flüssigkeit den Rahm oder die Sahne. Durch anhaltendes Schlagen dieses Rahms oder auch der Milch selbst vereinigen sich allmählig die darin enthaltenen Kügelchen zu aneinander hängenden Plättchen, die unter fortgesetztem Schlagen sich zu einer fetten Masse, der Butter, verbinden; die zurückbleibende Flüssigkeit wird Buttermilch genannt und enthält noch eine gewisse Quantität Fettkügelchen in der Schwebe. Eine vortheilhafte Bereitung der Butter beruht also auf einer möglichst vollkommenen Ausscheidung der Fettkügelchen, wobei der Geschmack derselben nicht leidet und die zurückgebliebene Milch am vortheilhaftesten zu verwenden ist.

Es giebt im Allgemeinen 3 Methoden, um Butter dar-