Ueber ein *Frauenhofersches* Filarmikrometer.

Von Herrn Professor *Struve* in Dorpat.

Durch die Verbesserungen des Professors *Frauenhofer* in München hat das Fadenmikrometer eine Vollkommenheit erreicht, welche dasselbe zu den feinsten Messungen, z. B. über die Entfernungen der Doppelsterne mit größtem Erfolge brauchbar macht. Die Hauptveränderungen, die der genialische Künstler mit dem früheren Fadenmikrometer vorgenommen, bestehen darin, daß erstlich beide Fäden unabhängig von einander durch ihre Mikrometerschrauben beweglich sind, so daß sie einer bey dem andern vorbeigehen können, ohne sich zu berühren, indem sie etwas unter der Oberfläche zweier auf einander abgeschliffener Messingplatten in feinen Strichen liegen. Hiedurch wird es möglich, jeden Winkel durch Wiederholung zu messen. Ausserdem hat der Künstler eine Erleuchtung durch zwei Lämpchen, die sich an beiden Seiten befinden, hervorgebracht, durch welche die Fäden, welche das Licht dieser Lampen reflectiren, als helle Fäden in vollkommen dunkeln Felde erscheinen, so daß die Beobachtung der feinsten Lichtpunkte mit diesem Mikrometer möglich wird. — Ein solches Mikrometer erhielt ich im vorigen Sommer, als ich in München war, und der Künstler liefs auf meinen Wunsch noch einen eingetheilten kleinen Kreis von 4 Zoll Durchmesser, nur in Grade getheilt anbringen, der an den feststehenden Theil der Ocularröhre angeschraubt ist, und längst welchem sich ein mit dem Mikrometer verbundener Index verschiebt, durch den es möglich wird, die Positionswinkel naher Sterne gegen den Parallelkreis auszumitteln. Dagegen blieb bey diesem Mikrometer die Fadenbeleuchtung im dunkeln Felde weg. Es war meine Absicht, diesen Apparat an den 5füßigen Achromat von *Troughton*, den die hiesige Sternwarte besitzt, von $3\frac{1}{2}$ Zoll Oeffnung anzubringen, und so zur Beobachtung der Declinationsdifferenz der Doppelsterne anzuwenden, um hiedurch die Lücke in den Beobachtungen derselben durchs Mittagsfernrohr, wodurch nur AR. Differenzen erhalten werden, auszufüllen. Zufällige Umstände haben verursacht, daß ich erst seit dem Anfange dieses Monats in regelmäßiger Thätigkeit mit dem so ausgerüsteten Fernrohre bin, und die Beobachtungen mit demselben scheinen mir so zu gelingen, daß ich nicht umhin kann, einige derselben dem astronomischen Publico mitzutheilen, um es auf dies herrliche Kunstwerk aufmerksam zu machen, so wie dem Künstler hier meinen Dank für diesen mir unschätzbaren Apparat öffentlich abzustatten. Die Anbringung des ganzen Apparats an das Fernrohr hatte keine Schwierigkeit,

die frühere Ocularröhre fiel weg, und vom Hauptrohr mußte etwas abgenommen werden. Hiedurch wurden nun die früheren Oculare unbrauchbar. Aber augenscheinlich hatte das Fernrohr in optischer Rücksicht bloß schon durch die Verwechselung der Englischen Oculare mit den Münchnern gewonnen. Ich hatte selbst mit 221facher Vergrößerung den Doppelstern ϵ *Bootis* früher nur länglicht gesehen, der Nebelstern war nie vom Hauptstern rein getrennt. Jetzt konnte ich die Sterne schon mit dem nur 140 Mal vergrößernden Oculare aufs deutlichste getrennt sehen; noch besser mit dem stärksten Oculare. — Ueberhaupt sind zu dem Mikrometer 4 Oculare, die ich an diesem Fernrohre 70, 92, 140 und 200 Mal vergrößernd fand. Zu allen Beobachtungen wende ich jetzt die stärkste Vergrößerung an. Schwieriger, als die Anbringung des Ganzen, war dem Fernrohre die nöthige mikrometrische Verticalbewegung zu geben. Die dazu nöthige Einrichtung ward von dem hiesigen geschickten Mechanicus *Politour* ans Fernrohr angebracht, so wie schon früher das Fernrohr von der Seite durchbrochen war, und in der Röhre einen Spiegel bekommen hatte, welcher durch die Seitenöffnung das Licht von einer mit einem Collectivglase versehenen Lampe, die an der Röhre hängt, ins Gesichtsfeld reflectirt. Vor der Seitenöffnung ist ein prismatisches grünes Glas, um die Erleuchtung zu moderiren. — Den Werth eines Schraubenumganges habe ich auf doppelte Weise zu bestimmen gesucht, erstlich fand ich, daß ein mit dem *Reichenbachschen* Universalinstrumente gemessener Winkel von $5'46''{,}4$ zwischen 2 terrestrischen Signalstangen gleich 8,676 Schraubenumgängen des Mikrometers war, woraus 1 Umgang = $39''{,}93$ folgt; zweitens fand ich aus der gemessenen Gröfse eines Umgangs, deren 85,475 auf 1 Pariser Zoll gehen, so wie aus der Focallänge des Objectivs, den Werth eines Umganges = $40''{,}07$, woraus im Mittel 1 Umgang = $40''{,}00$ folgt, welchen Werth ich bis auf weitere noch sorgfältigere Messungen vorläufig angenommen habe. — Seiner Natur nach ist ein Fadenmikrometer vorzugsweise zur Beobachtung von Declinationsunterschieden bestimmt; Distanzen von Sternen lassen sich wegen der täglichen Bewegung nur mit geringerer Genauigkeit messen, erst näher beim Pole kann man auch bey diesen eine der bey Declinationsunterschieden Statt findenden gleiche Sicherheit erlangen. Die Beobachtung der Positionswinkel geschieht dadurch, daß man die Fäden erst der täglichen Bewegung parallel stellt, dann die Verbindungslinie der

beiden Sterne, und in beiden Tagen den Stand des Index auf dem Kreise abliest. Die Beobachtung der Positionswinkel gewinnt sehr, wenn das ganze Instrument parallelactisch aufgestellt ist. Um nun eine Probe, von dem was dies Mikrometer sowohl für die Beobachtung der Decl.-Differenzen, als der Positionswinkel leistet, zu geben, setze ich hier die für einige Sterne an mehreren Abenden dieses Octobermonats bey freilich günstiger Luft erhaltenen Resultate her, und zwar für die Declinationsdifferenzen, so wie sie aus jedem doppelten Winkel, also aus je zwei auf einanderfolgenden Ablesungen folgen.

Decl. Differenzen zwischen Doppelsternen 1821.

70 p. Ophiuchi	Diff. v. Mittel.	ζ Urs. maj.	Differ. v. Mittel
5. Oct. 4,00	+ 0,05	10. Oct. 12,31	+ 0,05
4,26	+ 0,31	11. — 12,30	+ 0,04
3,74	— 0,21	12,40	+ 0,14
11. Oct. 4,20	+ 0,25	23. — 12,70	+ 0,44
20. Oct. 4,05	+ 0,10	12,22	— 0,04
3,97	+ 0,02	11,66	— 0,60
29. Oct. 3,72	— 0,23	12,58	+ 0,32
3,70	— 0,25	25. — 11,90	— 0,36
Mittel 3,95		Mittel 12,26	

100 Herculis.		Aquila 57 Uranogr.	
11. Oct. 14,60	+ 0,24	5. Oct. 35,60	— 0,09
14,42	+ 0,06	35,32	— 0,37
23. — 14,32	— 0,04	35,72	+ 0,03
14,10	— 0,26	36,12	+ 0,43
Mittel 14,36		Mittel 35,69	

Aus diesen 24 Beobachtungen und den beygeschriebenen Differenzen derselben vom Mittel folgt nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, mit Rücksicht auf die bey jedem Sterne dem Mittel zum Grunde liegende Anzahl von Beobachtungen, der wahrscheinliche Fehler einer jeden Bestimmung = $0'',146$ also nur $\frac{1}{7}$ Bogensekunde; so geringe ist also der wahrscheinliche Fehler einer Declinationsdifferenz zwischen 2 innerhalb einer Minute nahen Sterne aus einmaliger Doppelmessung. Man ist hiernach befugt, das Mikrometer für frei von Fehlerquellen zu halten, und diese $\frac{1}{7}$ Secunde, bloß dem Sehen zuzuschreiben, woraus der wahrscheinliche Fehler des Sehens $0'',146\sqrt{2} = 0'',209$ also $\frac{1}{5}$ Bogensekunde bei jedem Pointiren beider Sterne, also für jeden Stern wieder = $0'',146$ folgt. Ich bemerke hiebei,

dafs immer eine 200fache Vergrößerung angewandt wurde, und dafs die Witterung an allen diesen Abenden sehr günstig war.

Den Positionswinkel des merkwürdigen 70. p. Ophiuchi fand ich an verschiedenen Abenden wie folgt:

1821. 15. Juli	68°,4	Südl. folgend
5. Oct.	70, 1	— —
20. —	67, 7	— —
Im Mittel	68°,7	Südl. folgend.

Für ζ Urs. maj. ergab sich am 11. Oct. 55°,6 Südl. folg., welches mit dem Mittel aus 7 im Jahr 1819 angestellten Beobachtungen vermittelt eines andern Fadenmikrometers, welches nur den Positionswinkel gab = 55°,3 übereinstimmt, Für 100 Herculis fand ich

am 11. Oct.	84°,7	Südl. vorang.
23. Oct.	85, 9	— —
Mittel	85°,3	— —

und für 57 Aquilae

am 5. Oct.	81°,6	Südl. folg.
24. —	82, 0	— —
Mittel	81°,8	Südl. folg.

Die Declinationsdifferenz = $3'',95$ und der Positionswinkel = $68°,7$ s. f. geben nun für den Doppelstern 70 p. Ophiuchi für das Jahr 1821,7 die Distanz = $4'',24$. Diese neue Bestimmung des Positionswinkels bestätigt aber die Revolution dieser Sterne um ihren Schwerpunkt vollkommen, denn es ist, wenn alle vorhandenen Beobachtungen zusammengestellt werden, der Positionswinkel

Für 1779,8	0° 0' folg.	= 0° 0' }	
1781,7	9° 14' N. f.	= 9° 14' }	nach <i>Herschel</i> .
1804,4	48° 41' N. v.	= 131° 19' }	
1819,6	78° 42' S. f.	= 281° 18' }	nach <i>Struve</i> .
1821,7	68° 42' S. f.	= 291° 18' }	

In den letzten 2 Jahren hat sich also der Positionswinkel um 10° verändert, und seit der ersten Herschelschen Beobachtung hat der Begleiter in 41,9 Jahren 291° seiner Bahn vollbracht. Schade, dafs *Herschel* keine Bestimmung der Entfernung dieser Sterne gemacht hat, denn die in Durchmessern gegebene Entfernung kann zu keiner Vergleichung gebraucht werden.

Struve.

I n h a l t.

Bessel's Tafeln zur Reduction der Oerter der Fixsterne. Pag. 49.
Struve über ein Fraunhofersches Filarmikrometer. Pag. 61.

Altona im December 1821.