auf Schwefelsäure einen geringen, die auf Kalk aber einen starken Gehalt zu erkennen, so ist anzunehmen, dass der Kalk nur zum geringeren Theil als Gyps, zum grösseren, als Calciumcarbonat im Wasser enthalten ist. Es wird sich daher bei Wasseruntersuchungen in Städten oder Dörfern stets empfehlen, gleichzeitig die Untersuchung eines Normalbrunnens der Ortschaft oder Gegend vorzunehmen, d. h. eines Brunnens, welcher das vom Einfluss menschlicher und thierischer, gewerblicher und wirthschaftlicher Auswurfstoffe unberührt gebliebene Grundwasser liefert, welches nur die der natürlichen Bodenbeschaffenheit entstammenden Stoffe gelöst enthält, daher, einem kochsalz- oder gypsreichen Boden entströmend, wohl über die Grenzzahl davon gelöst enthalten kann, ohne bei sonstiger Reinheit als Grundwasser geradezu verwerflich zu sein.

Diese eigentlich für Aerzte bestimmte Bearbeitung der Böhr'schen colorimetrischen Methode der chemischen Wasseruntersuchung dürfte vielleicht auch für diejenigen Herren Collegen von Interesse sein, welche entweder selbst zuweilen in die Lage kommen, über die Brauchbarkeit oder Schädlichkeit eines Genusswassers schnell ein Urtheil abgeben zu müssen, oder dem Physiker und den Aerzten ihres Kreises oder Wohnortes, in chemischer Beziehung, berathend zur Seite stehen.

Mittheilungen.

Von Dr. Vulpius, Apotheker in Heidelberg.

Ueber einige salicylsaure Salze und ihre Anwendungsform.

Die vorzüglichen antiseptischen Eigenschaften der Salicylsäure legten den Wunsch nahe, dieselben womöglich zu übertragen auf die hauptsächlichsten, bei localer Behandlung von erkrankten Augen zur Verwendung kommenden Metalle und

Alkaloïde, indem man eben die salicylsauren Salze dieser Körper in Gebrauch ziehe. So haben wir zunächst salicylsaures Kupfer, Zink und Atropin ihren Einzug in den Arzneischatz der Augenheilkunde halten sehen. Leider besitzen aber diese salicylsauren Salze Eigenschaften, welche ihrer practischen Anwendung vielfach störend in den Weg treten: Schwerlöslichkeit und leichte Zersetzbarkeit in dem einen, Hygroscopicität in dem anderen Falle, ganz abgesehen von der im Februarheft des Archivs, 1878, pag. 137 von mir erörterten Frage, ob man bei einem Salze der Salicylsäure deren Eigenschaften wiederzufinden a priori erwarten dürfe.

Schon das salicylsaure Zink ist ziemlich schwierig in Wasser löslich. Zwar hat man vierprocentige Lösungen desselben hergestellt, allein man wird eine solche Lösung wohl als übersättigt bezeichnen dürfen, denn bald scheidet sich ein Theil des gelösten Salzes wieder ab, eine Ausscheidung, welche jedoch nicht zu verwechseln ist mit derjenigen, welche wir auch in viel verdünnteren Lösungen des Zinksalicylates entstehen sehen und die ihren Grund hat in der Neigung des Zinks, basische schwerlösliche Salze zu bilden, wie es ja schon beim Verdünnen einer concentrirten Chlorzinklösung mit Wasser geschieht. Als relativ haltbar und leicht durch gelindes Erwärmen herzustellen muss eine 1 bis 2procentige wässrige Lösung des salicylsauren Zinkes bezeichnet werden. Kommt es darauf an, starke Lösungen zu erhalten, so lässt sich die ausserordentlich grosse Löslichkeit des Zinksalicylates in Weingeist mit Vorthail benutzen. Dieser nimmt nahezu sein gleiches Gewicht salicylsaures Zink auf und eine solche 50procentige Lösung kann bis zu ihrem 3fachen Gewicht mit Wasser verdünnt werden, ohne eine beträchtliche Menge des gelösten Salzes fallen zu lassen. Allein die Lösung ist nun eben keine wässrige mehr, sondern eine spirituöse, und es wird der Alkoholgehalt die therapeutische Anwendung einer solchen Lösung in vielen Fällen verbieten. Nebenbei sei noch bemerkt, dass das salicylsaure Zink sich auch sehr leicht in Aether löst, ein wie bekannt bei Schwermetallsalzen nicht gerade sehr häufiger Fall.

Noch ungünstiger aber liegen die Verhältnisse beim salicylsauren Kupfer, denn hier lässt sich eine wässrige Lösung von mehr als 2 Procent Salzgehalt überhaupt nicht herstellen. Wie bei der Bereitung dieses Salzes, so muss auch bei seinem Auflösen in Wasser Siedehitze vermieden werden, da sonst das Salz zu einer amorphen, sehr schwer löslichen, dunkelschwarzgrünen Masse zusammenschmilzt, bei längerem Kochen auch ein ausgesprochener Carbonsäuregeruch als deutliches Zeichen der Veränderung des Salicylates auftritt. In Weingeist zwar ist das salicylsaure Kupfer ungemein leicht löslich, doch eignet sich eine gesättigte Lösung des Salzes in starkem Alkohol schlecht zum Verdünnen mit Wasser, da schon bei geringem Wasserzusatz eine Ausscheidung des Kupfersalicylates erfolgt. Besser kommt man zum Ziele, wenn man eine Lösung von einem Theil des salicylsauren Kupfers in fünf Theilen Alkohol mit Wasser verdünnt, denn wir können von letzterem das vierfache Volumen zusetzen, ohne dass Salz ausfällt, erhalten also dann eine Lösung, welche neben 20 Procent Weingeist vier Procent Kupfersalicylat enthält, also noch einmal so viel als eine möglichst concentrirte rein wässrige Auflösung. Mit der Haltbarkeit der letzteren ist es leider sehr schwach bestellt, denn ursprünglich klar und prächtig smaragdgrün gefärbt, wird sie schon nach kurzer Zeit missfarbig und trüb und giebt dann bei der Filtration eine wenig gefärbte Flüssigkeit, kurzum zeigt sich zersetzt. Da die im Einzelfälle verordnete Lösung meist zu fortgesetztem Gebrauche bestimmt ist, so dürfte ihre leichte Zersetzbarkeit um so schwerer ins Gewicht fallen, von der Anwendung abschrecken.

Noch sei der Eigenthümlichkeit gedacht, dass, während wie erwähnt, salicylsaures Zink sich sehr leicht in Aether löst, beim Kupfersalicylat das Gegentheil in so ausgesprochenem Grade der Fall ist, dass seine weingeistige Lösung durch Aetherzusatz geradezu gefällt wird.

Ganz verschieden von den beiden besprochenen Salicylaten verhält sich das salicylsaure Atropin, denn es ist nicht nur wie in Aether und Weingeist, so auch in Wasser sehr

leicht löslich, sondern sogar so hygroskopisch, dass schon nach mehrmaligem Oeffnen des Aufbewahrungsgefässes eine glasartige, zusammengeflossene Masse entsteht. Dass damit eine erhebliche Gewichtszunahme verbunden, ist eben so selbstverständlich, als dass unter solchen Umständen der wirkliche Gehalt einer verordneten Atropinlösung, aus solchem Salicylat bereitet, ein schwankender und um so geringerer sein muss, je mehr das Salz schon Wasser aus der Luft aufgenommen hat, ganz abgesehen von der grossen Schwierigkeit des Abwägens einer solchen Substanz. Man wird sich also zu helfen suchen, indem man entweder eine starke Lösung des trockenen Atropinsalicylates vorrätig hält und zum Gebrauch in der geeigneten Weise verdünnt, oder, was noch rationeller, indem man an der Hand stöchiometrischer Berechnung direct aus Atropin und Salicylsäure eine Lösung von bestimmtem Gehalt darstellt, wozu auf pag. 366 des Aprilheftes dieser Zeitschrift sich eine Vorschrift findet.

Immerhin muss constatirt werden, dass diesen drei Salicylaten, vom pharmaceutisch-chemischen Standpunkt aus betrachtet, wesentliche Mängel ankleben, welche ihrer allgemeinen Benutzung nicht günstig sind. Unwillkürlich drängt sich deshalb die Frage auf, ob denn nicht die beabsichtigte Combination der antiseptischen Eigenschaften der Salicylsäure mit den specifischen der betreffenden Metalle, resp. Basen, einfacher und besser dadurch erreicht werden könnte, dass man die bis jetzt allgemein benutzten und so beständigen Sulfate der letzteren in einer viertelprocentigen wässerigen Salicylsäurelösung auflöst. Derartige versuchsweise hergestellte Lösungen der drei in Frage kommenden Sulfate von Zink, Kupfer und Atropin hielten sich wenigstens monatelang vollständig unverändert und es wäre dieser Modus vielleicht immerhin der Prüfung durch unsere Augenärzte werth.

Lösungsmittel des Jodoform.¹

Seit der jüngsten Empfehlung des Jodoform durch Molechott ist dieses sonst wenig gebrauchte Arzneimittel wieder

1) Vor der Veröffentlichung von Hager (Bd. 213. S. 548) eingesendet.

allerwärts in Aufnahme gekommen und es hat damit auch die Frage nach geeigneten Lösungsmitteln für dasselbe ein höheres Interesse gewonnen, speciell für den Apotheker, weil ja doch dieser in der Regel bei derartigen Novitäten hinsichtlich der geeignetsten Applicationsform vom Arzte consultirt wird. Das Einfachste könnte und sollte scheinen, in der Pharmacopöe nachzuschlagen, welche ja Lösungsmittel und Lösungsverhältnisse des genannten Körpers angiebt. Leider sind jedoch ihre Angaben in diesem Punkte durchaus irrig, und was sich in manchen Handbüchern darüber findet, ist es entweder gleichfalls oder leidet an Unvollständigkeit, weshalb einige auf eigenem Versuche basirte Notizen hier Platz finden mögen.

Die beliebteste äusserliche Anwendungsform des Jodoform ist seine Auflösung in Collodium. Man sollte nun unter Berücksichtigung der Angabe der Pharmacopöe, dass das Jodoform zu seiner Lösung sein zwanzigfaches Gewicht Aether bedürfe, denken, die Auflösung des Jodoform in Collodium könne höchstens eine fünfprocentige werden. Dem ist jedoch nicht so, denn auch eine zehnprocentige Lösung wird mit Leichtigkeit erhalten durch einfaches Schütteln des in wenig Aether vertheilten Jodoform mit der entsprechenden Menge Collodium. Und in der That wird auch jetzt meist eine solche zehnprocentige Lösung von den Aerzten verordnet. Man könnte aber erforderlichen Falles noch erheblich höher, bis auf 15 Procent gehen, denn das Jodoform löst sich nicht, wie die Pharmacopöe angiebt, erst in zwanzig, sondern schon in sechs Theilen Aether bei gewöhnlicher Zimmertemperatur. Hager mag an der Richtigkeit der pharmacopöischen Angabe auch seine Zweifel gehabt haben, denn in seinem Commentar bezeichnet er das Jodoform als „auch löslich in Aether“ ohne nähere Angabe eines Verhältnisses.

Die Löslichkeit des Jodoform in Weingeist ist gleichfalls erheblich höher, als gewöhnlich angegeben wird. Absoluter Alkohol löst davon vier Procent, giebt also damit eine für viele Zwecke hinlänglich starke Lösung.

Beabsichtigte intravaginale Application des Jodoforms mit Hilfe von Tampons, wobei der Ausschluss so reizender Lösungsmittel, wie Aether und Alkohol, unbedingt erforderlich ist, legten den Wunsch nach einem milden Lösungsmittel, wie Oel oder Glycerin, nahe. Möglichst wasserfreies Glycerin vermag nun zwar bei 100° C. nahezu ein Procent Jodoform aufzunehmen, allein in der Kälte scheidet sich davon mehr als die Hälfte wieder aus und man wird daher, da mit einer noch nicht einmal halbprocentigen Lösung wohl Niemand gedient sein dürfte, auf dieses Lösungsmittel verzichten müssen.

Weit günstiger gestaltet sich das Verhältniss bei Benutzung von Oel, welches letztere in der Dampfbadtemperatur gegen 20 Procent Jodoform aufzunehmen vermag und hiervon in der Kälte noch zwei Procent gelöst hält. Wenigstens wird eine zweiprocentige warm bereitete Lösung des Jodoform in Olivenöl beim Erkalten nur ganz wenig opalisirend. In vielen Anwendungsfällen wird ein solcher Gehalt von zwei Procent Jodoform ausreichend erscheinen. Suppositorien mit Jodoform werden gleichfalls verordnet und durch gelindes Erwärmen der Cacaobutter mit der vorgeschriebenen Menge Jodoform in geschlossenem Glase und Ausgiessen bei möglichst gesunkener Temperatur erhalten. Hält man hierbei das Löslichkeitsverhältniss des Jodoform in Oel fest, so können einem Suppositorium von dem gewöhnlichen 2,5 g. betragenden Gewicht 5 Centig. Jodoform in gelöstem Zustand, also in der höchsten möglichen Vertheilung incorporirt werden. Selbstverständlich muss jede unter Zuhülfenahme von Wärme bewerkstelligte Lösung des Jodoform in geschlossenem Gefässe ausgeführt werden, um jeden Verlust durch Verdampfung zu vermeiden.

Ueber einige Verbandstoffe.

Im Interesse derjenigen Collegen, welche nicht in der Lage sind, aus Fabriken bezogene imprägnirte Verbandstoffe vorrätig zu halten, aber gleichwohl in den Fall kommen können, dem plötzlichen Verlangen eines Arztes nach solchen

rasch entsprechen zu sollen, seien hier die zur Imprägnirung einer gewogenen Menge des unter dem Namen Lint bekannten Verbandstoffes nöthigen Quanta der betreffenden Lösungen, sowie die Zusammensetzung der letzteren mitgetheilt.

Zur Herstellung von Borlint wird 1 Theil Borsäure in 4 Theilen kochenden Wassers gelöst, mit der heissen Lösung 1 Theil Lint durchtränkt und dann getrocknet.

Um Carbollint selbst zu bereiten, werden nach dem von Herrn Professor Bruns jun. in Tübingen uns mündlich mitgetheilten Verfahren 400 g. Colophonium in 2 Litern Spiritus gelöst, 40 g. Oleum Ricini zugesetzt, in der Flüssigkeit 100 g. Carbonsäure aufgelöst und die gesammte Menge zur Tränkung von 1 Klg. Lint benutzt.

Darstellung von Kaliumnitrit.

Von H. Müller, stud. pharm. und Dr. C. Pauly.

(Mittheilung aus dem chemisch-pharmaceutischen Laboratorium der technischen Hochschule zu Braunschweig.)

Zur Darstellung von Kaliumnitrit sind verschiedene Methoden gebräuchlich, welche meist auf einer Reduction von Kaliumnitrat beruhen. Nach Stromeyer (Annal. d. Chem. u. Pharmac. 96, 230) wird Salpeter mit dem doppelten Gewicht Blei bis zur vollständigen Oxydation des Letzteren geschmolzen, wobei neben Kaliumnitrit stets auch etwas Kalium-Bleioxyd entsteht, welches beim Auslaugen der Schmelze mit Wasser mit aufgelöst und durch Behandlung der Lösung mit Kohlensäure und Schwefelwasserstoff zersetzt wird. Feldhaus (Annal. d. Chem. u. Pharmac. 126, 72) empfiehlt die Methode von Stromeyer, ändert sie aber dahin ab, dass er dem schmelzenden Salpeter statt zwei Gewichtstheile nur einen Gewichtstheil Blei und zwar in kleinen Portionen zusetzt, wodurch er eine leichtere Oxydation des Metalles erzielt und eine Zersetzung des entstandenen Kaliumnitrits vermeidet. Der überschüssige Salpeter wird durch Krystallisation