merkt — in der Quadratur etwa zwei Stunden nach dem Mittag der betreffenden Gebiete ein, also gerade um die wärmste Zeit des Tages. Wenn wir dagegen annehmen, daß die Atmosphäre über den betreffenden Gebieten mit leichtem Nebel gefüllt ist, so ist die Veränderung leicht erklärlich. In der Opposition geht die Gesichtslinie, wenn die Gegend den Rand passiert, durch eine weit dickere Luftschicht als im Meridian; in den Quadraturen dagegen ist die durchlaufene Luftschicht erheblich größer am erhellten Rande als am Phasenrande, wo außerdem der Nebel von der Sonne nur schwach erleuchtet ist. Diese naheliegende Erklärung, die ich bisher nur bei *Antoniadi* gefunden habe, ist um so mehr wahrscheinlich, als die betreffenden Inseln, und in erster Linie Hellas, offenbar ein sehr rauhes Klima besitzen. So fand *Lowell* (s. I. Teil, 3), daß Hellas einer Beule in der Schneegrenze entspricht, sodaß die Insel also noch mit Schnee bedeckt ist, wenn die umgebenden Gebiete schneefrei sind. Hellas bildet also sozusagen einen Vorposten der antarktischen Gegend, und seine Verhältnisse erinnern an die kleinen antarktischen Inseln, wie Novissima Thule, wo der Schnee später schmilzt als in den Umgebungen. Wenn die »Meere« um Hellas nebelfrei sind, ist die Aufhellung am Rande leicht wahrzunehmen; wenn dagegen die Meere stark verschleiert sind, wie z. B. im Juli und August 1909, so werden die Meere am Rande ebenso hell wie Hellas, und die Erscheinung ist daher wenig auffallend. Im Winter der südlichen Halbkugel hört der Farbenwechsel von selbst auf, weil Hellas sich dann immer in großer Nähe des Randes befindet. Der Farbenwechsel mag natürlich am Morgenrande durch Nebel oder Reif, die sich im Laufe der Nacht bilden und am Mittag wieder auflösen, verstärkt werden.

Wenn Hellas verschleiert ist, so müssen seine Ränder in exzentrischer Lage hell erscheinen, und die Insel wird dann am Rande der Scheibe größer sein als im Zentralmeridian. Die scheinbare Abnahme des Durchmessers während der Auflösung der Nebel, die 1909 beobachtet ist, hängt wohl hiermit zusammen. Auf der kalten Hochebene von Hellas werden die Nebel verdichtet und sinken dann nach allen Seiten in die umgebenden Einsenkungen nieder, sodaß die »Insel« sich über die »Meere« verbreitet. Die angebliche geringe Ausdehnung von Hellas im Winter ist dagegen nur scheinbar; was die Beobachter mit »Hellas« bezeichnen, ist nur die schneeweiße Mitte der hellen Region südlich von Ausonia-Japygia.

Außer diesen scheinbaren Veränderungen können noch wirkliche Veränderungen vorkommen, die vom Farbenwechsel der Oberfläche im Laufe des Marsjahres herrühren. Das Verbleichen der Meere nördlich und südlich von Noachis und Argyre könnte sehr wohl ein Anwachsen dieser Inseln im Herbst bewirken; die Frage ist indessen praktisch schwierig zu lösen, weil die Inseln schon gegen Ende des Sommers sehr undeutlich und verschwommen sind.

Zum Schlusse wollen wir noch die Ergebnisse dieser Untersuchung übersichtlich zusammenstellen:

1. Die Oberfläche des Planeten Mars zeigt eine Abweichung von der Kugelform im Sinne der Tetraedertheorie, die von einer Kontraktion nach der Erstarrung herrührt. Die größte Einsenkung umgibt den Südpol, die drei übrigen liegen in 30° bis 40° nördlicher Breite im nördlichen »Festlande« in den Regionen Mare Acidaliu, Propontis und Utopia.

2. Die drei kontinentalen Einsenkungen sind teils einander verbunden durch Spalten, welche die zwischenliegenden Hochländer durchbrechen, teils stehen sie mit der südlichen Einsenkung durch Bündel von Spalten in Verbindung, die sich in die dunklen Regionen (»Meere«) fortsetzen.

3. Der nördliche Polarfleck liegt in einer höheren Region, und das Schneewasser sammelt sich daher in den drei Einsenkungen, die von Nebel und Gewölk verschleiert werden, wogegen die höheren, gelben Gebiete vom Schmelzen des Polarflecks wenig beeinflusst werden. Das Schmelzen des südlichen Polarflecks bewirkt eine ähnliche Überflutung in der antarktischen Niederung. Im Laufe des Sommers werden die Einsenkungen wieder hell, und im Winter sind sie meist von Wolken verhüllt.

4. Der nördliche »Kontinent« liegt anscheinend über der Wolkengrenze, und dichte Wolkenmassen sind daher nur auf dem Boden der früheren Meere und der Einsenkungen häufig. Im Sommerhalbjahre sind die Nebel nur in den tiefsten Spalten, besonders in den »Meeren«, und deren Umgebung häufig; im Winter und Frühling können sie dagegen selbst die höheren, gelben Regionen verschleiern.

5. Die Oberfläche des Planeten zerfällt natürlich in eine Äquatorzone, die bis $\pm 30^\circ$ reicht, und zwei Polargebiete. In der Äquatorzone sind die Veränderungen regellos und gering und rühren meist von Niederschlägen her, mit Ausnahme der Gebiete, welche mit den drei Einsenkungen des nördlichen Festlandes in Verbindung stehen. In den Polarkalotten werden dagegen die dunklen Gebiete im Frühling verstärkt und im Herbst verschleiert.

6. Die dunklen Streifen (»Kanäle«) sind Bruchlinien, deren Farbe von Niederschlägen oder Überflutungen herrührt. Sie sind häufig mit Nebel gefüllt, wodurch scheinbare Verdoppelungen, besonders im Frühling und Herbst, entstehen. Die dunklen Flecke sind Stellen, wo die Kruste zusammengebrochen ist; wo zwei Bruchstellen nahe beieinander liegen, gibt es wirkliche Doppelspalten.

7. Die dunklen Gebiete der südlichen Halbkugel sind flache Einsenkungen, die entweder durch Niederschläge oder Überflutungen im Frühling dunkel gefärbt werden. Die antarktischen Inseln sind Hochebenen, wo die Temperatur besonders niedrig ist.

Hörsholm, 1916 September.

H. E. Lau.

Bedeckungsveränderlichkeit von ζ^1 Ursae majoris.

Lichtelektrische Messungen seit Mitte Februar dieses Jahres zeigen eine mit der $20\frac{1}{2}$ -tägigen Periode der Komponente ζ^1 von Mizar verlaufende Veränderlichkeit, die wahrscheinlich als Superposition eines Bedeckungs- und eines

δ Cephei-Lichtwechsels aufgefaßt werden muß. Die Amplitude beträgt mehr als 0^m.06. Die eine Bedeckung fand ungefähr 1917 April 14.3 m. Z. Gr., im aufsteigenden Ast der δ Cephei-Lichtkurve, die andere 1917 März 15.1 $\pm$ statt.

Von den selenphotometrischen Messungen *Stebbins'*, Ap. J. 39.474, liegen die fünf von 1911 März 19 auf dem aufsteigenden Ast des ersten Minimums, diejenige von 1910 Juli 26 wahrscheinlich ziemlich genau in der Mitte des anderen. Die Bedeckungen, deren Dauer kurz ist, fallen gegenwärtig 1^h4 bzw. 1^h9 vor die spektroskopischen Konjunktionen, die berechnet sind mit den Elementen: $P = 20^d 536$, $T =$

2415472.07 m. Z. Gr., $e = 0.52$, $\omega = 98^\circ 4$ (*Ludendorff*, V. J. S. 45.116). Dies ist der 5. Bedeckungsveränderliche und der 6. Fall übereinstimmender Lage der Bahnebenen im System *Ursa major*.

Kgl. Sternwarte Berlin-Babelsberg, 1917 April 22.

P. Guthnick.

Die Sonnenfleckperiode im Klima von Berlin. Von *O. Meißner*.

An anderer Stelle (*Ann. d. Hydrographie* 45.186) habe ich gezeigt, daß sich bei der Untersuchung des Einflusses der Sonnentätigkeit auf das Klima von Berlin (als Repräsentanten von Norddeutschland, wohl überhaupt von Mitteleuropa) herausstellt, daß man viel deutlichere Ergebnisse erhält, wenn man statt der Jahres- die Monatsmitteltemperaturen zugrunde legt. Man bekommt dann das gewiß interessante Resultat, daß im Frühling und Herbst (März–Mai, Sept.–Nov.) kein Einfluß vorhanden ist, wohl aber in den beiden anderen Jahreszeiten, am meisten im Januar und Juli. Dies werde ich im

folgenden noch auf andere Weise darlegen, indem ich statt der manches verwischenden Monatsmitteltemperaturen die Anzahl der Eistage (Maximum unter 0°) und Sommertage (Maximum mindestens 25°) zugrunde lege. Dabei ist der II. Teil von *Hellmanns* »Klima von Berlin« benutzt; die Angaben für die Jahre 1830–1907 ergeben gerade 7 Sonnenfleckperioden, wenn auch bei der in Anwendung gebrachten Methode, die Jahre nach dem Abstand vom nächsten Fleckenmaximum bzw. -minimum zu ordnen, einige wenige Jahre ausfallen und andere doppelt zählen.

Tabelle I. (Berlin 1830–1907.)

Jahr des ☉ fleck- Zyklus	Anzahl der Eistage nach Abweichungen vom Mittel (letzte Zeile der Tabelle)						Anzahl der Sommertage						Sommer	S – W
	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	Winter	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.			
Max. 0	–0.7	+3.1	+0.3	+1.5	0.0	+ 4.98	+0.2	–2.0	–2.5	–2.6	–1.9	– 7.06	–12.04	
1	+2.1	+2.1	+6.3	+2.1	–0.9	+10.58	–0.2	–1.4	+0.4	–2.0	+0.2	– 2.96	–13.54	
2	+0.8	+0.2	+2.3	–1.8	–0.6	+ 0.68	–0.9	+0.5	+1.5	–2.6	–0.2	– 0.56	– 1.24	
3	–0.5	–1.8	–0.8	+0.7	+0.4	– 1.82	–1.6	–1.4	–2.6	+1.8	+0.2	– 2.16	– 0.34	
4	–1.3	–1.6	–1.6	0.0	0.0	– 3.12	+1.2	–1.8	–0.3	–1.9	+0.1	– 3.96	– 0.84	
5	+1.0	–2.4	+0.6	+1.5	+0.3	– 0.22	–1.3	+1.6	–2.0	–1.4	–0.8	– 1.76	– 1.54	
Min. 6	0.0	–0.5	–3.3	–0.6	+1.1	– 4.42	+1.5	+2.2	–4.6	–1.4	–1.2	– 3.76	+ 0.66	
7	+0.4	+3.1	–2.0	–0.4	–0.9	+ 0.68	+2.2	–1.1	+1.0	+2.8	+2.8	+ 2.74	+ 2.06	
8	–1.3	–4.1	–1.4	+0.3	+1.7	– 5.12	0.0	+0.3	+3.3	+2.8	+0.8	+ 6.44	+11.56	
9	+1.1	+0.1	0.0	–1.1	+0.3	– 1.02	+0.7	+3.9	+2.5	+3.7	–0.1	+10.14	+11.16	
10	–1.2	+1.5	–0.4	–2.2	–1.3	– 1.12	–1.3	–1.3	+3.1	+1.1	+0.2	+ 2.94	+ 4.06	
Mittel	1.64	6.47	10.70	4.55	1.61	21.72	3.95	9.35	11.58	9.33	2.51	30.26	(8.54)	

Zu Tabelle I wäre noch zu bemerken: »Winter« = Dezember–Februar, »Sommer« = Juni–August; S – W = der Differenz der beiden Spalten. Man sieht sogleich, daß die in den einzelnen Monaten noch ziemlich undeutliche (doppelte!)

Periodizität bei dieser Zusammenfassung mit einer für meteorologische Verhältnisse außerordentlich großen Deutlichkeit hervortritt. Eine mathematische Klarlegung dieser Verhältnisse gibt Tabelle II.

Tabelle II. (Berlin 1830–1907.)

	Eistage						Sommertage						
	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	Winter	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Sommer	S — W
<i>A</i>	12.98	54.55	65.55	19.24	8.11	198.81	15.85	37.01	58.42	58.87	14.35	256.96	615.09
<i>B</i>	32.50	100.06	86.96	46.36	19.30	277.04	35.14	73.00	110.38	72.32	31.02	255.28	561.92
<i>2A : B</i>	0.80	1.09	1.51	0.83	0.84	1.44	0.90	1.01	1.06	1.63	0.92	2.01	2.37
<i>a</i> ₀	—	6.47	10.70	4.55	—	21.72	—	9.35	11.58	9.33	—	30.26	8.54
<i>a</i> ₁	—	— 0.25	+ 1.58	+ 0.55	—	+ 1.71	—	— 1.04	— 1.54	— 2.15	—	— 4.65	— 6.41
<i>b</i> ₁	—	+ 1.64	+ 2.08	— 0.05	—	+ 3.62	—	— 0.33	+ 1.40	— 0.27	—	+ 0.29	— 3.22
<i>a</i> ₂	—	+ 1.00	+ 0.92	+ 0.31	—	+ 2.26	—	— 0.20	— 0.31	— 0.36	—	— 0.95	— 3.26
<i>b</i> ₂	—	+ 1.35	+ 0.23	+ 0.60	—	+ 2.19	—	— 0.26	— 1.84	— 1.93	—	— 3.98	— 6.24
<i>c</i> ₁	—	1.66	2.61	0.55	—	4.00	—	1.09	2.08	2.17	—	4.66	7.17
<i>g</i> ₁	—	351°	37°	95°	—	25°	—	253°	312°	263°	—	274°	223°
<i>c</i> ₂	—	1.68	0.95	0.67	—	3.15	—	0.33	1.87	1.96	—	4.09	7.04
<i>g</i> ₂	—	37°	76°	27°	—	46°	—	219°	190°	191°	—	194°	208°
<i>A</i> ₂	—	25.04	25.73	14.90	—	73.01	—	28.03	25.92	11.39	—	41.11	54.36
<i>μ</i> ₀ ²	1.30	5.46	6.56	1.92	0.81	19.88	1.59	3.70	5.84	5.89	1.44	25.70	61.51
<i>μ</i> ₂ ²	—	4.16	4.29	2.48	—	12.17	—	4.67	4.32	1.90	—	6.85	9.06
<i>1 ← μ</i> ₂ ² : <i>μ</i> ₀ ²	—	0.24	0.36	< 0	—	0.39	—	< 0	0.26	0.68	—	0.73	0.85