ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o. 287.

Versuch, die Berechnungen zur Bestimmung der Wiederkehr des *Halley'schen* Kometen aufs Reine zu bringen.

Von Herrn *J. W. H. Lehmann*,

Doctor der Philosophie, Prediger zu Derwitz und Krielow bei Potsdam.

Es könnte nach den Leistungen so ausgezeichneten Männer, wie *Damoiseau*, *Pontécoulant* und *Rosenberger*, vermessen scheinen, wenn ein Unbekannter es wagt, seine Untersuchungen über den oben benannten schwierigen Gegenstand der astronomischen Welt mitzuthemen. Aber das Bewusstsein, in diesem Aufsätze etwas zu liefern, was sich nicht auf unsicheren Herumlappungen, sondern auf jahrelangen mühsamen Berechnungen gründet, verbunden mit dem allgemeinen Interesse, welches der *Halleysche* Komet einflößt, und mit dem sehr schmeichelhaften Beifall, welcher den Untersuchungen des Verfassers auch schon vor ihrer gänzlichen Vollendung von einigen competenten Kennern der Wissenschaft zu Theil geworden, vermag es, eine Schüchternheit zu überwinden, welche um so größer sein müßte, als die End-Ergebnisse von den bisher bekannt gewordenen Resultaten anderer Geometer in einigen wesentlichen Punkten bemerkbar abweichen.

Der Gang, welchen eine gründliche Erforschung der Störungen eines Kometen von so langer Umlaufszeit nehmen muß, um zu dem erwünschten Ziele zu führen, die Rückkehr zum Perihelium auf einige Tage genau vorauszubestimmen, ist schon im Allgemeinen von dem unsterblichen *Laplace* in seiner *Mechanik des Himmels* (Buch IX, Seite 214 und 15) angedeutet worden, und man hat es nach dem bisherigen Zustande der Wissenschaft nicht für nöthig gefunden, davon abzugehen. Hiernach mußte die ganze Rechnung von einer gründlichen Discussion aller bekannt gewordenen Beobachtungen dieses Kometen in den Jahren 1682 und 1759 ausgehen. Eine solche Discussion ist von *Burckhardt* zwar mit der größten Sorgfalt, aber doch nicht mit wissenschaftlicher Vollendung vorgenommen worden, weil dabei die Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate und die Rücksicht auf die Störungen des Kometen während der Dauer seiner Sichtbarkeit fehlte. Die Verdienste *Rosenberger's* in dieser Beziehung sprechen

zu sehr für sich selbst, als daß sie durch meine Worte im Mindesten erhöht werden könnten, und seine beiden klassischen Abhandlungen in Nr. 180 und 196 dieser Nachrichten werden ihm die dankbare und bewundernde Anerkennung aller europäischen Astronomen auf Jahrhunderte sichern. Denn wenn auch die Berücksichtigung der in Deutschland fast gänzlich unbekannten *Jean-Dominic-Cassini'schen* Beobachtungen von 1682 vermisst wird, so möchten doch um derselben willen die nach der Methode der kleinsten Quadrate gefundenen Elemente von 1682 nur äußerst unbedeutender Verbesserungen bedürfen, welche kaum einen merklichen Einfluß auf die Störungen bis 1759 und noch weniger auf die nachfolgenden Störungen haben können. So ist es denn nicht zu viel gesagt, wenn man den Resultaten der beiden genannten Abhandlungen die höchste wissenschaftliche Vollendung zuschreibt. Man wird es mir aber verzeihen, wenn ich den End-Ergebnissen der in Nr. 250 dieser Zeitschrift enthaltenen Abhandlung desselben Verfassers, nach meinen gleichzeitig angestellten Berechnungen, nicht ebenso unbedingt beistimmen kann, und wenn ich die Ueberzeugung ausspreche, daß der Grund der Verschiedenheit unserer Resultate nicht in irgend einem eigentlichen Rechnungsfehler auf der einen oder andern Seite, sondern in der Verschiedenheit der befolgten Methoden liege. *Rosenberger* betrachtete, nach dem Beispiel der Franzosen, die excentrische Anomalie, ich dagegen die Zeit als absolute Variable, und bediente mich durchgängig der *Bessel'schen* Formeln (siehe des letzteren unsterbliche Abhandlung: Untersuchungen über die scheinbare und wahre Bahn des im Jahre 1807 erschienenen großen Kometen; Königsberg 1810) zur Bestimmung der Differential-Coefficienten der Kometen-Elemente. *Rosenberger* bezog die Bewegung des Kometen während des größten Theils seiner Bahn auf den Schwerpunkt des Sonnensystems, ich dagegen durchgängig auf den Mittelpunkt der Sonne. Wären nun die zum Grunde gelegten großen Axen, für die Epochen des Peri-

heliums von 1682 und 1759, völlig scharf die der Wirklichkeit entsprechenden gewesen, so hätten unsere beiderseitigen Resultate, d. h. sowohl der Totalbetrag der Störungen aller Elemente vom Perihel 1682 bis zum Perihel 1759, als auch die daraus geschlossenen genaueren Elemente für beide Epochen, bei den beiderseits gewählten hinreichend kurzen Intervallen, und bei dem Bestreben, selbst die Anziehungen der vier unteren Planeten in möglichster Extension zu berücksichtigen, bis auf unbedeutende Kleinigkeiten übereinstimmen müssen. Selbst der Umstand, daß ich die letzterwähnten Anziehungen bei beträchtlichen Entfernungen des Kometen von der Sonne nicht mit absoluter geometrischer Schärfe bestimmte, wie sie doch bei Befolgung der in *Argelanders* Werk über den Kometen von 1811 auseinandergesetzten Methode erreichbar gewesen wäre, scheint mir die bedeutende Abweichung meines Resultats von dem *Rosenbergerschen*, hinsichtlich der großen Axe, nicht genügend zu erklären. Ich liefs mich bei Berechnung der Störungen der 4 kleinen Planeten von den Grundsätzen leiten, welche *Bessel* in dem oben erwähnten Werk über den Kometen von 1807 (Seite 78) kurz und treffend mit den Worten ausspricht: „Dieser Theil der Störung (welcher von der Wirkung der Planeten auf die Sonne herrührt) wird sich nie sehr anhäufen können, weil er in Perioden, die ungefähr den Umläufen der störenden Planeten gleich sind, wiederkehrt; denn (die Planeten Coordinaten) x', y', z' kehren in solchen Perioden wieder, und die wahre Anomalie des Kometen wächst ein oder einige Jahre nach dem Durchgange durchs Perihelium so langsam, daß dadurch keine sehr beträchtliche Aenderung dieses Resultats entsteht. Dagegen ist die directe Wirkung der Planeten auf den Kometen nur in der Nähe des Kometen bei den Planeten merklich; späterhin wird sie sehr klein, und nähert sich immer mehr dem Werthe $\sum \frac{\mu'}{r^2}$, welcher sich mit der Attraction der Sonne vereinigt, und dann die Bewegung des Kometen nicht mehr ungleichförmig stört.“ Indem ich diese Grundsätze strenger durch den analytischen Calkül prüfte, und dabei die Aenderung jedes Kometen-Elements durch die indirecte Störung eines der unteren Planeten in eine Reihe entwickelt dachte, welche nach den Potenzen des Quotienten fortschreitet, den man erhält, wenn man den Radius Vector des Planeten durch den des Kometen dividirt, indem ich ferner die Störungen vernachlässigte, welche die unteren Planeten durch ihre Anziehung unter einander und von den oberen Planeten leiden, und indem ich von der eben erwähnten Reihe, bei hinreichend großer Entfernung des Kometen von der Sonne im Vergleich des Halbmessers der Planetenbahn, nur die mit der ersten Potenz behafteten

Glieder beibehielt (in der Ueberzeugung, daß die Summe der übrigen Glieder sich noch viel weniger anhäufen kann, und gleichfalls in Perioden, welche ungefähr der Umlaufzeit des betreffenden Planeten gleich sind, wiederkehrt), bemerkte ich, daß derjenige Theil des Differential-Coefficienten eines jeden Kometen-Elements, welcher von der indirecten Anziehung eines unteren Planeten herrührt, ein geschlossenes Integral zuläfst, welches dadurch gefunden wird, daß man partiell integrirt, daß man nämlich nur den Radius Vector und die wahre Anomalie des Planeten als variabel, den Radius Vector und die wahre Anomalie des Kometen dagegen als constant betrachtet. Das Argument dieses Integrals ist die wahre Anomalie des Planeten, von seinem Knoten mit der Ecliptik oder einer andern festen Ebene angerechnet, woraus hervorgeht, daß die Wirkung der indirecten Anziehung, bei obiger Vernachlässigung der höheren Potenzen, genau in Perioden, welche der Umlaufzeit des störenden Planeten gleich sind, wiederkehrt, und sich daher nie anhäufen kann. Wir wollen diese Wirkung Kürze halber die Nutation der Kometen-Elemente nennen; solche Elemente aber, welche von der Nutation befreit sind, mögen mittlere Elemente, in Beziehung auf die indirecte Anziehung dieses oder jenes unteren Planeten, heißen. Die Formeln, wodurch diese Nutation bestimmt wird, sind den *Besselschen*, zur Berechnung der Differential-Coefficienten der Elemente dienenden, völlig analog; Rücksichten auf die in diesem Aufsätze zu beobachtende Kürze, bei der schon so nahe vor der Thür stehenden Wiedererscheinung des *Halleyschen* Kometen, verbieten mir, diese Nutations-Formeln oder deren Beweis, so einfach auch beide sind, hier anzuführen, und ich muß mich mit folgender allgemeinen Bemerkung begnügen. Da ich beim Anfange meiner Rechnung die Präcision überall weiter trieb, als nöthig war, und z. B. durchgängig mit siebenziffrigen Logarithmen rechnete, und erst allmählig, bei mehrerer Beachtung der wichtigen von *Encke* gegebenen Regeln (siehe *Astron. Jahrbuch* für 1835 Seite 257), zu einem sichereren Tacte gelangte, wie viel man den jedesmaligen Umständen gemäß von der äußersten Strenge nachlassen dürfe, so hatte dies auch einen Einfluß auf die Extension, welche ich meinen Berechnungen der Störungen des Kometen von Seiten der kleineren Planeten gab; daher die dabei obwaltende Ungleichförmigkeit. Ich berechnete die indirecte Störung durch Merkur von 1759 rückwärts bis 1758 Sept. 2, verwandelte dann die Kometen-Elemente durch die Nutationsformeln in solche, die man in Beziehung auf diesen Planeten mittlere nennen kann, und liefs weiter rückwärts die indirecte Anziehung des Merkurs ganz unberücksichtigt. Die indirecte Störung durch Venus, Erde und Mars berechnete ich respective bis 1757 Juli 9, 1757 Juli 9 und

1755 März 22 in extenso rückwärts. Bei der vorwärtsgehenden, von 1682 anfangenden Rechnung dagegen führte ich die indirecte Störung durch Merkur in extenso bis zum 2^{ten} Jan. 1683, die durch Venus und Erde bis 1683 Dec. 28, und die durch Mars bis 1686 März 23 fort. Was nun aber die directe Störung von Seiten der unteren Planeten betrifft, so ermittelte ich dieselbe in aller Strenge so lange, bis sie sich nicht merklich verschieden ergab, man mochte nun den Sitz der directen Anziehung in den wahren Mittelpunkt des Planeten, oder in den Mittelpunkt der Sonne setzen. Von da an war es erlaubt, die Bewegung des Kometen, abgesehen von der Störung durch die übrigen Planeten, als rein elliptisch und den *Keplerschen* Gesetzen unterworfen zu betrachten, nur mit dem Unterschiede, daß, statt der Sonnenmasse allein, die mit der Masse des betreffenden Planeten vereinigte Sonnenmasse als Centralkraft wirkt. Hieraus geht nun aber, für den Augenblick, wo man aufhört, die directe Störung durch irgend einen unteren Planeten in extenso zu berechnen, eine plötzliche Aenderung der großen Axe, des Parameters, des Abstandes des Perihels vom Knoten, und der Zeit des Perihels hervor, wovon man sich in der Kürze folgendermaßen eine deutliche Vorstellung machen kann. Es giebt, streng genommen, nicht bloß 6, sondern 7 von einander unabhängige Elemente einer Kometenbahn, welche einem und demselben physischen Augenblicke angehören; die große Axe und Umlaufszeit sind in der That zwei von einander unabhängige Elemente, und diese beiden, verbunden mit den 5 übrigen Elementen, sind Functionen von 7 gegebenen Größen, welche demselben physischen Augenblicke angehören, nämlich von den 3 rechtwinkligen Coordinaten des Kometen, von den Differential-Coefficienten dieser Coordinaten in Beziehung auf die Zeit, und von der anziehenden Masse. Wenn man also die letztere plötzlich verändert denkt, so müssen auch 5 von den 7 Elementen der Kometenbahn eine plötzliche Aenderung leiden, indem nur Knoten und Neigung unverändert bleiben, welche beiden Elemente von der anziehenden Masse unabhängig sind. Die Formeln zur Bestimmung dieser plötzlichen Aenderung ergeben sich leicht aus den *Laplaceschen*, in der *Méc. cél.* Tom. I. pag. 163—168 enthaltenen, und gewähren, besonders bei Vernachlässigung der Quadrate der unbedeutenden störenden Kräfte der unteren Planeten, eine sehr einfache numerische Rechnung. Die oben bemerkte Rücksicht verbietet mir indessen auch hier, die betreffenden Formeln oder deren Beweis anzuführen. Ich berechnete die directe Störung durch Merkur von 1759 an in extenso rückwärts bis 1755 März 22, verwandelte dann die bei der Anziehung der Sonnenmasse allein geltenden Elemente in diejenigen, welche

für die Anziehung der vereinigten Sonnen- und Merkursmasse gelten, und liefs weiter rückwärts die directe Anziehung Merkurs ganz unberücksichtigt. Die directe Störung durch Mars, Venus und Erde wurden resp. bis 1752 Oct. 3, 1750 April 17 und 1747 Oct. 30 rückwärts in extenso fortgeführt. Von 1682 an vorwärts rechnend, bestimmte ich dagegen in extenso die directen Störungen durch Merkur, Mars, Venus und Erde resp. bis 1683 Dec. 28, 1686 März 23, 1686 März 23 und 1688 Sept. 8. Was ferner die Verbesserung der Elemente durch die gefundenen Störungen betrifft, so glaubte ich auf den Umlauf von 1682—1759, welcher gleichsam die Grundlage der ganzen übrigen Rechnung bildet, die größte Sorgfalt wenden zu müssen. Die Störungen wurden daher alle 900 Tage, und für die dem Perihel zunächst liegenden Jahre nach noch viel kürzeren Zeiträumen (wie man aus den bereits angegebenen Datis ersieht) an die zum Grunde gelegten Elemente applicirt. Die Zeiträume aber, welche zur Bestimmung der Störungen vermittelt unverändert beibehaltener Fundamental-Elemente dienten, wurden in größere oder kleinere Intervalle, je nach der größeren oder kleineren Entfernung des Kometen von dem am meisten störenden Planeten, getheilt. So wählte ich für den 14tägigen Zeitraum um die Zeit der stärksten Annäherung des Kometen an die Venus (im Sept. 1682) Intervalle von 1½ Tagen, für die Zeit der stärksten Annäherung an Jupiter (1683) Intervalle von 15 Tagen, für die Zeit der stärksten Annäherung an Saturn (1684 ff.) Intervalle von 3½ Tagen, für die Jahre um das Aphelium des Kometen herum Intervalle von 150 Tagen. Die Planeten-Oerter suchte ich aus den *Lindenau'schen* und *Bouvard'schen* Tafeln mit derselben Schärfe, welche *Rosenberger* bei seiner Rechnung beobachtete, ausgenommen daß ich die periodischen Gleichungen des Uranus und der 4 unteren Planeten größtentheils vernachlässigte, was bei der nicht sehr beträchtlichen Annäherung des Kometen an jeden dieser 5 Planeten wohl erlaubt scheint; ich nahm bei den Reductionen auch auf die Ungleichförmigkeit der Präcession und auf die Verrückung der Erdbahn im Weltraume Rücksicht, indem ich voraussetzte, daß die letztere sich um eine Linie, welche nach dem 170^{sten} Grade der Länge (vom Aequinoctium des Jahrs 1759 an gerechnet) gerichtet ist, in 100 Jahren um einen Winkel von 53" drehe. Ich ging von denjenigen für den 31^{sten} Dec. 1758 und 19,3125 Sept. 1682 geltenden Elementen der Kometenbahn aus, welche sich aus *Rosenberger's* Untersuchungen in Nr. 180 und 196 dieser Nachrichten ergeben, indem ich voraussetzte, daß die Differential-Coefficienten, welche in den beiden genannten Aufsätzen für die Zeiträume 1758 Dec. 31 bis 1759 Juni 9 und 1682 Aug. 26, 3125. bis Sept. 19, 3125 angegeben sind, keiner weiteren Verbesserung bedürften.

Ich legte dieselben Planetenmassen wie *Rosenberger* zum Grunde, und fügte gleichfalls, nach vollendeter Rechnung für den Zeitraum von 1682 bis 1759, eine Correction sämtlicher Störungen hinzu, welche sich aus Verwandlung der *Bouvard'schen* Jupitersmasse $\left(\frac{1}{1070,5}\right)$ in die *Nicolai'sche* $\left(\frac{1}{1053,924}\right)$ ergibt. Damit auf die Veränderung der Fundamental-Elemente von einem Intervall zum andern möglichst Rücksicht genommen würde, so bestimmte ich die Differential-Coefficienten für solche Augenblicke, wo die Fundamental-Elemente durch die gefundenen Störungen verbessert wurden, doppelt, nämlich vermittelt der durch die Störungen noch nicht verbesserten und vermittelt der verbesserten Elemente. Der Unterschied ergab sich, bei der hinreichenden Kürze der Zeiträume, überall höchst unbedeutend, selbst bei dem 360tägigen Zeitraum im Jahr 1683, da die Entfernung des Kometen vom Jupiter sich bis auf 1,691 verminderte. Ich hielt es daher für hinreichend genau, diesen Unterschied unter alle Intervalle des vorhergehenden Zeitraums gleichförmig zu vertheilen, was darauf hinausläuft, die durch die Quadratur gefundenen Störungen um die Größe jenes Unterschiedes, mit der halben Anzahl der Intervalle des vorhergehenden Zeitraums multiplicirt, zu verbessern. Wir wollen diejenigen Aenderungen der Elemente, welche sich vermittelt unverändert beibehaltener Fundamental-Elemente durch Quadratur ergeben, Kürze halber Quadraturen der ersten Ordnung, die eben erwähnten Verbesserungen aber Quadraturen der zweiten Ordnung nennen, und jene mit Δ' , diese aber mit Δ'' bezeichnen. Die Quadraturen erster Ordnung wurden mit Berücksichtigung aller successiven Differenzen, so weit sie sich

noch irgend verkleinern wollten, und in manchen Fällen bis zur fünften Differenz inclusive, nach Anleitung der *Laplace'schen* Formel (*Méc. cél.* Tom. IV. pag. 207) gefunden. Um der Vermeidung aller erheblichen Rechnungsfehler gewiss zu sein, controllirte ich die Resultate vermittelt der successiven Differenzen, so weit sie sich noch verkleinern wollten, nicht nur nach Beendigung der Rechnung für jeden Zeitraum, sondern auch während der Rechnung, so oft die excentrische Anomalie, der Radius Vector und die wahre Anomalie des Kometen, seine Länge und Breite und seine rechtwinkligen Coordinaten gefunden waren; eben so controllirte ich die Planeten-Oerter, die von *Bessel* mit *A, B, C* bezeichneten störenden Kräfte und ihre Summen für alle Planeten, endlich auch die transformirten störenden Kräfte *A', B', C'*. Nach Beendigung der auf den ganzen Umlauf des Kometen sich erstreckenden Rechnung stellte ich noch eine General-Probe an, indem ich die Störungen des ganzen Umlaufs in eine Summe brachte, und diese mit den Elementen verglich, wovon ich anfangs ausgegangen war, und wohin ich zuletzt gelangte, damit ich auf diese Weise gewiss würde, daß keine Verwechselung der Zeichen + und - vorgegangen sei, der auf- und niederwärts steigenden Zusammenzählung (bei Addition langer Columnen) und anderer bekannter Proben nicht zu gedenken.

Nach dieser nothwendigen Rechenschaft über die von mir angewandten Methoden und Vorsichtsmaafsregeln (bei welchen ich mich namentlich des Beifalls eines *Encke* erfreue) möge hier die specielle Vergleichung meiner Resultate mit den *Rosenbergerschen* (in Nr. 250 dieser Nachrichten enthaltenen) folgen. Zuerst die Störungen vom Perihel 1682 bis zum Perihel 1759:

	Δv	Δe	Δi	Δn	$\Delta \omega$	$\Delta T'$ Tage.
<i>Rosenberger</i> hat:	+ 0,308490 + 0,313051	- 2434.93 - 2358.34	+ 7' 34",50 + 7 36,26	+ 1° 32' 33,9 + 1 33 27,2	+ 1° 21' 27,85 + 1 22 26,62	+ 361,365 + 352,874
Unterschiede:	- 0,004561	- 76.59	- 1,76	- 53,3	- 58,77	+ 8,491

Für die Störungen der Neigung *i*, des Knotens *n*, und des Abstandes ω des Perihels vom Knoten, bemerke ich, daß hier die Wirkung der Präcession und der Verrückung der Ebene der Erdbahn nicht mit eingeschlossen ist; die Unterschiede sind unbedeutend. Bei der Excentricität *e* trennt das Punctum die siebente Bruchstelle von der achten; der Unterschied erscheint unbedeutend, wenn man ihn auf die Quadratwurzel *h* des halben Parameters reducirt, welche überhaupt in der ganzen Störungsrechnung (nach den *Bessel'schen* Formeln) viel bequemer statt der Excentricität angewandt wird. Die Zeit des Perihels *T'* bezieht sich lediglich auf die Erscheinung des Kometen im Jahre 1759; denn ob-

gleich ich, mit *Rosenberger*, die Störungen der Zeit des Perihels vom Jahre 1682 an bis gegen die Zeit des Aphels auf die Erscheinung des Kometen im Jahre 1682 bezog, so läßt sich doch für die Resultate hinsichtlich *T'* keine unmittelbare Vergleichung anstellen, weil *Rosenberger* die excentrische Anomalie, ich dagegen die Zeit als absolute Variable betrachtete, jener die Bewegung des Kometen in der Gegend des Aphels auf den Schwerpunkt des Sonnensystems, ich dagegen auf den Mittelpunkt der Sonne bezog. Der beträchtliche Unterschied (+ 8,491 Tage) würde sich noch mehr vermehren, wenn man ihn auf die Erscheinung des Kometen im Jahre 1682 reduciren wollte. Bedenkt man dieses, so

möchte die nahe Uebereinstimmung von Δv (der Störung der täglichen mittleren anomalistischen Bewegung) wohl nur als zufällig erscheinen, indem der Unterschied vom Perihel 1682 bis zum Aphel sich mit dem Unterschiede vom Aphel bis zum Perihel 1759 beinahe compensirt; und es tritt nun die Frage ein: Welches ist der Grund dieser beträchtlichen Abweichung? Ich habe mich der Bestimmung unseres *Encke* zu erfreuen, wenn ich behaupte, daß die *Laplace'sche* Methode, wonach man die excentrische Anomalie als absolute Variable betrachtet, bei einem nicht ganz scharf bestimmten Werthe der großen Axe im Ausgangspunkte der Rechnung, auf größere Irrthümer führe, als die (in Frankreich jetzt keineswegs ganz unbekannte) *Besselsche* Methode, welche die Differential-Coefficienten für gleiche Zeit-Intervalle sucht. Die Sache läßt sich am kürzesten so darstellen. So lange man in der Bestimmung der halben großen Axe beim Anfangspunkte der Rechnung um mehrere Einheiten der dritten Bruchstelle fehlt, muß man die, einem gegebenen und von 180° wenig verschiedenen Grade der excentrischen Anomalie entsprechende Zeit um mehrere Tage (bei den *Damoiseau'schen* Werthen der großen Axe bis zu 20 Tagen) fehlerhaft finden. Man fehlt daher in der Bestimmung der Planetenörter um einen Bogen, welchen der Planet in 20 Tagen durchläuft (was für Jupiter beträchtlich ist, für den Kometen aber, wegen seiner äußerst langsamen Bewegung in der Gegend des Apheliums, bei Befolgung der *Besselschen* Methode kaum in Anschlag kommen kann). Hieraus ist klar, daß man in der Aufsuchung der störenden Kräfte (welche sich überdies, bei Beziehung der Bewegung des Kometen auf den Schwerpunkt des Sonnensystems, größtentheils auf die directen Anziehungen der Planeten reduciren und daher nicht compensiren) unter Befolgung der *Laplace'schen* Methode größeren Irrthümern ausgesetzt ist, als unter Befolgung der *Besselschen*, wenigstens was die Störungen der großen Axe betrifft, welche die beträchtlichsten unter allen sind. Diese Irrthümer könnte man scheinbar durch eine dritte Annäherung wieder gut machen, indem man die ganze Rechnung von vorn anfinge, und dabei die durch die zweite Annäherung gefundenen großen Axen für die beiderseitigen Perihelia zum Grunde legte. Aber der ungeheuren Weitläufigkeit dieses Verfahrens nicht zu gedenken (wozu vor der wirklichen Wiedererscheinung des *Halley'schen* Kometen sicherlich keine Zeit mehr ist), so ist noch die Frage, ob man sich davon in der That eine wesentliche Hilfe versprechen könne. Denn die durch die zweite Annäherung gefundenen großen Axen für 1682 und 1759 (die *Rosenberg'schen*) müßten kaum merklich genäherter seyn, als die durch die erste Annäherung bestimmten (*Damoiseau'schen*) großen Axen, bei welchen

letzteren doch noch der Vortheil statt findet, daß sie sich auf Fundamental-Elemente gründen, welche vom Perihel bis zum Aphel unverändert beibehalten sind, wodurch die dem 180^{ten} Grade vorwärts entsprechende Zeit mit der dem 180^{ten} Grade rückwärts entsprechenden Zeit (wegen der angenommenen halben großen Axe $= 18,0186$, welche der wirklich beobachteten Umlaufszeit $= 27937$ Tagen entspricht) völlig coincidirt. Ich habe, nach allen diesen Betrachtungen, nicht umhin gekonnt, die von *Rosenberger* durch die zweite Annäherung bestimmten großen Axen von 1682 und 1759 auf sich beruhen zu lassen, und die von mir bestimmten für die weitere Rechnung zum Grunde zu legen. Damit man indessen dem von mir beobachteten Verfahren keinen ähnlichen Vorwurf machen könne, als ich dem *Rosenberger'schen* machen zu müssen glaube, so bemühte ich mich, die von mir gefundenen Störungen durch eine dritte (wenn auch nicht in extenso durchgeführte) Annäherung möglichst zu verbessern. Aus dem Zeitpunkt, auf welchen sich das Perihel von 1682 durch die planetaren Störungen bis zum 21^{ten} Sept. 1720 verschoben hat, und aus dem Zeitpunkt, auf welchem sich das Perihel von 1759 durch die rückwärts berechneten planetaren Störungen bis zum 21^{ten} Sept. 1720 verschoben hat, bestimmte ich die dem genannten Datum entsprechende Umlaufszeit und daraus die große Axe. Hieran die Störungen der großen Axe bis zum Perihel applicirt, gaben die zweiten genäherten Werthe der großen Axe für 1682 und 1759. Die übrigen Elemente für die beiden genannten Epochen zu verbessern, damit sie der Gesamtheit der Beobachtungen so gut als möglich Genüge thäten, während sie gerade um den Werth der berechneten Störungen von einander verschieden wären, dazu hätte ich streng genommen alle einzelnen Beobachtungen in Betracht ziehen müssen. Der große darauf zu verwendende Zeitaufwand (da mir die *Rosenberg'schen* Bedingungen für die einzelnen Beobachtungen unbekannt sind) schien mir mit dem zu erwartenden Nutzen in keinem Verhältnisse zu stehen. Ich zog es vor, mich an die mittleren Fehler zu halten, welche dieser Geometer in den Nummern 180 und 196 der *Astron. Nachrichten* für die einzelnen Elemente angibt. Ich betrachtete dieselben als die Gewichte der Zuverlässigkeit der einzelnen Elemente von 1682 und 1759, und suchte nun diejenigen Coefficienten, womit die mittleren Fehler multiplicirt werden müssen, um die wahren zu geben, unter der Bedingung, daß die Summe der Quadrate dieser Coefficienten die möglichst kleinste sei, und daß die Elemente von 1682 und 1759 sich gerade um den Werth der berechneten Störungen von einander unterschieden. Bei diesem Verfahren bedarf, wie leicht zu sehen ist, die Zeit des Perihels gar keiner Verbesserung,

oder die Coefficienten der mittleren Fehler dieser Zeit sind $= 0$. Die auf diese Art von mir bestimmten Werthe von h, i, n, ω, T für die Epochen 1682 und 1759 stimmen mit den *Rosenberger'schen*, aus Berücksichtigung aller einzelnen Beobachtungen erhaltenen Werthen sehr nahe überein; und was etwa gefehlt ist, hat sicherlich keinen merklichen Einfluß auf die Störungen vor 1682 und nach 1759. Hiernach verbesserte ich nun auch die Elemente am 21^{sten} Sept. 1720, und bestimmte daraus die für dies Datum geltenden Differential-Coefficienten der Elemente von neuem, wodurch eine Art von Vermittelung zwischen den vor- und rückwärts berechneten Differential-Coefficienten getroffen ward. Diese vermittelten Differential-Coefficienten waren aber von den vor- und rückwärts berechneten so wenig verschieden, daß ich es, zumal hinsichtlich $\left(\frac{dh}{dt}\right)$, $\left(\frac{di}{dt}\right)$, $\left(\frac{dn}{dt}\right)$ und $\left(\frac{d\omega}{dt}\right)$, für unbedenklich hielt, den Unterschied auf den Zeitraum von 1682 Sept. 19, 3125 bis 1720 Sept. 21 und auf den Zeitraum von 1720 Sept. 21 bis 1758 Dec. 31 gleichförmig zu vertheilen, wie ich oben bei den Quadraturen zweiter Ordnung erwähnt habe. Dieselbe Verbesserung konnte auch auf die Störungen von a (der halben großen Axe) und T angewandt werden; doch mußte dazu noch eine anderweitige Verbesserung kommen, welche in der Natur der *Besselschen*

Formeln für $\left(\frac{da}{dt}\right)$ und $\left(\frac{dT}{dt}\right)$ gegründet ist. Die erstere dieser beiden Formeln enthält nämlich a^2 , die andere aber a als gemeinschaftlichen Factor aller Glieder. Bezeichnen wir nun die halbe große Axe im Perihel 1682 und 1759 resp. mit a und a' , die Verbesserung des *Damoiseau'schen* a aber nach *Rosenberger's* Beispiel (in Nr. 196 dieser Nachrichten) mit Δa , und die Verbesserung des *Damoiseau'schen* a' mit (Δa) , so kann man annehmen, daß jedes vorwärts berechnete $\left(\frac{da}{dt}\right)$ und $\left(\frac{dT}{dt}\right)$ resp. mit $\left(\frac{a + \Delta a}{a}\right)^2$ und $\frac{a + \Delta a}{a}$, jedes rückwärts berechnete $\left(\frac{da}{dt}\right)$ und $\left(\frac{dT}{dt}\right)$ aber resp. mit $\left(\frac{a' + (\Delta a)}{a'}\right)^2$ und $\frac{a' + (\Delta a)}{a'}$ multiplicirt werden müsse. Vollzieht man diese multiplicirt, anstatt an allen einzelnen Differential-Coefficienten, sogleich an dem ganzen Integral vom Perihel bis zum Aphel, so kommt man der Wahrheit sehr nahe, vorausgesetzt daß die dadurch erhaltene Verbesserung an sich so unbedeutend ist, daß sie allenfalls ganz vernachlässigt werden könnte (im entgegengesetzten Falle wäre eine in extenso durchgeführte dritte Annäherung unerläßlich). Dieser günstige Fall traf bei meiner Rechnung zu, wie man aus folgendem Schema sieht:

	Perihel 1682 bis 1758 Dec. 31, ohne Präcession:				Perihel 1682 — 1720 Sept. 21		1720 Sept. 21 — 1758 Dec. 31.	
	Δh	Δi	Δn	$\Delta \omega$	Δa	ΔT	$\Delta a'$	$\Delta T'$
Durch die zweite Annäherung wurden folgende Störungen gefunden:								
Correction wegen Δa und (Δa)	+0,0015614	+7 34,21	+1 32' 30,9	+1 21' 22,05	-0,147954	+42,246	+0,063291	-26,947
Correction von 1682 Sept. 19, 3125 bis 1720 Septbr. 21, nach der Vermittelung.....	-0,0001199	+ 19,77	- 54,6	-52,8	-0,000069	+ 0,403		
Correction von 1720 Septbr. 21 bis 1758 Decbr. 31, nach der Vermittelung.....	+0,0000377	- 2,33	- 5,6	- 4,7			-0,000130	+ 0,158
Wahre Störungen.....	+0,0014792	+7 51' 65	+1° 31' 30" 7	+1° 20' 24" 55	-0,147952	+42,639	+0,063204	-26,798

Vermittelt dieser wahren Störungen wurde nun die Umlaufszeit am 21^{sten} Sept. 1720 genauer, als vorher bestimmt, und dadurch die halbe große Axe für denselben Zeitpunkt gefunden. Hiervon $\Delta a = -0,147952$ subtrahirt, gab die wahre halbe große Axe im Perihel 1682, ohne Rücksicht auf den Widerstand des Aethers, $= 18,174110$, wofür *Rosenberger* 18,170129 hat. Dagegen $\Delta a' = +0,063204$ addirt, gab die wahre halbe große Axe am 31^{sten} Dec. 1758 $= 18,089362$. Da kein Grund war, an der Zuverlässigkeit der *Rosenbergerschen* Differential-Coefficienten der Elemente vom 31^{sten} Dec. 1758 bis 9^{ten} Juni 1759 (in Nr. 180 dieser Nachrichten) zu zweifeln, so nahm ich diese Differential-Coefficienten unverändert in meine Rechnung auf, inte-

grirte sie jedoch, der Sicherheit wegen, von neuem, weil die Bestimmung dieses Integrals, wegen der starken Annäherung des Kometen an Venus um die Zeit des Perihels 1759, und an die Erde gegen Ende Aprils, ein sehr delicateser Punct ist. Wenn gleich ich nun aus dem Gange der successiven Differenzen ersah, daß R , die Zeit-Intervalle kurz genug angenommen hatte, so wich doch das Resultat der von mir vollzogenen Quadratur (wobei ich die fünften Differenzen mit berücksichtigte) von dem seinigen, hinsichtlich der großen Axe, bemerkbar ab. Ich fand Δa vom 31^{sten} Decbr. 1758 bis 9^{ten} Juni 1759 $= -0,011113$, und, um (Δa) willen verbessert, $= -0,011120$, wofür *Rosenberger* (in Nr. 180 dieser Nachrichten) $-0,012685$ hat.

Ich fand Δa vom 31. Dec. 1758 bis zum Perihel $= +0,003369$, und a im Perihel 1759 $= 18,089362 + 0,003369 = 18,092731$, wofür *Rosenberger* (in Nr. 180) $+ 0,002067$ und (in Nr. 250) $18,087821$ hat. Es könnte hiernach scheinen, als wenn diese Verbesserung der *R.*'schen Integration der Differential-Coefficienten die ganze Untersuchung in Nr. 180 wankend machte. Dennoch verliert diese nichts von ihrer Klassicität, und unsere bisherigen Schlüsse bleiben fest stehen, weil der Einfluss dieser Correction auf den geocentrischen Ort des Kometen zur Zeit seiner Sichtbarkeit im Jahre 1759 durchaus unmerklich ist. Merklich kann diese Verbesserung nur bei der Verkündigung der Zeit des diesjährigen Periheliums werden. Ob *R.* diese Correction nachträglich angebracht habe, lässt sich aus den Aufsätzen in Nr. 250 und 276 dieser Nachrichten nicht deutlich erkennen. Mit den auf diese Weise gefundenen Werthen von a im Perihel 1682 und 1759 verbesserte ich auch die übrigen Elemente für beide Epochen von neuem, und hatte so die gewünschten dritten Annäherungen, wie ich glaube, mit hinreichender Schärfe gefunden.

Da ich die von mir befolgte Methode der Ermittlung der planetaren Störungen an dem Beispiel des Umlaufs von 1682 bis 1759 genugsam erläutert zu haben glaube, so werde ich mich mit meinen Bemerkungen über den übrigen Theil meiner Rechnung kürzer fassen können. Da es mir schien, als wenn nichts mich hinderte, an die *Rosenberger*-schen Störungen bis zum 9^{ten} Juni 1759 weiter die nachfolgenden Störungen mittelst der *Besselschen* Methode anknüpfen zu können, so fuhr ich ruhig fort zu rechnen, kam jedoch bald durch Lesung des höchst wichtigen *Olbers'schen* Aufsatzes in Nr. 268 dieser Nachrichten auf andere Gedanken. Denn ich sah voraus, dass mir, sobald ich das im Jahre 1797 eingetretene Aphelium überschritten haben würde, das Gefühl immer drückender werden musste, bei der Berechnung der Störungen ein Perihelium von 1835 zum Grunde legen zu müssen, welches wegen des unbekannten Widerstandes um mehrere Tage fehlerhaft seyn kann. Dieser Uebelstand musste am meisten auf die Störungen durch Jupiter in den Jahren 1834 und 1835 einwirken, da der Abstand desselben vom Kometen sich nach *Damoiseau* bis auf 1,33 verminderte. Dem Uebel abzuhelpen, dazu war, wie *Olbers* bemerkt, eine genaue Berechnung der Störungen bis 1607 rückwärts unerlässlich, da sich über die Wirkung des Widerstandes auf den *Halley'schen* Kometen durchaus nichts a priori bestimmen, ja nicht einmal schätzen lässt. Es könnte scheinen, als wenn zu einer Ermittlung der specifischen Intensität der Wirkung des Widerstandes auf einen bestimmten Weltkörper, das Gesetz dieser Wirkung

schon im Voraus bekannt sein müsste; d. h. man müsste die Form der Function kennen, welche diese Wirkung für verschiedene Entfernungen von der Sonne ausdrückt; man müsste auch davon unterrichtet sein, ob der Widerstand übrigens dem Quadrat der Geschwindigkeit proportional, ob er für rückläufige Weltkörper ein anderer als für rechtläufige, ob er für einen bewegten Aether ein anderer, als für einen ruhenden, ob er innerhalb der Grenzen der sichtbaren Zodiakallicht-Materie eingeschränkt sey, oder sich ins Unendliche erstrecke, u. s. w. Glücklicherweise aber sind alle diese Fragen für einen Kometen von so langgestreckter Bahn, wie beim *Halley'schen*, gleichgültig; und es handelt sich nur darum, die Wirkung des Widerstandes im Ganzen durch Erfahrung zu bestimmen. Denn die obgedachte Form der Function, wie auch die übrigen angeführten Umstände, seien welche sie wollen, so lässt sich leicht zeigen, dass die Wirkung des Widerstandes auf ω und T äußerst unbedeutend ist, und sich noch dazu während eines Umlaufs compensire. Abstrahirt man ferner von der Excentricität, und lässt ihre Stelle unter den 6 von einander unabhängigen Elementen allemal durch die Quadratwurzel h des halben Parameters vertreten, so ist die Wirkung des Widerstandes auf h , wenngleich sie sich nicht compensirt, doch, selbst nach einem Zeitraum von mehreren Umläufen des Kometen, höchst unbedeutend. Die Excentricität vermindert sich daher durch den Widerstand nur insofern, als die grosse Axe sich vermindert, und an der letzteren kann die gesammte Wirkung des Widerstandes nachgewiesen werden. Man wird nicht merklich von der Wahrheit abweichen, wenn man annimmt, dass die grosse Axe sich bei jedem anomalistischen Umlauf durch den Widerstand um gleichviel vermindere, so lange die Kometen-Elemente keine wesentliche Aenderung leiden, wie dies der Fall bis jetzt beim *Halley'schen* Kometen gewesen ist. Die Frage aber: Um wieviel? beantwortet sich aus der Berechnung der planetaren Störungen von 1682 bis 1607 rückwärts, verglichen mit den im Jahre 1607 angestellten Beobachtungen. Herr *von Pontécoulant* meint zwar, dass die Beobachtungen von 1607 (welche bekanntlich vor der Erfindung der Fernröhre gemacht sind) völlig unbrauchbar seien, um daraus hinlänglich zuverlässige Elemente zu finden, und dass es daher immer ungewiss bleiben werde, ob der Unterschied zwischen den Durchgangszeiten durchs Perihel im Jahre 1759, welche durch die Theorie und durch die Beobachtung gegeben sind, von der Ungenauigkeit der angewandten Elemente von 1607 oder vom Widerstande des Aethers, oder von irgend einer andern unbekannten störenden Ursache herrühre. Diese Bemerkung ist gewiss im Allgemeinen gegründet, scheint mir aber doch der Einschränkung zu be-

dürfen, daß man (bei der ungewöhnlichen Annäherung des Kometen an die Erde gegen Ende Septembers 1607, wodurch seine scheinbare Bewegung am Himmel gar sehr vergrößert erschien) in der Bestimmung der Zeit des Perihels aus den Beobachtungen höchstens um einen Tagebruch zweifelhaft bleiben kann, wodurch die Hoffnung, diese Beobachtungen zu einer genaueren Bestimmung der Wirkung des Widerstandes und folglich zu einer zuverlässigeren Verkündigung der nächstbevorstehenden Wiedererscheinung unseres Kometen benutzen zu können, bedeutend erhöht wird. Wir wollen Herrn von *Pontécoulant* soviel zugestehen, daß alle übrigen Elemente, die man aus den Beobachtungen von 1607 geschlossen hat, sowohl die *Halley'schen* als die *Bessel'schen* (in *v. Zach's* monatlicher Correspondenz, Band X. Seite 438 enthaltenen), in ihrer Zuverlässigkeit so tief stehen, daß man den rein und allein durch die Theorie bestimmten Elementen (d. h. denjenigen, welche man erhält, wenn man die Störungen in ununterbrochener Folge von 1682 bis 1607 zurück berechnet) ein größeres Vertrauen schenken dürfe; aber an den Tag des Periheliums, wie er sich aus den Beobachtungen von 1607 ergibt, werden wir uns doch wenigstens halten können; und ich werde weiter unten zeigen, wie ich es versucht habe, auch den Tagebruch zu berichtigen.

Ich legte zur Berechnung der Störungen von 1682 bis 1607 rückwärts diejenigen Elemente von 1682 zum Grunde, welche ich auf die bisher beschriebene Weise aus den *Rosenbergerschen* Abhandlungen Nr. 180 und 196 dieser Nachrichten, verbunden mit den von mir berechneten Störungen von 1682 bis 1759, gefolgert hatte. Die Grundsätze, welche ich weiter befolgte, waren im Wesentlichen dieselben, wie ich sie bei der Ermittlung der planetaren Störungen nach dem Jahre 1682 beobachtet hatte, nur mit folgenden Unterschieden: 1) ich legte gleich anfangs die *Nicolai'sche* Jupitersmasse zum Grunde, und behielt dieselbe ununterbrochen bei, obgleich ich entdeckte, daß die Verwandlung derselben in die *Airy'sche* ($\frac{1}{1045}$), wegen der ganz außerordentlichen Annäherung des Kometen an Jupiter (indem der Abstand beider Gestirne sich am 10^{ten} Juli 1681 bis auf 1,107 verminderte), das durch die Theorie bestimmte Perihel von 1607 um 3 Tage vorwärts schiebt, oder, was dasselbe sagt, die durch die Erfahrung bestimmte Total-Wirkung des Widerstandes um 3 Tage vergrößert, während die alte *Laplace'sche* und *Bouvard'sche* Jupitersmasse ein ganz widersinniges Resultat, nämlich eine Verzögerung der mittleren Bewegung statt einer Beschleunigung, geben würden; 2) ich wählte bei der Bestimmung der Differential-Coefficienten der Elemente größere Zeitintervalle; und verbesserte die Fundamental-Elemente erst nach längeren Zeiträumen,

als dies beim Umlauf von 1682 bis 1759 geschehen war. Denn zu einer Durchführung der Rechnung in derselben Extension wie bisher war, wie auch *Rosenberger* gesteht (siehe die Nachschrift zur *Olbers'schen* Abhandlung in Nr. 268 dieser Nachrichten) vor der wirklichen Wiedererscheinung des Kometen keine Zeit mehr vorhanden. Aber eine solche Extension war, selbst zu einer möglichst vollständigen Begründung der Theorie dieses Kometen, gar nicht nöthig, und wäre, wegen der Ungenauigkeit der Beobachtungen von 1607, fruchtlose Mühe gewesen, wofern man nur dafür sorgte, daß die Störungen der großen *Axe* überall mit der nöthigen Schärfe berechnet würden, damit man sich zur Zeit des im Jahre 1645 eingetretenen Apheliums noch auf die 4^{te} Bruchstelle der halben großen *Axe* verlassen könne. Ich knüpfte die Störungsrechnungen unmittelbar an die *Rosenberger'schen* an, welche in Nr. 196 dieser Nachrichten bis 1682 Aug. 26,3125 zurückgeführt erscheinen. Ich berechnete die directen und indirecten Störungen durch alle 7 Planeten für einen Zeitraum von 120 Tagen, bis zum 28,3125 April 1682 rückwärts, mit 10tägigen Intervallen. Darauf verwandelte ich die wahren Elemente in mittlere, in Beziehung auf die 4 unteren Planeten, und in solche, welche für die vereinigte Masse der Sonne und dieser 4 kleinen Planeten gelten, was bei der schon ziemlich beträchtlichen Entfernung des Kometen von der Sonne und bei der geringen Masse des Mars wohl erlaubt schien (jene Entfernung betrug 2,45555, und die plötzliche Aenderung der halben großen *Axe* wegen Vereinigung der Sonnenmasse mit den Massen der 4 kleinen Planeten = 0,001546). Weiter rückwärts wählte ich einen Zeitraum von 600 und 1200 Tagen, resp. in 50- und 100tägige Intervalle getheilt, was sich im Endresultat (in der Fortschreitung der successiven Differenzen der Differential-Coefficienten der Elemente) ungeachtet der außerordentlichen Annäherung des Kometen an Jupiter und Saturn als hinreichend genau bewährte. Weiter rückwärts nahm ich Zeiträume von 4332 Tagen, gleich der siderischen Umlaufszeit des Jupiter, in je 12 Intervalle getheilt, indem ich bedachte, daß die Elemente des Kometen durch die indirecte Anziehung Jupiters (welche in der Regel den beträchtlichsten Theil aller Störungen ausmacht) nach einem vollen Umlaufe dieses Planeten ungefähr auf ihren alten Zustand zurückgeführt werden, und daher die Irrthümer, welche aus unverändert beibehaltenen Fundamental-Elementen hervorgehen, sich beinahe compensiren; auch schienen mir die 361tägigen Intervalle, wegen der geringen Excentricität der Jupitersbahn, nicht zu groß gewählt, und der Erfolg bestätigte wiederum dies Wagniß als etwas Zulässiges, wegen der regelmäßigen Fortschreitung der successiven Differenzen der Differential-Coefficienten der Ele-

mente. Dieser 4332tägige Zeitraum wiederholte sich 5mal, bis 1618 Febr. 3,3125 rückwärts. Weiter zurück schränkte ich Zeiträume und Intervalle wiederum nach und nach enger ein; vor dem 3^{ten} Febr. 1618 liefs ich drei 1200tägige Zeiträume vorhergehen, resp. in 300-, 300- und 100tägige Intervalle getheilt; der letzte kurze 153tägige Zeitraum endlich wurde in neun 17tägige Intervalle getheilt; alles dies bestätigte sich durch den Erfolg als zulässig. 3) Auch in der Extension bei Anwendung der Logarithmen liefs ich von der bisherigen Strenge allmählig nach; wenn ich für den Umlauf von 1682 bis 1759 überall mit fünfziffrigen Logarithmen gerechnet hatte, so behielt ich dieselben nur bis zum 14^{ten} Juli 1665 rückwärts bei, um der Zuverlässigkeit der Störungen der großen Axe willen; weiter zurück brauchte ich vierziffrige Logarithmen und die Winkel nur in Minuten, weil die Störungen der großen Axe gegen das Aphelium hin immer geringer werden; dieselbe vierziffrige Rechnung behielt ich bis zum Jahr 1608 rückwärts bei (ungeachtet die Störungen der großen Axe wieder zunahmen), weil man ja keinesweges die Absicht hat, von der großen Axe im Augenblick des Perihels von 1607 einen weiteren Gebrauch zu machen, und man sich zur Darstellung der geocentrischen Oerter des Kometen zur Zeit seiner Sichtbarkeit im Jahre 1607 mit einem sehr rohen Werthe der großen Axe behelfen kann. Ja für den letzten 153tägigen Zeitraum begnügte ich mich mit dreiziffriger Berechnung der Störungen, was sich durch den Erfolg (d. h. durch die sehr geringe Gröfse der sich ergebenden Differenzial-Coefficienten und ihrer einzelnen Theile) als vollkommen statthaft bewährte. 4) Was die Berechnung der Planeten-Oerter aus den *Bouvard'schen* Tafeln betrifft, so supplirte ich diejenige Tafel, welche die grofse Ungleichheit des Uranus angiebt, für die Jahre 1607 bis 1680 vermittelst der Formel, worauf diese Tafel gegründet ist. Streng genommen hätten für die nächsten Monate nach dem Perihel von 1607 auch die Oerter der 4 unteren Planeten aus den Tafeln gesucht, und daraus die Störungen berechnet werden müssen. Aber eine leichte Ueberlegung, nach den Epochen der mittleren Länge und nach der gröfstmöglichen Aequatio Centri angestellt, zeigte a) dafs der Komet, während er von seinem Perihel im J. 1607 bis zur Erdbahn lief, sich beinahe auf entgegengesetzter Seite der Sonne befand, als Venus und die Erde; b) dafs er zwar während der Dauer seiner Sichtbarkeit (1607 Sept. 28 bis Oct. 23) der Venus und Erde ziemlich nahe kam, aber doch eine zu grofse nördliche Breite hatte, als dafs die directe Anziehung dieser beiden Planeten eine merkliche Aenderung (mit Rücksicht auf die Ungenauigkeit der damaligen Beobachtungen) in seinen Elementen hätte hervorbringen können; c) dafs zwar einige Monate nach

dem Perihel eine heliocentrische Conjunction des Kometen mit Mars statt fand, bei einem Abstände des Kometen von der Sonne, welcher beinahe dem Halbmesser der Marsbahn gleich war, dafs aber dennoch der Komet damals, nach bereits durchschrittenem absteigenden Knoten mit der Erdbahn, schon eine zu grofse südliche Breite erreicht hatte, als dafs er von der Anziehung des Mars eine merkliche Störung hätte erleiden können; endlich d) dafs der Komet bei jedem seiner Umläufe von der Merkursbahn zu weit entfernt bleibt, als dafs es nöthig wäre, die Anziehung dieses Planeten bei Beobachtungen, welche nicht auf die äußerste Genauigkeit Anspruch machen, in Rechnung zu ziehen. Die Berechnung der Störungen für die nach 1607 zunächst folgenden Jahre wurde überdies durch den Umstand, dafs der Komet in dieser Zeit stets sehr weit vom Jupiter und Saturn entfernt blieb, um vieles erleichtert. Seine kleinste Entfernung vom Uranus, während des dreifachen Umlaufs von 1607 bis jetzt, fand am 7^{ten} December 1620 statt, und betrug 9,722. 5) Ich habe, aus den schon angeführten Gründen, die Störungen nicht von 1607 vorwärts und von 1682 rückwärts berechnet, dafs sie sich etwa im Aphelium begegnet hätten, wie ich dieses Verfahren für den Umlauf von 1682 bis 1759 beobachtete; sondern ich führte die Störungen in Einem Zuge rückwärts, über das Aphelium hinaus, bis zum wirklichen Perihelium des Jahrs 1607 fort. Dabei wurde, hinsichtlich des Elements T , die nach und nach durch die Störungen verbesserte Zeit des Perihels von 1682 zum Grunde gelegt, bis ich, einige Jahre über das Aphelium hinaus rückwärts, den 24,3125 Oct. 1641 erreicht hatte. Hier wurden nicht nur die Elemente der Lage vom mittleren Aequinoctium des 15^{ten} Sept. 1682 auf das mittl. Aequin. des 26^{sten} Oct. 1607 und auf die damals statt gefundene Ebene der Erdbahn reducirt, sondern es wurde auch die Zeit des Perihels von 1682, vermittelst der aus der großen Axe hergeleiteten Umlaufszeit, auf die Zeit des Perihels von 1607 übertragen, und diese letztere für die weiter rückwärts zu berechnenden Störungen als Fundamental-Elemente angewandt. Wir wollen nun die um der Störungen willen veränderliche Zeit des Perihels von 1607 mit T , die um der vor 1682 vorhergehenden Störungen willen veränderliche Zeit des Perihels von 1682 aber mit T' bezeichnen. Es ist leicht einzusehen, dafs man sich des auf rein theoretischem Wege gefundenen Werthes von α und T auf eine Reihe von Jahren vor 1641 ohne merklichen Fehler (mit Rücksicht auf die geringe Genauigkeit der Beobachtungen von 1607) bedienen konnte, da ja überhaupt die erforderliche Präcision des als Fundamental-Element angewandten T mit der (vom Perihel angerechneten) mittleren Anomalie des Kometen in umgekehrtem Verhältnisse steht. Je weiter aber

die Störungen gegen das Jahr 1607 hin zurückgeführt wurden, desto wünschenswerther war es begreiflicherweise, über die Total-Wirkung des Widerstandes schon wenigstens eine vorläufige Kenntniss zu haben. Allerdings eine wesentliche Schwierigkeit; aber sie liefs sich überwinden. Den Widerstand hypothetisch zu bestimmen, blieb immer bedenklich; sicherer war es, die planetaren Störungen des Elements T vom Perihel 1607 bis zum 14,3125 Dec. 1629 (bis zu diesem Datum rückwärts wurden die rein theoretisch bestimmten Werthe von a und T durchaus unverändert beibehalten) im Voraus ungefähr zu schätzen und an den erfahrungsmässig bestimmten Werth von T (1607 Oct. 26 oder 27) zu appliciren. Aus den *Rosenberger'schen*, in Nr. 250 und 276 dieser Nachrichten niedergelegten, Rechnungen scheint hervorzugehen, daß das auf den gemeinschaftlichen Schwerpunkt der Sonne, des Jupiter, Saturn und Uranus bezogene T während des halben Umlaufs vom Perihel bis zum Aphel immer nur um Brüche des Tages, oder höchstens um wenige ganze Tage variire, und mit dem wirklichen physischen Perihelium beinahe coincidire. Diese Bemerkung gab mir den Wink, das Element T für den 14^{ten} Dec. 1629 vom Mittelpunkt der Sonne auf den genannten Schwerpunkt zu reduciren (wozu ich mich theils der Näherungsformeln in Nr. 250 dieser Nachrichten Seite 169, theils der für 361tägige Intervalle berechneten rechtwinklichen Jupiters-, Saturns- und Uranus-Coordinaten und ihrer successiven Differenzen bediente), und die Reduction für den genäherten Werth der Störungen des Elements T vom Perihel 1607 bis zum 14^{ten} Dec. 1629 zu halten. Dasselbe Verfahren mußte noch für die Endgrenzen einiger der nächstfolgenden Zeiträume, für welche die Fundamental-Elemente unverändert beibehalten wurden, wiederholt werden, um in dem zum Grunde gelegten T so wenig als möglich von der Wahrheit abzuweichen. Endlich aber, gegen die Zeit des wirklichen, physischen Perihels von 1607, da die Störungen von T sich in immer engere Grenzen zusammengezogen, und zuletzt auf sehr kleine Brüche des Tages schmolzen, verlies ich die Reduction auf den Schwerpunkt gänzlich, und muthmaafte die noch übrigen Schwankungen von T aus der oberflächlichen Ansicht der bis dahin erhaltenen Werthe von $\left(\frac{dT'}{dt}\right)$ und aus der Fortschreitung ihrer successiven Differenzen. Nach diesen Vorsichtsmaafregeln fand ich im Endresultat (als ich die Störungen bis zum wirklichen Perihel von 1607 rückwärts fortgeführt hatte), daß ich in den als Fundamental-Elemente zum Grunde gelegten Werthen von a und T niemals mehr gefehlt hatte, als statthaft war. In dem letzten, kurzen, 153tägigen Zeitraum könnte es scheinen, als wäre zur genauen Bestimmung

der Störungen auch eine scharfe Kenntniss des Tagebruchs nöthig, wodurch die Zeit des wirklichen, physischen Perihels von 1607 ausgedrückt wird. Es ist aber erlaubt, diesen Bruch beliebig anzunehmen (ich setzte ihn der Bequemlichkeit wegen = Oct. 26,3125, welcher Bruch, von *Rosenbergers* in Nr. 196 dieser Nachrichten angeführten Störungen her, für alle einzelnen Intervalle von mir beibehalten worden war), und den dadurch begangenen Fehler in entgegengesetztem Sinne auf die Planeten-Oerter zu übertragen, wo sich dann leicht zeigen läfst, daß selbst ein Fehler von einem ganzen Tage, bei der damals statt gefundenen sehr grofsen Entfernung des Kometen vom Saturn und Jupiter; gar keinen merklichen Einfluß auf die störenden Kräfte hat. Der einzige Fehler, der hiernach übrigbleiben kann, besteht in der Veränderung der 6 Kometen-Elemente während des Verlaufs eines Tagebruchs; dieser Fehler aber ist, bei der Kleinheit der Differential-Coefficienten der Elemente, so gering, daß er (mit Rücksicht auf die Ungenauigkeit der Beobachtungen von 1607) unbedenklich vernachlässigt werden kann. Endlich habe ich noch 6) zu bemerken, daß ich die scheinbar zu grofse Abweichung von der erforderlichen Strenge, indem ich Intervalle von nicht weniger als 361 Tagen und Zeiträume von 4332 Tagen wählte, dadurch wieder gut zu machen suchte, daß ich a) zwischen den Coordinaten des Saturn und Uranus und den von diesen beiden Planeten ausgehenden störenden Kräften niemals interpolirte, sondern die letzteren, für dieselben Zeit-Intervalle als beim Jupiter, durchaus in extenso aus den Tafeln berechnete; b) daß ich die von mir so genannten Quadraturen der zweiten Ordnung auf ähnliche Art bestimmte, wie ich beim Umlauf von 1682 bis 1759 angeführt habe, daß ich aber, da dies für die Zeit der außerordentlichen Annäherung des Kometen an Jupiter im Jahre 1681 nicht genau genug war, in dem oben angeführten 600tägigen Zeitraum die Fundamental-Elemente auch für die einzelnen Zeit-Intervalle durch die gefundenen Störungen verbesserte, und danach die Differential-Coefficienten von neuem bestimmte. Dies Verfahren gab für den genannten Zeitraum $\Delta''a = -0,006870$; die Vernachlässigung dieser Vorsicht würde die Total-Wirkung des Widerstandes 16 bis 17 Tage zu grofs, und folglich die diesjährige Rückkehr unsers Kometen zur Sonnennähe um eben soviel Tage zu früh gegeben haben.

Ehe ich dem Resultat meiner Untersuchung der planetaren Störungen von 1607 bis 1682 absolut traute, beschlofs ich eine Probe durch Vergleichung desselben mit den Beobachtungen von 1607 anzustellen. Zum grofsen Glück besitzen wir eine höchst scharfsinnige Discussion dieser Beobachtungen von *Bessel*, am angeführten Orte der *v. Zach'schen*

Correspondenz. Ich glaubte den von diesem außerordentlichen Manne vorgenommenen Reductionen der Beobachtungen blindlings trauen zu dürfen. Ich wählte daher zur Vergleichung mit meinem Resultat auch nur diejenigen *Harriot'schen* und *Longomontan'schen* Beobachtungen aus, welche dieser große Geometer als überhaupt brauchbar angiebt. Ich suchte diese Beobachtungen durch meine rein theoretisch bestimmten Elemente darzustellen, und wählte für T zuerst versuchsweise den Werth, welchen *Bessel* gefunden, October $\frac{1}{2}$ 17^h 20' 19" m. Z. zu Paris. Da aber die sehr geringe Genauigkeit der Beobachtungen widerrieth, die Rechnung in der größten Schärfe zu führen, so vernachlässigte ich 1) die periodischen Störungen der Erde durch die übrigen Planeten, 2) die Störungen der Kometen-Elemente vom Tage der Beobachtung bis zum Augenblick des Perihels (es wurden vielmehr diejenigen für den Augenblick des Perihels geltenden Elemente zum Grunde gelegt, welche man in Beziehung auf die 4 unteren Planeten mittlere Elemente nennen kann, und welche überdies für die vereinigte Masse der Sonne und dieser 4 Planeten gelten); 3) die Nutation der Aequinoctial-Punkte bei Bestimmung der Länge der Erde und des Kometen; 4) die Präcession vom Tage der Beobachtung bis

zum Tage des Perihels; 5) die Parallaxe des Kometen; 6) seine Aberration. Da die Unterschiede der berechneten und beobachteten geocentrischen Oerter sich einerseits größer ergaben, als mit der Güte der Beobachtungen vereinbar war, andererseits aber regelmäßig fortschritten, und größtentheils mit einerlei Zeichen behaftet waren, so war zu vermuthen, daß eine kleine Aenderung der Zeit des Perihels die Unterschiede bedeutend verringern würde. Ich behielt daher die theoretisch bestimmten Elemente a, h, i, n, ω unverändert bei, und änderte nur T so, daß die Summe der Quadrate der übrigbleibenden Unterschiede (nachdem jeder Längenunterschied, wie sich's gehört, mit dem Cosinus der Breite multiplicirt war) die kleinstmögliche ward. Hiernach fand sich das Perihel 0,2924 Tage später als nach *Bessel*, und versetzte sich auf 1607 Oct. 27,0148 Pariser M. Z., vom Mittag an gerechnet. Folgende Tafel zeigt die Unterschiede der berechneten und beobachteten geocentrischen Längen und Breiten, je nachdem man die theoretisch bestimmten Elemente a, h, i, n, ω mit dem *Bessel'schen* $T = \text{Oct. 26,7224}$, oder mit dem von mir gefundenen $T = \text{Oct. 27,0148}$ in Verbindung setzt:

Zeit der Beobachtung. Tag alten Styls. Pariser M. Z.	Beobachter.	Perihel Oct. 26,7224. Unterschiede.		Perihel Oct. 27,0148. Unterschiede.	
		Länge.	Breite.	Länge.	Breite.
1607 Sept. 18,26707	Longomontan	- 2° 0' 38"		+ 16' 43"	
21,27673		- 1 42 17	+ 36' 21"	- 18 57	+ 43
21,35373		- 1 26 19	+ 35 4	- 3 33	- 1' 14
22,33269		- 1 13 11	+ 39 31	- 11 16	- 1 31
23,29081	Harriot	- 1 18 7	+ 58 36	- 33 28	+ 15 40
24,26977		- 41 30	+ 34 18	- 9 18	- 7 57
24,33226		- 40 51	+ 34 18	- 9 14	- 7 45
28,31065		- 10 34	+ 13 53	- 5 48	- 20 56
Oct. 3,28896		- 23	+ 11 40	- 6 42	- 17 50
13,24606		+ 21 23	+ 16 44	- 8 29	- 18 10

Das Zeichen + bedeutet, daß die beobachtete Länge oder Breite größer ist, als die berechnete. Man sieht aus obigem Schema, daß die Fehler, welche bei dem angenommenen Perihel Oct. 27,0148 übrig bleiben, geringer sind, als die Abweichungen derjenigen Längen und Breiten von einander, welche aus gleichzeitig gemessenen Abständen des Kometen von mehr als Einem Fixstern-Paar gefolgert wurden. Der einzige auffallend große Unterschied ist der der Länge bei der Beobachtung am 23^{ten} September; aber auch er schränkt sich in die gehörigen Schranken ein, wenn man ihn mit dem Cosinus der Breite multiplicirt, und so sehen wir, daß sich die durch die Theorie ermittelten Elemente von 1607 gar wohl mit den Beobachtungen, nach deren Güte zu urtheilen, vereinigen lassen, und daß die letzteren ein sicheres Mittel darbieten,

die Total-Wirkung des Widerstandes bis auf einen kleinen Theil eines Tages zuverlässig zu bestimmen. Diese Bemerkung dient zugleich zur Probe, daß sich in unsere Berechnung der planetaren Störungen von 1607 bis 1682 kein erheblicher Rechnungsfehler eingeschlichen habe. Wenn dies für die große Axe nicht unzweifelhaft erhellt, so läßt sich doch auch dafür eine Art von Probe denken. Ich brachte die Störungen des Elements T , vom Perihel 1607 bis zum 24,3125 Oct. 1641, desgleichen die Störungen von T' , vom 24,3125 Oct. 1641 bis zum Perihel 1682, in eine Summe, und applicirte die erste Summe an das von mir bestimmte wirkliche Perihelium $T = 1607 \text{ Oct. 27,01}$, die letztere Summe aber an das wirkliche Perihelium $T' = 1682 \text{ Sept. 14,81427}$. Daraus fand sich für den 14,3125 Oct. 1641: $T = 1607 \text{ Oct. 23,28}$,

und $T' = 1682$ Oct. 17,07. Dies giebt für das genannte Datum des Jahrs 1641 eine Umlaufszeit von 27387,79 Tagen, welcher eine halbe große Axe $= 17,781659$ entspricht. Hieraus und aus den planetaren Störungen von 1641 Oct. 24,3125 bis zum Perihel 1682 ergibt sich a im Perihel 1682 $= 18,175395$. Wir fanden aber aus den planetaren Störungen von 1682 bis 1759 und aus der wirklich beobachteten anomalistischen Umlaufszeit für denselben Zeitraum: a im Perihel 1682 $= 18,174110$. Hiervon der eben angeführte Werth $a = 18,175395$ abgezogen, giebt die Total-Wirkung des Widerstandes auf die halbe große Axe der Bahn des *Halley'schen* Kometen für jeden Umlauf

$$= -0,001285.$$

Da nun eine Veränderung von 0,00042 in der halben großen Axe der Bahn dieses Kometen eine Veränderung von einem Tage in der Umlaufszeit bewirkt, so sehen wir, daß der Widerstand jeden folgenden Umlauf unseres Kometen um 3,06 Tage verkürzt. Indem ich nun an das dem 24,3125 Oct. 1641 entsprechende $a = 17,781659$ die Störungen von a bis zum Perihel 1607 rückwärts applicirte, und außerdem die Total-Wirkung des Widerstandes 0,001285 mit dem Zeichen + hinzufügte, erhielt ich dasjenige a , aus welchem man theoretisch den Tag des Perihels im Jahre

1531 bestimmen könnte, wenn man von den planetaren Störungen zwischen 1531 und 1607 abstrahiren wollte. Ich fand 1531 Oct. 8 (neuen Styls). Dies Datum konnte nur wenige Monate von der Wahrheit abweichen, weil der Komet in den vor 1607 zunächst vorhergehenden Jahren stets sehr weit vom Jupiter und Saturn entfernt (fast in heliocentrischer Opposition mit beiden Planeten) blieb. Wirklich hat *Halley* das Perihel am 25^{ten} Aug. 1531 (alten Styls) gefunden, welches Datum von obigem (Oct. 8) nur um 34 Tage abweicht; ein geringer Unterschied, wenn man bedenkt, daß die Störungen durch Jupiter und Saturn (welche Planeten in den nächsten Jahren nach 1769 gleichfalls stets sehr weit vom Kometen entfernt blieben) während der Dauer des letzten Umlaufs das auf 1835 bezügliche T um drei Monate verschoben haben.

Nach diesen Bemerkungen über die Ermittlung der Totalwirkung des Widerstandes und über die Proben, welche dabei der Sicherheit wegen notwendig angestellt werden mußten, will ich nun die Elemente von 1607, 1682 und 1759, wie ich sie mit Rücksicht auf den Widerstand in aller Schärfe bestimmt habe, in einen gemeinschaftlichen Ueberblick zusammenstellen:

Elemente, bezogen auf das jedesmalige gleichzeitige mittlere Aequinoctium.

Im Perihel 1607:	Im Perihel 1682:	Im Perihel 1759:
Zeit des Perih. 1607 Oct. 27,0148	Zeit 1682 Sept. 14,81427	Zeit 1759 März 12,57124
Kleinster Abstand von der $\odot$: 0,584175	Excentricität..... = 0,96793150	Excentricität..... = 0,96769237
Halbe große Axe = 17,94943	halbe große Axe..... = 18,174752	halbe gr. Axe..... = 18,092089
Knoten..... = $48^{\circ}14'9''$	Knoten..... = $51^{\circ}10'29''9$	Knoten..... = $53^{\circ}47'44''9$
Perihel in der Bahn = 300 46 59	Abstand des Perihels vom	Abstand des Perihels vom
Neigung..... = 17 6 17,1	Knoten..... = 109 14 54,5	Knoten..... = 110 37 21,9
Bewegung rückläufig.	Neigung..... = 162 13 56,16	Neigung..... = 162 22 7,00

Die Zeit ist überall mittlere Pariser, vom Mittag an gerechnet. Man könnte statt dieser Elemente vielleicht noch strengere finden, welche, nach der Methode der kleinsten Quadrate, allen Beobachtungen von 1607, 1682 und 1759 zusammengenommen, mit Rücksicht auf ihre Güte, so nahe als möglich Genüge thäten, während sie sich genau um den Werth der berechneten planetaren Störungen und um die gefundene Total-Wirkung des Widerstandes unterschieden. Aber einmal würde der dazu erforderliche Zeitaufwand dem zu erwartenden Nutzen nicht entsprechen; zweitens würde die Bestimmung des Grades der Zuverlässigkeit der Beobachtungen von 1607 im Vergleich zu denen von 1682 und 1759 sehr precär sein; drittens würden die Verbesserungen so gering sein, daß sie kaum einen merklichen Einfluß auf die Störungen von 1759 bis 1835 haben möchten. Ich wende mich daher sogleich zu diesen

letzteren, und will etwas über die Art und Weise sagen, wie ich sie berechnete.

Ich legte diejenigen Elemente vom 31^{ten} Dec. 1758 zum Grunde, welche ich aus den *Rosenberger'schen* Resultaten in Nr. 180 und 196 dieser Nachrichten, verbunden mit den von mir berechneten planetaren Störungen vom 19,3125 Sept. 1682 bis 31^{ten} Dec. 1758, geschlossen hatte. Ich applicirte daran die in Nr. 180 enthaltenen Störungen vom 31^{ten} Dec. 1758 bis 9^{ten} Juni 1759, jedoch mit der oben angeführten Verbesserung der Integration und mit der erfahrungsmäßig bestimmten Total-Wirkung des Widerstandes. Zur Berechnung der Störungen nach dem 9^{ten} Juni 1759 betrachtete ich, wie ich das schon vom 19,3125 Sept. 1682 an immer gethan hatte, die am 31^{ten} Dec. 1758 statt findende Ebene der Erdbahn als die zum Grunde gelegte feste Ebene,

und bezog auf diese und auf das mit dieser Ebene gleichzeitig statt findende mittlere Aequinoctium alle Elemente und Coordinaten; die Reduction auf das für die Zeit des Perihels 1835 geltende mittlere Aequinoctium versparte ich bis zum völligen Schlufs der Rechnung. Die Zeit-Intervalle nahm ich im Ganzen von derselben Gröfse, wie für den Umlauf von 1607 bis 1682, was mir, in Uebereinstimmung mit den Ansichten des Herrn Prof. *Encke*, hinreichende Zuverlässigkeit im Endresultat zu versprechen schien, da ja die Störungen von 1759 bis 1835 nicht zur Begründung einer völlig scharfen Theorie unseres Kometen, sondern nur zur Ankündigung seiner bevorstehenden Wiedererscheinung berechnet werden sollten, damit man ihn bei der ersten neuen, schwachen Lichtspur im Fernrohr nicht verfehle. Zur vollständigen Begründung der Theorie dieses Kometen ist noch wenigstens das Ensemble der Beobachtungen bei seiner nächstbevorstehenden Sichtbarkeit abzuwarten, und man wird sich bemühen müssen, ihn so früh als möglich zu entdecken, einen möglichst grofsen Bogen seiner scheinbaren Bahn in möglichst ununterbrochenem Zusammenhange vor und nach der Sonnennähe beobachtend zu verfolgen, die an verschiedenen Orten der Erdoberfläche anzustellenden Beobachtungen möglichst zu vervielfältigen, daraus die wahrscheinlichsten Elemente zu bestimmen, und mit Hülfe derselben und aller in den nächsten Jahrzehenden noch zu hoffenden Erweiterungen unserer Kenntnifs des Planeten-Systems die Störungen von 1835 von neuem rückwärts zu berechnen. Damit eine solche Rückwärtsrechnung möglichst scharf und sicher durchgeführt werden könne, mufs schon ein ziemlich der Wahrheit nahekommender Werth der grofsen Axe im Augenblick des Perihels von 1835 bekannt sein. Diesen Werth der grofsen Axe zu bestimmen, mufs, neben dem Bestreben, den Kometen bei seinem ersten lichtschwachen Anrücken nicht zu verfehlen, ein Hauptzweck der vorläufigen Berechnung der Störungen bis 1835 sein. Diesen Hauptzweck glaubte ich schon sicher genug zu erreichen, wenn ich die Intervalle zur Bestimmung der Differential-Coefficienten, und die Zeiträume zur Verbesserung der Elemente, im Ganzen so grofs annahm, wie ich sie für den Umlauf von 1607 bis 1682 gewählt hatte. Ich nahm nach dem 9^{ten} Juni 1759 einen Zeitraum von 324 Tagen, in 18tägige Intervalle getheilt, und berechnete für denselben die Störungen durch alle 7 Planeten, mit Ausnahme der indirecten durch Merkur. Die auf diesen Planeten bezügliche Nutation subtrahierte ich beim Anfang des gedachten 324tägigen Zeitraums, die auf Venus, Erde und Mars bezügliche

aber am Ende desselben. So war ich bis zum 28^{ten} April 1760 gekommen, und reducirte nun die Elemente auf die mit der Masse der 4 unteren Planeten vereinigte Sonnenmasse als Centralkraft. Von hier an wurden lediglich die Störungen durch Jupiter, Saturn und Uranus gesucht, und zwar mit Anwendung der *Nicolai'schen* Jupitersmasse, welche indefs nach *Pontécoulant's* Aeuferung (siehe dessen *Notice sur la comète de Halley et son retour en 1835, suivie d'un éphéméride calculé par Bouvard, pag. 130*, in der Anmerkung) das diesjährige Perihel kaum um Einen Tag anders bestimmt, als die *Bouvard'sche* Masse $\frac{1}{1070,5}$. Ich liefs nach dem 28^{ten} April 1760 einen Zeitraum von 720 Tagen folgen, in 40tägige Intervalle getheilt (ich hätte die letzteren, wegen der grofsen Entfernung des Kometen vom Jupiter und Saturn, beträchtlich gröfser annehmen können). Dann folgte ein Zeitraum von 1080 Tagen, in 360tägige Intervalle getheilt, dann 5 Zeiträume von je 4332 Tagen, mit 361tägigen Intervallen, dann 2 Zeiträume von je 1080 Tagen, bei welchen letzteren ich jedoch den Pariser mittleren Mittag allmählig in die Berliner mittlere Mitternacht übergehen liefs, indem ich 4 Intervalle von 270 Tagen und 4 Intervalle von $270\frac{29273}{172800}$ Tagen annahm. Diese Verwandlung der Tageszeit hatte darin ihren Grund, dafs ich die Planeten-Oerter bis zum 21^{ten} Juni 1830 in extenso aus den *Bouvard'schen* Tafeln aufsuchte, von da an aber mich der vortrefflichen *Encke'schen* Ephemeriden für die Jahre 1830 bis 1835 bediente. Die Rechnung wurde bis 20 Jahre vor dem Aphelium mit fünfziffrigen Logarithmen durchgeführt, von da an aber vierziffrig. Am 1^{ten} November 1800 wurde die auf 1759 bezügliche Zeit des Perihels (*T*) mittelst der aus der grofsen Axe geschlossenen Umlaufszeit auf die dem Jahre 1835 zugehörige Zeit des Perihels (*T'*) übergetragen, auch diese letztere vom 21^{ten} Juni 1830 an nach Berliner mittlerer Zeit ausgedrückt. Da zu erwarten war, dafs das für 1830 geltende *T'* sich durch die Störungen bis zum wirklichen Perihel kaum um Einen Tag verschieben würde (eine Erwartung, die sich durch den Erfolg bestätigte), so richtete ich mich danach hinsichtlich der Wahl der Intervalle, welche auf den 21^{ten} Juni 1830 noch folgen sollten, und sorgte zugleich dafür, dafs ich beim Gebrauch der Ephemeriden des *Encke'schen* Jahrbuchs so wenig als möglich zu interpoliren nöthig hätte. Ich wählte daher für die noch übrige Zeit bis zum wirklichen Perihel drei Zeiträume, einen von 1345 Tagen, in 5 Intervalle getheilt, einen von 456 Tagen, mit 6 Intervallen, und einen von 183 Tagen mit 11 Intervallen. Alle diese Intervalle bestätigten sich durch den Erfolg als klein genug, obgleich der Abstand des Kometen vom Jupiter sich am 12^{ten} Febr. 1835 bis auf 1,33 verminderte; (bei der Rückwärtsrechnung nach den dies-

jährigen Beobachtungen, zur vollständigen Theorie unseres Kometen, wird man kleinere Intervalle nehmen müssen). Auch die Quadraturen zweiter Ordnung ließen sich, nach der oben angeführten Näherungsmethode, ohne Umstände bewerkstelligen; und für den letzten, kurzen, 183tägigen Zeitraum reichte ich mit dreiziffriger logarithmischer Rechnung aus. Da ich nun überdies durch die

ganze Rechnung dieselben Vorsichtsmaafsregeln und Proben anwandte, wovon ich oben Erwähnung gethan, so wage ich es, hier das End-Resultat vor den Richterstuhl kompetenter Astronomen zu stellen und mit den Resultaten anderer Geometer, welche dieser langwierigen Arbeit ihre Kräfte gewidmet, zu vergleichen:

Elemente im Perihel 1835, auf das gleichzeitige mittlere Aequinoctium bezogen.

(Die Zeit ist vom Mittag an gerechnet.)

Nach <i>Damoiseau</i> , mit Rücksicht auf die Verfrühung des Perihels durch die Wirkung der Erde im Jahre 1759:	<i>Pontécoulant's</i> neueste Elemente:	Nach <i>Rosenberger's</i> Störungen bis zum 296° der excentr. Anom., verbunden mit den <i>Damoiseau's</i> chen von 296° bis 360°:	Nach meiner Rechnung:
$T = 1835 \text{ Nov. } 4,32 \text{ M. P. Z.}$	$T = 1835 \text{ Nov. } 12,7 \text{ M. P. Z.}$	$T = 1835 \text{ Nov. } 11,576 \text{ (Nov. } 3,844)$	$1835 \text{ Nov. } 26,27$
Kleinster Abst. von der $\odot = 0,585520$	Kl. Abstand von $\odot = 0,584539$	Kl. Abst. von $\odot = 0,58657$	$0,586782$
$a = 17,99035$	$a = 17,997554$	$a = 17,98792 \text{ (17,98297)}$	$17,86452$
$n = 55^\circ 7' 6''$	$n = 55^\circ 29' 57''$	$n = 55^\circ 11' 21''$	$55^\circ 9' 43''$
Perihel in der Bahn $= 304^\circ 34' 27''$	Perihel $= 304^\circ 31' 43''$	Perihel $= 304^\circ 30' 59''$	$304 \text{ } 30 \text{ } 11$
$i = 17^\circ 46' 51''$	$i = 17^\circ 44' 24''$	$i = 17^\circ 43' 25''$	$17 \text{ } 44 \text{ } 46$
(Siehe die Turiner Preisschrift)			

Bewegung rückläufig.

Bei *Rosenberger's* Angaben beziehen sich die eingeklammerten Zahlen auf die Wirkung des hypothetisch angenommenen Widerstandes; bei meiner großen Axe ist schon die halbe Total-Wirkung des Widerstandes applicirt, welche erfahrungsmässig aus den Beobachtungen von 1607 gefolgert wurde.

Der auffallendste Unterschied dieser meiner Resultate von denen anderer Berechner besteht nicht in der um 14 Tage

späteren Zeit des Perihels, sondern in dem viel kleineren Werthe der großen Axe, wonach das im Anfang des künftigen Jahrhunderts zu erwartende Perihel sich um $\frac{1}{4}$ Jahre früher ergeben würde. Aber diese auffallende Differenz läßt sich leicht erklären. Zu dem Ende setze ich hier erst eine Vergleichung meiner Störungen vom Perihel 1759 bis zum diesjährigen Perihel mit den *Rosenberger's*chen her: (die Präcession ist nicht mit eingeschlossen)

	Δa	Δi	Δn	$\Delta \omega$	$\Delta T'$ Tage.
	$-0,22629$	$+0,001933$	$-7' 10,9$	$+15' 51''$	$+10''$
<i>Rosenberger</i> hat:	$-0,09990$	$+0,001798$	$-6' 50,0$	$+15' 0$	$-1' 26$
Unterschiede:	$-0,12639$	$+0,000135$	$-20'' 9$	$+51''$	$+1' 36''$
					$-6,19$

Diese Unterschiede sind unbedeutend, außer bei T' und a . Den bei T' glaube ich am besten aus der Verschiedenheit der befolgten Methoden (die excentrische Anomalie oder die Zeit als absolute Variable zu betrachten) erklären zu können, indem die große Axe im Perihel 1759, von welcher *Rosenberger* ausging, sich von der meinigen merklich unterschied; und ich habe mich oben bemüht, die schwache Seite der Methode, welche die excentrische Anomalie als absolute Variable betrachtet, aufzudecken. Der ungeheure Unterschied in den Störungen von a aber verschwindet größtentheils, wenn man die Störungen nur bis zum 296sten Grade der excentrischen Anomalie fortgeführt denkt; denn bis dahin finde ich $\Delta a = -0,054$, *Rosenberger* aber $-0,052$. Es ist also ersichtlich, daß der große Unterschied der Stö-

rungen von a nur von der starken Annäherung des Kometen an Jupiter im XIten Zeichen der excentrischen Anomalie herrührt, wodurch Störungen hervorgebracht werden, welche mit Sicherheit zu bestimmen schon eine sehr genaue Kenntniss der Zeit des diesjährigen Perihels voraussetzt; diese Zeit läßt sich aber nur aus einer sehr scharfen Kenntniss der großen Axe von 1759, oder besser aus den in diesem Jahre 1835 noch zu machenden Beobachtungen schließen.

Die Rechnungen zur Vorausbestimmung der diesjährigen Elemente unseres Kometen würden allen Werth verlieren, und könnten selbst bei der Aufsuchung des anrückenden Kometen irre führen, wenn man nicht den Grad ihrer Zuver-

lässigkeit und besonders den bei Bestimmung der Zeit des Perihels möglichen Fehler beurtheilen könnte. Das ist freilich bei einer so weitläufigen Rechnung und beim Zusammenwirken so complicirter Umstände schwierig; doch läßt die geringe Genauigkeit der Beobachtungen von 1682 im Vergleich zu denen von 1759, welche besonders bei der starken Annäherung an Saturn und Jupiter in den Jahren 1680 bis 1684 in ihren Folgen merklich wird, desgleichen auch die noch nicht völlig scharf bestimmte Jupitersmasse (welche vorzüglich bei der nahen Zusammenkunft dieses Planeten mit dem Kometen im Jahre 1681 in Betracht kommt), fürchten, daß es, aus den bisherigen Beobachtungen dieses Kometen und nach unserer jetzigen Kenntniß des Planetensystems, überhaupt unmöglich sein möchte, in der Verkündigung der diesjährigen Sonnennähe eine größere Zuverlässigkeit zu erreichen als à quelques jours près, wie *Laplace* sagt (*Méc. cél.* Tom. IV. gegen Ende der 215^{ten} Seite). Um aber durch Vergleichung der Theorie mit den Beobachtungen dieses Jahres einen sichereren Maafsstab der Beurtheilung der Fortschritte der Kometen-Astronomie seit *Clairaut's* Zeiten zu geben, habe ich nach meinen Elementen eine Ephemeride berechnet, welche im Allgemeinen von 4 zu 4 Tagen für den Berliner mittleren Mittag, um die Zeit der Erdnähe aber von 24 zu 24 Stunden den geocentrischen Lauf des Kometen angiebt. Ich begnügte mich dabei mit einer Präcision, welche einer dreiziffrigen logarithmischen Rechnung entspricht, (wegen der eben angeführten Ungewissheit der Zeit des Perihels); hierbei war es, wie sich von selbst versteht, erlaubt, die Bahn des Kometen als eine unveränderliche Ellipse zu betrachten, und Nutation des Aequinoctialpuncts, Aberration und Parallaxe zu vernachlässigen. Von der Wirkung des Mars auf den Kometen bei seinem Anrücken zur Erdbahn ist nichts zu fürchten, weil er mehrere Halbmesser der Erdbahn von ihm entfernt bleibt; die nahe Zusammenkunft mit der Venus aber findet erst nach dem Perihel statt, und die Wirkung der Erde im October dieses Jahrs ändert nur die große Axe merklich, was aber auf die Ephemeride keinen erheblichen Einfluß hat. Für die letztere habe ich nicht nöthig gefunden, das *Kepler'sche* Problem nochmals zu lösen (was um das Perihel herum allemal Weitläufigkeit macht, man mag nun die Formel $u - e \sin u = m$ *) anwenden, oder die wahre Anomalie durch eine nach den Potenzen von $1 - e$ geordnete Reihe bestimmen); ich habe vielmehr zwischen den wahren Anomalien, welche meiner Berechnung der Störungen in dem letzten kurzen Zeitraume zum Grunde lagen, interpolirt und den Radius Vector durch

*) u ist excentrische, m die mittlere Anomalie, und φ die wahre

die Formel $\frac{h^2}{1 + e \cos \varphi}$ bestimmt. Die Elemente der Lage der Kometenbahn, nämlich i , n und ω , wurden ein- für allemal von der Ecliptik auf den Aequator reducirt, und so die heliocentrische gerade Aufsteigung und Abweichung des Kometen gefunden. Daraus ergaben sich die heliocentrischen Coordinaten des Kometen in Beziehung auf den Aequator; und hierzu die Sonnen-Coordinaten gethan, welche im *Encke'schen* Jahrbuch für 1836 als eine so höchst erwünschte Zugabe erscheinen, gaben die geocentrischen Coordinaten, woraus sich ohne weitere Umstände die geocentrische gerade Aufsteigung und Abweichung und die Entfernung des Kometen von der Erde fanden. Zwischen den rechtwinkligen geocentrischen Coordinaten des Kometen um die Zeit der Erdnähe von 4 zu 4 Tagen wurde noch überdies interpolirt, um sie von 24 zu 24 Stunden zu erhalten. Ich fange die Ephemeride mit dem 1^{sten} Juli an, um sie desto leichter mit der *Bouvard'schen* (in der *Bibliothèque universelle de Genève* enthaltenen) vergleichen zu können; auch möchte die Entfernung des Kometen von Sonne und Erde schon jetzt kein Hinderniß sein, ihn mit guten Fernröhren aufzufinden; ein solches liegt vielmehr nur in der starken sommerlichen Dämmerung, und es läßt sich nicht recht mit Bestimmtheit angeben, wann dieses Hinderniß aufhört wirksam zu sein.

		AR.	Decl.	Entfernung von	
				☉	♂
Juli	1	76° 19'	+ 19 44'	2,54	3,45
	5	77 6	+ 19 57	2,48	3,36
	9	77 51	+ 20 9	2,43	3,28
	13	78 37	+ 20 20	2,38	3,19
	17	79 26	+ 20 32	2,32	3,09
	21	80 11	+ 20 45	2,27	3,00
	25	80 56	+ 20 58	2,22	2,90
	29	81 42	+ 21 10	2,17	2,79
Aug.	2	82 26	+ 21 23	2,12	2,69
	6	83 14	+ 21 38	2,06	2,57
	10	84 4	+ 21 53	2,00	2,45
	14	85 2	+ 22 10	1,93	2,31
	18	85 54	+ 22 25	1,87	2,19
	22	86 37	+ 22 45	1,82	2,07
	26	87 27	+ 23 7	1,76	1,93
	30	88 8	+ 23 30	1,71	1,81
Sept.	3	88 44	+ 23 54	1,66	1,68
	7	89 25	+ 24 25	1,60	1,54
	11	90 0	+ 25 2	1,53	1,39
	15	90 30	+ 25 47	1,510	1,281
	19	91 0	+ 26 42	1,451	1,138
	23	91 35	+ 27 56	1,389	0,990
	27	92 14	+ 29 35	1,327	0,843
	Oct.	1	93 0	+ 31 50	1,268
5		93 55	+ 35 17	1,208	0,553
9		95 19	+ 43 55	1,147	0,410
13		98 46	+ 53 10	1,085	0,274

	AR.	Decl.	Entfernung von	
			☉	♂
Oct. 14	100° 44'	+ 58° 13'	1,070	0,243
15	104 16	+ 64 34	1,055	0,214
16	112 14	+ 72 35	1,039	0,189
17	141 39	+ 81 12	1,024	0,170
18	227 13	+ 79 38	1,008	0,157
19	252 36	+ 66 54	0,992	0,154
20	259 59	+ 53 13	0,977	0,160
21	263 10	+ 41 3	0,961	0,175
22	265 1	+ 31 9	0,946	0,196
23	266 12	+ 23 22	0,931	0,223
24	267 2	+ 17 19	0,916	0,253
25	267 38	+ 12 34	0,901	0,284
29	268 48	+ 1 3	0,841	0,423
Nov. 2	269 2	— 4 47	0,784	0,571
6	268 57	— 8 16	0,732	0,716
10	268 40	— 10 37	0,686	0,856
14	268 8	— 12 23	0,647	0,992
18	267 17	— 13 51	0,616	1,123
22	266 9	— 15 14	0,595	1,247
26	264 41	— 16 16	0,587	1,352

Hieraus ergeben sich noch folgende Umstände, welche von den Resultaten anderer Berechner merklich abweichen: Kleinste Entfernung des Kometen von der Erde = 0,154 Halbmesser der Erdbahn = 3 190 000 geographische Meilen, am 19^{ten} October Morgens 8 Uhr bürgerliche Berliner mittlere Zeit, um die Zeit des Neumondes (die *Boguslawski'sche* Ephemeride nach den vorletzten *Pontécoulant'schen* Elementen giebt Kleinste Entfernung von der Erde: 3 758 000 Meilen, am 6^{ten} October, um die Zeit des Vollmondes; also keine so vortheilhafte Sichtbarkeit des Kometen, als nach meiner Rechnung). Ich finde ferner: größte nördliche Abweichung des Kometen: 81° 49' am 17,35 October. Der Komet geht nicht durch den grossen, sondern durch den kleinen Bären, dann durch den Herkules und Schlangemann. Grösste AR. 269° 3' am 2,24 November.

J. W. H. Lehmann.

Elemente des Doppelsterns σ Coronae nach *Enckes* Methode berechnet, von Herrn *Mädler*.

Durchgang durchs Perihelium 1836,73	Halbe grosse Axe 2° 9' 279	
Umlaufzeit 199,95 Jahr.	Knoten 129° 22' 0	} M. Aeq. 1830.
Excentricitäts-Winkel 35° 13',6	Perihel 146 5,9	
Neigung 39 48,8	Bewegung rückläufig.	

Vergleichung.

Die Beobachtungen sind auf das Aequinoctium von 1830 reducirt.

Zeit.	Position		Diff.	Distanz		Differenz.	
	berechnet.	beobachtet.		berechn.	beob.		
1781,79	348° 19'	347° 49'	— 30	3" 465	(3" 3)		<i>Herschel.</i>
1802,74	11 39	11 33	— 6	2,487			<i>Herschel.</i>
1819,60	54 5	50 22	— 223	1,605			<i>Struve.</i>
1821,30	60 44	65 19	+ 275	1,541			<i>Herschel u. South.</i>
1822,67	66 28	61 3	— 325	1,495			<i>Struve.</i>
1823,47	69 59	72 59	+ 180	1,472	1,45	— 0,022	<i>Herschel u. South.</i>
1825,44	79 7	77 32	— 95	1,420	1,48	+ 0,060	<i>South.</i>
1826,77	85 38	89 1	+ 203	1,391	1,30	— 0,091	<i>Struve.</i>
1828,50	94 30	92 7	— 143	1,358			<i>Herschel j.</i>
1830,28	104 2	105 5	+ 63	1,329	1,22	— 0,109	<i>Herschel j.</i>
1830,52	105 20	107 17	+ 117	1,326			<i>Dawes.</i>
1831,35	110 25	111 32	+ 67	1,316	1,57	+ 0,254	<i>Dawes.</i>
		108 46	— 99		1,39	+ 0,074	<i>Herschel j.</i>
1835,45	134 11	134 44	+ 33	1,243	(1,3)		<i>Mädler.</i>

Mittlerer Fehler einer Position 214'.

Um diese Positionen mit den Beobachtungen zu vergleichen, muß für jedes seit 1830 verflossene Jahr + 0'357 hinzugefügt werden.

Zur Bestimmung der Position für 1835,45 habe ich an 4 Abenden Beobachtungen angestellt, und folgende Werthe erhalten, deren jede das Mittel aus 10 Ablesungen ist.

1835 Juni 9. 135° 1'9
11. 135 12,9

1835 Juni 13. 136° 1'4

20. 132 49,7 Geschätzte Distanz = 1",3.

Die übrigen Angaben sind nach *Herschel* angesetzt; die Distanz für 1781 aus den Abständen in Durchmessern, die sich bei *Herschel* dem Vater finden, geschlossen.

Ist π die Parallaxe des Sternpaares und M seine Masse, so geben die vorstehenden Elemente $\pi \sqrt[3]{M} = 0''0857$.

Mädler.

Altona 1835. Juli 25. (Nr. 283, 284, 285 und 286 werden nachgeliefert.)