Zum Nachweis von Blausäure. G. Calvi und M. Malacarne¹⁾ machen darauf aufmerksam, dass in Fäulnis übergegangene Leichenteile, namentlich aber sauer reagierende Untersuchungsobjekte, wie Erbrochenes, zu einer wesentlich schnelleren Zersetzung der Cyanalkalien durch die Luft beitragen. Ein Zusatz von 95-prozentigem Alkohol dagegen hält die Zersetzung wesentlich auf, so dass bei in diesem aufbewahrten Leichenteilen Blausäure noch nach einem Monat nachgewiesen werden konnte.

Nachweis von Metallgiften. Eine schnelle Methode zum Nachweis von Metallgiften in Leichenteilen haben G. D. Landier und H. W. Winter²⁾ ausgearbeitet. Sie richteten ihr Augenmerk hauptsächlich darauf, mit möglichst wenig Substanz auszukommen und nur geringe Mengen an Reagenzien anzuwenden. Deshalb teilen sie auch ihr Untersuchungsmaterial in zwei Teile und prüfen den einen Teil unter Benutzung des Reinsch'schen Verfahrens auf Arsen, Antimon, Wismut und Quecksilber.

Den anderen Teil extrahieren sie mit 50-prozentiger Salpetersäure unter Hinzufügen von ein wenig Schwefelsäure und erhalten in dem Auszug Blei, Quecksilber, Wismut, Kupfer, Zink und Chrom. Wird die Schwefelsäure weggelassen, so findet man hier auch Baryum.

Das Extrahieren geschieht in der Weise, dass die zu untersuchende Substanz (etwa 10 g) mit dem Säuregemisch (40 *ccm* 50-prozentige Salpetersäure und 5—10 *ccm* konzentrierte Schwefelsäure) in einer Schale bis zum Entweichen von braunen Dämpfen mit kleiner Flamme erhitzt, dann mit Wasser verdünnt und filtriert wird. In dem Filtrat können die einzelnen Metalle nach bekannten Methoden identifiziert werden.

Mit der für den ersten Teil der Untersuchungsobjekte angewandten Reinsch'schen Methode war es den Verfassern gelungen, noch 0,05 *mg* Arsen und 0,1 *mg* Antimon in 120 g, dagegen nur 1 *mg* Quecksilber in 60 g organischer Substanz nachzuweisen.

Den Nachweis von Quecksilber in Leichenteilen führt C. Lombardo³⁾ auf folgende Weise. Als Reagens benutzt er eine Lösung, die 12 g Zinnchlorür, 25 *ccm* Salzsäure und 75 *ccm* Wasser enthält. Von dieser fügt er 5 *ccm* zu 5 *ccm* einer aus den Leichenteilen her-

1) Giorn. Farm. Chim. **56**, 5; durch Zeitschr. f. Unters. d. Nahrungs- und Genussmittel **17**, 208.

2) The Analyst **33**, 450.

3) Arch. d. Farmacol. speriment. **7**, 400; durch Chem. Zentralblatt **79**, II, 1788.