Eine sphärische Interpolationsmethode für photographische Himmelsaufnahmen.

Von F. Kaiser.

Die Vorteile, die die gewöhnliche Interpolationsmethode für photographische Himmelsaufnahmen¹⁾ in niederen und mittleren Deklinationen bietet, nämlich Benutzung nur zweier Anschlußsterne, geringe Rechenzeit und Kontrolle durch Doppelrechnung bei für die meisten Anwendungen genügender Genauigkeit, verschwinden in hoher Deklination durch die merklich werdenden Vernachlässigungen in den Formeln und die dadurch bedingte Unbestimmtheit des Resultates. Es erscheint deshalb wünschenswert, ein Verfahren mitzuteilen, das bei etwa gleicher Rechenzeit auch in hoher Deklination seine Genauigkeit bewahrt und die übrigen Vorteile der gewöhnlichen Interpolationsmethode besitzt.

Zur Herleitung kann von dieser ausgegangen werden. Ihre Anschlußformeln für logarithmische Rechnung lauteten:

$$\Delta\delta_1 = \sigma(\Delta y_1 \cdot \cos \Theta + \Delta x_1 \cdot \sin \Theta)$$

$$\Delta\alpha_1 = \sigma(\Delta x_1 \cdot \cos \Theta - \Delta y_1 \cdot \sin \Theta)$$

und entsprechend für $\Delta\delta_2$ und $\Delta\alpha_2$ bei Einsetzung von Δx_2 und Δy_2 anstelle von Δx_1 und Δy_1 . Hierin ist Θ bestimmt aus:

$$\operatorname{tg} \varphi = \Delta\delta : \Delta\alpha \quad \operatorname{tg}(\varphi - \Theta) = \Delta y : \Delta x \quad (1)$$

$$\text{und } \sigma \text{ aus: } \sigma = \Delta\delta : (\Delta y \cdot \cos \Theta + \Delta x \cdot \sin \Theta) \quad (2)$$

$$= \Delta\alpha : (\Delta x \cdot \cos \Theta - \Delta y \cdot \sin \Theta).$$

Die Koordinatendifferenzen $\Delta\delta$ und $\Delta\alpha$ der beiden Anschlußsterne: α_a, δ_a und α_b, δ_b werden dabei aus:

$$\Delta\delta = \delta_b - \delta_a$$

$$\Delta\alpha = 15(\alpha_b - \alpha_a) \sqrt{\cos \delta_a \cdot \cos \delta_b}$$

direkt ohne sphärische Rechnung gewonnen. Dies genügt für niedere und auch für mittlere Deklinationen, wenn noch Verbesserungen für »Krümmung des Parallels« angebracht werden. Für hohe Deklinationen jedoch wird das Verfahren zu unbestimmt, sodaß die direkte Berechnung der $\Delta\delta$ und $\Delta\alpha$ nicht mehr angängig ist und zur sphärischen Herleitung übergegangen werden muß. Hierzu bieten nun die Überlegungen der Turnerschen Methode²⁾ geeignete Grundlagen. Sie geben in anderer Bezeichnungsweise bezogen auf Anschlußstern a als Ursprung und bezogen auf Anschlußstern b zur Kontrolle (siehe Figur).

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} q_a &= \operatorname{tg} \delta_b \cdot \sec \Delta\alpha & \operatorname{tg} q_b &= \operatorname{tg} \delta_a \cdot \sec \Delta\alpha \\ \operatorname{tg} \Delta\alpha_a &= \operatorname{tg} \Delta\alpha \cdot \cos q_a & \operatorname{tg} \Delta\alpha_b &= -\operatorname{tg} \Delta\alpha \cdot \cos q_b \\ \operatorname{tg} \Delta\delta_a &= \operatorname{tg}(q_a - \delta_a) & \operatorname{tg} \Delta\delta_b &= -\operatorname{tg}(q_b - \delta_b). \end{aligned}$$

Im kleinen Bereich und nicht zu weit vom Plattenmittelpunkt erhalten wir dann als in die Interpolationsformeln an-

stelle der früheren $\Delta\alpha$ und $\Delta\delta$ einzusetzende Idealkoordinaten:

$$\xi_a = \operatorname{tg} \Delta\alpha \cdot \cos q_a : \sin 1''$$

$$\eta_a = \operatorname{tg}(q_a - \delta_a) : \sin 1''$$

$$\text{und } \xi_b = -\operatorname{tg} \Delta\alpha \cdot \cos q_b : \sin 1''$$

$$\eta_b = -\operatorname{tg}(q_b - \delta_b) : \sin 1''$$

sodaß die Rechnung nach diesem Verfahren folgendermaßen vor sich geht.

$$\text{Aus } \operatorname{tg} q_a = \operatorname{tg} \delta_b \cdot \sec \Delta\alpha$$

$$\operatorname{tg} q_b = \operatorname{tg} \delta_a \cdot \sec \Delta\alpha$$

und den (1) entsprechenden Formeln:

$$\operatorname{tg} \varphi_a = \operatorname{tg}(q_a - \delta_a) : (\operatorname{tg} \Delta\alpha \cdot \cos q_a)$$

$$\operatorname{tg}(\varphi_a - \Theta_a) = \Delta y : \Delta x$$

$$\text{und } \operatorname{tg} \varphi_b = \operatorname{tg}(q_b - \delta_b) : (\operatorname{tg} \Delta\alpha \cdot \cos q_b)$$

$$\operatorname{tg}(\varphi_b - \Theta_b) = \Delta y : \Delta x$$

folgen Θ_a und Θ_b , während sich $\sigma \cdot \sin 1''$ aus den (2) entsprechenden Gleichungen:

$$\sigma \cdot \sin 1'' =$$

$$= \operatorname{tg}(q_a - \delta_a) : (\Delta y \cdot \cos \Theta_a + \Delta x \cdot \sin \Theta_a)$$

$$= \operatorname{tg} \Delta\alpha \cdot \cos q_a : (\Delta x \cdot \cos \Theta_a - \Delta y \cdot \sin \Theta_a)$$

$$\text{und } \sigma \cdot \sin 1'' = \operatorname{tg}(q_b - \delta_b) : (\Delta y \cdot \cos \Theta_b + \Delta x \cdot \sin \Theta_b)$$

$$= \operatorname{tg} \Delta\alpha \cdot \cos q_b : (\Delta x \cdot \cos \Theta_b - \Delta y \cdot \sin \Theta_b)$$

mit mehrfacher Kontrolle ergibt. Die Koordinaten des Anschlußobjektes können dann aus:

$$\operatorname{tg}(q_1 - \delta_a) = \sigma \cdot \sin 1'' \cdot (\Delta x_1 \cdot \sin \Theta_a + \Delta y_1 \cdot \cos \Theta_a)$$

$$\operatorname{tg} \Delta\alpha_1 \cdot \cos q_1 = \sigma \cdot \sin 1'' \cdot (\Delta x_1 \cdot \cos \Theta_a - \Delta y_1 \cdot \sin \Theta_a)$$

bezogen auf Anschlußstern a und aus:

$$\operatorname{tg}(q_2 - \delta_b) = \sigma \cdot \sin 1'' \cdot (\Delta x_2 \cdot \sin \Theta_b + \Delta y_2 \cdot \cos \Theta_b)$$

$$\operatorname{tg} \Delta\alpha_2 \cdot \cos q_2 = \sigma \cdot \sin 1'' \cdot (\Delta x_2 \cdot \cos \Theta_b - \Delta y_2 \cdot \sin \Theta_b)$$

bezogen auf Anschlußstern b erhalten werden.

Die Rechnung ist in etwa der gleichen Zeit wie bei der gewöhnlichen Interpolation durchführbar, da der Mehraufwand an Zeit durch die sphärische Rechnung ausgeglichen wird durch den Wegfall der Korrekturen für Krümmung des Parallels.

Es erübrigt noch, die gewonnenen Ausdrücke in die direkten Formeln der gewöhnlichen Interpolationsmethode einzuführen; bis zum Vorliegen genügender numerischer Tafeln der trigonometrischen Funktionen jedoch bietet hier die Verwendung der Rechenmaschine wenig Vorteil.

¹⁾ Veröffentlichungen d. Königstuhl-Sternwarte Band 7-Nr. 5 und AN 5039.

²⁾ Siehe Observatory 16.373 und 17.141.

Beispiel.

$\alpha_a = 10^h 52^m 57^s.00$ $\delta_a = +88^\circ 25' 30''.0$ $\alpha_b = 11^h 51^m 20^s.40$ $\delta_b = +87^\circ 48' 8''.3$			
$\Delta\alpha = 0^h 58^m 23^s.40 = 14^\circ 35' 51''.0$ $\Delta x = +4.1032$ mm $\Delta y = -5.1617$ mm			
$\lg \delta_b$	1.415942	$\lg \Delta y$	0.712793n
$-\cos \Delta\alpha$	9.985750	$\lg \Delta x$	0.613123
$\lg q_a$	1.430192	$\lg (\varphi_a - \Theta_a)$	0.099670n
$q_a + 87^\circ 52' 23''.44$		$\varphi_a - \Theta_a - 51^\circ 31' 3''.7$	
$q_a - \delta_a - 0^\circ 33' 6.56$		$\varphi_a - 44^\circ 53' 59.8$	
		$\Theta_a + 6^\circ 37' 3.9$	
$\lg \Delta\alpha$	9.415698	$\lg \Delta x$	0.613123
$+\cos q_a$	8.569509	$+\sin \Theta_a$	9.061622
$\lg \xi_a \cdot \sin 1''$	7.985207		9.674745
$\lg \eta_a \cdot \sin 1''$	7.983690n	$\Delta x \sin \Theta_a + 0.47287$	
$\lg \varphi_a$	9.998483n	$\lg \Delta y$	0.712793n
		$+\cos \Theta_a$	9.997097
			0.709890
		$\Delta y \cos \Theta_a - 5.12731$	
		Nenner	-4.65444
		$\lg$ Nenner	0.667867n
		$\lg \eta_a \cdot \sin 1''$	7.983690n
		$\lg \sigma \cdot \sin 1''$	7.315823 ¹⁾
$\Delta x_1 = +2.5386$ mm $\Delta y_1 = -2.9413$ mm $\Delta x_2 = -1.5646$ mm $\Delta y_2 = +2.2204$ mm			
$\lg \Delta x_1$	0.404594	$\lg \Delta y_1$	0.468539n
$+\sin \Theta_a$	9.061622	$+\sin \Theta_a$	9.061622
	9.466216		9.530161
	+0.29256		+0.33897
$\lg \Delta y_1$	0.468539n	$\lg \Delta x_1$	0.404594
$+\cos \Theta_a$	9.997097	$+\cos \Theta_a$	9.997097
	0.465636n		0.401691
	-2.92170		+2.52169
	-2.62914		+2.86066
	0.419813n		0.456466
$\lg \sigma \cdot \sin 1''$	7.315823	$\lg \sigma \cdot \sin 1''$	7.315823
$\lg (q_1 - \delta_a)$	7.735636n		7.772289
$q_1 - \delta_a - 0^\circ 18' 42''.16$		$-\cos q_1$	8.517505
$q_1 + 88^\circ 6' 47.84$		$\lg \Delta\alpha_1$	9.254784
		$\Delta\alpha_1 + 10^\circ 11' 33''.88$	
$\lg q_1$	1.482261	$\Delta\alpha_1 + 0^h 40^m 46^s.257$	
$+\cos \Delta\alpha_1$	9.993092	α_1	10 52 57.000
$\lg \delta_{\text{Obj.}}$	1.475353	$\alpha_{\text{Obj.}}$	11 33 43.257
$\delta_{\text{Obj.}} + 88^\circ 4' 59''.03$			
		$\lg q_2$	1.476642
		$+\cos \Delta\alpha_2$	9.998715
		$\lg \delta_{\text{Obj.}}$	1.475357
		$\delta_{\text{Obj.}} + 88^\circ 4' 59''.09$	
		$\lg \Delta\alpha_2$	9.254784
		$\Delta\alpha_2 + 10^\circ 11' 33''.88$	
		$\Delta\alpha_2 + 0^h 40^m 46^s.257$	
		α_2	11 33 43.257
		$\alpha_{\text{Obj.}}$	11 33 43.257

Definitiver Ort: $\alpha = 11^h 33^m 43^s.26$ $\delta = +88^\circ 4' 59''.1$.

Wiesbaden, 1920 November.

F. Kaiser.

¹⁾ Kontrolle: Die σ -Werte müssen übereinstimmen.

Sterndistanzmethode zur gleichzeitigen Bestimmung der geographischen Breite und Länge eines Punktes, sowie des Azimuts einer Ortsrichtung. Von E. W. Albrecht.

Betrachtet man zwei sphärische Dreiecke: Pol, Zenit, Stern I und Pol, Zenit, Stern II [siehe Figur 1 (Horizontalprojektion) PZI und $PZII$], so findet man bei bekannter Rektaszension und Deklination beider Sterne im sphärischen Dreieck Pol, Stern I, Stern II (Fig. 1 PII):

$$RA(II) - RA(I) = \theta.15 = \theta \quad (1)$$

$$\cos \frac{1}{2}(\delta_1 - \delta_2) / \sin \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2) \lg \frac{1}{2}\theta = \lg \frac{1}{2}(I + 2) \quad (2)$$

$$\sin \frac{1}{2}(\delta_1 - \delta_2) / \cos \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2) \lg \frac{1}{2}\theta = \lg \frac{1}{2}(I - 2) \quad (3)$$

$\sin \frac{1}{2}(I + 2) \lg \frac{1}{2}(\delta_1 - \delta_2) / \sin \frac{1}{2}(I - 2) = [\text{zur Probe: } \cos \frac{1}{2}(I + 2) / \cos \frac{1}{2}(I - 2) \lg \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)] = \lg \frac{1}{2}k \quad (4)$
 worin δ_1 und δ_2 die Deklinationen der Fixsterne I und II, k den beide Sterne verbindenden Großkreisbogen, I und 2 die von k und δ_1^* , bzw. von k und δ_2^* eingeschlossenen sphärischen Winkel darstellen.

Da Rektaszension und Deklination von Fixsternen als relativ konstant aufgefaßt werden können, heiße das Dreieck