grössten war nach der rechten Seite hin gebogen, und theilte sich in zwei, mit dem Mondrande parallele, Streifen, deren Längen ich auf zwei Minuten schätzte, obgleich der äussere doch etwas länger sowie auch etwas breiter als der innere war; diese Streifen zeigten keine Strahlen, sondern schienen mir am meisten mit Wolken vergleichbar zu sein, deren Ränder vom Lichte der aufgehenden oder untergehenden Sonne beleuchtet werden. An den äusseren Rändern contrastirte die Farbe der Streifen sehr mit der Corona, verlor sich aber an den inneren Rändern allmählig in diese. Kurz vor der Rückkehr der Sonne wurde eine Ausdehnung der Grundflächen der Flecken bemerkbar, und es bildete sich allmählig ein röthlicher Saum um den Mondrand, an der Stelle, wo die ersten Sonnenstrahlen hervorbrachen, welches letztere um $3^h 15' 50''$ nach dem Chronometer geschah. Hierauf verschwanden nun sowohl der rothe Saum als auch die Flecken am Mondrande. Als ich das Fernrohr auf den Theil der Corona, der sich am entgegen-

gesetzten Punkte des Mondrandes befand, richtete, wodurch ich die Sonnenstrahlen ausserhalb des Fernrohrs hielt und also ohne Blendglas beobachten konnte, beobachtete ich die Corona noch $9''$ nach dem Ende der totalen Finsterniss, nach welchem Momente sie so schwach wurde, dass sie nicht mehr gesehen werden konnte. Auf der Mondscheibe habe ich während der ganzen Finsterniss nichts Auffallendes bemerkt. Die Finsterniss war vorbei nach dem Chronometer: $4^h 14' 11''$.

Der Stand des Chronometers gegen die mittlere Zeit von Christiansö wurde für die Zeit der Finsterniss $+1^h 1' 35''$ angenommen, ist aber nicht zuverlässig, da er nur auf einigen am 24^{ten} Juli und 4^{ten} August mit der Pendeluhr des Seecharten-Archivs in Copenhagen angestellten Vergleichen beruht, aus welchen Vergleichen indessen zu ersehen war, dass der Chronometer auf der Reise seinen Gang bedeutend verändert hatte.

Beobachtungen des von Herrn *Brorsen* 1851 October 22 entdeckten Cometen.

a) Auf der Wiener Sternwarte von Herrn Prof. v. *Littrow*.

Es ist Ihnen vielleicht angenehm eine Position des neuen *Brorsen'schen* Cometen zu erhalten, und ich beeile mich deshalb den folgenden, von mir beobachteten und von Dr. *Kunes* reducirten, Ort mitzutheilen:

1851	M. Wien. Zt.	Sch. AR.	Sch. Decl.	Zahl d. Vergl.
Oct 24	$7^h 1^m 39^s.2$	$13^h 50^m 4^s.01$	$+34^{\circ} 9' 27''.5$	8

Der Vergleichstern ist H. C. $13^h 43^m 55^s.30$. Der Comet zeigte zwei Schweife, nahezu in derselben geraden Linie; der eine sehr hell, etwa $30'$ lang, $5'$ breit von der Sonne abge-

kehrt, der andere matt, etwa $8'$ lang, zur Sonne hin gerichtet. Ich glaube den Cometen mit freiem Auge wahrgenommen zu haben; im Refractor war der Kern einem Stern 6. Grösse vergleichbar, und so glänzend, dass ich anfangs glaubte, ein Fixstern müsse sich eben hinter ihm befinden.

b) Auf der Berliner Sternwarte von Herrn *Luther*.

1851	m. Zt. Berl.	sch. AR.	sch. Decl.	Vergl.
Oct. 30	$7^h 27^m 34^s.2$	$214^{\circ} 51' 25''.5$	$+38^{\circ} 12' 9''.3$	12
Angenommener scheinbarer Ort des Vergleichsterns				
	$214^{\circ} 41' 58''.9$		$+38^{\circ} 10' 9''.0$	

Observations of Parthenope.

Haverhill.

		m. t. Greenw.	app. AR.	app. N. P. D.	Star of Comp.
1851	Sept. 22	$10^h 17^m 55^s$	$2^h 17^m 35^s.92$	$83^{\circ} 53' 15''.7$	<i>a</i>
	28	9 36 42	2 14 26,79	84 24 39,0	<i>a</i>
	29	10 11 22	2 13 49,32	84 30 19,9	<i>b</i>
	Oct. 4	10 42 15	2 10 21,54	84 59 3,9	<i>b</i>
	5	9 35 31	2 9 38,45	85 4 34,8	<i>b</i>
Mean Places 1851,0					
<i>a</i> = Weisse II. Nr. 244		$= 2^h 15^m 36^s.33$		$84^{\circ} 4' 43''.74$	
<i>b</i> = ——— Nr. 192		$= 2^h 12^m 33^s.86$		$84^{\circ} 48' 11,34$	

W. W. Boreham.

The above observations are corrected for Refraction and Parallax by MM. *Luther* & *Vogel's* ephemeris.