ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o. 427.

Vergleichung der neuen Königsberger Bestimmung der Declinationen der Fundamentalsterne und einiger Circumpolarsterne mit anderen Verzeichnissen.

Von Dr. A. L. Busch.

In Nr. 422 der Astr. Nachr. hat Herr Geheime Rath *Bessel* das Verfahren angegeben, nach welchem ich die Beobachtungen am Meridiankreise gemacht und aus ihnen die Bestimmung der Declinationen von 62 Sternen für den Anfang des Jahres 1840 abgeleitet habe. Ich theile gegenwärtig eine Vergleichung dieser neuen Bestimmung der Declinationen mit denen mit, welche seit 1820 von anderen Sternwarten bekannt geworden sind. Diese Declinationen finden sich an folgenden Orten:

- 1) *Bessel*. VII Abth. der Königsberger Beobachtungen.
- 2) *Pond*. Berechnung der Greenwicher Beobachtungen von 1822, auf *Bessels* Veranlassung von *Olufsen* ausgeführt. Astr. Nachr. Nr. 73.
- 3) *Struve*. Observationes Dorpatenses Vol. VI.
- 4) *Argelander*. Stellarum fixarum positiones etc. Helsingforsiae 1835.

- 5) *Airy*. The first Cambridge Catalogue of 726 Stars. Memoirs of R. Astr. Society Vol. XI. London 1840.
- 6) *Pond*. Catalogue of 1112 Stars. London 1833.
- 7) *Johnson*. Catalogue of 606 Principal fixed Stars. London 1835.
- 8) *Henderson*. Declinations of 172 Principal fixed Stars. Astr. Nachr. Bd. XIV. Nr. 318.

Mit der für jeden Stern in der angeführten Abhandlung des Herrn Geheimen Rathes *Bessel* angegebenen Präcession, eigenen Bewegung und Säcular-Aenderung habe ich die Positionen für 1840 auf das Jahr, für welches jeder dieser Cataloge gilt, reducirt und folgende Unterschiede erhalten. Das + Zeichen zeigt an, daß der mit dem neueren verglichene ältere Catalog eine Declination nördlicher ergiebt, das — Zeichen das entgegengesetzte.

		<i>Bessel</i> 1820	<i>Pond</i> 1822	<i>Struve</i> 1824	<i>Argelander</i> 1830	<i>Airy</i> 1830	<i>Pond</i> 1830	<i>Johnson</i> 1830	<i>Henderson</i> 1833
Nr. 3	γ Cephei	— 0"09	—	+ 0"17	+ 0"46	+ 0"94	+ 0"76	—	—
4	β Ursæ min.	— 0,68	—	— 1,33	— 0,61	— 0,90	— 0,11	—	—
5	γ —	— 0,04	—	— 0,57	— 0,22	—	— 0,92	—	—
6	β Cephei	— 1,31	—	— 0,88	— 0,79	0,00	— 0,49	—	—
7	α Ursæ maj.	— 1,23	—	— 1,66	— 1,04	— 1,10	— 0,34	— 1"84	—
8	α Cephei	— 1,34	—	— 0,93	— 0,47	— 0,04	— 0,57	— 4,07	—
9	α Cassiopeæ	+ 0,40	—	+ 1,16	+ 1,32	+ 1,27	+ 1,12	— 0,48	—
10	γ Ursæ maj.	— 1,15	—	— 0,69	— 0,47	— 0,08	+ 0,73	+ 1,93	—
11	κ Cygni	+ 0,92	—	—	—	—	+ 1,82	—	—
12	β Draconis	— 0,36	—	—	+ 0,45	— 0,76	+ 0,45	— 0,35	—
16	γ —	+ 0,15	—	+ 1,45	+ 1,71	+ 2,23	+ 1,11	— 0,19	—
17	ι Cygni	— 0,06	—	—	—	—	+ 0,60	—	—
18	η Ursæ maj.	— 0,65	—	— 0,96	— 0,49	— 0,08	+ 0,11	—	+ 3,28
19	θ Cygni	+ 0,36	—	—	+ 0,94	—	+ 1,04	—	—
20	α Persei	+ 0,35	—	+ 0,49	+ 0,66	+ 1,61	+ 1,26	— 1,64	+ 2,84
21	δ —	—	—	—	+ 1,14	—	+ 1,44	—	—
22	α Aurigæ	+ 1,15	+ 1"31	+ 1,41	+ 1,24	+ 0,62	+ 2,44	—	+ 2,67
23	α Cygni	— 0,63	— 0,49	+ 0,08	+ 0,57	+ 0,26	+ 0,37	— 1,03	+ 1,97
24	γ Andromedæ	— 0,46	—	— 0,30	+ 0,79	+ 1,62	+ 0,99	—	—
25	β Persei	— 0,15	—	— 0,31	—	+ 1,35	+ 1,87	—	—
26	γ Cygni	— 0,80	—	+ 0,62	+ 0,40	—	+ 1,20	—	—
27	ϵ Persei	— 0,38	—	—	—	—	+ 1,31	—	—
28	η Herculis	— 0,12	—	+ 1,06	+ 0,75	—	+ 1,85	—	—
29	γ Bootis	— 0,34	—	— 1,39	—	+ 0,45	+ 0,16	—	—
30	α Lyre	— 0,97	+ 0,40	+ 0,10	+ 1,24	+ 2,40	+ 1,34	— 0,46	+ 0,53

		<i>Bessel</i> 1820	<i>Pond</i> 1822	<i>Struve</i> 1824	<i>Argelander</i> 1830	<i>Airy</i> 1830	<i>Pond</i> 1830	<i>Johnson</i> 1830	<i>Henderson</i> 1833
31	α Geminor.	+ 0"27	+ 0"63	+ 0"57	+ 0"21	+ 0"85	+ 2"31	— 0"69	+ 0"47
32	β Tauri	— 0,76	+ 0,38	— 0,73	— 0,12	+ 0,21	+ 1,68	—	— 0,30
33	β Geminor.	— 0,45	+ 0,15	— 0,51	+ 0,06	+ 0,56	+ 1,56	— 1,34	— 0,12
34	α Andromedæ	— 0,25	+ 0,12	+ 0,17	+ 0,29	— 0,13	+ 0,59	— 2,21	— 0,63
35	α Coronæ	— 0,65	— 0,18	+ 0,09	+ 0,39	+ 0,18	+ 0,89	— 1,51	— 0,79
36	α Arietis	— 0,36	+ 0,52	— 0,45	+ 0,51	— 0,12	+ 1,11	— 1,79	— 0,16
37	α Bootis	— 0,20	+ 0,46	— 0,13	+ 0,69	+ 0,70	+ 1,59	— 1,71	— 0,78
38	α Tauri	+ 0,07	+ 0,79	+ 0,40	+ 0,61	+ 0,29	+ 1,81	— 1,39	+ 0,80
39	β Leonis	+ 0,09	+ 0,63	— 0,07	+ 0,59	+ 0,31	+ 1,89	— 0,71	+ 0,94
40	α Herculis	— 0,53	+ 0,59	+ 0,94	+ 1,56	+ 0,34	+ 2,16	— 0,84	+ 0,94
41	α Pegasi	+ 0,12	+ 0,62	+ 0,54	+ 1,28	+ 0,95	+ 2,48	— 1,12	+ 1,08
42	γ —	— 0,32	+ 0,39	+ 0,34	+ 0,85	+ 1,47	+ 1,45	— 1,55	+ 0,87
43	α Leonis	— 0,03	+ 1,72	0,00	+ 0,48	+ 0,75	+ 2,78	+ 0,88	+ 0,68
44	α Ophiuchi	— 0,06	+ 1,69	+ 0,90	+ 1,13	— 0,33	+ 2,51	—	+ 0,44
45	γ Aquilæ	— 0,68	—	+ 0,15	+ 0,60	+ 1,04	+ 1,60	— 1,10	— 0,01
46	α —	— 0,42	+ 0,52	+ 0,78	+ 1,25	+ 2,40	+ 1,95	— 0,25	+ 1,10
47	α Orionis	— 0,19	— 0,21	+ 0,16	+ 0,35	+ 0,37	+ 1,75	— 1,15	+ 0,10
48	α Serpentis	— 0,70	+ 0,67	+ 0,96	+ 1,07	+ 1,49	+ 2,67	+ 0,17	+ 0,79
49	β Aquilæ	— 0,75	+ 0,47	+ 1,02	+ 1,30	+ 2,14	+ 2,60	— 0,70	+ 0,76
50	α Canis min.	— 1,64	— 0,42	— 0,61	— 0,22	+ 0,03	+ 1,38	— 1,32	+ 0,17
51	α Ceti	— 0,10	+ 1,65	+ 1,10	+ 1,39	+ 1,01	+ 1,89	— 0,01	+ 1,12
52	β Virginis	— 0,23	—	+ 1,17	+ 1,30	— 0,97	+ 2,10	—	+ 0,56
53	α Aquarii	— 0,15	+ 1,11	+ 1,45	+ 2,06	+ 1,71	+ 2,76	+ 0,46	+ 1,80
54	α Hydræ	— 0,42	+ 0,79	+ 0,39	+ 1,25	+ 1,08	+ 2,55	+ 0,28	+ 0,54
55	β Orionis	— 0,08	+ 0,65	+ 0,92	+ 1,31	+ 1,49	+ 2,11	— 0,49	+ 0,97
56	α Virginis	— 0,58	+ 0,68	+ 0,82	+ 1,18	+ 1,58	+ 2,28	— 0,42	+ 0,47
57	1 α Capricorni	+ 0,01	—	+ 0,21	+ 2,99	+ 4,12	+ 4,20	+ 0,99	+ 2,19
58	2 α —	— 0,64	+ 2,24	+ 1,71	+ 1,97	+ 3,47	+ 3,97	+ 0,67	+ 1,38
59	1 α Libræ	+ 0,50	+ 1,61	+ 1,35	+ 2,90	+ 2,93	+ 3,80	—	+ 1,02
60	2 α —	+ 0,61	+ 1,08	+ 1,53	+ 2,71	+ 2,16	+ 3,71	+ 0,81	+ 1,04
61	α Canis maj.	+ 0,03	+ 0,37	+ 0,30	+ 1,02	0,00	+ 1,82	— 1,28	— 0,39
62	α Scorpïi	+ 0,87	+ 2,02	+ 3,38	+ 3,74	+ 3,43	+ 6,64	+ 2,44	+ 1,76

A. L. Busch.

Schreiben des Herrn *Rümcker*, Directors der Hamburger Sternwarte, an den Herausgeber.
Hamburg 1841. Febr. 17.

Ich habe die Ehre, Ihnen hiemit ein Register von in der Bahn des von Herrn *Bremiker* entdeckten Cometen gelegenen Sternen zuzusenden, welches vielleicht den Beobachtern dieses Cometen nicht ungelegen kommen mag.

Es bildet ein Bruchstück eines auf dieselbe Art eingerichteten Cataloges von etwa 8000 Sternen mehrentheils unter der 6^{ten} Gröfse, welche ich auf der Hamburger Sternwarte mit dem *Repsoldschen* Meridiankreise beobachtet habe, der, wenn andere Berufs-Geschäfte mir die Mufse gestatten, in diesem Jahre zum Drucke befördert werden soll, daher ich mir jetzt die Freiheit nehme ihn den Freunden der Astronomie anzukündigen.

Dieser Catalog ist vom Jahre 1836, als das Jahr, in welchem ich den *Repsoldschen* Meridiankreis erhielt, datirt. Der sehr gegründete Rath des Herrn Geheimen Rathes *Bessel*, ihn von einem Decimal-Jahre zu datiren, kam zu spät, wie die Reduction schon zu weit vorgerückt war.

Die Constanten sind von dem Herrn *Georg Weyer* berechnet. Sie sind in der Ordnung der analogen Logarithmen *ABCD* im Nautical Almanac geordnet. Wo nicht exprefs das Zeichen — steht, ist + zu verstehen.

Nachträglich noch einige seitdem unterm Pole beobachteten Sterne in derselben Bahn, welche zur Identification dienen können.