Die Position vom 22^{ten} Juni, von der ich Ihnen früher schrieb, lasse ich als zu ungenau hier, wo wir spätere und bessere Beobachtungen mittheilen konnten, lieber weg.

C. L. v. Littrow.

Auszüge aus Briefen des Herrn Directors *Rümker* an den Herausgeber.
Hamburg 1847. Juli 7.

Den neuesten *Hencke'schen* Planeten habe ich in der verflossenen Nacht beobachtet.

1847	M. H. Zt.	Sch. AR.	Sch. Decl.	Beob.
Juli 6	12 ^h 25'54"	256°38'20"4	—4°15'31"3	2

Wobei ich noch bemerke, daß die von *Bessel* angegebene Declination des Sternes 8. Gr. auf welchen zu, wie auch *Hencke* sagt, der Planet seinen Lauf richtet, über 1' falsch, dagegen in der *Histoire Céleste* richtig ist.

Beobachtungen des Neptun.

	M. H. Zt.	AR.	Decl.	Beob.
Juni 28	12 ^h 46' 8"0	332°29' 59"1	—11°56' 54"6	8
Juli 3	12 39 9,0	332 25 54,4	10 58 32,8	5
5	12 36 34,8	332 24 9,2	11 59 20,2	7

Hamburg 1847. Juli 9.

Ich erlaube mir Ihnen meine Beobachtungen des neuesten Planeten nach Zuziehung aller Vergleichungs-Sterne (welches keine Veränderung in den schon gegebenen Positionen hervorbringt, herzusetzen.

1847	M. H. Zt.	Sch. AR.	Sch. Decl.	Beob.
Juli 6	12 ^h 25' 54"0	256°38' 20"4	—4°15' 31"3	2
7	10 46 13,3	256 27 51,2	—4 20 55,9	10

Die scheinbaren Oerter der aus *Bessels* Zonen und der H. C. entnommenen Sterne sind:

Juli 6	$\left\{ \begin{array}{l} b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 17^{\circ} 4' 45''62 \\ 17 6 22,32 \\ 17 6 34,98 \\ 17 10 37,70 \\ 17 10 55,70 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} -3^{\circ}59' 57''5 \\ 3 58 35,9 \\ 4 17 53,9 \\ 4 6 38,9 \\ 4 8 21,8 \end{array} \right.$
Juli 7	$\left\{ \begin{array}{l} a \\ c \\ d \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 17 3 41,11 \\ 17 6 22,33 \\ 17 6 35,02 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} -4 26 47,4 \\ 3 58 36,0 \\ 4 17 54,0 \end{array} \right.$

Hamburg 1847. Juli 17.

Ich nehme mir die Ehre, Ihnen meine bisherigen Beobachtungen des Planeten (bis auf die nicht reducirte gestrige) zusammen zu stellen, und Ihnen meine Beobachtungen des Cometen mitzutheilen.

1847.	M. H. Zt.	AR. Plan.	Decl. Plan.	Beob.
Juli 9	13 ^h 22' 1"25	256° 4' 24"5	—4°34' 38"0	4
12	9 41 50,6	255 35 27,1	—4 54 6,6	Merid.
14	9 32 44,7	255 16 51,9	—5 8 26,9	Merid.
—	10 38 57,7	255 16 25,1	5 8 24,5	2

Der scheinbare Ort eines Vergleichungs-Sternes aus den *Bessel'schen* Zonen, der dort unrichtig angegeben ist, habe ich beobachtet

Juli 12 AR. 17°6'34"605 —4°17'57"82

Comet von *Mauvais*.

1847	M. H. Zt.	AR. ☿	Decl. ☿	Beob.
Juli 12	11 ^h 44' 19"4	273°23' 44"4	85°40' 18"6	1
—	12 20 25,4	273 4 55	85 40 23,0	1

1847	M. H. Zt.	AR. ☿	Decl. ☿	Beob.
Juli 13	12 ^h 47' 4"0	259°27' 59"7	85°35' 28"0	3
14	12 53 48,0	247 11 40,6	85 17 9,8	3
15	11 51 52,8	237 21 49,0	84 49 36,5	4
16	11 46 4	229 10 15,1	84 12 10,7	

Am 17^{ten} Juli um 9^h53' bedeckte der Comet einen Stern in AR. 14^h53', Decl. 83°34'. Wolken verhinderten genauere Beobachtungen.

Vergleichungs-Sterne. Scheinbare Oerter nach eigenen Beobachtungen.

	AR.	Decl.
Juli 13	18 ^h 20 ^m 10 ^s 808	85°40' 9"6
14	17 2 30,480	85 53 51,6
15	15 51 38,40	85 19 25,5
—	16 9 8,118	85 0 57,4

Die Sternörter sind immer den Tag nach der Vergleichung mit dem Cometen bestimmt.

Hamburg 1847. Juli 20.

Hiebei erlaube ich mir Ihnen den Verfolg meiner Beobachtungen des Planeten mitzutheilen.

	M. H. Zt.	AR. Planet.	Decl. Planet.	Beob.
Juli 15	9 ^h 28' 13 ^{''} 7	255° 8' 6 ^{''} 0	—5° 15' 49 ^{''} 5	Merid.
16	10 18 6,4	254 59 26,7	5 23 32,0	6
18	9 14 50,9	254 44 19,8	5 38 29,1	Merid.
—	10 37 12,0	254 43 53,7	5 38 56,9	3
20	10 17 19,9	254 30 11,9	5 54 40,3	5
21	9 51 50,6	254 24 3,3	6 2 27,5	8

C. Rümker.

Beobachtungen des neuen von Henke entdeckten Planeten auf der Altonaer Sternwarte.

	M. Alt. Zt.	AR.	δ.	
Juli 7	10 ^h 46' 9 ^{''} 2	256° 27' 44 ^{''} 4	—4° 21' 1 ^{''} 7	Kreis-Micrometer
14	9 32 44,7	255 16 50,7	—5 8 24,1	Meridiankreis
15	9 28 14,2	255 8 8,6	—5 15 47,1	—
16	9 23 45,2	254 59 51,2	—5 23 14,8	—
21	9 1 43,4	254 24 11,9	—6 2 10,1	—

Vorstehende Beobachtungen sind von Herrn Dr. Petersen gemacht.

S.

Circular.

Am 20sten Juli 12^h 15' m. Zt. fand Herr Brorsen, der jetzt auf der hiesigen Sternwarte arbeitet, unter 1^h 49' 7 AR. und +26° 7' Declination einen schwachen Nebelfleck, den er früher an dieser Stelle nicht bemerkt hatte. Der Himmel bezog sich aber so schnell, dafs er nicht bestimmt seine Bewegung erkennen konnte.

In der vorigen Nacht fand sich der Nebelfleck nicht mehr an der früheren Stelle, und es konnte über seine Natur kein Zweifel übrig bleiben. Der neue telescopische Comet ward auf der hiesigen und der Hamburger Sternwarte beobachtet. Hier fand Herr Dr. Petersen,

	Alt. m. Zt.	AR. ☾	Decl. ☾
Juli 21	12 ^h 38' 8 ^{''}	29° 4' 27 ^{''}	+27° 1' 22 ^{''}
	— 45 35	—	—

wobei der scheinbare Ort der Vergleichungssterne angenommen ist,

a)	1 ^h 54' 52 ^{''} 65	+26° 44' 42 ^{''} 7
b)	— 58 39,98	+26 30 23,3

Herr Director Rümker fand

	Hamb. m. Zt.	AR. ☾	Decl. ☾
Juli 21	13 ^h 3' 43 ^{''} 6	29° 6' 23 ^{''} 0	+27° 1' 51 ^{''} 3

Der Comet bewegt sich also stark in AR. und Declination.

Er ist sehr lichtschwach, von unbestimmter Form, und ohne erkennbaren Kern.

Herrn Brorsen's Position vom 20sten ist eine auf der Karte gemachte Schätzung.

H. C. Schumacher.

Altona 1847. Julius 22.

Schreiben des Herrn Professors Encke an den Herausgeber.

Berlin 1847. Juli 22.

Folgendes sind unsere bisherigen Planetenbeobachtungen:

Juli 5	10 ^h 12' 7 ^{''} 1	256° 51' 35 ^{''} 4	—4° 8' 29 ^{''} 2 Refr.	Juli 14	12 ^h 27' 50 ^{''} 8	255° 15' 52 ^{''} 9	—5° 9' 12 ^{''} 0 Refr.
—	10 14 27,8	51 34,5	8 27,8 Mer.	16	9 23 46,0	254 59 55,4	23 1,3 Mer.
10	9 51 5,2	255 55 36,3	40 15,2 Mer.	—	10 18 30,9	59 34,9	23 25,7 Refr.
—	10 14 13,9	55 17,9	40 25,0 Refr.	21	9 1 45,6	24 15,3	6 2 3,6 Mer.
12	10 41 39,2	35 3,0	54 20,8 Refr.	—	10 15 34,9	23 54,9	2 29,6 Refr.
14	9 32 47,6	17 3,0	5 8 17,2 Mer.				