ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN.

N^o 2888.

Beitrag zur Ermittlung von Sternparallaxen aus Durchgangsbeobachtungen.

Von A. Belopolsky.

Bei meinem Eintritt in den Dienst der Pulkowaer Sternwarte übertrug mir Herr Director Struve die Bearbeitung der vom verstorbenen Vice-Director A. Wagner am Pulkowaer Passageninstrumente zur Bestimmung der Rectascensionen für 1885.0 ausgeführten Beobachtungen. Mein erster Schritt in dieser Arbeit war natürlich das sorgfältige Studium der Wagner'schen Einleitung zum Vol. XII der *Observations de Poulkova*, das die entsprechenden Beobachtungen für die Epoche 1865 enthält. Schon die erste Durchsicht des reichen Schatzes der Wagner'schen Beobachtungen zeigte, dass aus demselben eine Menge werthvoller Resultate, unter anderm namentlich eine Reihe genäherter Sternparallaxen gewonnen werden könne.

Indem ich als ersten Versuch in dieser Richtung im Folgenden einige von mir aus Wagner's Beobachtungen abgeleitete Parallaxen mittheile, möchte ich mir erlauben — und das ist der Hauptzweck meiner Mittheilung — auf die Bedeutung hinzuweisen, welche grössere Reihen von Durchgangsbeobachtungen für unsere Kenntniss der Sternparallaxen haben können.

Die grössere Helligkeit und die grössere Eigenbewegung der Sterne dürften gegenwärtig kaum mehr als genügendes Kriterium für das Vorhandensein grösserer Parallaxen angesehen werden, und es dürfen jetzt a priori wohl alle Sterne dem Forscher in dieser Richtung als gleichberechtigt gelten. Jeder Stern erfordert eine besondere Prüfung. Diese Arbeit sogleich mit den feinsten instrumentellen Hilfsmitteln der Neuzeit vorzunehmen, wäre eine in den vorwiegend meisten Fällen verlorene Arbeit, indem schwerlich viele Parallaxen grösser als 0".1 vorhanden sind, und die grösseren Parallaxen vorläufig gerade das meiste Interesse bieten. Es würde sich demnach für das erste Nachforschen nach Parallaxen ein derartiges Instrument am besten eignen, welches die Arbeit mit möglichst wenig Aufwand von Zeit und Mühe auszuführen erlaubt. Ein solches Instrument wäre ein im Meridian aufgestelltes grösseres Passageninstrument mit einem Registrirapparat. Als besondere Vorzüge würden dabei auch die Abwesenheit jedes Einflusses der Refraction und die unausgesetzte Controlle über die Fehler des Instruments anzusehen sein.

Die Anwendung von Durchgangsbeobachtungen zu Parallaxenbestimmungen ist lange nichts neues mehr (W. Struve, Pape u. A.), und dass dieselbe zu Resultaten von hoher Genauigkeit führen kann, haben neuerdings L. Struve's »Resultate aus den in Pulkowa angestellten Vergleichen von Procyon mit benachbarten Sternen« erwiesen, indem derselbe für die Procyonparallaxe einen höchst befriedigend

mit dem Resultate der Yale College Heliometermessungen stimmenden Werth fand.

Selbst wenn das Passageninstrument nicht definitive Parallaxen liefern könnte, so bietet es doch ein geeignetes Mittel, um Andeutungen über merkbare Sternparallaxen zu erhalten und diejenigen darunter auszuwählen, für welche eine weitere Nachforschung mit feineren Mitteln positive Resultate verspräche. Um einen Beitrag für die Berechtigung dieser Anschauung zu liefern, habe ich aus Wagner's im XII. Bande der *Observations de Poulkova* gegebenen Beobachtungsergebnissen einige Parallaxen abgeleitet, welche allerdings keinen Anspruch auf die höchste Genauigkeit haben, indem die von mir benutzten Beobachtungen nicht für den speciellen Zweck der Parallaxenbestimmung ausgeführt sind.

Zuerst berechnete ich versuchsweise die Parallaxen von 61 Cygni pr., 61 Cygni sq. und Sirius. Die Vergleichung der für dieselben gefundenen Werthe mit denjenigen anderer Berechner ergab ein recht befriedigendes Resultat. Bei der weiteren Auswahl der Sterne hielt ich mich an die Resultate von Wagner's eigenen Untersuchungen, welche im Capitel »Vergleichen der oberen und unteren Culminationen« des XII. Bandes der *Observations de Poulkova* enthalten sind. Die aus den Beobachtungen in der oberen und unteren Culmination abgeleiteten Rectascensionen vergleichend, findet Wagner nicht nur, dass die AR. aus den unteren Culminationen im allgemeinen grösser sind als aus den oberen, sondern giebt auch für die Sterne bis zu + 45° Decl. einen numerischen Werth für diese constante Differenz an, nämlich:

für Sterne bis zu + 40° Decl. ist diese Differenz

$$= - 0''.043$$

für Sterne von + 40° bis + 45° Decl.

$$= - 0''.012.$$

Für Sterne grösserer Decl. liess sich der Werth der Differenz nicht mit genügender Sicherheit ableiten; man sieht nur, dass das negative Zeichen in allen Fällen vorwiegt, wo die beiden Culminationen zu verschiedenen Jahreszeiten (z. B. die eine im Herbst, die andere im Frühjahr) beobachtet sind. Wagner sucht die Erklärung darin, dass die Güte der Bilder in der unteren Culmination immer schlechter ist, als in der oberen. Es ist ihm auch gelungen den Einfluss der Güte der Bilder auf die AR. zu bestimmen; indem bei schlechten Bildern die AR. grösser ausfällt wie bei guten. Er giebt folgende Tabelle dieser Differenzen:

	Decl.	bessere — schlechtere Bilder
obere Culmin.	-15°	-0.029
	-5	-0.023
	$+5$	-0.013
untere Culmin. bis	$+40$	-0.005
	$+40$ bis $+45$	-0.027

Diese Differenzen zwischen oberer und unterer Culmination (wie ich der Kürze wegen mich auszudrücken erlaube) verdienen ein eingehenderes Studium. Es fragt sich, ob sie nicht dadurch entstanden sein könnten, dass die eine Culmination ein halbes Jahr später als die andere beobachtet wurde, und ob nicht unter den Sternen einige mit bedeutenderer Parallaxe vorkommen, wobei die Epochen des positiven und negativen Maximalbetrages der parallactischen Coefficienten mit den Beobachtungszeiten zusammenfallen könnten.

Zu den Sternen zwischen $+35^\circ$ und $+40^\circ$ Decl., aus welchen die obige Differenz abgeleitet ist, gehören z. B. 61 Cygni pr. und 61 Cygni sq., und die Beobachtungszeiten derselben fallen sehr nahe auf die Epochen der Maximalwerthe der parallactischen Coefficienten. Corrigirt man die Beobachtungen für den Einfluss der Parallaxe, letztere nach O. Struve zu 0.51 angenommen, so ergibt sich die Differenz der beiden Culminationen im Mittel für 61 Cygni pr. zu 0.000 , für 61 Cygni sq. zu -0.016 , während sie bei Wagner resp. -0.053 und -0.086 beträgt.

In Bezug auf den Doppelstern ν Draconis, für welchen die obige Differenz besonders gross ausfällt, sagt Wagner selbst (pag. 55):

»Da hier zufällig die mittleren Beobachtungszeiten der beiden Culminationen abwechselnd nahezu mit den Maximis und Minimis für Parallaxe zusammengefallen sind, so verdient dies Sternenpaar, trotz seiner nicht sehr bedeutenden Eigenbewegung, in dieser Beziehung näher untersucht zu werden«.

Es dürfte somit wohl angenommen werden, dass auch in anderen Fällen verhältnissmässig grosser Differenzen zwischen beiden Culminationen, wenn die Beobachtungszeiten nahezu den Maximis und Minimis der Parallaxe entsprechen, eine mehr oder weniger bedeutende Parallaxe zu erwarten ist. Von dieser Voraussetzung ausgehend, habe ich aus Wagner's Beobachtungen die Parallaxen für folgende Sterne berechnet:

	α 1865.0	δ 1865.0
Sirius	$6^h 39^m 12^s$	$-16^\circ 32'$
61 Cygni pr.	$21 \ 0 \ 52$	$+38 \ 5$
61 Cygni sq.		
ν^1 Draconis	$17 \ 29 \ 34$	$+55 \ 17$
ν^2 Draconis		
η Herculis	$16 \ 38 \ 16$	$+39 \ 11$
π Herculis	$17 \ 10 \ 21$	$+36 \ 58$
10 Urs. maj.	$8 \ 51 \ 52$	$+42 \ 19$

Bevor ich zur Mittheilung des von mir benutzten Beobachtungsmaterials und der angewandten Rechenmethode übergehe, muss ich noch erwähnen, dass ich nur die registrirten mittleren Rectascensionen der Sterne von 1862

bis 1872 benutzt habe, welche im XII. Bande der Obs. de Poulk. gegeben sind. Der w. F. einer Einzelbestimmung für Sterne zwischen $+30^\circ$ und $+70^\circ$ Decl. beträgt ± 0.022 bis ± 0.041 ; die Bearbeitung der Beobachtungen schliesst die Möglichkeit constanter Fehler aus; die neuesten Untersuchungen über die Eigenbewegungen der Sterne sind schon in Betracht gezogen; es bieten somit die »Mittleren Rectascensionen auf 1865.0 reducirt« (pag. 105–214) ein für unsere Zwecke vollständig fertiggestelltes Material.

Für die Berechnung der Parallaxen benutzte ich die bekannte Formel, mit Einführung eines der Zeit proportionalen Gliedes, welches die von der Zeit abhängigen Correctionen für die Differenz zwischen oberer und unterer Culmination enthält. Bezeichnet man durch t das seit 1860 verflossene Zeitintervall, und durch y einen constanten, zu bestimmenden Coefficienten, so erhält die Formel für die Bestimmung der Parallaxe folgende Gestalt:

$$\alpha_1 - \alpha = -\pi \sec \delta \sin(\alpha - A) \cos D + ty.$$

Die heliocentrische Rectascension α wird ausgeschlossen, indem man von allen für ein und denselben Stern angesetzten Gleichungen das Mittel aus allen Gleichungen subtrahirt. Zur Vereinfachung der Rechnung habe ich Mittel aus Gleichungen mit fast gleichen parallactischen Coefficienten genommen, wobei jedes dieser Mittel ein der Anzahl der benutzten Gleichungen entsprechendes Gewicht erhielt.

61 Cygni pr.

Wir entnehmen den »Mittleren Rectascensionen auf 1865.0 reducirt« folgende Positionen (das Zeichen * bezieht sich auf die untere Culmination):

Nr.	Beob. Zeit	α_1	$\frac{\sin(\alpha - A)}{\times \cos D}$
1	1862.88	$21^h 0^m 50.898$	$+0.937$
2	62.88	50.837	$+0.929$
3	62.83	50.975	$+0.958$
4	62.84	50.871	$+0.959$
5	62.89	50.874	$+0.916$
6	63.70	50.939	$+0.613$
9	63.75	50.880	$+0.789$
8	63.76	50.880	$+0.833$
9	63.76	50.928	$+0.841$
10	63.78	50.914	$+0.878$
11	63.78	50.912	$+0.890$
12	69.67	50.982	$+0.444$
13	69.66	50.974	$+0.415$
14	69.69	50.974	$+0.567$
15	69.77	50.897	$+0.867$
16	70.68	50.960	$+0.500$
17	63.27	$50.904*$	-0.887
18	64.26	$51.089*$	-0.865
19	64.26	$51.038*$	-0.872
20	64.22	$50.913*$	-0.732
21	68.26	$51.078*$	-0.851
22	68.25	$50.974*$	-0.843
23	69.25	$51.023*$	-0.824
24	69.25	$50.982*$	-0.835
25	69.24	$51.005*$	-0.807

Nr.	Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A) \times \cos D$
26	1869.28	$21^h 0^m 51^s 005^*$	-0.902
27	70.19	51.074*	-0.597
28	70.21	51.018*	-0.684
29	70.23	50.918*	-0.787
30	70.17	50.840*	-0.512

Zuerst bildete ich Mittel für jedes Jahr und erhielt folgende neun Gleichungen, in denen nur die Secunden ausgeschrieben sind und $\pi \sec \delta = x$ gesetzt ist.

Gleichungen	Gew.
$50.891 - \alpha = -0.940x + 2.86y$	5
$50.909 - \alpha = -0.807x + 3.75y$	6
$50.957 - \alpha = -0.573x + 9.70y$	4
$50.960 - \alpha = -0.500x + 10.68y$	1
$50.904 - \alpha = +0.887x + 3.27y$	1
$51.013 - \alpha = +0.823x + 4.25y$	3
$51.013 - \alpha = +0.835x + 8.25y$	3
$51.004 - \alpha = +0.842x + 9.25y$	4
$50.962 - \alpha = +0.645x + 10.18y$	4

Mittel: $50.957 - \alpha = +0.135x + 6.91y$

Nach Elimination von α und Einführung der Gewichte erhalten wir:

$$\begin{aligned} 2.408x + 9.07y - 0.148 &= 0 \\ 2.309x + 7.74y - 0.118 &= 0 \\ 1.416x - 5.58y + 0.000 &= 0 \\ 0.635x - 3.77y + 0.003 &= 0 \\ 0.752x - 3.64y + 0.053 &= 0 \\ 1.191x - 4.60y - 0.097 &= 0 \\ 1.211x + 2.32y - 0.097 &= 0 \\ 1.414x + 4.68y - 0.094 &= 0 \\ 1.020x + 6.54y - 0.010 &= 0 \end{aligned}$$

Die Behandlung dieser Gleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate führt zu folgenden Endgleichungen:

$$\begin{aligned} 20.105x + 37.298y - 0.963 &= 0 \\ 37.298x + 291.988y - 2.744 &= 0 \end{aligned}$$

woraus

$$\begin{aligned} \pi &= +0''.47 \pm 0''.092 \\ y &= +0''.0043 \pm 0''.0022. \end{aligned}$$

Man kann eine strengere Vereinigung der Beobachtungen zum Mittel verlangen, nicht den Jahren nach, sondern nach gleichen parallactischen Coefficienten. Eine solche ergibt:

Nr.	Gleichungen	Gew.
1	$-0.877x - 3.70y + 0.080 = 0$	2
2	$-0.903x - 3.74y + 0.025 = 0$	2
3	$-0.860x - 3.69y + 0.074 = 0$	1
4	$-0.557x - 2.88y + 0.009 = 0$	1
5	$-0.733x - 2.83y + 0.068 = 0$	1

Nr.	Gleichungen	Gew.
6	$-0.781x - 2.82y + 0.044 = 0$	2
7	$-0.828x - 2.80y + 0.035 = 0$	2
8	$-0.374x + 3.09y - 0.030 = 0$	2
9	$-0.511x + 3.11y - 0.026 = 0$	1
10	$-0.811x + 3.19y + 0.051 = 0$	1
11	$-0.444x + 4.10y - 0.012 = 0$	1
12	$+0.943x - 3.31y + 0.044 = 0$	1
13	$+0.924x - 2.32y - 0.115 = 0$	2
14	$+0.788x - 2.36y + 0.035 = 0$	1
15	$+0.903x + 1.68y - 0.074 = 0$	2
16	$+0.886x + 2.67y - 0.055 = 0$	2
17	$+0.863x + 2.66y - 0.057 = 0$	1
18	$+0.958x + 2.70y - 0.057 = 0$	1/2
19	$+0.611x + 3.60y - 0.009 = 0$	2
20	$+0.702x + 3.64y - 0.020 = 0$	2

Und die Endgleichungen sind:

$$\begin{aligned} 18.366x + 33.080y - 0.925 &= 0 \\ 33.080x + 282.946y - 2.543 &= 0 \end{aligned}$$

woraus

$$\begin{aligned} \pi &= +0''.50 \pm 0''.094 \\ y &= +0''.0039 \pm 0''.0021. \end{aligned}$$

Dieses Resultat stimmt mit dem früher erhaltenen.

61 Cygni sq.

Es wurden folgende Beobachtungen benutzt:

Nr.	Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A) \times \cos D$
1	1862.86	$21^h 0^m 52^s 389$	+0.937
2	62.88	52.353	+0.929
3	62.83	52.386	+0.956
4	62.84	52.402	+0.989
5	62.89	52.429	+0.916
6	63.70	52.437	+0.613
7	63.75	52.442	+0.789
8	63.76	52.347	+0.833
9	63.76	52.365	+0.841
10	63.78	52.371	+0.878
11	63.78	52.419	+0.890
12	69.67	52.428	+0.444
13	69.69	52.440	+0.567
14	69.66	52.500	+0.415
15	69.77	52.443	+0.867
16	70.68	52.433	+0.497
17	68.25	52.545*	-0.851
18	68.24	52.439*	-0.810
19	69.25	52.551*	-0.824
20	69.25	52.505*	-0.835
21	69.24	52.503*	-0.807
22	69.28	52.531*	-0.902
23	70.19	52.583*	-0.597
24	70.21	52.502*	-0.684
25	70.17	52.399*	-0.512
26	70.23	52.517*	-0.787

Hieraus wurden folgende Gleichungen gebildet:

	Gewicht	
$-0.933x + 2.87y - 52.371 + \alpha = 0$	2	$-0.772x - 4.35y + 0.083 = 0$
$-0.957x + 2.84y - 52.394 + \alpha = 0$	2	$-0.796x - 4.38y + 0.060 = 0$
$-0.916x + 2.89y - 52.429 + \alpha = 0$	1	$-0.755x - 4.33y + 0.025 = 0$
$-0.613x + 3.70y - 52.437 + \alpha = 0$	$1/2$	$-0.226x - 1.76y + 0.009 = 0$
$-0.789x + 3.75y - 52.442 + \alpha = 0$	1	$-0.628x - 3.47y + 0.012 = 0$
$-0.837x + 3.76y - 52.356 + \alpha = 0$	2	$-0.676x - 3.46y + 0.098 = 0$
$-0.884x + 3.78y - 52.395 + \alpha = 0$	2	$-0.723x - 3.44y + 0.059 = 0$
$-0.430x + 9.67y - 52.464 + \alpha = 0$	1	$-0.269x + 2.45y - 0.010 = 0$
$-0.567x + 9.69y - 52.440 + \alpha = 0$	$1/2$	$-0.203x + 1.23y + 0.007 = 0$
$-0.867x + 9.77y - 52.443 + \alpha = 0$	1	$-0.706x + 2.55y + 0.011 = 0$
$-0.497x + 10.68y - 52.443 + \alpha = 0$	$1/3$	$-0.168x + 1.73y + 0.011 = 0$
$+0.830x + 8.25y - 52.492 + \alpha = 0$	2	$+0.991x + 1.03y - 0.038 = 0$
$+0.830x + 9.25y - 52.528 + \alpha = 0$	2	$+0.991x + 2.03y - 0.074 = 0$
$+0.807x + 9.24y - 52.503 + \alpha = 0$	1	$+0.968x + 2.02y - 0.049 = 0$
$+0.902x + 9.28y - 52.531 + \alpha = 0$	$1/3$	$+0.532x + 1.03y - 0.039 = 0$
$+0.555x + 10.18x - 52.491 + \alpha = 0$	1	$+0.716x + 2.29y - 0.037 = 0$
$+0.684x + 10.21x - 52.502 + \alpha = 0$	1	$+0.845x + 2.99y - 0.048 = 0$
$+0.787x + 10.23x - 52.517 + \alpha = 0$	1	$+0.948x + 3.01y - 0.063 = 0$

Mittel: $-0.161x + 7.22y - 52.454 + \alpha = 0$

Die Endgleichungen sind:

$$13.820x + 42.657y - 0.920 = 0$$

$$42.657x + 225.675y - 3.453 = 0$$

woraus

$$\pi = +0''.55 \pm 0''.091$$

$$y = +0''.0065 \pm 0''.0019$$

Diese Werthe der Parallaxe für 61 Cygni stimmen nahe mit den bis jetzt auf andere Weise bestimmten Grössen:

Bessel-Auwers	$+0''.56$	Peters - Glasenapp	$+0''.43$
Peters	$+0.35$	Gill	$+0.50$
O. Struve	$+0.51$	Pritchard	$+0.43$
Schweizer-Sokoloff	$+0.43$		

Die Werthe von y geben für die Vergleichung der beiden Culminationen eine Grösse von circa $0''.02$, die mit Wagner's Correction für Sterne zwischen $+35^\circ$ und $+45^\circ$ ($-0''.027$) übereinstimmt, sowie auch mit der Correction wegen der Güte der Bilder: schl. — bess. $= +0''.027$. Uebrigens muss bemerkt werden, dass die Beobachtungen dieser Sterne nicht so gut wie sonst bei Wagner sind, da hier jedesmal nur 5–8 Fäden benutzt sind.

Sirius.

Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A) \times \cos D$
1862.69	$6^h 39^m 11^s.960$	-0.927
62.69	11.990	-0.944
62.70	12.040	-0.949
63.58	12.006	-0.506
63.66	11.972	-0.840
63.70	11.992	-0.958
63.72	12.032	-0.987

Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A) \times \cos D$
1863.62	$6^h 39^m 11^s.962$	-0.704
63.62	12.012	-0.715
63.63	12.062	-0.738
63.66	11.982	-0.858
63.66	12.002	-0.866
63.67	12.012	-0.882
63.68	11.977	-0.912
63.74	11.982	-0.996
66.67	11.967	-0.979
69.70	11.985	-0.958
70.72	12.040	-0.987
63.14	11.950	$+0.824$
63.15	11.890	$+0.843$
63.15	11.870	$+0.852$
63.16	11.940	$+0.878$
63.16	11.930	$+0.772$
63.19	11.940	$+0.952$
63.20	11.930	$+0.971$
63.22	11.890	$+0.993$
63.19	11.920	$+0.941$
63.19	11.940	$+0.947$
64.13	11.990	$+0.769$
64.13	12.040	$+0.783$
64.26	11.940	$+0.985$
64.17	12.010	$+0.900$
64.19	11.980	$+0.956$
64.20	12.000	$+0.977$
64.16	11.980	$+0.858$
65.19	11.919	$+0.960$
65.20	11.919	$+0.964$
65.20	11.939	$+0.969$
65.20	11.959	$+0.976$
65.17	11.969	$+0.905$

Courbes syndynamiques axiales pour le moment 1884 Janu. 15. 17^h 46^m t. m. de Greenwich.
Echelle: distance moy. du Soleil à la Terre 1-1500 mm.

Fig. 2.
Moment: 1884 Févr 25 6^h 46^m t. m. d. Gr.
Même échelle

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A)$ $\times \cos D$
1866.25	6 ^h 39 ^m 11 ^s .957	+0.993
66.12	11.957	+0.715
66.18	11.997	+0.924
66.19	11.987	+0.953
66.22	11.997	+0.990
67.16	11.986	+0.877
67.18	11.981	+0.935
67.21	11.970	+0.977
67.21	11.984	+0.981
68.21	11.865	+0.980
68.25	11.959	+0.996
68.15	11.924	+0.849
68.16	11.903	+0.867
69.21	11.988	+0.979
69.24	11.988	+0.997
70.17	11.964	+0.910
70.24	11.930	+0.997
70.25	12.000	+0.996

Zur Erleichterung der Rechnung bildete ich Mittel aus den Beobachtungen einzelner Jahre und erhielt folgende Gleichungen:

Gew.

$$\begin{aligned}
 +0.940x + 2.69y - 11.997 + \alpha &= 0 & 3 \\
 +0.830x + 3.66y - 11.999 + \alpha &= 0 & 12 \\
 +0.979x + 6.67y - 11.967 + \alpha &= 0 & 1 \\
 +0.958x + 9.58y - 11.985 + \alpha &= 0 & 1 \\
 +0.987x + 10.72y - 12.040 + \alpha &= 0 & 1 \\
 -0.897x + 3.17y - 11.920 + \alpha &= 0 & 10 \\
 -0.890x + 4.18y - 11.991 + \alpha &= 0 & 7 \\
 -0.955x + 5.17y - 11.941 + \alpha &= 0 & 5 \\
 -0.915x + 6.19y - 11.979 + \alpha &= 0 & 5 \\
 -0.967x + 7.19y - 11.900 + \alpha &= 0 & 4 \\
 -0.923x + 8.19y - 11.910 + \alpha &= 0 & 4 \\
 -0.988x + 9.22y - 11.988 + \alpha &= 0 & 2 \\
 -0.968x + 10.22y - 11.965 + \alpha &= 0 & 3
 \end{aligned}$$

$$\text{Mittel: } -0.216x + 6.69y - 11.968 + \alpha = 0$$

Nach Elimination von α und Einführung der Gewichte erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 2.000x - 6.92y - 0.050 &= 0 \\
 3.619x - 10.48y - 0.111 &= 0 \\
 1.195x - 0.02y + 0.001 &= 0 \\
 1.174x + 3.01y - 0.017 &= 0 \\
 1.203x + 4.03y - 0.072 &= 0 \\
 2.152x + 11.13y - 0.152 &= 0 \\
 1.786x + 6.65y + 0.061 &= 0 \\
 1.655x + 3.40y - 0.060 &= 0 \\
 1.566x + 1.12y + 0.025 &= 0 \\
 1.502x - 1.00y - 0.136 &= 0 \\
 1.414x - 3.00y - 0.116 &= 0 \\
 1.088x - 3.57y + 0.028 &= 0 \\
 1.301x - 6.11y - 0.005 &= 0
 \end{aligned}$$

Die Endgleichungen sind:

$$\begin{aligned}
 41.495x - 17.759y - 1.231 &= 0 \\
 -17.759x - 423.945y + 0.121 &= 0
 \end{aligned}$$

woraus:

$$\pi = +0''.43 \pm 0''.099$$

$$y = +0''.00098 \pm 0''.0022$$

Dieser Werth liegt zwischen den neuen Bestimmungen von

$$\text{Gill } +0''.37$$

$$\text{Elkin } +0.47 \text{ Serie I}$$

$$\text{Elkin } +0.39 \text{ Serie II.}$$

2 Draconis pr.

Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A)$ $\times \cos D$
1862.68	17 ^h 29 ^m 31 ^s .112	+0.979
62.71	31.131	+0.996
62.71	31.131	+0.999
63.59	31.115	+0.741
63.63	31.074	+0.876
63.68	31.124	+0.979
64.72	31.124	+0.995
64.76	31.154	+0.934
65.58	31.159	+0.725
65.59	31.189	+0.769
65.60	31.089	+0.810
69.67	31.065	+0.974
69.74	31.085	+0.981
64.11	31.196*	-0.841
66.12	31.160*	-0.873
68.15	31.222*	-0.963
68.16	31.162*	-0.970
68.25	31.160*	-0.942
69.09	31.115*	-0.799
69.10	31.155*	-0.809
69.17	31.074*	-0.984
70.09	31.157*	-0.799
70.10	31.187*	-0.837
70.11	31.207*	-0.847
70.15	31.161*	-0.965
70.17	31.176*	-0.987
70.20	31.235*	-0.998

Es wurden auch hier Mittel aus den Beobachtungen jedes Jahres gebildet. Auf solche Weise erhielten wir die Gleichungen:

Gew.

$$\begin{aligned}
 -0.991x + 2.70y - 31.125 + \alpha &= 0 & 3 \\
 -0.865x + 3.63y - 31.104 + \alpha &= 0 & 3 \\
 -0.965x + 4.74y - 31.139 + \alpha &= 0 & 2 \\
 -0.768x + 5.59y - 31.142 + \alpha &= 0 & 3 \\
 -0.978x + 9.70y - 31.075 + \alpha &= 0 & 2 \\
 +0.841x + 4.11y - 31.196 + \alpha &= 0 & 1 \\
 +0.873x + 6.12y - 31.160 + \alpha &= 0 & 1 \\
 +0.958x + 8.19y - 31.181 + \alpha &= 0 & 3 \\
 +0.864x + 9.12y - 31.115 + \alpha &= 0 & 3 \\
 +0.905x + 10.14y - 31.187 + \alpha &= 0 & 6
 \end{aligned}$$

$$\text{Mittel: } -0.126x + 6.40y - 31.142 + \alpha = 0$$

Nach Elimination von α und Einführung der Gewichte erhalten wir:

$$\begin{aligned} 1.496x + 6.401y - 0.029 &= 0 \\ 1.278x + 4.792y - 0.066 &= 0 \\ 1.183x + 2.341y - 0.004 &= 0 \\ 1.111x + 1.401y + 0.000 &= 0 \\ 1.201x - 4.653y - 0.094 &= 0 \\ 0.967x - 2.29y - 0.054 &= 0 \\ 0.991x - 0.28y - 0.018 &= 0 \\ 1.875x + 3.097y - 0.067 &= 0 \\ 1.713x + 4.706y + 0.047 &= 0 \\ 2.526x + 9.163y - 0.110 &= 0 \end{aligned}$$

Die Endgleichungen sind:

$$\begin{aligned} +22.725x + 48.955y - 0.642 &= 0 \\ +48.955x + 214.045y - 0.944 &= 0 \end{aligned}$$

woraus:

$$\begin{aligned} \pi &= +0''.32 \pm 0''.076 \\ y &= -0''.0040 \pm 0''.0029. \end{aligned}$$

ν Draconis sq.

Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A) \times \cos D$
1862.68	$17^h 29^m 36^s.483$	+0.980
62.71	36.402	+0.998
62.71	36.482	+0.998
62.71	36.432	+0.999
63.66	36.407	+0.954
63.67	36.437	+0.972
64.72	36.465	+0.996
64.76	36.454	+0.940
65.58	36.530	+0.724
65.60	36.459	+0.809
65.59	36.569	+0.769
68.77	36.471	+0.921
70.74	36.434	+0.979
1866.12	36.520*	-0.881
68.15	36.502*	-0.962
68.16	36.487*	-0.971
69.17	36.543*	-0.986
69.10	36.514*	-0.809
70.09	36.570*	-0.775
70.10	36.575*	-0.837
70.11	36.575*	-0.847
70.19	36.524*	-0.998
70.20	36.573*	-0.998
70.15	36.464*	-0.965
70.17	36.594*	-0.987

Hieraus folgen die Gleichungen:

Gew.

$$\begin{aligned} -0.994x + 2.70y - 36.450 + \alpha &= 0 & 4 \\ -0.963x + 3.67y - 36.422 + \alpha &= 0 & 2 \\ -0.968x + 4.74y - 36.459 + \alpha &= 0 & 2 \\ -0.767x + 5.59y - 36.519 + \alpha &= 0 & 3 \\ -0.921x + 8.77y - 36.471 + \alpha &= 0 & 1 \end{aligned}$$

Gew.

$$\begin{aligned} -0.979x + 10.74y - 36.434 + \alpha &= 0 & 1 \\ +0.881x + 6.12y - 36.520 + \alpha &= 0 & 1 \\ +0.967x + 8.15y - 36.495 + \alpha &= 0 & 2 \\ +0.897x + 9.13y - 36.529 + \alpha &= 0 & 2 \\ +0.915x + 10.14y - 36.554 + \alpha &= 0 & 7 \end{aligned}$$

$$\text{Mittel: } -0.193x + 6.97y - 36.485 + \alpha = 0$$

Nach Elimination von α und Einführung der Gewichte:

$$\begin{aligned} 1.602x + 8.54y - 0.070 &= 0 \\ 1.086x + 4.65y - 0.089 &= 0 \\ 1.093x + 3.14y - 0.037 &= 0 \\ 0.993x + 2.39y + 0.059 &= 0 \\ 0.728x - 1.80y - 0.014 &= 0 \\ 0.786x - 3.77y - 0.051 &= 0 \\ 1.074x - 0.85y - 0.035 &= 0 \\ 1.636x + 1.66y - 0.014 &= 0 \\ 1.537x + 3.05y - 0.062 &= 0 \\ 2.925x + 8.37y - 0.182 &= 0 \end{aligned}$$

Die Endgleichungen sind:

$$\begin{aligned} 21.821x + 51.236y - 0.929 &= 0 \\ 51.236x + 210.417y - 2.575 &= 0 \end{aligned}$$

woraus:

$$\begin{aligned} \pi &= +0''.28 \pm 0''.088 \\ y &= +0''.0044 \pm 0''.0022. \end{aligned}$$

η Herculis.

Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A) \times \cos D$
1862.56	$16^h 38^m 16^s.171$	+0.764
63.65	16.162	+0.982
63.66	16.112	+0.986
63.59	16.162	+0.855
63.59	16.142	+0.863
63.63	16.132	+0.948
63.66	16.162	+0.989
63.67	16.112	+0.990
70.53	16.177	+0.648
70.56	16.066	+0.774
70.61	16.126	+0.909
1863.15	16.169*	-0.987
63.13	16.214*	-0.974
64.13	16.216*	-0.973
68.17	16.211*	-0.988
68.15	16.196*	-0.989
68.16	16.131*	-0.989
69.15	16.227*	-0.988
70.09	16.228*	-0.887
70.09	16.233*	-0.895
70.15	16.173*	-0.989
70.17	16.193*	-0.984
71.06	16.249*	-0.794
71.10	16.179*	-0.907
71.10	16.189*	-0.914
71.11	16.254*	-0.927
72.18	16.226*	-0.984

Hieraus folgen die Gleichungen:

Gewicht

$-0.764x + 2.56y - 16.171 + \alpha = 0$	1	$-0.906x - 5.17y + 0.014 = 0$
$-0.984x + 3.65y - 16.137 + \alpha = 0$	2	$-1.126x - 4.08y + 0.048 = 0$
$-0.859x + 3.59y - 16.152 + \alpha = 0$	2	$-1.001x - 4.14y + 0.033 = 0$
$-0.948x + 3.63y - 16.132 + \alpha = 0$	1	$-1.090x - 4.10y + 0.053 = 0$
$-0.990x + 3.67y - 16.137 + \alpha = 0$	2	$-1.132x - 4.06y + 0.048 = 0$
$-0.648x + 10.53y - 16.177 + \alpha = 0$	1	$-0.790x + 2.80y + 0.008 = 0$
$-0.774x + 10.56y - 16.066 + \alpha = 0$	1	$-0.916x + 2.83y + 0.119 = 0$
$-0.909x + 10.61y - 16.126 + \alpha = 0$	1	$-1.051x + 2.88y + 0.059 = 0$
$+0.981x + 3.14y - 16.191 + \alpha = 0$	2	$+0.839x - 4.59y - 0.006 = 0$
$+0.973x + 4.13y - 16.216 + \alpha = 0$	1	$+0.831x - 3.60y - 0.031 = 0$
$+0.989x + 8.16y - 16.178 + \alpha = 0$	3	$+0.847x + 0.43y + 0.007 = 0$
$+0.988x + 9.15y - 16.227 + \alpha = 0$	1	$+0.846x + 1.42y - 0.042 = 0$
$+0.891x + 10.09y - 16.230 + \alpha = 0$	2	$+0.749x + 2.36y - 0.045 = 0$
$+0.987x + 10.16y - 16.183 + \alpha = 0$	2	$+0.845x + 2.43y + 0.002 = 0$
$+0.794x + 11.06y - 16.249 + \alpha = 0$	1	$+0.652x + 3.33y - 0.064 = 0$
$+0.911x + 11.10y - 16.184 + \alpha = 0$	2	$+0.769x + 3.37y + 0.001 = 0$
$+0.927x + 11.11y - 16.254 + \alpha = 0$	1	$+0.785x + 3.38y - 0.069 = 0$
$+0.984x + 12.18y - 16.226 + \alpha = 0$	1	$+0.842x + 4.45y - 0.041 = 0$

Mittel: $+0.142x + 7.73y - 16.185 + \alpha = 0$

Die Endgleichungen sind:

$$22.130x + 40.985y - 0.777 = 0$$

$$40.985x + 313.868y - 1.525 = 0$$

woraus:

$$\pi = +0^{\circ}40 \pm 0^{\circ}072$$

$$y = +0^{\circ}0004 \pm 0^{\circ}0016.$$

 π Herculis.

Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A)$ $\times \cos D$
1862.71	$17^h 10^m 20^s.797$	$+0.989$
63.65	20.780	$+0.783$
63.66	20.745	$+0.968$
63.59	20.732	$+0.778$
63.59	20.790	$+0.788$
63.66	20.790	$+0.979$
63.68	20.755	$+0.989$
64.72	20.785	$+0.986$
64.59	20.784	-0.814
64.72	20.745	-0.984
64.76	20.745	-0.910
65.65	20.758	-0.957

Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A)$ $\times \cos D$
1863.13	$17^h 10^m 20^s.744*$	-0.948
63.14	$20.725*$	-0.967
63.17	$20.754*$	-0.989
63.17	$20.855*$	-0.991
68.17	$20.845*$	-0.995
68.16	$20.795*$	-0.981
69.15	$20.809*$	-0.977
69.09	$20.808*$	-0.830
70.15	$20.858*$	-0.979
70.16	$20.863*$	-0.987
70.17	$20.873*$	-0.994
71.10	$20.816*$	-0.853
71.17	$20.797*$	-0.989

Hieraus folgen die Gleichungen:

Gewicht

$-0.989x + 2.71y - 20.797 + \alpha = 0$	1	$-1.152x - 3.71y - 0.005 = 0$
$-0.783x + 3.61y - 20.767 + \alpha = 0$	3	$-0.946x - 2.81y + 0.025 = 0$
$-0.973x + 3.66y - 20.768 + \alpha = 0$	2	$-1.136x - 2.76y + 0.024 = 0$
$-0.989x + 3.68y - 20.755 + \alpha = 0$	1	$-1.152x - 2.74y + 0.037 = 0$
$-0.985x + 4.72y - 20.765 + \alpha = 0$	2	$-1.148x - 1.70y + 0.027 = 0$
$-0.814x + 4.59y - 20.784 + \alpha = 0$	1	$-0.977x - 1.83y + 0.008 = 0$
$-0.910x + 4.76y - 20.745 + \alpha = 0$	1	$-1.073x - 1.66y + 0.047 = 0$
$-0.957x + 5.65y - 20.758 + \alpha = 0$	1	$-1.120x - 0.77y + 0.034 = 0$
$+0.948x + 3.13y - 20.744 + \alpha = 0$	1	$+0.785x - 3.29y + 0.048 = 0$
$+0.967x + 3.14y - 20.725 + \alpha = 0$	1	$+0.804x - 3.28y + 0.067 = 0$
$+0.990x + 3.17y - 20.804 + \alpha = 0$	2	$+0.827x - 3.25y - 0.012 = 0$
$+0.988x + 8.17y - 20.820 + \alpha = 0$	2	$+0.825x + 1.75y - 0.028 = 0$
$+0.830x + 9.09y - 20.808 + \alpha = 0$	1	$+0.667x + 2.67y - 0.016 = 0$
$+0.977x + 9.15y - 20.809 + \alpha = 0$	1	$+0.814x + 2.73y - 0.017 = 0$
$+0.979x + 10.15y - 20.858 + \alpha = 0$	1	$+0.816x + 3.73y - 0.066 = 0$

Gewicht

$$\begin{aligned}
 +0.987x + 10.16y - 20.863 + \alpha &= 0 & 1 & +0.824x + 3.74y - 0.071 = 0 \\
 +0.994x + 10.17y - 20.873 + \alpha &= 0 & 1 & +0.831x + 3.75y - 0.081 = 0 \\
 +0.853x + 11.10y - 20.816 + \alpha &= 0 & 1 & +0.690x + 4.68y - 0.024 = 0 \\
 +0.989x + 11.17y - 20.797 + \alpha &= 0 & 1 & +0.826x + 4.75y - 0.005 = 0
 \end{aligned}$$

$$\text{Mittel: } +0.163x + 6.42y - 20.792 + \alpha = 0$$

Die Endgleichungen sind:

$$22.210x + 42.484y - 0.520 = 0$$

$$42.484x + 222.512y - 2.075 = 0$$

woraus:

$$\pi = +0''.11 \pm 0''.063$$

$$y = +0''.0076 \pm 0''.0017.$$

10 Ursae majoris.

Die Zahl der Beobachtungen ist hier weit geringer als bei den anderen Sternen, die parallactischen Coefficienten sind klein.

Nr.	Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A) \times \cos D$
1	1863.25	$8^h 51^m 52^s 000$	+0.841
2	68.25	51.961	+0.848
3	68.30	51.883	+0.949
4	69.27	51.981	+0.921
5	70.19	51.897	+0.626
6	70.22	51.908	+0.763

Nr.	Beob. Zeit	α_1	$\sin(\alpha - A) \times \cos D$
7	1863.68	$8^h 51^m 51^s 951*$	-0.547
8	63.68	52.046*	-0.553
9	63.72	51.944*	-0.729
10	63.74	51.988*	-0.782
11	63.65	52.024*	-0.387
12	69.66	51.981*	-0.450
13	69.67	51.881*	-0.479
14	70.69	52.001*	-0.557

Es folgen die Gleichungen:

Gewicht

$$\begin{aligned}
 -0.850x + 3.25y - 52.000 + \alpha &= 0 & 1 & 0.646x + 4.10y + 0.036 = 0 \\
 -0.848x + 8.25y - 51.961 + \alpha &= 0 & 1 & 0.644x + 0.90y - 0.003 = 0 \\
 -0.949x + 8.30y - 51.888 + \alpha &= 0 & 1 & 0.745x - 0.95y - 0.076 = 0 \\
 -0.921x + 9.27y - 51.981 + \alpha &= 0 & 1 & 0.717x - 1.92y + 0.017 = 0 \\
 -0.626x + 10.19y - 51.897 + \alpha &= 0 & 1 & 0.422x - 2.84y - 0.067 = 0 \\
 -0.763x + 10.22y - 51.908 + \alpha &= 0 & 1 & 0.559x - 2.87y - 0.056 = 0 \\
 +0.756x + 3.73y - 51.966 + \alpha &= 0 & 2 & 0.960x - 3.62y - 0.002 = 0 \\
 +0.550x + 3.68y - 51.998 + \alpha &= 0 & 2 & 0.754x - 3.67y - 0.034 = 0 \\
 +0.387x + 3.65y - 52.024 + \alpha &= 0 & 1 & 0.591x - 3.70y - 0.060 = 0 \\
 +0.465x + 9.67y - 51.931 + \alpha &= 0 & 1 & 0.669x + 2.32y + 0.033 = 0 \\
 +0.557x + 10.69y - 52.011 + \alpha &= 0 & 1 & 0.761x + 3.34y - 0.047 = 0
 \end{aligned}$$

$$\text{Mittel: } -0.204x + 7.35y - 51.964 + \alpha = 0$$

Die Endgleichungen sind:

$$6.748x - 13.394y - 0.187 = 0$$

$$-13.394x + 121.890y + 0.946 = 0$$

$$\text{woraus: } \pi = +0''.17 \pm 0''.13; y = -0''.0060 \pm 0''.0028.$$

Wenn die stärker abweichende Beobachtung vom 2. Sept. 1869 (Nr. 13) weggelassen wird, so erhalten wir:

$$\pi = +0''.20 \pm 0''.11$$

$$y = -0''.0073 \pm 0''.0024.$$

Ausserdem habe ich noch die Parallaxen von τ Cygni, θ Urs. maj. und μ Urs. maj. abzuleiten versucht. Die wahrscheinlichen Fehler der gefundenen Werthe sind jedoch so gross, dass ich die letzteren hier gar nicht anführe. Ich bemerke nur, dass sie sämmtlich positiv, aber kleiner als 0''.1 sind (für τ Cygni z. B. $\pi = +0''.08 \pm 0''.06$).

Es erscheint mir sehr wünschenswerth, dass weitere Beobachtungen mit Passageninstrumenten speciell zur Bestimmung von Parallaxen ausgeführt werden, indem sie dann

voraussichtlich weit genauere Resultate liefern werden. Am besten wäre es dabei mit solchen Sternen anzufangen, deren Eigenbewegungen schon gut bekannt sind, und auch später hin und wieder Sterne mit bekannten Parallaxen mit zu beobachten, um dadurch eine Controlle für die Sicherheit der Resultate zu gewinnen.

Zum Schluss möchte ich noch betonen, dass das Anbringen der Correction für Parallaxe an die Beobachtungen der in gegenwärtigem Aufsätze behandelten Sterne den Sprung in den von Wagner gefundenen Differenzen zwischen oberer und unterer Culmination (von $-0''.043$ für Sterne bis zu $+40^\circ$ Decl. und $-0''.012$ für Sterne zwischen $+40^\circ$ und $+45^\circ$ Decl.) bedeutend vermindert. Nach Anbringung dieser Correction an die Beobachtungen der beiden Componenten von 61 Cygni, und der Sterne η Herculis und π Herculis ergibt sich die mittlere Differenz der beiden Culminationen für Sterne bis zu $+40^\circ$ Decl. zu $-0''.024$, welcher Werth viel besser mit der von Wagner abgeleiteten mittleren Differenz: bessere — schlechtere Bilder = $-0''.027$ stimmt.

Pulkowa Januar 1889.