DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinalwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Begründet von Dr. Paul Börner.

XXV. Jahrgang.

Redaction: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. A. Eulenburg und Dr. J. Schwalbe, Berlin. — Verlag: Georg Thieme, Leipzig.

Lichtensternallee 3.

Am Karlsbad 5.

Seeburgstr. 53.

INHALT.

I. *Aus der chirurgischen Universitätsklinik in Göttingen:* Die diagnostische Bedeutung acuter Ergüsse in die Bauchhöhle. Von Geh. Med.-Rath Prof. Dr. H. Braun. S. 837.

II. *Aus dem Laboratorium der III. medicinischen Universitätsklinik in Berlin:* Zur Frage des Nierendiabetes. Von Dr. P. F. Richter in Berlin. S. 840.

III. Zur Frage des Nierendiabetes. Von Dr. Eger in Berlin. S. 844.

IV. *Aus der I. deutschen medicinischen Universitätsklinik in Prag:* Zur Aetiologie der Meningitis cerebrospinalis epidemica. Von L. Zupnik. S. 845.

Aus der ärztlichen Praxis: Ein Fall von Hysteria virilis. Von Dr. K. Uibeleisen in Bad Thalkirchen-München. S. 848.

Feuilleton: Nachklänge aus der Cholerazeit 1892. Von Dr. G. H. Sieveking in Hamburg. S. 849.

Oeffentliches Sanitätswesen: Mittheilungen über die Verbreitung von Volksseuchen. S. 850. — Dirksen und Spitta, Veränderungen des Spreewassers auf seinem Laufe durch Berlin. Ref. Ober-Stabsarzt Dr. Kübler in Berlin. S. 850. — Cheval, Gefahren der Quellen aus Kalksteingebieten. Ref. Privatdocent Dr. v. Notthafft in München. S. 851. — Kabirske, Das Breslauer Hallenbad. Ref. Geh. Hofrath Prof. Dr. Gärtner in Jena. S. 851. — Schulärztliche Untersuchungen in Zürich. Ref. Dr. G. Heimann in Berlin. S. 851.

Kleine Mittheilungen. S. 852.

I. Aus der chirurgischen Universitätsklinik in Göttingen. Die diagnostische Bedeutung acuter Flüssigkeitsergüsse in die Bauchhöhle.¹⁾

Von Prof. H. Braun in Göttingen.

Die Veranlassung für mich, hier eine Mittheilung über die diagnostische Bedeutung acuter Ergüsse in die Bauchhöhle zu machen, liegt darin, dass ich bereits im Jahre 1891 in einem Vortrage, den ich auf dem 20. Deutschen Chirurgencongress über die operative Behandlung der Achsendrehung der Flexura sigmoidea²⁾ hielt, meines Wissens zuerst darauf aufmerksam machte, dass der Nachweis von Flüssigkeitsansammlungen in der Bauchhöhle für die Diagnose gewisser Zustände verwerthet werden könnte. Meiner damaligen Ansicht nach musste in allen Fällen, in denen Darmtheile mit ihrem dazugehörigen Mesenterium abgeschnürt werden, in Folge der dadurch eintretenden venösen Blutstauung ein Exsudat in die Bauchhöhle zu Stande kommen, analog dem Bruchwasser bei eingeklemmten äusseren Hernien. Weiterhin gab ich damals an, dass diese Flüssigkeitsansammlung oft so reichlich sei, dass sie durch die Percussion nachgewiesen werden könnte. Damals hatte ich ein solches Exsudat in der Bauchhöhle bei einer Achsendrehung der Flexura sigmoidea und bei der Umschnürung vieler Dünndarmschlingen durch ein an seiner Spitze fixirtes Meckel'sches Divertikel gefunden. Ausserdem waren mir aus der Litteratur eine Anzahl analoger Beobachtungen bekannt. In Folge dessen meinte ich, dass unter Berücksichtigung aller anderen vorhandenen Symptome und nach dem meist leicht möglichen Anschluss eines Ascites oder einer Peritonitis, der Flüssigkeitserguss in die Bauchhöhle die Strangulation eines grösseren Darmabschnittes beweise.

Im Jahre 1893 theilte dann Gangolphe³⁾, ohne meine Publication zu kennen, auf dem siebenten französischen Chirurgencongresse mit, dass er einmal in der Lendengegend und im unteren

Theile der Bauchhöhle bei einem 45jährigen Manne, der seit vier Tagen das Bild der Darmocclusion bot, eine Dämpfung nachgewiesen und bei der Operation mehr als ein Glas voll blutiger Flüssigkeit entleert habe. Die Ursache für die Obstruction wurde bei der Laparotomie nicht gefunden, aber die Section des nach drei Tagen gestorbenen Mannes ergab die Einklemmung einer etwa 1½ m langen Darmschlinge in das Foramen Winslowii. Ferner gab er an, dass er in einem zweiten Falle, drei Tage nach Beginn der Erscheinungen, in der Regio iliaca beiderseits eine Dämpfung gefunden und daraufhin sofort die Laparotomie empfohlen habe, welche aber erst am nächsten Tage zur Ausführung gekommen sei. Dabei entleerte ich dann sero-sanguinolente Flüssigkeit, das Hinderniss wurde nicht gefunden, da wegen der allzu bedeutenden Schwäche des Kranken die Operation unterbrochen werden musste. Die Section ergab die Anwesenheit von 500 ccm blutiger Flüssigkeit in dem Abdomen und eine durch ein Divertikel abgeschnürte Darmschlinge.

Gangolphe nahm in Folge dieser beiden Beobachtungen an, dass die Flüssigkeitsansammlung durch die Einklemmung eines Darmabschnittes in normale oder abnorme Oeffnungen der Bauchhöhle und bei der Umschnürung durch Divertikel stattfände; ferner, dass der Erguss um so reichlicher wäre, je länger der eingeschnürte Darmabschnitt sei, und dass derselbe bei Frauen vielleicht durch die Untersuchung durch das hintere Scheidengewölbe erkannt werden könnte. Auf dem folgenden französischen Chirurgencongress — 1894 — ergänzte dann Gangolphe¹⁾ seine erste Mittheilung noch dahin, dass er das Exsudat auch bei einer Achsendrehung des Darms gefunden habe und dass diese also ebenfalls als eine Ursache für die Bildung acuter Ergüsse in die Bauchhöhle angesehen werden müsste. Nach diesen beiden Mittheilungen kam Gangolphe zu derselben Ansicht wie ich, auch er meint, dass der Nachweis von Ergüssen in die Bauchhöhle für solche Fälle ein werthvolles diagnostisches Hilfsmittel sei. Zur Ergänzung der ersten Mittheilung erschien dann noch die Dissertation von Camichel.²⁾ In derselben werden zunächst die beiden ersten Beobachtungen von Gangolphe ausführlich mitgeteilt, dann aber noch eine Zusammenstellung von 15 aus der französischen, vier

¹⁾ Michel Gangolphe, Nouveau signe de l'occlusion intestinale par étranglement ou torsion (épanchement séro-hématique). Congrès français, VIII sess. 1894.

²⁾ Paul Camichel, Contribution à la séméiologie de l'occlusion intestinale par étranglement. Lyon 1893.

¹⁾ Abgekürzt vorgetragen in der chirurgischen Section der 71. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in München am 23. September 1899.

²⁾ Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 1891, II, S. 376 und Archiv für klinische Chirurgie 1892, Bd. XLIII, S. 172.

³⁾ Michel Gangolphe, Nouveau signe de l'occlusion intestinale par étranglement. Association française de chirurgie, VII. congrès, Paris 1893, p. 487.

aus der englisch-amerikanischen und einem aus der deutschen Litteratur¹⁾ gesammelter Fälle gegeben, in denen viermal Darmschnürungen durch Ligamente, sechsmal durch Divertikel, zehnmal durch Einklemmungen in abnorme Oeffnungen der Bauchhöhle die Ursache für den Flüssigkeitserguss abgegeben hatten. In allen diesen Fällen war, mit Ausnahme von zweien, keine Spur von Peritonitis vorhanden, das Exsudat bei 18 Kranken sanguinolent, einmal serös und einmal bei einer durch Divertikel verursachten Darmschnürung in Folge der Zerreißung eines Mesenterialgefäßes fast rein blutig. Neuerdings hat dann besonders Bayer in mehreren Mittheilungen²⁾ sich nach eigenen Beobachtungen mit der Bedeutung der acuten Flüssigkeitsergüsse in die Bauchhöhle beschäftigt. Bayer nimmt an, dass ein acut entstandenes Exsudat in die Bauchhöhle bei heftigem, sich stetig steigendem, ziemlich lokalisiertem Schmerz schon vor allen übrigen das Bild vollendenden Symptomen für innere Incarceration und bei schwankender Diagnose zwischen Peritonitis und innerer Einklemmung für die letztere spräche.

Nach seiner letzten Publication vermisst Bayer zweierlei in meiner Auffassung der Dignität der genannten Erscheinung, „nämlich den Hinweis darauf, dass das erwähnte Symptom nicht bloss bei Ausschluss einer Peritonitis, sondern überdies noch gerade als werthvolles differential-diagnostisches Symptom zwischen Peritonitis, oder bei schon bestehender Peritonitis zwischen einem peritonitischen Nachschub und Incarceration für die letztere Annahme direkt entscheidend anzusehen ist, und zweitens die besondere Betonung des Umstandes, dass es eben auf die Acuität des Ergusses ankommt.“ Auf den ersteren Einwurf gehe ich nicht näher ein, da nicht theoretische Auseinandersetzungen, sondern nur spätere genaue klinische Beobachtungen das zur Entscheidung dieser Frage nothwendige Material liefern müssen. Mit Bezug auf den zweiten Vorwurf möchte ich nur erwähnen, dass die Acuität nicht besonders von mir betont wurde, weil ich dieselbe für selbstverständlich hielt, denn ich wüsste nicht, wie man ohne diese Annahme einen Ascites oder einen schon längere Zeit bestehenden Erguss von einem solchen, der sich bei einer inneren Einklemmung entwickelt hat, unterscheiden sollte.

Von sonstigen Mittheilungen über die diagnostische Bedeutung der acuten Flüssigkeitsergüsse in das Abdomen habe ich nur noch die folgenden gefunden. Naunyn³⁾ giebt in seiner 1896 erschienenen Abhandlung über Ileus an, dass Gangolphe auf dieses Symptom aufmerksam gemacht und dass er selbst einige Fälle von Erguss bei Strangulation des Darmes gefunden, ihn aber auch einmal vermisst habe. In Folge dessen meint Naunyn, dass sich erst noch zeigen müsse, ob dieses Symptom diagnostischen Werth besitze.

Weiterhin theilte Brault⁴⁾ eine Beobachtung mit, welche die Richtigkeit der von Gangolphe geäußerten Ansicht über die Ursache derartiger Ergüsse bestätigte, und eine andere, welche mit ihr im Widerspruch stand.

Im letzteren Falle hatte ein 45 Jahre alter Mann seit zwei Tagen Ileuserscheinungen gezeigt, und bei der Percussion des Unterleibes fand sich in der Nabelgegend und auf der rechten Seite des Abdomens eine Dämpfung. Bei der Operation entleerte sich zunächst eine reichliche Menge serös blutiger Flüssigkeit, während stark injicirte und stark geblähte Darmschlingen vorfielen; bei dem weiteren Hervorziehen der Därme entstand plötzlich das Gefühl, als wenn ein Hinderniss überwunden worden sei, und zugleich setzten sich die Gase im Darm in Bewegung. An der Stelle des Darmes, an der die stärkste Congestion war, fand sich eine circuläre Einschnürung, und von da ab war der

Darm nebst dem dazugehörigen Mesenterium auf die Entfernung von zwei Meter nach oben stark injicirt und verdickt. Der Tod erfolgte fünf Stunden nach der Laparotomie, und bei der Section fand sich auch nur die eine circuläre Schnürfurche, daneben ein wandständiger, an seiner Spitze abgerissener Fettklumpen, der wohl die Einklemmung veranlasst hatte.

Brault nimmt in Folge dieser Beobachtung an, dass unter gewissen Verhältnissen eine circuläre Umschnürung des Darmes zu einer bedeutenden Congestion desselben auf grosse Strecken hin und zu einem Erguss in die Bauchhöhle führen könnte. Zur Stütze seiner Ansicht erwähnt er eine analoge, aber nicht genauer mitgetheilte Beobachtung von Mores, über die man sich kein eigenes Urtheil bilden kann. Meiner Ansicht nach ist die Beobachtung von Brault nicht vollkommen beweisend für die Annahme, dass eine circuläre Umschnürung eines Darmes für sich, also ohne das dazu gehörige Mesenterium, zu einem acuten Erguss in die Bauchhöhle führt. Da trotz der erst zwei Tage bestehenden Incarcerationserscheinungen schon eine Verdickung des Darmes und des Mesenteriums in einer Ausdehnung von 2 m bei der Laparotomie gefunden wurde, müssen wir wohl annehmen, dass diese weitgehenden Veränderungen schon länger bestanden haben und durch andere Ursachen, als diese einfache circuläre Umschnürung des Darmes, verursacht wurden. Umso mehr scheint mir diese Annahme wahrscheinlich, da Camichel keine analoge Beobachtung erwähnt und auch mir ebenfalls keine einzige aus der Litteratur bekannt ist. Jedenfalls bedarf die Ansicht von Brault erst noch weiterer Bestätigung, um beweisend zu sein.

Zuletzt wäre noch eine Bemerkung von Nothnagel¹⁾ zu erwähnen, derselbe giebt in seinem 1898 erschienenen Handbuche an: „Nachweisliches flüssiges Exsudat wird als die Peritonitisdiagnose unterstützendes Moment angesehen. Doch ist auch hier Vorsicht geboten. Denn einerseits kann bei innerer Einklemmung, namentlich bei Achsendrehung in Folge der mesenterialen venösen Stauung eine so reichliche blutige Transsudation in das Cavum abdominis geschehen, dass dadurch ein flüssiges peritonitisches Exsudat vorgetäuscht wird, andererseits kann thatsächlich letzteres vorhanden sein und doch dem physikalischen Nachweis sich entziehen, indem der vorderen und seitlichen Bauchwand überall laut klingende, lufthaltige Darmschlingen anliegen.“ Eine eigene Meinung über den diagnostischen Werth dieser acuten Flüssigkeitsergüsse äusserte Nothnagel aber nicht.

Dies ist alles, was meines Wissens bis jetzt in klinischer Hinsicht über die Bedeutung dieser acuten Transsudate in die Bauchhöhle veröffentlicht wurde. Hinzufügen möchte ich noch, dass auch experimentelle Untersuchungen angestellt wurden, und zwar zunächst von Gangolphe und Camichel an drei Hunden. Bei dem ersten Hunde steckten dieselben in einen Kautschukring, dessen Lichtung etwa 1 cm betrug, eine ca. 25 cm lange Eingeweideschlinge und fanden bei der Autopsie des in der Nacht gestorbenen Thieres eine 85 cm lange Dünndarmschlinge eingeklemmt, daneben ungefähr 100 ccm serös blutiger Flüssigkeit im Abdomen. Bei dem zweiten Hunde wurde eine Eingeweideschlinge in einem etwa 1—1½ cm weiten Kautschukring eingeklemmt; die am dritten Tage wieder geöffnete Bauchhöhle enthielt wenig serosanguinolente Flüssigkeit, die abgeschnürte Darmschlinge hatte eine Länge von 12 cm. Bei dem dritten Hunde umschnürten sie den Darm allein mit einem Seidenfaden, die am dritten Tage vorgenommene Autopsie ergab, dass keine Flüssigkeit in der Bauchhöhle war und nur einige Darmschlingen stärker vascularisirt und durch Gas ausgedehnt erschienen. Brault machte dann im Anschluss an seine oben mitgetheilte Beobachtung einige Experimente. Bei weissen Ratten und Meerschweinchen erhielt er durch circuläre Umschnürung des Darmes mit einem dicken Faden zwar eine starke Vascularisation oberhalb des Hindernisses, aber keinen Erguss in die Bauchhöhle, dagegen bei Hunden durch eine circuläre Kautschukligatur des Darmes allein ein reichliches serös blutiges Exsudat. Ich selbst hatte früher von der Ausführung derartiger Experimente abgesehen, da mir die Entstehung eines Ergusses in die offene Bauchhöhle bei der Strangulation von Darmschlingen selbstverständlich schien, nach den Kenntnissen, welche wir schon lange über die Bildung des Bruchwassers bei

¹⁾ Leicht würde es sein, die Zahl dieser Fälle zu vermehren, vor allem auch aus der deutschen Litteratur; allein in meiner oben erwähnten Publication über die Achsendrehung der Flexura sigmoidea finden sich sechs von Camichel nicht erwähnte Beobachtungen, in denen zweimal blutige, dreimal seröse und einmal trübe Flüssigkeit in der Bauchhöhle bei der Laparotomie gefunden wurde.

²⁾ Carl Bayer, Zur Diagnose des Darmverschlusses. Prager medicinische Wochenschrift 1898, No. 48/49, S. 597. — Ueber ein wenig gewürdigtes Frühsymptom der inneren Incarceration. Aertzliche Praxis 1898, No. 24. — Die Form des Meteorismus als diagnostisches Hilfsmittel. Prager medicinische Wochenschrift 1899, No. 26, S. 345. — Acuter intraperitonealer Erguss als Symptom innerer Einklemmung (Bruchwasseranalogon). Centralblatt für Chirurgie 1899, No. 23, S. 665.

³⁾ B. Naunyn, Ueber Ileus. Mittheilungen aus den Grenzgebieten der Medicin und Chirurgie 1896, Bd. 1, S. 98.

⁴⁾ J. Brault, Occlusion intestinale, constriction circulaire. Vaste épanchement sérohématique, injection extrême de l'intestin grêle, vascularisation et épaississement de mésentère en l'étendue de deux mètres en amont de l'obstacle. Gazette hebdomad. de méd. et de chir. 1898, No. 46, pag. 541.

¹⁾ H. Nothnagel, Die Erkrankungen des Darmes und des Peritoneums. Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie 1898, Bd. XVII, S. 369.

eingeklemmten äusseren Hernien haben. Ferner weil ausserdem auch die von Bönnecken¹⁾ u. a. zum Studium des Bacteriengehaltes des Bruchwassers angestellten Experimente die Bildung von Flüssigkeitsergüssen in die Bauchhöhle bei Umschnürungen des Darmes direkt gezeigt hatten. Nachdem mir die Mittheilung von Brault bekannt war, wiederholte ich die circuläre Umschnürung des Darmes allein mit einem dicken Gummifaden und fand bei dem einen Hunde bei der zwei Tage später vorgenommenen Section eine ganz geringe Menge blutiger Flüssigkeit in der Bauchhöhle, bei dem zweiten aber keinen Erguss. Zweifelhaft erschien mir, ob in dem ersten Falle nicht die an den Därmen vorgenommenen Manipulationen zu einer Reizung und starken Congestion des Peritoneums Anlass gegeben und dadurch den Erguss verursacht hatten.

Wichtiger als diese Experimente an Thieren und allein maassgebend für die diagnostische Bedeutung dieser Flüssigkeitsergüsse in die Bauchhöhle sind zahlreiche exacte Beobachtungen der aus verschiedenen Ursachen entstandenen inneren Einklemmungen, bei denen sowohl eine genaue klinische Untersuchung bei Beginn der Erkrankung und während ihres Verlaufs stattgefunden hatte, als auch ein genauer Befund bei der Operation oder bei der Section erhoben wurde. Nachdem ich erkannt hatte, dass bei inneren Einklemmungen die Flüssigkeitsergüsse in die Bauchhöhle in kurzer Zeit in solcher Menge entstehen können, dass sie durch die Percussion nachweisbar sind, habe ich in späteren Fällen fast immer daraufhin untersucht. Gefunden habe ich dieselben in vier Fällen von Achsendrehungen der Flexura sigmoidea und des Coecums mit dem anstossenden Theile des Colon ascendens und des Ileums, und in einem Falle von Achsendrehung eines Dünndarmabschnittes, je zweimal nach Umschnürung des Darmes durch Divertikel und durch Ligamente, einmal bei einer acuten Invagination. Dagegen habe ich den Flüssigkeitserguss auch in mehreren Fällen vermisst, in denen man nach der Art der Einklemmung das Vorhandensein desselben hätte annehmen sollen, so besonders bei einigen Achsendrehungen des Dünndarms. Die Ursache für das Fehlen des Transsudates in diesen Fällen kann entweder darin liegen, dass die Umschnürung des Darmes und des dazu gehörigen Mesenteriums zu leicht oder zu fest war. Im ersteren Falle kann wohl eine Stauung des Kothes stattfinden und können damit die Symptome des acuten Darmverschlusses veranlasst werden, während die zur Bildung des Transsudates notwendige Stauung des venösen Blutes fehlt. Im zweiten Falle kann ausser dem Verschluss der Venen auch ein solcher der Arterien erfolgen, so dass überhaupt kein Blut mehr in die Gefässe des eingeschnürten Darmes eintritt; in Folge dessen wird die Blutstauung und damit auch die Bildung des Ergusses ausbleiben. Letztere Ursache möchte ich bei zwei von mir beobachteten Kranken annehmen. In dem einen Falle, in dem nach der Exstirpation einer Mesenterialcyste eine bis dahin vorhandene chronische Achsendrehung des ganzen Dünndarms acut wurde und in etwa 18 Stunden den Tod des Kranken herbeiführte, und in einem anderen Falle, in dem bei der Autopsie zwei Dünndarmschlingen blauschwarz aussehend und durch ein Ligament fest abgeschnürt gefunden wurden: der Tod war kaum 24 Stunden nach Beginn der ersten Incarcerationserscheinungen eingetreten. Die kurze Dauer der Einklemmung kann wohl nicht die Ursache gewesen sein, weil man sonst wenigstens eine geringe Menge von Flüssigkeit in der Bauchhöhle hätte finden müssen, was aber keineswegs der Fall war. Erwähnen möchte ich im Anschluss hieran noch, dass die Quantität des Ergusses nicht immer, wie Gangolphe annahm, der Länge der eingeklemmten Darmschlinge proportional ist, sondern dass dieselbe bei gleicher Länge vor allem auch von der mehr oder weniger festen Umschnürung der incarcerirten Darmstücke abhängt; ferner auch darauf hinweisen, dass bei künftigen Beobachtungen noch genauer darauf geachtet werden muss, wie lange Zeit nach Beginn der Einklemmungserscheinungen der Erguss durch die Percussion erkannt werden konnte.

In Bezug auf die Beschaffenheit des Transsudates möchte ich noch hinzufügen, dass dasselbe in den meisten Fällen eine mehr oder minder blutig gefärbte Flüssigkeit ist, da die Einschnürung gewöhnlich eine feste ist; seltener wird dieselbe serös gefunden. In den von Camichel zusammengestellten Beobachtungen war z. B. das Exsudat mit Ausnahme eines Falles, in dem es serös

war, sanguinolent. In den von mir beobachteten Fällen war es bei der Achsendrehung des Dünndarms und bei der Invagination serös, sonst mehr oder weniger blutig gefärbt. Da unter Umständen die Kenntniss von dem Aussehen des Exsudates, z. B. vor der Ausführung einer Operation, erwünscht sein kann, so wird man gelegentlich die Punction des Abdomens mit feiner Hohlneedle vornehmen müssen. Besonders hervorheben möchte ich noch, dass das Vorhandensein geringer Mengen von seröser Flüssigkeit, die man bei einer Operation findet, keine besondere diagnostische Bedeutung hat, da dieselben auch bei leichteren Circulationsstörungen entstehen kann. So sah ich z. B. öfters bei der Operation eingeklemmter äusserer Hernien nach der Durchtrennung des einschnürenden Ringes seröse Flüssigkeit aus der Bauchhöhle, manchmal in reichlicher Menge, abfliessen, und nichtsdestoweniger erfolgte nach der Herniotomie, auch wenn ich zur Radikalheilung durch Ligatur des Bruchsackhalses die Peritonealhöhle wieder verschlossen hatte, eine vollkommen glatte Heilung. Fliesst in einem Falle von eingeklemmtem Bruche bei der Operation eine sanguinolente Flüssigkeit ab, so weist dies nach Gangolphe darauf hin, dass neben der äusseren Hernie noch eine innere Einklemmung besteht. Gangolphe hat auf diese Erscheinung hin nach der Operation eines eingeklemmten Bruches die Laparotomie gemacht und eine grosse, durch ein mesenteriales Band abgeschnürte Darmschlinge gefunden und gelöst, seinen Kranken aber an Collaps am nächsten Tage verloren. Die allgemeine Gültigkeit des Satzes, dass das Ausfliessen sanguinolenter Flüssigkeit aus der Bauchhöhle bei der Operation eines eingeklemmten Bruches stets eine innere Einklemmung beweise, muss ich auf Grund einer eigenen Beobachtung einschränken. Danach hat das Abfliessen von blutiger Flüssigkeit aus dem Abdomen nur dann diese Bedeutung, wenn bei der zuerst vorgenommenen Herniotomie der Bruchsack wie gewöhnlich gegen die Bauchhöhle fest abgeschlossen ist und Bruchwasser enthält. In einem von mir vor kurzer Zeit beobachteten Falle machte ich die Herniotomie bei einer alten Frau, die schon seit acht Tagen an den Erscheinungen eines eingeklemmten Schenkelbruches gelitten hatte. Bei der Operation war nur eine ganz minimale Menge von Flüssigkeit in dem Bruchsacke vorhanden, während nach Erweiterung des im Bruchsackhalse gelegenen Einschnürungsringes blutige Flüssigkeit aus der Bauchhöhle abfloss. Da der Darm keine Spur von tiefgreifenden Veränderungen an den eingeklemmt gewesenen Stellen zeigte, konnte das Fehlen der Flüssigkeit im Bruchsack nicht durch die Anämie der incarcerirten Darmschlinge bedingt sein, sondern man musste annehmen, dass das Bruchwasser durch den nicht absolut fest abgeschlossenen Bruchsackhals in die Bauchhöhle abgeflossen war. Wie mir scheint, rechtfertigt die vollkommen reactionslose Reconvalescenz, welche die Kranke durchmachte, diese Annahme.

Im Anschluss an diese Auseinandersetzungen möchte ich nur noch auf einige praktische Consequenzen hinweisen, die sich durch den Nachweis eines acut entstandenen Ergusses in der Bauchhöhle und durch das Ausfliessen von sanguinolenter Flüssigkeit aus der Bauchhöhle bei der Laparotomie ergeben. Vor allem wird man in allen Fällen von innerer Einklemmung, bei denen man ein acut entstandenes, oder ein rasch zunehmendes Exsudat findet, möglichst rasch die Laparotomie empfehlen oder ausführen, weil gerade in diesen Fällen sich schnell Veränderungen am Darne, besonders Gangrän, einstellen, welche die Prognose der Operation wesentlich verschlechtern. Ferner wird man, wenn die Laparotomie wegen einer wahrscheinlichen inneren Einklemmung gemacht war, bei dem Ausfliessen sanguinolenter Flüssigkeit unbedingt das Hinderniss, auch wenn grosse Schwierigkeiten vorhanden sind, aufsuchen müssen und nicht die Anlegung des künstlichen After ausführen. Ferner wird man bei Incarcerationen, bei denen man einen künstlichen After anlegen wollte, von dieser Operation abstehen und die Aufsuchung und Beseitigung des die Erscheinungen hervorrufenden Hindernisses vornehmen müssen. Ueberzeugt bin ich, dass dies manchmal möglich sein wird, z. B. bei einer Achsendrehung der Flexura sigmoidea, welche oft einen ganz enormen Meteorismus hervorruft, und dass durch ein solches Vorgehen doch manchmal ein Kranker am Leben erhalten werden kann, der ohne dasselbe dem sicheren Tode verfallen wäre.

Fasse ich das Resultat meiner Untersuchungen zusammen, so ergibt sich, dass ein endgiltiges Urtheil über die diagnostische Bedeutung dieser acuten Flüssigkeitsergüsse wegen der ungenügenden Zahl einschlägiger Beobachtungen noch nicht möglich ist. Jedoch glaube ich, dass der Nachweis eines Ergusses in die

¹⁾ Bönnecken, Ueber Bacterien des Bruchwassers eingeklemmter Hernien und deren Beziehung zur peritonealen Sepsis. Archiv für pathologische Anatomie 1890, Bd. CXX, S. 7.

Bauchhöhle seine hohe Bedeutung hat. Derselbe kommt vor bei Achsendrehungen des Dünndarms, vorzüglich aber bei denjenigen des Dickdarms und bei Einklemmungen von Darmtheilen in abnorme Oeffnungen der Bauchhöhle, welche entweder angeboren sind, oder durch Ligamente oder durch Divertikel gebildet sein können; selten bei Invaginationen, für deren Erkenntniss aber gewöhnlich andere charakteristische Symptome vorhanden sind. Der Flüssigkeitsnachweis spricht gegen einen Obturationsileus durch Fremdkörper und circulär das Darmlumen verengende Tumoren.

Schliessen möchte ich meine Mittheilung mit der Aufforderung, künftighin allgemein auf das Vorhandensein und den Verlauf dieser acuten Flüssigkeitsergüsse in die Bauchhöhle zu achten; geschieht dies, so werden wir bald den diagnostischen Werth dieser Erscheinung sicher feststellen können.