in diesem Falle in bezug auf t ein noch günstigeres Resultat als im Falle der drei absoluten parallaktischen Winkel. Nachdem so bei nur 3 Sternen mittlerer Zenitdistanz für Zeit wie Polhöhe eine Genauigkeit von nur wenigen Bogensekunden erreicht worden ist, dürfte hiermit der Beweis erbracht sein, daß die photographische Methode allen visuellen Methoden mit Instrumenten gleicher Dimensionen völlig gleichwertig, ihnen an Einfachheit der instrumentellen Hilfsmittel und an der Art und Kürze der Ausführung, die übrigens z. B. auf Forschungsreisen auch astronomisch nicht vorgebildeten Beobachtern möglich ist, überlegen ist. Ferner hat die Methode den Vorteil, daß ihre Ergebnisse in jedem Moment nachgeprüft werden können, was speziell wieder für die Kritik von Forschungsreisen von erheblicher Bedeutung sein kann. Eine Erhöhung der Genauigkeit ist nun einmal dadurch möglich, daß man eine größere Gruppe von Bildpunkten als 5 zu Anfang und Ende der Exposition heranzieht und auch eine stärkere Vergrößerung als 30, als

Kiel, 1913 Febr. 10.

mir bei dem Toepferschen Meßapparat zur Verfügung stand, benutzt. Ferner erhöht sich die Genauigkeit von selbst, wenn man der Platte eine größere Dimension gibt, als grade dem Objektivdurchmesser zukommt, und die Sterne dann längere Spuren beschreiben läßt, wobei etwa zu befürchtende unregelmäßige Distorsionswirkung bei einem besseren Objektiv nicht zu erwarten ist, solange die Spurlänge nicht wieder zu groß gewählt wird. Da man ebenso mit einem Objektiv größerer Öffnung oder längerer Brennweite als bei dem von mir benutzten Objektiv den Sternspuren eine größere Länge geben kann, so wird man auch auf diesem Wege eine höhere Genauigkeit, als mir möglich war, erreichen und damit der photographischen Methode eine höhere Genauigkeit als den visuellen Methoden zuweisen können. Schließlich erhöht auch die zulässige Wahl viel geringerer Zenitdistanzen als bei meinen Aufnahmen, weil die Fehler im parallaktischen Winkel nur mit $\sin z$ multipliziert in Zeit und Polhöhe eingehen, von selbst die Genauigkeit des Resultats.

A. Wilkens.

Observations de planètes

à l'Observatoire de Nice (Equatorial de 0.76 m d'ouverture) par S. Javelle.

1912	T.m.de Nice	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cp.	α app.	$\log p\Delta$	δ app.	$\log p\Delta$	Red. ad l. app.	*
108 Hecuba.										
Oct. 4	10 ^h 34 ^m 24 ^s	+2 ^m 17 ^s .43	-3' 12".9	15,10	1 ^h 30 ^m 25 ^s .97	9.350 _n	+12° 39' 44".6	0.675	+3 ^s .29 +23".2	1
5	11 19 48	+2 21.79	-1 6.2	15,10	1 29 40.96	9.135 _n	+12 36 35.3	0.664	+3.30 +23.3	2
9	11 33 0	+1 31.54	+4 33.2	14,10	1 26 43.09	8.890 _n	+12 23 40.1	0.662	+3.34 +23.6	3
15	11 15 12	+1 52.55	-2 28.0	15,10	1 22 9.71	8.764 _n	+12 2 46.5	0.665	+3.39 +24.0	4
Nov. 1	10 36 36	+0 8.33	-4 18.1	18,10	1 9 45.86	8.309	+10 59 59.2	0.677	+3.45 +24.7	5
76 Freia.										
Oct. 9	9 37 48	+0 32.63	+1 3.9	16,10	23 39 23.12	8.956 _n	-0 37 13.2	0.790	+3.28 +20.6	6
15	9 38 15	+0 41.46	-1 10.9	20,10	23 36 6.07	8.620 _n	-1 3 35.1	0.785	+3.26 +20.3	7
16	9 36 31	+0 11.57	-4 18.8	18,10	23 35 36.18	8.540 _n	-1 6 43.0	0.786	+3.26 +20.3	7
1912 PF.										
Oct. 16	11 24 33	-0 54.48	+4 52.9	20,10	23 44 36.92	9.172	+11 20 54.6	0.677	+3.17 +23.3	8
31	10 28 21	+2 42.15	-2 20.4	15,10	23 36 21.03	9.227	+10 51 10.2	0.687	+3.04 +22.7	9
Nov. 1	10 2 39	+2 17.94	-4 2.4	15,10	23 35 56.81	9.117	+10 49 28.2	0.684	+3.03 +22.7	9
8	11 13 43	+2 12.38	-0 59.1	6, 4	23 33 35.75	9.470	+10 38 55.8	0.709	+2.97 +22.7	10
13	8 34 8	+1 12.94	+3 46.1	14,10	23 32 33.40	8.777	+10 33 28.9	0.683	+2.93 +22.7	11
711 Marmula.										
Oct. 15	11 53 8	-0 49.85	-5 18.2	20,10	0 48 19.48	8.889	+9 43 59.7	0.693	+3.34 +23.8	12
16	12 45 27	+3 38.47	-4 5.7	14,10	0 47 14.59	9.258	+9 41 33.7	0.701	+3.33 +23.8	13
18	13 0 36	-0 22.32	-8 35.3	16,10	0 45 12.51	9.348	+9 34 58.5	0.707	+3.35 +23.9	14
91 Aegina.										
Nov. 21	8 56 26	+0 8.62	-1 52.0	18,10	3 16 21.30	9.413 _n	+20 48 19.7	0.582	+4.05 +22.6	15
22	8 48 31	-0 49.56	-4 55.4	20,10	3 15 23.13	9.423 _n	+20 45 16.4	0.584	+4.06 +22.7	15
25	9 3 19	+1 30.09	-7 8.6	15,10	3 12 31.16	9.329 _n	+20 36 5.2	0.569	+4.06 +23.1	16
550 Senta.										
Nov. 28	9 46 18	+1 5.81	+1 46.4	15,10	1 48 38.86	8.735	+23 8 3.3	0.492	+3.67 +26.9	17
Déc. 2	9 25 16	-0 8.78	+3 45.0	18,10	1 47 30.93	8.659	+22 35 22.3	0.481	+3.65 +27.1	18
4	10 18 21	+1 43.81	-4 45.8	15,10	1 47 7.83	9.217	+22 19 48.3	0.524	+3.62 +27.2	19
335 Roberta.										
Déc. 11	12 20 54	-2 16.83	+8 39.0	15,10	3 44 22.64	9.331	+11 57 22.4	0.682	+4.13 +20.0	20
13	9 42 50	-3 46.69	+6 59.2	15,10	3 42 52.79	8.759 _n	+11 55 42.5	0.667	+4.14 +19.9	20

Date	T.m.de Nice	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cp.	α app.	$\log p\Delta$	δ app.	$\log p\Delta$	Red. ad l. app.	*
1912-13					1912 PZ					
Déc. 13	11 ^h 2 ^m 18 ^s	-2 ^m 47 ^s 19	-2' 31" 0	15,10	3 ^h 21 ^m 4 ^s 51	9.118	+11° 3' 4" 1	0.681	+4 ^s 04 +21" 1	21
14	9 35 21	-3 21.13	-1 33.2	15,10	3 20 30.57	8.355n	+11 4 1.8	0.676	+4.04 +21.0	21
Janv. 4	10 17 50	-0 6.75	-2 15.4	18,10	3 15 39.97	9.331	+11 59 46.8	0.681	+0.67 + 7.7	22
8	11 3 59	+1 43.27	-1 4.9	15,10	3 16 25.77	9.487	+12 17 3.3	0.702	+0.62 + 7.6	23
12	10 7 28	+3 10.55	+3 29.2	15,10	3 17 39.93	9.391	+12 35 31.6	0.698	+0.60 + 7.5	24
13	9 13 26	-4 25.42	+4 58.7	15,10	3 18 2.13	9.205	+12 40 14.5	0.666	+0.65 + 7.6	25
1912					1912 PY.					
Déc. 13	12 17 31	-0 53.18	-5 31.1	12,12	3 43 10.04	9.415	+32 44 11.0	0.333	+4.63 +22.9	26
14	10 18 10	-1 46.84	-4 17.0	14,10	3 42 16.38	8.282	+32 45 25.2	0.175	+4.63 +23.0	26
1913					200 Dynamene.					
Févr. 11	10 34 7	-1 0.79	-0 45.1	15,10	8 36 53.08	8.867n	+21 7 9.7	0.532	+1.89 + 1.0	27
12	10 23 6	-1 54.39	-0 28.3	15,10	8 35 59.48	8.935n	+21 7 26.6	0.534	+1.89 + 1.1	27
13	10 0 23	+0 59.01	+1 22.7	15,10	8 35 6.92	9.083n	+21 7 38.6	0.539	+1.89 + 1.3	28
24	11 12 57	+1 24.70	-5 6.5	15,10	8 26 43.86	9.093	+21 3 54.0	0.540	+1.85 + 2.2	29
25	10 19 20	+0 49.31	-5 54.8	20,10	8 26 8.47	8.414	+21 3 5.7	0.529	+1.85 + 2.2	29
1913					1913 QT.					
Mars 11	11 16 47	-2 58.83	-1 26.6	14,10	10 5 18.31	8.737	+23 16 25.7	0.508	+2.14 - 3.8	30
15	10 28 11	+6 20.34	-0 50.1	15,10	10 2 36.45	7.763n	+23 29 43.7	0.479	+2.11 - 2.7	31
15	10 32 45	+4 58.21	+3 48.2	12, 8	10 2 36.27	7.543	+23 29 44.5	0.479	+2.11 - 2.7	32
1913					1913 QU.					
Avril 9	11 48 38	-2 55.80	-5 43.7	15,10	9 6 17.07	9.622	+30 12 36.3	0.563	+1.80 + 4.8	33
11	10 37 14	+3 46.31	+4 14.4	15,10	9 6 34.89	9.521	+30 4 36.0	0.461	+1.72 + 5.3	34
1913					1913 QV.					
Avril 11	12 18 1	-0 13.27	+2 48.9	18,10	9 56 33.90	9.546	+ 6 21 0.3	0.751	+1.59 - 5.3	35

Positions moyennes des étoiles de comparaison.

*	α moy.	δ moy.	Autorité	*	α moy.	δ moy.	Autorité
1	1 ^h 28 ^m 5 ^s 25	+12° 42' 34" 3	Lpz I 448, Par 1900	19	1 ^h 45 ^m 20 ^s 40	+22° 24' 6" 9	Par ph III 72.26
2	1 27 15.87	+12 37 18.2	Lpz I 442, Kam ₂ 530	20	3 46 35.34	+11 48 23.4	Lpz I 1125
3	1 25 8.21	+12 18 43.3	Lpz I 423, Kam ₂ 518	21	3 23 47.66	+11 5 14.0	" 1016
4	1 20 13.77	+12 4 50.5	Lpz I 400	22	3 15 46.05	+12 1 54.5	Lpz I 993, Palisa 428
5	1 9 34.08	+11 3 52.6	" 342	23	3 14 41.88	+12 18 0.6	Lpz I 987
6	23 38 47.21	-0 38 37.7	Nic 5880	24	3 14 28.78	+12 31 54.9	" 986
7	23 35 21.35	-1 2 44.5	Alg ph VI, 1757.86	25	3 22 26.90	+12 35 8.2	BD +12° 476 rapportée à Lpz I 1026, Boss PGC 804
8	23 45 28.23	+11 15 38.4	Lpz I 9455	26	3 43 58.59	+32 49 19.2	Boss PGC 878
9	23 33 35.84	+10 53 7.9	" 9387	27	8 37 51.98	+21 7 53.8	Berl B 3515
10	23 31 20.40	+10 39 32.2	" 9364	28	8 34 6.02	+21 6 14.6	" 3467
11	23 31 17.53	+10 29 20.1	" 9363	29	8 25 17.31	+21 8 58.3	" 3401
12	0 49 5.99	+9 48 54.1	" 305	30	10 8 15.00	+23 17 56.1	" 3961
13	0 43 32.79	+9 45 15.6	Lpz II 264	31	9 56 14.00	+23 30 36.5	Par ph II 450.52
14	0 45 31.48	+9 43 9.9	Toul ph II 6.33	32	9 57 35.95	+23 25 59.0	" 450.68
15	3 16 8.63	+20 49 49.1	Boss PGC 761	33	9 9 11.07	+30 18 15.2	Lei 3799
16	3 10 57.01	+20 42 50.7	Bo VI +20° 531	34	9 2 46.86	+30 0 16.3	Boss PGC 2444
17	1 47 29.38	+23 5 50.0	Par ph II 343.33	35	9 56 45.58	+ 6 18 16.7	Lpz II 5333
18	1 47 36.06	+22 31 10.2	Berl B 561				

Nice, 1913 Avril 26.

S. Favelle.

Inhalt zu Nr. 4660. A. Wilkens. Neue Prinzipie und Methoden zur geographischen Ortsbestimmung. 49. — S. Favelle. Observations de planètes. 93.