für die normale Zystenbildung gehalten hatte. Später fand er dann die normale Zystenbildung, hielt sie aber zunächst für Stadien einer besonderen pathogenen Art; es ist das die von seinem Schüler Viereck nach seinem Tode als *Entamoeba tetragena* beschriebene Form. Durch Hartmann und seine Mitarbeiter Withmore und Ornstein wurde dann die Entwicklung der harmlosen wie pathogenen Art in jahrelangen Untersuchungen genauer festgestellt und nach vielen Bemühungen die Zusammengehörigkeit der Schaudinn'schen und Viereck'schen Formen erkannt, was dann durch gründliche Untersuchungen von Kuenen und Swellengrebel in Sumatra, sowie experimentell durch Darling in Panama und vor allem Walker in Manila bestätigt und endgültig bewiesen wurde. Nach den übereinstimmenden Angaben all dieser Forscher, denen sich auch noch Akashi aus Japan zugesellt, gelingt es jetzt jederzeit, auf Grund der mikroskopischen Befunde die richtige Diagnose zu stellen, was im Institut für Infektionskrankheiten Robert Koch an Hunderten von Fällen aus den verschiedensten Weltteilen, teilweise sogar an ganz alten Präparaten, im Laufe der letzten Jahre sich immer wieder bestätigt hat.

Was die richtige Benennung der harmlosen und pathogenen Art anlangt, so befindet sich Kruse in einem Irrtum, wenn er den Namen *E. coli* Lösch als den nach den zoologischen Nomenklaturregeln gültigen Namen für die pathogene Art hält. Diese muß vielmehr *E. histolytica* Schaudinn heißen, da nach den Angaben Löschs eine Identifizierung seiner Form nicht möglich ist, während die Schaudinn'sche Revision der Gattung gültig ist.

Zur Aetiologie der Amöbenruhr.

Berichtigung zu dem Artikel von Prof. W. Kruse „Die Ruhr in Krieg und Frieden“ in Nr. 36 dieser Wochenschrift.

Von Prof. Dr. Max Hartmann,

Mitglied des Kaiser Wilhelm-Instituts für Biologie in Berlin-Dahlem.

In einem Vortrage, der in Nr. 36 dieser Wochenschrift veröffentlicht ist, bespricht Kruse auch die Aetiologie und Diagnose der Amöbendysenterie. Danach sollen sich die pathogenen Dysenterieamöben von den gleichfalls beim Menschen vorkommenden harmlosen Darmamöben nur durch den 1892 von Kruse und Pasquale gelieferten Nachweis ihrer Fähigkeit, bei Katzen Ruhr zu erzeugen, unterscheiden lassen. Von den morphologischen und entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen Schaudinn's, durch die die Unterscheidung der Arten auf dieser Grundlage zuerst festgestellt wurde, werden nur einige Irrtümer in der Deutung mancher Stadien angeführt, und die ganze neuere Literatur über die Aetiologie der Amöbendysenterie, von den Arbeiten Hartmann's (1907) angefangen bis zu denen Walkers 1913, durch die die Unterscheidung der Arten und die Aetiologie einwandfrei durch vergleichend entwicklungsgeschichtliche wie experimentelle Feststellungen geklärt ist, wird überhaupt mit keinem Worte erwähnt. Vielmehr wird die Behauptung aufgestellt: „Der Tierversuch bleibt also nach wie vor entscheidend für die Erkennung der Ruhramöben.“

Bei aller Anerkennung der Verdienste Kruses um die Aetiologie der Amöbendysenterie durch seine Uebertragungsversuche auf Katzen und durch die Aufdeckung der charakteristischen pathologisch-anatomischen Befunde, muß aber betont werden, daß für die Erkennung der Dysenterieamöben der Tierversuch nicht nur ein sehr umständliches und zeitraubendes, sondern auch ein sehr leicht irreführendes, ja oft völlig versagendes Verfahren ist. Denn, wie schon Casagrandi und Barbagallo nachgewiesen haben, und seitdem verschiedentlich bestätigt wurde, können bei Katzen auch durch andere Amöben, ruhrähnliche Darmerkrankungen hervorgerufen werden, und andererseits gelingt es auch häufig nicht, Katzen mit echten Ruhramöben zu infizieren.

Dagegen ist es nach den jetzigen Kenntnissen jederzeit verhältnismäßig leicht möglich, durch mikroskopische Untersuchung die Dysenterieamöben von den harmlosen Darmamöben zu unterscheiden und so eine rasche und sichere Diagnose zu stellen. Die zuerst von Schaudinn richtig angegebenen Verschiedenheiten in Bau und Entwicklung der harmlosen und pathogenen Darmamöben haben zwar zunächst die Frage noch nicht völlig geklärt, da Schaudinn bei seinen Fällen aberrante, teilweise degenerative Entwicklungsformen irrtümlich