einer mehr oder weniger gefärbten, klaren Lösung, welche man in ein kleines, 10 cm langes, 12 mm weites Reagensglas laufen lässt und durch Nachwaschen des Filters auf 4—5 cc bringt. Das Filtrat wird, um den oxydirenden Einfluss der Luft fernzuhalten, zunächst mit einigen Cubikcentimetern Benzin überschichtet, dann mit 2 Tropfen einer weinsäurehaltigen Eisenvitriollösung (je 1 Theil Weinsäure und Eisenvitriol auf 10 Theile Wasser) versetzt, wodurch das vorhandene Hämatin in reducirtes Hämatin umgewandelt wird, und mit Hülfe eines kleinen Spectroskops betrachtet. Der charakteristische Absorptionsstreif im Grün, $\alpha = 2564-547$, ist noch bei grösster Verdünnung*), der schwächere s-Streifen, 25300—5150, nur bei grösserem Blutgehalt zu erkennen. Die Versuche Wolff's sind mit normalem Harn nach Zusatz kleinster Blutmengen angestellt; inwiefern die Empfindlichkeit der Probe durch höheren Eiweissgehalt des Blutharns beeinträchtigt wird, bleibt noch festzustellen.

Ueber die densimetrische Bestimmung des Eiweisses in thierischen Flüssigkeiten. Der wiederholt gemachte Vorschlag,**) zur Bestimmung des Eiweisses die Dichtigkeitsabnahme zu benutzen, welche eine eiweisshaltige Flüssigkeit durch Coagulation erfährt, geht von der Annahme aus, dass die Verminderung der Dichtigkeit der Menge des abgeschiedenen Eiweisses direct proportional und demgemäss der Factor, mit welchem man den beobachteten Dichtenunterschied zu multipliciren hat, um die Menge des gefällten Eiweisses zu erhalten, eine constante Grösse sei. Hiergegen hat Budd e***) auf Grund theoretischer Erwägungen geltend gemacht, dass der Factor je nach der Anfangsdichte der Flüssigkeit einen wechselnden Werth besitzen muss. Die Zulässigkeit dieses Einwandes, sowie die Feststellung der zahlenmässigen Beziehung zwischen Eiweissgehalt und Dichtigkeitsabnahme durch eine geeignete empirische Formel bildet den Gegenstand einer Untersuchung durch H. Huppert und H. Záhoř†). Eine weitere Versuchsreihe von H. Záhoř††) beleuchtet die Verwendbarkeit des Verfahrens für die Eiweissbestimmung im Harn.

Huppert und Záhoř haben an 20 Flüssigkeiten verschiedener Herkunft, welche theils die Eiweisskörper des Blutserums, theils jene

*) Vergl. diese Zeitschrift 26, 673.

**) Zuletzt von Bornhardt, diese Zeitschrift 16, 124.

***) Bibliothek for Laeger 20; vgl. diese Zeitschrift 25, 282.

†) Zeitschrift für physiol. Chemie 12, 467.

††) Ebenda 12, 484.

des Hühnereies enthielten, einerseits den Eiweissgehalt durch Wägung, andererseits die Dichtigkeit vor und nach dem Enteiweissen mit dem Sprengel'schen Pyknometer unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaassregeln bestimmt. Zur Abscheidung des Eiweisses wurden die Lösungen in Medicinflaschen von ungefähr 300 cc Inhalt gefüllt, in die Flaschen mit Natronlauge ausgekochte und vollständig gewaschene, weiche Kautschukstopfen eingebunden, die Flaschen in Wasser gelegt, mit diesem erhitzt und schliesslich 10—15 Minuten im siedenden Wasser gehalten. Dann wurde das Glas aus dem Wasser genommen, erkalten gelassen und das Eiweissgerinnsel durch ein Faltenfilter abfiltrirt. Um dabei Verdunstung zu verhindern, war der Trichter mittelst eines durchbohrten Pfropfens fest in ein Kölbchen eingesetzt und der Trichter mit einer Glasplatte bedeckt. Die Anfangsdichte der verwendeten Eiweisslösungen schwankte von 1,004890—1,054478, der Eiweissgehalt von 0,5951—5,2570 g in 100 cc. Der Vergleich der gewonnenen Zahlen lehrte, dass sich zwar die Dichtedifferenzen im Allgemeinen in demselben Sinne ändern, wie der Eiweissgehalt, dass aber der jeweilige Factor sehr verschiedene, zwischen 353—440 liegende Werthe annehmen kann, somit keine constante Grösse darstellt. Multiplicirt man die beobachteten Abnahmen mit dem Mittel der für den Factor gefundenen Werthe (383), so ergeben sich zwischen beobachtetem und berechnetem procentischem Eiweissgehalt Abweichungen in der ersten Decimale.

Bessere Uebereinstimmung lässt sich erzielen, wenn man die von Budde herrührende Formel

$$v_x = \frac{100 v_2}{v_2 - v_1} (v - v_1)$$

benutzt, worin v_x den Eiweissgehalt in 100 cc, v die ursprüngliche Dichte der Eiweisslösung, v_1 dieselbe nach Abscheidung des Eiweisses, v_2 die Dichtigkeit des in Lösung befindlichen Eiweisses bezeichnet, und überdies die Annahme macht, dass die letztere Grösse einen wechselnden, von v_1 abhängigen Werth besitzt, welcher sich ausdrücken lässt durch

$$v_2 = 1,3879 - 0,9946 (v_1 - 1).$$

Am nächsten, bis auf Differenzen in der zweiten Decimale, kommt den Wägungsergebnissen die Berechnung nach der Formel:

$$v_x = [\alpha + \beta (v - 1) + \gamma (v_1 - 1)] (v - v_1),$$

worin $\alpha = 351,424$, $\beta = 911,44$, $\gamma = 833,22$ zu setzen ist.

Trotz dieser Uebereinstimmung stellt Huppert das densimetrische Verfahren der Wägung nach, da einerseits die zur Rechnung dienenden

Formeln den wirklichen Verhältnissen nicht genau, sondern nur annähernd entsprechen, andererseits die Ausführung der Bestimmung nicht weniger Arbeit und Übung in Anspruch nimmt, als eine Wägungsbestimmung.

Etwas günstiger sind die Verhältnisse für die densimetrische Eiweissbestimmung im Harn, da hier wegen des relativ geringen Eiweissgehaltes die Schwankungen in den Dichtigkeitsdifferenzen und damit auch die davon abhängigen Fehler sich innerhalb engerer Grenzen halten. In 14 vergleichenden Doppelbestimmungen, welche Záhory in der oben besprochenen Weise ausführte, und bei denen der Eiweissgehalt des Harns 0,0631—0,7634 g in 100 cc betrug, war Eiweissgehalt und Dichtigkeitsabnahme so weit proportional, dass bei Multiplication der letzteren mit dem empirischen Factor 400*) sich Uebereinstimmung mit den Wägungsergebnissen bis auf $\pm 0,0175\%$ im Mittel herausstellte. Die grössten Differenzen waren 0,0432 und 0,0544 %.

Das Verfahren gestaltet sich bei der Ausführung folgendermaassen. Man versetzt zunächst, wenn es nöthig ist, den filtrirten Harn mit so viel verdünnter Essigsäure, dass beim Kochen alles Eiweiss ausfällt. Um zu ermitteln, ob bereits die nöthige Menge Essigsäure zugesetzt ist, taucht man ein Reagensglas mit einer Probe des Harns zuerst einige Zeit in siedendes Wasser und kocht dann über der Flamme auf. Das Filtrat darf auf Zusatz von Essigsäure und Ferrocyankalium keine Trübung geben. Von dem so hergerichteten Harn wird die Dichte bestimmt. Eine grössere Portion wird nunmehr, wie oben beschrieben, in einer verschlossenen Medicinflasche coagulirt und filtrirt, schliesslich wird in dem erhaltenen Filtrat neuerdings die Dichte bestimmt. Zur Dichtigkeitsbestimmung genügt, wo es sich nicht um ganz genaue Werthe handelt, ein auf seine Richtigkeit geprüftes Aräometer, an welchem noch die vierte Decimale ablesbar ist. Für ein Intervall von 0,01 Dichte braucht man immer eine Spin del. Bei dieser Bestimmung müssen Harn und Filtrat dieselbe Temperatur besitzen, was man erzielen kann, wenn man beide Flüssigkeiten in geeigneten Cylindern in ein grosses mit Wasser gefülltes Gefäss stellt und wenn in denselben die Temperatur gleich geworden ist, die Aräometer einsenkt. Die Differenz der Dichte mit 400 multiplicirt gibt den Eiweissgehalt für 100 cc an.

*) Aus Lang's Bestimmungen (Orvosi Szemle, 2. Jahrgang, Pressburg 1862) berechnet Záhory den Factor zu 370, aus Bornhardt's Zahlen zu 435, aus jenen Budde's zu 420. Die Verschiedenheit dieser Werthe führt Záhory auf Ungenauigkeiten bei der Ausführung des Verfahrens zurück.