nen Kessel der Destillation unterworfen, wobei man ein Drittel sehr flüchtiges und flüssig bleibendes Oel erhält; dass zweite Drittel ist dickflüssig und das letzte erstarrt in der Kälte. Diese drei verschiedenen Producte werden nach der für das Photogen von Vohl angegebenen Methode behandelt; nur mit dem Unterschiede, dass statt Schwefelsäure von 66° B., solche von 60° angewendet wird.

Durch das Abblasen erhält man ein wasserhelles, wenig Geruch besitzendes leichtes Oel von 0,800 spec. Gew., welchem Vohl den Namen *Oleon* gegeben hat, um theils seine Herkunft, theils seine acetonähnliche Zusammensetzung zu bezeichnen. Es ist ein vortreffliches Beleuchtungsmaterial und dem Verharzen nicht unterworfen. Es dient zur Speisung der Photogen-, Camphin- und Pinolinlampen.

Das zweite Product, welches dickflüssig ist, ist sauerstofffrei und dem Oxydiren an der Luft nicht unterworfen; man wendet es mit Vorthail zum Schmieren von feinen Maschinentheilen an, auch kann es zum Brennen verwendet werden.

Aus dem dritten Product der fractionirten Destillation bereitet Vohl einen dem Paraffin ähnlichen festen Kohlenwasserstoff, der ein vortreffliches Kerzenmaterial abgiebt. (*Polyt. Journ. Bd. 147.*) B.

Rhamnoxantin.

Buchner in München hatte 1853 aus den Wurzeln von *Rhamnus Frangula* einen gelben Farbstoff geschieden, den er Rhamnoxantin nannte. T. L. Phipson bestätigt und erweitert Buchner's Angaben über diesen Körper.

Das Rhamnoxantin findet sich nach Phipson nur in den Bastschichten und in den Markstrahlen von *Rhamnus frangula*, auch in *Rh. catharticus*. Buchner zog dasselbe mit Aether aus und erhielt es noch mit Fett verunreinigt. Um dasselbe rein zu gewinnen, taucht Phipson die Zweige 3 bis 4 Tage lang in Schwefelkohlenstoff, welcher sich dann goldgelb färbt. Man verdunstet die Lösung, behandelt den Rückstand mit kaltem Alkohol, welcher den Farbstoff löst und das Fett hinterlässt. Die Lösung wird verdampft, der Rückstand mit Aether aufgelöst und die Lösung verdunstet. Das Rhamnoxantin krystallisirt dann in kleinen goldglänzenden Flittern. Es ist flüchtig. Seine Dämpfe sind weiss oder

gelblich, von angenehmen Geruch und verdichten sich gleich der Benzoësäure und dem Alizarin. Unlöslich in Wasser, in Säuren und Salzlösungen. Löslich im Aether, Alkohol, Schwefelkohlenstoff; Wasser fällt es aus diesen Lösungen.

Ammoniak löst es zu prächtig-purpurrother Flüssigkeit. Kali- und Natronlauge desgleichen. Kohlensaure Alkalien liefern weniger schön gefärbte Flüssigkeiten. Diese alkalischen Verbindungen sind unlöslich im Schwefelkohlenstoffe. Säuren stellen die ursprünglich gelbe Farbe wieder her. Concentrirte Schwefelsäure färbt sich damit anfangs smaragdgrün, bald darauf purpurroth. Wasserzusatz bewirkt wieder gelbe Färbung.

Unter oxydirenden Einflüssen liefert das Rhamnoxantin braune Zersetzungsproducte.

In Ammoniak gelöst, mit Citronensäure gesättigt, dann mit Talkerde versetzt, erhält man einen sehr schönen violetten Lack; mit Zinnsalz einen chocoladebraunen. Mit den Metalloxyden liefert es gelbe, rothe, braune Lacke. Seide und Wolle lassen sich damit gelb färben. (*Compt. rend. 26. Juill. 1858. pag. 153.*) Dr. H. Ludwig.

Ueber Bereitung reiner Rosolsäure.

Dr. H. Müller hatte rohe Carbolsäure (sogenanntes Steinkohlentheer-Kreosot) so unrein, wie man sie von den Theerfabriken erhält, mit Kalk behandelt, um die Kalkverbindung derselben zu erhalten, und diese Verbindung längere Zeit an der Luft an einem warmem Orte stehen gelassen. Als er später diesen carbolsauren Kalk untersuchen wollte, fand er, dass dieses Salz ganz und gar in eine rothe Substanz umgewandelt war, die sich in Wasser mit schön rother Farbe löste, wobei ein brauner Rückstand blieb. Weder aus der Lösung, noch aus dem braunen Rückstand liess sich Carbolsäure (Phenylalkohol) darstellen.

Die rothe Lösung enthielt dagegen die von Runge mit dem Namen Rosolsäure belegte Substanz. Um sie zu gewinnen, zog Müller das oben erwähnte Rohmaterial mit kohlensaurem Ammoniak aus und dunstete die Lösung ein. Dabei entweicht Ammoniak, die carmoisinrothe Farbe verwandelt sich in Gelb und es scheidet sich rohe Rosolsäure als dunkles Harz aus.

Diese rohe Säure löst Müller nach dem Verfahren von Runge in Alkohol auf und fügt Kalkhydrat hinzu.