[Aus dem hygienischen Institut der Universität Giessen.]

Ueber einen dem Pneumonieococcus sehr ähnlichen Mikroorganismus.

Von

Michael Nikiforoff.

Die jüngste Influenza-Pandemie hat zahlreichen Forschern Veranlassung zu bacterioskopischen Untersuchungen gegeben, deren Hauptziel war, den bisher unbekannten Erreger der Krankheit zu entdecken. Umfangreiche Untersuchungen haben während dieser Epidemie sowohl die krankhaften Secrete (Auswurf, Nasenschleim) als auch das Blut und in tödtlich verlaufenen Fällen die inneren Organe in Betracht gezogen. In letzteren Fällen lieferten besonders die entzündlich veränderten Respirationsorgane und namentlich die Lunge das zur Untersuchung verwandte Material, da gerade die mit Pneumonie complicirten Influenzaerkrankungen verhältnissmässig häufig zum Tode führten. Dass jene Untersuchungen, trotz ihrer grossen Zahl, bisher den vermutheten specifischen Influenzaerreger nicht haben auffinden lassen, darüber stimmen wohl alle Forscher, die auf diesem Gebiete gearbeitet haben, überein. — Eine besondere Stellung nehmen die Befunde von Klebs¹ ein, der im Blute von Influenzakranken Gebilde gesehen hat, welche er als den bekannten Malariaplasmodien sehr ähnlich beschreibt. Es ist aber ein solcher Befund Seitens anderer Forscher nicht bestätigt; ja selbst der Entdecker der Malariaplasmodien Laveran vermochte im Blute von Influenzakranken irgend welche fremde Bestandtheile nicht aufzufinden. — Die Resultate der bisher veröffentlichten bacteriologischen Influenzauntersuchungen lassen sich dahin resumiren, dass in den Ausscheidungen der entzündeten Respirationsorgane verschiedene

¹ *Centralblatt für Bacteriologie.* Bd. VII. S. 5.

Bakterien sich nachweisen lassen, die eventuell als Erreger dieser Influenza-complicationen zu betrachten, deren ursächliche Beziehungen zur Influenza selbst aber mindestens fraglich sind. Diese Bakterienarten sind theils Streptococcus- resp. Staphylococcusarten (Faillard, Ribbert, Chantemesse u. A.), theils sind sie anscheinend identisch mit den wohlbekannten Pneumonieerregern (Weichselbaum, Ribbert u. A.).

Die Pneumoniekokken — *Diplococcus pneumoniae* von Talamon, Fränkel, Weichselbaum — wurden besonders oft von Weichselbaum in Influenzafällen gefunden. Allerdings unterschieden sich in einzelnen seiner Fälle diese Kokken durch einige nicht näher beschriebene Merkmale von den echten Pneumokokken.

Die bacterioskopische Untersuchung der pneumonisch veränderten Lunge¹ eines der Influenza erlegenen Individuums durch Prof. Gaffky in Giessen hat zur Auffindung eines Mikroorganismus geführt, welcher in vielen Beziehungen mit dem Pneumoniecoccus übereinstimmte, andererseits aber doch bemerkenswerthe Unterschiede von demselben zu bieten schien, und dessen Natur und biologische Eigenschaften näher zu bestimmen Prof. Gaffky mir vorgeschlagen hat. Es sei mir gestattet, hier meinen herzlichsten Dank für die bei Ausführung der Arbeit mir erteilten Rathschläge auszusprechen. — Obgleich bei der Untersuchung der Lungen von noch einigen anderen letal verlaufenen und mit Pneumonie complicirten Influenzafällen der in Rede stehende Mikroorganismus nicht gefunden werden konnte, so bieten doch seine biologischen Eigenthümlichkeiten so viel Interesse dar, dass seine nähere Beschreibung wohl gerechtfertigt erscheint.

Das zur Untersuchung verwendete Ausgangsmaterial bestand in einer Lunge, in welcher sich zerstreute pneumonische Infiltrate vorfanden. In dem ausgestrichenen Lungensaft konnte man nur wenige Bakterien auffinden, namentlich einige kurze und etwas dicke Bacillen und Diplokokken. In Schnittpräparaten der in Alkohol gehärteten Lungen waren nur vereinzelt Kokken nachweisbar.

Am 2./I. 1890 wurden Stückchen des infiltrirten Lungengewebes einem Kaninchen in die vordere Augenkammer, einem Meerschweinchen und zwei Mäusen in eine Hauttasche eingeführt. Das dem Kaninchen in die vordere Augenkammer gebrachte Stückchen war nach einigen Wochen spurlos resorbirt, nachdem sich anfänglich eine geringe entzündliche Reaction bemerkt gemacht hatte.

Die eine Maus starb am 5./I. (die zweite ist gesund geblieben).

¹ Die Lungen waren von Hrn. Prof. Dr. Leichtenstern in Cöln dem Giessener pathologischen Institut übersandt. Ihre bacteriologische Untersuchung wurde von Hrn. Prof. Dr. Bostroem freundlichst gestattet.

Sectionsbefund: Sehr stark ausgeprägte Durchtränkung des subcutanen Gewebes mit klarer, wässriger Flüssigkeit. In Deckglaspräparaten aus der ödematösen Flüssigkeit findet man zahlreiche Kokken, die grösstentheils zu zweien mit einander verbunden sind. Sie sehen etwas oval aus; einige haben zugespitzte Enden, so dass sie die Form der sogenannten Lancettkokken besitzen. Die Untersuchung von nach Gram gefärbten Schnitten der in Alkohol gehärteten inneren Organe ergab, dass vereinzelte Doppelkokken auch im Blute vorhanden waren. Die Veränderung der Haut bestand nach der mikroskopischen Untersuchung in einer beträchtlichen entzündlichen Infiltration mit Anhäufung von Leukocyten; die Kokken fanden sowohl in den Lymphgefässen als auch in dem zwischen den Bindegewebsfasern vorhandenen Exsudate sich vor. Der Versuch, die im Unterhautgewebe gefundenen Kokken in Nährgelatine zu züchten, fiel negativ aus, dagegen waren auf den bei Brüttemperatur aufbewahrten Agarplatten nach 24 Stunden sehr kleine Colonieen zu bemerken. Unter diesen stellten sich die tiefer gelegenen bei schwacher Vergrösserung als scharf abgegrenzte ovale, vielfach auch spindelförmige Häufchen dar, während die oberflächlich gelegenen in Folge der Ausbreitung auf der freien Fläche von einer helleren Zone umgeben waren. Nach längerer Aufbewahrung im Brütoven konnte man keine nennenswerthe Vergrösserung der Colonieen mehr wahrnehmen. Ausstrichculturen auf schräg erstarrtem Agar erwiesen sich aus sehr kleinen, schwer bemerkbaren, fast durchscheinenden, tröpfchenähnlichen Colonieen bestehend, die ebenfalls nach längerer Brütovenzüchtung keine weitere Entwicklung und Vergrösserung mehr erfuhren.

In Agar-Stichculturen war die Entwicklung längs des ganzen Stichcanals zu sehen.

Eine mit Agarculture am 7./I. geimpfte Maus starb am 10./I. und bot die gleichen Veränderungen wie die zuerst eingegangene dar; in der ödematösen Flüssigkeit fanden sich ebenfalls reichliche Doppelkokken, dagegen konnten im Blute keine Mikroorganismen nachgewiesen werden.

Das am 2./I. geimpfte Meerschweinchen starb am 9./I. und zeigte bei der Untersuchung folgende Veränderungen: An der Impfstelle fibrinöses Exsudat, ringsum dasselbe ein erhebliches seröses subcutanes Oedem. In den inneren Organen wurden keine Bakterien gefunden, dagegen in der subcutanen ödematösen Flüssigkeit zahlreiche Doppelkokken, die bei der Züchtung dieselben Eigenthümlichkeiten darboten, wie die von der ersten Maus gewonnenen.

Eine am 9./I. mit der ödematösen Flüssigkeit des Meerschweinchens geimpfte Maus starb am 13./I. Der Sectionsbefund bei dieser Maus war folgender (14./I.): Subcutanes Oedem schwach ausgeprägt, Lymphdrüsen geschwollen, Darmschlingen mit zähem, reichlichem Exsudat bedeckt, welches zahlreiche lancettförmige Kapselkokken enthält.

Die aus diesem Falle rein gezüchteten Diplokokken besaßen ebenfalls die oben beschriebenen typischen Merkmale.

Eine am 14./I. von dieser Maus geimpfte andere Maus starb am 17./I. Sectionsbefund: Subcutanes Oedem mit zahlreichen, mit Hüllen versehenen Kokken, keine Bakterien im Blute. Von dieser Maus wurde am 17./I. wieder eine Maus geimpft und gleichzeitig einem Kaninchen und einem Meer-

schweinchen ziemlich grosse Stückchen des ödematös durchtränkten Gewebes unter die Haut eingeführt. Die beiden letzteren Thiere blieben trotz der grossen Menge des eingeführten Impfmateri als ganz gesund, während die Maus nach zwei Tagen unter den früher beschriebenen Erscheinungen eingegangen war. Aus der Oedemflüssigkeit wuchsen wieder dieselben pneumokokkenähnlichen Culturen.

Die Uebertragungen von einer Maus auf die andere wurden dann noch längere Zeit und zwar stets mit sicherem Erfolge vorgenommen. Die Mäuse starben regelmässig nach 2 bis 3 Tagen und zeigten bei der Section ein ausgesprochenes subcutanes Oedem mit zahlreichen Kokken. Zuweilen konnten die letzteren auch im Blute nachgewiesen werden. Die von den Mäusen gewonnenen Reinculturen besaßen immer dieselben oben beschriebenen Eigenthümlichkeiten.

Die Versuche, bei Kaninchen eine Infection zu erzielen, wurden von Zeit zu Zeit, aber stets erfolglos, wiederholt; bemerkt sei dabei, dass zu diesem Zwecke immer frische Thiere verwandt wurden. So wurde beispielsweise am 21./I. einem Kaninchen von einer der Infection erlegenen Maus ohne jeden Erfolg ein grosses ödematöses Gewebstückchen subcutan eingeführt. Am 29./I. wurde von einer soeben gestorbenen und unter den nöthigen Cautelen secirten Maus eine Bouilloncultur angefertigt. Am 30./I. war die Bouillon in Folge einer reichlichen Diplokokken-Vermehrung ganz gleichmässig getrübt. Mit dieser Bouilloncultur wurden ein Kaninchen und ein Meerschweinchen, eine Taube und eine Maus inficirt, indem jedem der drei ersten Thiere $\frac{1}{4}$ der Koch'schen Spritze subcutan injicirt wurde. Die Maus war nach zwei Tagen unter den gewöhnlichen Erscheinungen gestorben, das Kaninchen und die Taube blieben reactionslos und gesund. (Der Versuch, eine Taube zu inficiren, wurde nochmals und zwar wieder ohne Erfolg ausgeführt, indem einem neuen Thiere ein ziemlich grosses Bindegewebsstückchen von einer frisch gestorbenen Maus unter die Haut eingeführt wurde.)

Das am 30./I. geimpfte Meerschweinchen war am 7./II., also nach acht Tagen, gestorben. Der Sectionsbefund war folgender: An der Injectionsstelle im Unterhautgewebe fibrinöses Exsudat; ringsum dasselbe starkes Oedem mit Diplokokken. In der rechten Pleurahöhle ziemlich klare Flüssigkeit mit zahlreichen Kokken. Die Pleura selbst schien unverändert zu sein. Rechte Lunge etwas collabirt. Pericardium mit dem Herzen durch ein zähes, fibrinöses Exsudat verklebt. Die Exsudatmassen enthielten zahlreiche Diplokokken, die mit deutlichen Kapseln versehen waren. Lunge und Milz normal. Keine Kokken im Blute.

Mittels einer in diese pericardiale Exsudatflüssigkeit eingetauchten Platinöse wurde eine Maus subcutan geimpft, und dann ein grosses Stückchen des pericardialen Gewebes sammt Exsudatmasse einem Kaninchen tief in eine Hauttasche eingeführt. Ausserdem wurde eine Bouilloncultur angefertigt. Am nächsten Tage, als in der Bouillon eine kräftige Entwicklung der Diplokokken zu constatiren war, wurde einem frischen Kaninchen $\frac{3}{4}$ Spritze der Cultur unter die Haut eingespritzt. Während nun die am 7./II. geimpfte Maus nach zwei Tagen unter den gewöhnlichen Erscheinungen eingegangen war, blieben beide Kaninchen ganz gesund, insbesondere waren auch an den Injectionsstellen keine Veränderungen zu finden.

Die aus dem subcutanen Oedem der Mäuse gezüchteten Diplokokken-culturen erreichten, wie erwähnt, das Maximum ihres Wachstums auf Agar (Glycerin-Agar, schwach alkalisch) nach 24 bis 48 Stunden. Unter Luftabschluss gezüchtete Culturen (überschichtete Agarröhrchen) stellten kleine kugelförmige Colonieen dar, die bald keine bemerkbare Vergrößerung mehr wahrnehmen liessen. Die Culturen erwiesen sich als übertragbar und entwicklungsfähig, selbst wenn sie nicht in kurzen Zwischenräumen auf neues Nährmaterial übertragen wurden. So gelang von einer mit Agar überschichteten, am 23./I. angesetzten Cultur (à l'anaérobiose), in welcher die durch Agar bedeckten Colonieen längere Zeit vor Austrocknung geschützt waren, eine Umzüchtung noch am 27./II., also nach mehr als einem Monate. Die Umzüchtung der auf schräg erstarrtem Agar gewachsenen Culturen wurde in einem Falle noch nach sechs Tagen mit gutem Erfolge vorgenommen. Weitere Umzüchtungsversuche mit längere Zeit aufbewahrten Agarculturen wurden nicht ausgeführt, da es sich erwies, dass der beschriebene Diplococcus längere Zeit im trockenen Zustande entwicklungsfähig sich erhalten lässt.

Am 5./II. wurde eine Bouilloncultur angefertigt und nach genügendem Wachstum mit derselben sterile Seidenfäden durchtränkt, welche dann getrocknet und im Exsiccator aufbewahrt wurden. Am 24./II. wurde ein solches Fädchen in Bouillon eingebracht, in welcher nach 24 stündigem Verweilen im Brütöfen ein kräftiges Wachstum zu constatiren war. Die mikroskopische Untersuchung ergab eine Reincultur der ovalen Kokken, von denen die meisten in der Form von Doppelkokken erschienen, einige aber auch zu kurzen aus 3 bis 4 Kokken bestehenden Ketten verbunden waren. Bei der Verimpfung dieser Bouilloncultur auf schräg erstarrtes Agar waren nach 24 stündigem Verweilen im Brütöfen Colonieen zu bemerken, die zwar auch als ziemlich kleine durchscheinende Tröpfchen sich darstellten, im Vergleich mit den früher beschriebenen Culturen aber, wie es schien, ein etwas kräftigeres Wachstum besaßen. Controlzüchtungen haben indess ergeben, dass ein solches etwas kräftigeres Wachstum wahrscheinlich dadurch bedingt ist, dass bei der Verimpfung einer Bouilloncultur auf Agar immer eine grosse Menge vollständig entwicklungsfähiger Bacterien übertragen wird. Wenn man nämlich von derselben Bouilloncultur statt einer Oese nur diejenige Menge, welche an einer Platindrahtspitze hängen bleibt, auf Agar übertrug, und dann diese kleine Menge mittelst Oese gut ausstrich, so bekam man ganz typische kleine, durchscheinende, tröpfchenartige, denjenigen der Pneumoniekokken sehr ähnliche Colonieen, die geradezu als Muster der letzteren dienen konnten.

Dass die nahezu drei Wochen lang im Exsiccator aufbewahrten Bacterien nicht nur entwicklungsfähig, sondern auch virulent geblieben waren, zeigt folgender Versuch:

Am 25./II. wurde mit der erwähnten von einem Seidenfädchen aus gewachsenen Bouilloncultur eine Maus geimpft und eine Agarcultur angefertigt.

Am 26./II. sah die Maus krank aus. Auf Agar waren im Brütöfen kleine typische Colonieen gewachsen.

Am 27./II. war die Maus gestorben. Sectionsbefund: Stark ausgeprägtes subcutanes Oedem mit zahlreichen Diplokokken; letztere auch vereinzelt im

Blute zu finden. Von der Oedemflüssigkeit wurden Agarculturen angefertigt, welche am 28./II. wiederum dieselben Colonieen zeigten.

In der folgenden Versuchsreihe gelang es zum ersten Male auch ein Kaninchen zu inficiren und zwar mittelst Injection in die Blutbahn. Der Verlauf der Versuche war folgender:

Am 10./III. wurde ein Seidenfädchen (vom 5./II.) in Bouillon eingebracht, welche sich in Folge dessen am 11./III. getrübt zeigte. Bei der mikroskopischen Untersuchung erwies sich, dass es sich um eine Reincultur von Diplokokken handelte. Mit dieser Bouilloncultur wurden eine Maus geimpft und eine Control-Agarcultur angefertigt. Auf der letzteren waren am 12./III. ganz typische Colonieen entwickelt.

13./III. Maus sieht schwer krank aus.

14./III. Maus todt. Sectionsbefund: Mässig ausgeprägtes subcutanes Oedem. Schwellung der Lymphdrüsen. Diplokokken in der Oedemflüssigkeit, sowie auch im Blute. Von dieser Oedemflüssigkeit wurde ein Bouillonröhrchen geimpft.

15./III. Bouillon getrübt. Mit dieser Bouilloncultur wurde eine Maus subcutan geimpft und dann $\frac{1}{2}$ Spritze der mit etwas sterilisirtem Kartoffelbrei gemischten, durch Gaze filtrirten Bouilloncultur einem Kaninchen in die Ohrvene injicirt. (Der Zusatz von Kartoffelbrei geschah in der Absicht, die Infection zu erleichtern, wie das beispielsweise bei entsprechenden Versuchen mit Typhusbacillen gelingt. Leider wurde versäumt einen Controlversuch ohne Zusatz von Kartoffelbrei auszuführen.) Schon am 17./III. waren die Maus und das Kaninchen eingegangen.

Sectionsbefund bei der Maus: Stark ausgeprägtes subcutanes Oedem mit zahlreichen Diplokokken. Vereinzelte Kokken im Blute.

Sectionsbefund beim Kaninchen: Keine entzündlichen Veränderungen an dem zur Operation benutzten Ohre. Im Blute aus der Vena cruralis fanden sich Diplokokken. Peritoneum glatt, glänzend, unverändert. In der rechten Pleurahöhle seröse Flüssigkeit, in welcher bei der mikroskopischen Untersuchung vereinzelte Diplokokken gefunden wurden. Pleura links normal. Pericardium durch ganz trübe Flüssigkeit, die auch schwimmende Flöckchen und Fäden (Fibrin) enthält, ausgedehnt. Pericardium stark geröthet, mit Ecchymosen durchsetzt, seine Oberfläche getrübt und mit weisslichen Einlagerungen versehen. Das pericardiale Exsudat enthält eine grosse Menge lancettförmiger, mit Kapseln umgebener Doppelkokken. Im Herzblute finden sich ebenfalls zahlreiche Kapselkokken. Milz etwas vergrössert; im Milzsaft dieselben Kokken. Im Zwölffingerdarm, sowie stellenweise auch im Dünndarm finden sich kleine Ecchymosen. Peyer'sche Drüsen in der Nähe der Valv. Bauhini, sowie Mesenterialdrüsen geschwollen.

Vom pericardialen Exsudate wurden Culturen angesetzt und eine Maus geimpft; dann wurde $\frac{1}{4}$ Spritze dieses Exsudates einem frischen Kaninchen unter die Haut eingespritzt.

Am 18./III. zeigten die Agarculturen das bekannte Wachsthum. An der Injectionsstelle beim Kaninchen hatte sich eine pflaumengrosse Geschwulst entwickelt.

Am 19./III. wurde die Maus todt gefunden. Sectionsbefund: Subcutanes Oedem mit Diplokokken, keine Kokken im Blute.

Die Geschwulst beim Kaninchen wurde bis zum 22./III. beobachtet; dann wurde sie, da sie keine nennenswerthen Veränderungen mehr erfuhr, mittels Scalpell etwas eröffnet und ihr Inhalt mikroskopisch untersucht, wobei dieselben Diplokokken zu finden waren. Aus äusseren Gründen musste leider auf die Anstellung weiterer Thierversuche verzichtet werden. —

Der oben beschriebene Diplococcus lässt sich auch gut in steriler Milch züchten, und zwar ohne dass er bei seinem Wachsthum eine Gerinnung, bezw. eine Veränderung der Reaction hervorruft. Beispielsweise wurde am 27./II. eine Reincultur der Diplokokken in Milch geimpft, die dann in den Brütöfen gestellt wurde. Am 28./II. war die Milch nicht geronnen, ihre Reaction unverändert. In gefärbten Deckglaspräparaten waren nur die bekannten Kokken zu sehen. Von dieser Milch wurde eine Agarcultur angefertigt, auf welcher am 1./III. ganz typisches Wachsthum erfolgt war. Die Milch zeigte auch an diesem Tage noch keine Veränderungen. Die in der Milch gezüchteten Diplokokken verlieren offenbar ihre Virulenz, da solche Culturen die Mäuse zu tödten nicht mehr im Stande sind. Dagegen können sie bis zu einem gewissen Grade eine Immunisirung von Mäusen bewirken. Es spricht dafür folgender Versuch.

Am 7./III. wurde eine Maus mit einer Milhcultur, die schon dreimal und zwar immer nach zwei Tagen umgezüchtet war, geimpft. Bis zum 10./III. blieb die Maus gesund. Am 11./III. wurde sie sammt einer frischen zur Controle dienenden Maus mittelst einer Bouilloncultur geimpft, die von einem Seidenfaden (vom 5./II.) angefertigt war. Von der Bouilloncultur wurde gleichzeitig auch eine Agarcultur angesetzt, auf welcher am 12./III. ganz typisches Wachsthum eingetreten war.

Am 13./III. wurde diejenige Maus, welche früher mit Milhcultur geimpft war, noch ganz gesund befunden, während die Control-Maus schon sehr schwer krank aussah und am 14./III. starb. (Sectionsbefund: Nicht stark ausgeprägtes subcutanes Oedem, Lymphdrüenschwellung, Diplokokken im Gewebssafte und im Blute.)

Die anscheinend immun gewordene Maus wurde nun nochmals und zwar am 17./III. mit ödematöser Flüssigkeit einer soeben gestorbenen Maus geimpft. Dieses Mal widerstand sie der Infection nicht. Schon am 18./III. sah sie krank aus und starb am 19./III. (Sectionsbefund: Subcutanes Oedem mit Diplokokken. Keine Kokken im Blute.) — Es scheint also, dass die frisch dem Thierkörper entnommenen Diplokokken eine stärkere Virulenz als die nach vorgängiger längerer Aufbewahrung im trockenen Zustande künstlich gezüchteten besitzen.

Der im Vorstehenden beschriebene Mikroorganismus besitzt ohne Zweifel viel Aehnlichkeit mit dem als Erreger der Lungenentzündung bekannten Pneumonicoccus. Sein mikroskopisches Aussehen ist mit demjenigen des Pneumonicoccus identisch, insbesondere zeigen beide Organismen zuweilen zugespitzte Enden, sehen lancettförmig aus und erscheinen unter gewissen Verhältnissen mit einer Kapsel versehen; beide lassen sich nach Gram gut färben. Was die Cultureigenschaften betrifft, so wachsen beide Organismen nur bei Brüttemperatur, indem sie Colonieen entwickeln, die nach mikro- und makroskopischem Aussehen sich vollkommen gleichen.

Ein scharfer Unterschied zwischen beiden zeigt sich aber bezüglich der Erhaltung der Virulenz und der Lebensfähigkeit in den Culturen. Der Pneumococcus bedarf nach Fränkel, um seine Virulenz und Entwicklungsfähigkeit zu bewahren, der Umzüchtung in kurzen Zwischenräumen. In glücklichen Fällen liess sich seine Virulenz bei aufmerksamer, nach je drei Tagen vorgenommener Umzüchtung bis zu 24 Tagen erhalten. Falls aber die Uebertragung nicht mindestens alle 4 bis 5 Tage vorgenommen wurde, zeigte sich ein grosser Theil der Culturen überhaupt nicht mehr fortpflanzungsfähig, d. h. abgestorben. Auch nach Weichselbaum sterben die Culturen ab, wenn sie nicht jeden 3. bis 4. Tag umgezüchtet werden; die äusserste Grenze dafür bildet nach Weichselbaum eine Woche.

Der oben beschriebene Diplococcus hat sich in dieser Hinsicht als weit weniger empfindlich bewiesen, da seine Culturen sogar in getrocknetem Zustande noch nach einem Monate ganz entwicklungsfähig und fast unverändert virulent sich erhalten haben. (Wie lange Zeit die in Bouillon gezüchteten und an Seidenfäden angetrockneten Pneumokokken-culturen ihre Virulenz und Lebensfähigkeit bewahren, darüber existiren allerdings meines Wissens keine Angaben in der Litteratur. — Wie nebenbei bemerkt sei, wird auch von Fränkel angeführt, dass der Pneumococcus nach vorgängiger Züchtung in Bouillon kräftigere Culturen ergebe und bei höherer Temperatur auch in Gelatine sich züchten lasse.) Zu den weiteren Unterscheidungsmerkmalen zwischen beiden Diplokokken kann ihr Verhalten in der Milch gezählt werden, da der echte virulente Pneumococcus bei seinem Wachsthum in der Milch eine Gerinnung derselben und Veränderung der Reaction (Säuerung) hervorruft, während der oben beschriebene weder Gerinnung noch Aenderung der Reaction verursacht. Uebrigens muss in dieser Beziehung hervorgehoben werden, dass nach Fränkel's Mittheilungen die abgeschwächte, weniger virulente Modification des Pneumococcus bei der Milchezüchtung ganz anders sich verhält als der virulente. Es soll nämlich der Pneumococcus schon nach 4 bis 5 tägiger Cultivirung in der Milch nicht nur seine pathogenen Eigenschaften, sondern auch sein Vermögen, Milch zur Gerinnung zu bringen und deren Reaction zu verändern, verlieren.

Es ist hiernach leicht ersichtlich, dass der oben beschriebene Diplococcus hauptsächlich mit dieser soeben besprochenen Pneumococcus-Modification sehr grosse Aehnlichkeit besitzt. Uebereinstimmung besteht, um es kurz zu wiederholen, in folgenden Punkten: Gleiches mikroskopisches Aussehen, bei beiden Anwesenheit einer Kapsel, gleiches Verhalten zu den Farblösungen (Gram), Wachsthum nur bei Brüttemperatur, gleiches mikro- und makroskopisches Aussehen der Culturen, bei der Cultivirung in Milch bei beiden weder Gerinnung noch Veränderung der Reaction. Die Unter-

schiede bestehen, soweit bis jetzt bekannt ist, in Folgendem: Der oben beschriebene Diplococcus besitzt die Eigenschaft, in trockenem Zustande seine Lebensfähigkeit und Virulenz längere Zeit zu bewahren; ob der abgeschwächte Pneumococcus etwa dieselbe biologische Eigenthümlichkeit besitzt, darüber existiren wenigstens zur Zeit keine Beobachtungen. Was die pathogenen Eigenschaften beider Organismen betrifft, so erscheint der oben beschriebene Coccus als äusserst virulent für Mäuse, die bei subcutaner Impfung, sogar mit älteren Culturen, stets nach 2 bis 4 Tagen erliegen. Die Kokken vermehren sich bei diesen Versuchsthiere hauptsächlich im subcutanen Gewebe und gehen nur selten in's Blut oder in die serösen Höhlen über. Meerschweinchen erweisen sich gegenüber diesen Kokken wenig empfänglich, indem selbst bei ausnahmsweise gelungener Infection der Verlauf der Krankheit ein protrahirter wird (7 bis 8 Tage). Bei den genannten Thieren finden sich ausser örtlichen Veränderungen gelegentlich auch fibrinöse Entzündungen der serösen Höhlen. Tauben sind gegen Impfungen immun. Kaninchen erweisen sich bei der subcutanen Impfung als vollständig refractär, und nur bei directer Injection in's Blut (mit Kartoffelpartikelchen) kann man eine tödtliche Erkrankung hervorrufen, indem die Kokken im Blute sich vermehren und auch eine fibrinöse Entzündung in den serösen Höhlen zu bewirken vermögen. Es wären noch weitere Versuche darüber anzustellen, ob die unter solchen Umständen im Kaninchen gewachsenen Kokken bei folgenden Impfungen etwa eine gesteigerte Virulenz erkennen lassen. Bis zu einem gewissen Grade scheint das nach dem oben mitgetheilten Versuche der Fall zu sein, in welchem es gelungen war, mittelst subcutaner Application der im pericardialen Exsudate des Kaninchens vermehrten Kokken bei einem anderen Kaninchen örtliche Veränderungen hervorzurufen, was früher niemals hatte erreicht werden können.

Was nun auf der anderen Seite die pathogenen Eigenschaften des Pneumococcus betrifft, so erscheint derselbe nicht nur für Mäuse, sondern auch für Kaninchen schon bei subcutaner Application als äusserst virulent, auch vermehrt er sich bei solchen Thieren immer im Blute. Ein subcutanes Oedém gehört dagegen, wie es scheint, bei Pneumokokkenimpfungen nicht zu den gewöhnlichen Erscheinungen; das Auftreten desselben bei Mäusen ist nur von Weichselbaum erwähnt, der es in einem Falle stark ausgeprägt zu beobachten Gelegenheit hatte.

Die uns besonders interessirende abgeschwächte Modification des Pneumococcus (welche man nach Fränkel am Besten in Bouillon bei 39 bis 40·5° C. oder nach 4- bis 5tägiger Milchwüchsigkeit bekommt) ist im Stande, bei subcutaner Verimpfung auf Kaninchen örtliche Veränderungen, Pneumonien und fibrinöse Entzündungen der serösen Höhlen

(Pleuritis) zu verursachen. Welchen Virulenzgrad dieser abgeschwächte Pneumococcus gegen Mäuse besitzt, welche Krankheitserscheinungen er bei den letzteren hervorruft, darüber habe ich leider keine Angaben in der Litteratur finden können. Es sind meines Wissens auch keine eingehenden Untersuchungen über die Frage angestellt, welchen Virulenzgrad die allmählich von selbst zu Grunde gehenden Pneumokokkenculturen in den verschiedenen Stadien besitzen, d. h. ob zu einer gewissen Zeit solche Culturen bei der subcutanen Application für Kaninchen schon wirkungslos sein können, während sie vielleicht Mäuse noch sicher und eventuell unter den oben beschriebenen Erscheinungen zu tödten vermögen.

Das Fehlen genügender Angaben über die pathogenen Eigenschaften der Pneumoniekokken bei Mäusen gestattet leider keine weitere Parallele zwischen den letzteren und den oben beschriebenen Organismen durchzuführen, und es lässt sich demnach weder die Identität noch die Verschiedenheit beider Diplokokken zur Zeit mit Bestimmtheit behaupten. Es müssen daher weitere Untersuchungen über den echten Pneumococcus unsere Ergebnisse ergänzen. Sollte sich dabei ergeben, dass der abgeschwächte Pneumonieococcus dieselben biologischen Eigenschaften wie der oben beschriebene Diplococcus besitzt, so würde das Verhalten des Pneumonievirus ausserhalb des Körpers in wesentlich anderem Lichte erscheinen als bisher. Es sei in dieser Beziehung namentlich auf die mitgetheilten Versuche über die Erhaltung der Virulenz und Lebensfähigkeit der an Seidenfäden angetrockneten Culturen hingewiesen.

UEBERSICHT

über die Verbreitung des Milzbrandes
und über die Vertheilung der Wildhautgerbereien

in

WUERTTEMBERG

- Landesgrenze.
- Kreisgrenze.
- Oberamts-grenze.
- Markungsgrenze.

UEBERSICHT

über die Verbreitung des Milzbrandes
und über die Vertheilung der Wildhautgerbereien
in
WUERTTEMBERG

- Landesgrenze.
- Kreisgrenze.
- Oberamts-grenze.
- Merkungs-grenze.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 11.

Fig. 13.

Fig. 12.

Fig. 10.

Fig. 14.

Fig. 1.

Ansicht.

Schnitt C-D.

Schnitt A-B.

Schritt E-F.

Grundriss.

Grundriss.

Massstab 1:200.

Sandfilter.

Fig. 1.

Längsschnitt durch den Reinwasserkanal.

Fig. 2.

Querschnitt durch den Reinwasserkanal und das Überlaufrohr.

Fig. 3.

Schnitt durch das Zuflussrohr:

Fig. 4.

Ansicht des Sandhahns.

Fig. 5.

Aufsicht.

Fig. 6.

Schnitt durch ein übervoltes Filter.

Massstab 1:200

Reinwasser-Reservoir.

Fig. 1.

Querschnitt.

Fig. 2.

Längsschnitt.

Vorkammer für die Filter der Station Tegel.

Fig. 4.

Fig. 3.

Grundriss.

Fig. 5.

Ansicht.

Schnitt A-B.

Masstab 1:200.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.