Aus der chirurgischen Universitätsklinik Basel (Vorsteher: Prof.
Dr. F. de Quervain).

Weiteres zur Technik der Kropfoperation.

Von Prof. Dr. F. de Quervain (Basel).

(Mit 10 farbigen Tafeln und 2 Abbildungen)

Vor 5 Jahren hatte ich mir zum Hausgebrauch eine Technik der Kropfoperation ausgearbeitet, welche dem Kocherschen Grundsatz der vorgängigen Arterienunterbindung dadurch seinen vollen Wert geben sollte, daß die Unterbindung vor der Luxation ausgeführt wird. Auf Grund anatomischer Studien wurde festgestellt, wie die so wichtige A. thyreoidea auf dem direktesten Wege unter sicherster Schonung des Rekurrens und der Epithelkörperchen freigelegt werden kann. Diese Methode erwies sich während des ersten Versuchsjahres als so brauchbar, daß ich sie am 7. XII. 1911 in einer kurzen Mitteilung in der medizinischen Gesellschaft Basel und am Chirurgenkongreß von 1912 in Berlin, und sodann im Juni 1912 ausführlicher in der Kocherschen Festschrift, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. 116, veröffentlichte. Da der Inhalt meiner Arbeit den meisten Lesern nicht gegenwärtig sein wird, so fasse ich, um das Verständnis für das Weitere zu erleichtern, die Hauptpunkte meiner Methode hier kurz noch einmal zusammen:

1. Die Unterbindung der Arterien, besonders der A. thy. inferior, wird in dem Momente ausgeführt, wo sie am meisten nützt, d. h. vor der Luxation des Kropfes.

2. Die Unterbindung der bei den meisten Kröpfen stärker entwickelten Inferior wird extrafascial, außerhalb der vom Halsbindegewebe gelieferten Kropffascie ausgeführt, weil hierdurch die innerhalb dieser Fascie liegenden Gebilde, der Rekurrens und die Epithelkörperchen am sichersten geschützt und die Kapselvenen am einfachsten vermieden werden. Den besten Zugang hierfür bietet das Spatium sternohyoideum, d. h.

der Spaltraum, in dem sich die kleinen Schilddrüsenmuskeln befinden, und zwar wird am besten nach außen von diesen Muskeln, aber innerhalb der sie nach außen bedeckenden starken Fascie eingegangen.

3. Ob für die Entfernung des kropfigen Gewebes mehr die Enukleation oder mehr die Resektion verwendet werde, das hängt von der Form des Kropfes ab und hat keine prinzipielle Bedeutung.

4. Der Isthmus wird nur dann durchtrennt und teilweise oder ganz entfernt, wenn er selbst kropfig erkrankt ist. In allen andern Fällen ist seine Durchtrennung nicht nur überflüssig, sondern deswegen nachteilig, weil sie die an seinem oberen und unteren Rande verlaufenden kollateralen Gefäße schädigt, auf welche wir für die Ernährung des Stumpfes bei der Unterbindung beider Arterien einer Seite einigermaßen zählen müssen.

5. Es wird auf jeder Seite, wenn irgend möglich, reichlich so viel Gewebe zurückgelassen, als einem normal großen Schilddrüsenlappen entspricht. Die ganze hintere Fläche des Lappens, also der Bereich, wo Rekurrens und Epithelkörperchen anliegen, bleibt unberührt, und weder das eine noch das andere dieser Organe wird freigelegt.

6. Die Stillung der parenchymatösen Blutung wird durch eine Naht mit feinem Catgut erzielt, welche die beiden Ränder des Schilddrüsendefektes vereinigt.

Wir halten es nun, nach 3 weiteren Jahren, für unsere Pflicht, über die mit dieser Methode erzielten Ergebnisse auf Grund von genauen Zahlenangaben Rechenschaft zu geben. Wir tun dies umso lieber, als sich die Methode bei uns auch weiterhin bewährt hat, und als durch sie die Kropfoperation auch in schwierigen Fällen beinahe ausnahmslos zu einem sehr ruhigen, unblutigen Eingriff geworden ist.

Bevor wir aber auf die Ergebnisse unserer Statistik eingehen, sei noch ein kurzer Blick auf das geworfen, was mittlerweile auf dem Gebiete der Kropfoperationstechnik gearbeitet worden ist.

Vor allem ist zu erwähnen, daß Halsted, der noch 1911, am Chirurgenkongreß in Berlin an der von uns in ihrer Zweckmäßigkeit bestrittenen Methodik der Unterbindung der Inferior

an ihrem Eintritt in das Schilddrüsengewebe — der sogen. Ultraligation — festhielt, nun neuerdings dieselbe aufgibt, und sich ebenfalls dahin ausspricht, daß der beste Schutz für Epithelkörperchen und Rekurrens in der Unterbindung der Inferior weit ab von der Schilddrüse zu finden sei. Halsted betont jetzt ausdrücklich, im Gegensatz zu seiner früheren Auffassung, und in Bestätigung des in meiner Arbeit Gesagten, daß die Gefahr der Tetanie auch bei Unterbindung aller vier Arterien wahrscheinlich nicht so groß sei, als man früher annahm, vorausgesetzt, daß die Unterbindung sorgfältig ausgeführt und in genügender Entfernung von den Epithelkörperchen vorgenommen werde. Die von ihm in seiner diesbezüglichen Veröffentlichung (1913) empfohlene Technik der Unterbindung stimmt genau mit derselben überein, welche ich 1912 beschrieben habe, mit dem im Prinzip belanglosen Unterschiede, daß Halsted nicht am Innenrande des Kopfnickers, sondern zwischen den Fasern dieses Muskels hindurch auf den extrafascialen Spaltraum eindringt.

Es freut mich sehr, daß ein so hervorragender und gerade auf dem Gebiete der Kropfanatomie so erfahrener Chirurg sich aus diametral entgegengesetzten Anschauungen heraus der meiner Methode zugrunde liegenden Auffassung angeschlossen hat¹⁾.

In einer aus dem gleichen Jahr (1913) stammenden kurzen Mitteilung empfiehlt Halsted ferner für diffuse Basedowstrumen, wie schon 1911, die beiderseitige Resektion.

D. Balfour betont 1914 in einer aus dem Institut der Gebrüder Mayo stammenden Arbeit für große, diffuse Strumen die Vorteile der beiderseitigen Resektion nach dem Prinzip von Mikulicz. Als ersten Akt nimmt auch er die Durchtrennung des Isthmus vor. Die Operation ist in ihrer ausgedehnten Bloßlegung der Halseingeweide allerdings viel eingreifender, als die

¹⁾ Nur der Vollständigkeit wegen erwähne ich eine Veröffentlichung von E. O. Jones vom November 1913. Dieser Autor gibt zuerst, zum Teil wörtlich aus meiner Arbeit übersetzt, die Resultate meiner Gelatineinjektionen wieder, die er aber Poulsen zuschreibt, und übersetzt sodann, ebenfalls in den Hauptpunkten wörtlich, meine Unterbindungsmethode der A. thyreoidea inferior, — ohne Quellenangabe, und schreibt sie anscheinend sich selbst zu. Ich hätte diese Mitteilung überhaupt nicht berührt, wenn sie nicht in einer sehr geachteten Zeitschrift erschienen wäre.

Form, die wir der beiderseitigen Resektion in unserer Arbeit gegeben haben.

Th. Frazier zieht in einer Mitteilung über 100 Kropfoperationen die Unterbindung der Gefäße des obern Poles derjenigen der Arteria thyreoidea inferior vor, weil man bei der ersteren nicht Gefahr laufe, Nerven mitzufassen.

Rogers, von New-York (zitiert bei Ginsburg), dessen Originalarbeit mir nicht zugänglich war, teilt 37 Fälle von Basedowscher Krankheit mit, in denen er alle 4 Schilddrüsenarterien ohne Nachteil unterbunden habe. Die Inferior wurde beiderseits durch je einen senkrechten Schnitt hinter dem untern Ende des Kopfnickers aufgesucht, also nach der alten Drobnik-schen Methode.

N. Ginsburg bestätigt auf Grund seiner anatomischen Untersuchungen, daß die Inferior meist größer ist als die Superior.

In einer Übersichtsarbeit über die gegenwärtige Technik der Kropfoperation tritt Alamartine wieder für die Drobnik'sche Methode: Unterbindung der Arth. thyreoidea inferior in ihrem aufsteigenden Teile ein, mit Eindringen an der Außenseite des Kopfnickers. Er gibt allerdings nicht an, inwieweit er diese Methode auch an Lebenden angewandt hat. Für einfache Enukleationen verwirft er die vorgängige Unterbindung, weil dieselbe überflüssig sei und — nach der von ihm angegebenen Methodik allerdings — unnötig ausgedehnte Schnitte und Gewebstrennungen erfordere. Die Vorteile der extrafascialen Unterbindung der Inferior vom Innenrande des Kopfnickers her berührt er nicht, trotzdem er unsere diesbezügliche Arbeit kurz erwähnt. Auch an der Durchtrennung des Isthmus hält er fest, und bespricht die Blutstillung bei derselben. Für gefäßreiche Kröpfe empfiehlt er als Hauptmethode die ausgedehnte Unterbindung der Arterien, fügt aber bei, daß ihre Resultate bei der geringen Zahl der bisher beobachteten Fälle noch wenig bekannt seien. Bei knotigen Kröpfen wird möglichst viel enukleiert; bei diffusen Strumen ein- oder beidseitig reseziert.

Iversen zeigt sich in seiner wertvollen Studie über das Verhältnis der Glandulae parathyreoideae bei Struma und Morbus

Basedowii noch immer von der Furcht vor den Folgen der Unterbindung der untern Schilddrüsenarterien beherrscht, so daß er, wie übrigens auch Kocher am Berliner Chirurgenkongreß von 1912, vor der beiderseitigen Unterbindung derselben warnt.

Schloffer äußert sich im selben Jahre auch dahin, daß er eine Unterbindung der A. thy. inf. mit Rücksicht auf Rekurrens und Epithelkörperchen bei gewöhnlichen Kröpfen und bei Basedowkropf zu vermeiden trachte. Er hält es gerade bei Basedowkropf mit Rücksicht auf die Tetaniegefahr für besonders wichtig, die Epithelkörperchen in keiner Weise zu gefährden und deshalb auf die Unterbindung der A. thy. inf. zu verzichten.

N. Petrow empfiehlt dagegen unsere Methode auf Grund der an 14 Fällen gemachten Erfahrungen.

Wertvoll war es mir endlich, von verschiedenen Kollegen mündlich zu erfahren, daß sie sich meiner Methode bedienen, und mit ihr dieselben Erfahrungen gemacht haben, wie ich selbst. In der chirurgischen Abteilung eines mir bekannten Kollegen hat sich die Operation der geringen Blutung wegen als die „Viertupferoperation“ eingebürgert. Anderen mündlichen Mitteilungen entnehme ich, daß dem einen und anderen Kollegen die Fascienverhältnisse einige Schwierigkeiten bereiteten.

Bevor wir auf die Besprechung unserer Resultate eingehen, wollen wir noch einige anatomische Erwägungen vorausschicken.

1. Ergänzung unserer anatomischen Untersuchungen.

In meiner ersten Arbeit hatte ich gezeigt, daß der Kopfnicker, die kleinen Schilddrüsenmuskeln und die Schilddrüse selbst je von einem Spaltraum umgeben sind, der sich getrennt von den übrigen injizieren läßt. Um die Beziehungen der Fascien und Spalträume zu den Muskeln, den Halseingeweiden und den großen Gefäßen darzustellen und damit auch schöne Demonstrationspräparate zu gewinnen, ging ich an sechs Leichen in folgender Weise vor:

Vorerst wurde von den Achselgefäßen aus nach Abschluß der Gefäße des oberen Mediastinum das Arteriensystem mit zinnober-

roter, das Venensystem mit ultramarinblauer Gelatine injiziert. Nach Erstarren derselben wurden, in zwei Versuchen durch Freilegung von kleinen Schnitten aus, in den übrigen Versuchen durch Einstechen einer langen Hohnadel in verschiedene Tiefen die verschiedenen Spalträume des Halses mit geklärter 20proz. Gelatine soweit injiziert, daß der ganze Hals diffus anschwellt. Nach völligem Erstarren der Gelatine wurde aus dem eisgekühlten Halse in der Höhe des sechsten bis siebenten Halswirbels eine ungefähr $2\frac{1}{2}$ cm dicke Scheibe herausgeschnitten, nach Kayserling konserviert und sodann in klare Gelatine eingegossen.

Es kam dabei nicht so sehr auf die getrennte Darstellung der einzelnen Spalträume an, da für alle die gleiche ungefärbte Gelatine benützt wurde, als auf das Sichtbarmachen der Fascien selbst. Es wurde also sozusagen ein hochgradiges künstliches Ödem des Halses geschaffen, und dasselbe durch Eingießung des ganzen Präparates in klare Gelatine zum Zwecke des weiteren Studiums festgehalten. Wie die beiden beigegebenen Tafeln I und II zeigen, entstehen so außerordentlich lehrreiche Präparate. Es ist selbstverständlich, daß nicht in jedem Präparate sämtliche Spalträume in gleicher Weise getroffen und damit sämtliche Fascien in gleicher Weise zur Darstellung gelangt sind. Die einzelnen Präparate ergänzen sich aber so gut, daß sich immerhin ein klares Bild von den Fascienverhältnissen gewinnen läßt. Die wichtigsten Schlüsse, die sich aus ihnen ziehen lassen, sind folgende (vgl. Taf. III):

1. Die Schilddrüse hat einmal ihre eigene, bindegewebige Kapsel, die unlösbar an ihr sitzt und mit den intraglandulären Septen zusammenhängt — Capsula propria (Epithyreoideum). Die Drüse liegt in dem leicht injizierbaren Spatium thyreoideum, das nach außen begrenzt ist von der

2. Schilddrüsenfascie (Perithyreoideum), der sogenannten äußeren Kapsel früherer Autoren. Dieselbe ist nach vorn identisch mit der hinteren Scheide des M. sternothyreoideus. Nach der Seite hin wird sie verstärkt durch das dünne vordere Blatt der Scheide dieses Muskels. Sie setzt sich durch feine Bindegewebslamellen mit der Capsula propria der Schilddrüse in Verbindung, zieht aber doch noch als kräftig ausgebildete Fascie vorn und innen an den großen Halsgefäßen vorbei an die Rückfläche der Schilddrüse. Dort verliert sie sich allmählich, d. h. sie blättert sich nach dem Oesophagus und der Trachea hin auf, in der Weise, daß ein ausgesprochenes Bindegewebslager kaum mehr zu erkennen ist. Sie trägt ferner in

Phot. F. Schneider.

Künstliche Oedematisierung der Spalträume durch Gelatine.
Struma colloides nodosa. Tuberkulöse Lymphome. Arterien rot injiziert.

Phot. F. Schneider.

Künstliche Oedematisierung der Spalträume durch Gelatine.
Zum Teil verkalkte Kropfknoten. Arterien rot, Venen blau injiziert.

Schematische Darstellung der Faszien und Spalträume der Schilddrüsengegend, nach Injektionspräparaten und Beobachtungen am Lebenden. Die Faszien sind, je nach ihrer Bedeutung, mehr oder weniger stark ausgezogen. Die Spalträume sind:

- gelb = Spatium thyroideum
- rosa = sternohyoideum
- grün = Spatium sternomastoideum
- hellblau = Gefäßspalt.

Dieselben sind schematisiert, als durch die Injektionsmasse künstlich erweitert, dargestellt.

ihrer hintern Hälfte zur Bildung des nach vorn innen gerichteten Anteils der Gefäßscheide bei. Medianwärts von der Carotis geht eine Schicht nach der Tiefe und heftet die Gefäßscheide an die tiefe Halsfascie. Nach außen von dieser Fascie liegt der Raum, den wir als *Spatium sternohyoideum* bezeichnen. Seine äußere Begrenzung wird geliefert von der

3. Umscheidung des *M. sterno-hyoideus*. Dieselbe zieht sich als ein verhältnismäßig kräftiges Fascienblatt seitwärts nach hinten und gelangt so an die Außenseiten der Vena jugularis, dort den anterolateralen Teil der Gefäßscheide bildend. Sie stellt die Scheidewand dar zwischen dem Spaltraume der kleinen Muskeln und demjenigen, in dem sich auf der Höhe unserer Schnitte der Kopfnicker befindet. Dieses Fascienblatt bedeckt also auch den *M. sterno-thyroideus*, ohne aber mit seiner dünnen äußern Fascie identisch zu sein. Diese letztere geht vielmehr, wie wir eben gesehen haben, ganz in die Schilddrüsenfascie über. Wir können also dieses Verhältnis so formulieren, daß die Scheidewand zwischen *Spatium thyroideum* und *Spatium sterno-hyoideum* (vergl. unsere frühere Darstellung) von der fasciösen Einscheidung des *M. sterno-thyroideus* geliefert ist, die Abgrenzung des *Spatium sterno-hyoideum* vom *Spatium mastoideum* dagegen von der fasciösen Hülle des *M. sterno-hyoideus*.

4. Die Gefäßscheide wird also der Hauptsache nach gebildet: nach vorn innen von den Ausläufern der Fascie des *M. sterno-thyroideus*, nach vorn außen von den Ausläufern der Fascie des *M. sterno-hyoideus*, und nach hinten von einem Blatt der tiefen Halsfascie. Dabei läßt sich eine feine Scheidewand zwischen der Loge der Arteria carotis und derjenigen der Vena jugularis sehr deutlich erkennen.

Die *A. thyroidea inferior* liegt in ihrem mehr oder weniger queren Verlaufe außerhalb der Schilddrüsenfascie und dringt erst im Bereiche ihrer Verzweigung durch dieselbe hindurch und in die Schilddrüse ein, da wo die Schilddrüsenfascie durch Abgabe von Bindegewebslamellen schon geschwächt worden ist. Ihr Stamm durchsetzt auch jenen fasciösen Ausläufer der Gefäßscheide, der dieselbe an die Hauptschicht der tiefen Halsfascie wirbelsäulenwärts anheftet.

II. Die Bedeutung dieses Verhaltens der Fascien für die operative Technik.

Unsere Untersuchungen bestätigen für die operative Technik das, was wir in unserer letzten Arbeit gesagt haben. Sie setzen noch mehr ins Licht, weshalb es bei der Aufsuchung der A. thy. inf. wichtig ist, das die kleinen Muskeln — genauer gesagt, den M. sterno-hyoideus — bedeckende Fascienblatt zu durchtrennen, sich aber nicht zwischen diese kleinen Muskeln und die Schilddrüse zu verirren. Blicke man außerhalb dieses äußeren Fascienblattes, im Spatium sterno-mastoideum, so würde man unvermeidlich auf die Vorder-Außenfläche der Vena jugularis interna gelangen, wie es nach mündlicher Mitteilung mehrfach Kollegen gegangen ist, die sich nicht genau an unsere Technik hielten. Durchtrennt man dagegen dieses Blatt im Bereich des äußeren Randes des genannten Muskels (siehe Taf. IV und V), so gelangt man ohne weiteres auf den weiter nach hinten liegenden M. sterno-thyreoides und, wenn man in derselben Schicht, nach außen von der Schilddrüsenfascie bleibt, an die innere Seite der Gefäßscheide. Hier muß man nun, um die A. thy. inf. sauber freizulegen, noch die medial nach der Tiefe verlaufenden Ausläufer der Gefäßscheide, die wir oben erwähnt haben, zum Teil stumpf mit dem Finger, zum Teil in der unten angegebenen Weise mit Pinzetten und schmalem Elevatorium durchtrennen. Diese Ausläufer sind in den meisten Fällen so dünne Bindegewebslamellen, daß man den Eindruck hat, die Arterie liege unmittelbar zutage. In allen Fällen sind aber doch einige feine Bindegewebsschichten von derselben abzuheben, um sie völlig freizulegen. Bisweilen ist dieses Bindegewebslager aber, im Gegenteil, ein dichteres, so daß das Herauspräparieren der Arterie einige Minuten sorgfältiger Arbeit erfordert.

Dies führt uns zu einigen Bemerkungen über unsere gegenwärtig benutzte Operationstechnik¹⁾.

Wir gehen noch jetzt in allen wesentlichen Punkten so vor,

¹⁾ Da die Fascienverhältnisse durch die mehr skizzenhaft gehaltenen Figuren meiner früheren Arbeit, wie es scheint, nicht genügend klar gemacht worden sind, da aber ihre genaue Berücksichtigung für die rasche und sichere Ausführung der Operation von großer Bedeutung ist, so habe ich die Hauptphasen der Operation durch Hrn. Maler Dreßler noch einmal darstellen lassen. (Taf. IV bis X.)

Haut und Platysma durchtrennt, Kopfnicker beiseite gezogen, äußere Faszie der kleinen Muskeln auf dem M. sternohyoideus längs eingeschnitten.

Äußerer Haken eingesetzt. M. sternohyoideus bloßgelegt. Darauf Eingehen mit dem Zeigefinger nach innen in die Tiefe zum Aufsuchen der A. thy. inferior.

wie dies in unserer ersten Arbeit beschrieben worden ist. Dies gilt ganz besonders vom Zugang zur A. thy. inferior. Der von

Fig. 1.

Feines 20 cm langes Elevatorium zum Freilegen der A. thy. inferior.

Halsted vorgeschlagene Zugang, durch den Kopfnicker hindurch, setzt etwas mehr Verletzung, scheint mir aber keinen Vorteil zu besitzen. Ein Blick auf Taf. I und IV—VI dürfte

dies bestätigen. Die lieber nicht allzu nackte Auslösung der Arterie aus dem umliegenden Bindegewebe nehmen wir, wie schon dort angegeben, mit einem Paar 17 cm langer stumpfer anatomischer Pinzetten vor, deren Enden keine allzu rauen Kanten aufweisen dürfen. Das Herumführen der Ligatur erleichtern wir uns dadurch, daß wir die Arterie an umschriebener Stelle von ihrer Unterlage mittels eines schnabelartigen, etwa einem langen, feinen leicht gekrümmten Elevatorium entsprechenden Instrumentes abheben (Fig. 1).

Zu dieser Vorsichtsmaßregel wurden wir veranlaßt durch einen Fall, in dem die Arterie beim sorgfältigen Herumführen der Cooper'schen Nadel einriß. Es handelte sich um ein außerordentlich sprödes Gefäß bei einem ältern Manne. Es entstand eine heftige Blutung, die allerdings durch sofortige Kompression des Arterienstumpfes, Luxation des Kropfes und durch Aufsuchen des Stammes derselben hinter der Carotis gestillt werden konnte. Der Eingriff war aber kein leichter, da Kropf und Arterie sehr tief lagen.

Gerade für solche Fälle hat sich die Benützung des schnabelartigen Instrumentes sehr bewährt. Es ist uns seither, d. h. bei mehreren hundert Unterbindungen der Arterie nur noch zweimal ein Anreißen einer brüchigen Inferior vorgekommen, übrigens ohne irgendwelche unangenehme Folgen. Bei dem einen dieser Fälle handelte es sich um eine abnorm weit thoraxwärts liegende Arterie in einem Falle von 8 Tage vorher spontan eingetretener Blutung nach außen von der Capsula propria. Die Arterie riß ein bei ihrer Auslösung aus dem noch stark blutig infiltriertem Gewebe. Sieht man der Arterie ihre schlechte Beschaffenheit an oder hat man Grund, dieselbe zu vermuten, oder ist dieselbe schwer zugänglich, so empfiehlt es sich, die Auslösung aus dem sie umgebenden Bindegewebe nicht zu weit zu treiben, und die Unterbindung nicht wie gewöhnlich mit Zwirn oder Seide, sondern mit dickem Catgut vorzunehmen, der weniger stark einschneidet.

Ist einem das Mißgeschick der Zerreißung passiert, und kann man die Arterie nicht gleich mit einer Arterienklemme fassen, so muß sie entweder mit dem Finger oder mit einem fest angedrückten Tupfer komprimiert werden, während der Kropf zur Raumgewinnung rasch im Spatium thyreoideum luxiert wird. Hat man das Coagulen von Kocher-Fonio zur Verfügung,

Innerer Haken ebenfalls eingesetzt. Arteria thyr. infer. stumpf heraus präpariert, wird in continuitate unterbunden.

Spatium sternohyoideum verlassen. Eingehen etwas mehr median durch die kleinen Muskeln und die Schilddrüsenfaszie hindurch unmittelbar auf die Schilddrüse (in das Spatium thyreoideum).
 Quere Einkerbung oder Durchtrennung der kleinen Muskeln, wenn der Raum nicht genügt.

Herunterziehen des Kropfes vor der Luxation, zur Unterbindung der A. thy. superior, bezw. ihres vorderen Astes. Liegt die Arterie sehr hoch, so wird der Kropf vor dieser Unterbindung luxiert.

Kropf luxiert. An die stärkeren Venen Klemmen angelegt. Die zu entfernende Partie
umschnitten.

Kropf durch Resektion, Enukleation oder gemischtes Verfahren entfernt. Die stärksten Venen unterbunden, ebenso der vordere Ast der A. thy. superior. Kleinere Venen in die blutstillende Naht gefaßt. Aus dem Rest ein Lappen von annähernd normaler Größe gebildet.

so scheint es mir zweckmäßig, von demselben etwas in die Wunde zu gießen. Die Bildung fester Coagula wird dadurch entschieden erleichtert. Die Hauptsache ist aber, daß man ganz ruhig einige Minuten lang komprimiert. Nimmt man dann vorsichtig den Tupfer weg, so ist es nicht schwer, die Arterie zu fassen. Ich erwähne diese scheinbar selbstverständlichen Dinge hier, weil mir von einem befreundeten Kollegen die unangenehme Lage geschildert wurde, in die er einmal durch Anreißen der Inferior geraten sei. Ich glaube nicht, daß dieses bei uns in weniger als 1 Proz. der Unterbindungen vorgekommene Ereignis ernstlich gegen die Anwendung unserer Methode sprechen dürfte. Höchstens wird derjenige, dem die nötige Übung noch fehlt, bei sehr tief liegender, wenig zugänglicher Inferior auf ihre präliminare Unterbindung und die damit verbundenen Vorteile verzichten.

Schwierigkeiten machten in einzelnen Fällen anatomische Anomalien. So kam es vor, daß trotz typischer Unterbindung die arterielle Blutung bei der Resektion des Kropfes ungewöhnlich stark war. Genaueres Nachsehen zeigte, daß sich die Arterie ausnahmsweise schon in ihrem aufsteigenden Teile in zwei große Äste geteilt hatte, von denen wir nur den einen, den oberen, unterbunden hatten. Gerade dieses Vorkommnis zeigte uns aber, wie zuverlässig durch die Unterbindung des ganzen Stammes die Blutstillung beherrscht wird. Die oben erwähnte frühe, d. h. in ihrem aufsteigenden Teile stattfindende Teilung der A. thy. inf. ist, wie wir auf Grund der Freilegung von mehreren hundert Arterien sagen können, ziemlich selten. Beinahe immer trennt sich die Arterie erst in der zweiten Hälfte ihres horizontalen Verlaufes, so daß man sie nach Seitwärtsziehen der Carotis noch ungeteilt vor sich sieht. Die auf Grund von Injektionspräparaten gemachten Angaben, daß sie da, wo sie hinter der Carotis durchgeht, meist schon geteilt sei, können wir am Lebenden nicht bestätigen. Die Teilung findet sich vielmehr hart nach innen von der Carotis, so daß man schon durch leichtes Seitwärtsziehen dieser letztern Zugang zum ungeteilt bogenförmigen Abschnitt der Arterie bekommt. Ungewöhnlich tiefe, d. h. thoraxwärts verschobene Lage der Arterie fanden wir in mehreren Fällen, und zwar beinahe immer dann, wenn sich das Unterhorn exzentrisch nach der Thoraxapertur hin ver-

größert hatte, also besonders bei intrathoracischen Strumen. In andern Fällen geht freilich der intrathoracische Anteil der Struma von dem unterhalb der Arterieneinmündung gelegenen Abschnitte der Unterhornes aus, und dann kann man unter Umständen die Arterie im Gegenteil nach oben gedrängt, ungewöhnlich hochliegend finden. Für die operative Technik von Interesse und oft eine ganz angenehme Hilfe ist es, zu wissen, daß sich Anomalien in der Lage der Inferior häufig auf beiden Seiten in gleicher Weise vorfinden.

Das völlige Fehlen der einen Inferior ist uns, wenn auch sehr selten, doch auch seit unserer ersten Mitteilung wieder vorgekommen. Ich schätze dieses Fehlen aber auf höchstens 2—3 Proz. der Fälle, so daß sich hieraus kein Einwand gegen unsere Operationstechnik ableiten läßt. Die Arterie ist dann durch eine sehr starke A. ima ersetzt.

Eine kleine Ergänzung hat unser Hakenmaterial erfahren. Die Erfahrung hat gezeigt, daß wir mit unsern frühern tiefen Haken bei großen Kröpfen nicht immer tief genug reichten. Wir haben deshalb ein Paar $6\frac{1}{2}$ cm tiefer Haken hinzugefügt, das nun auch für die schwierigsten Fälle, bei denen die Unterbindung überhaupt technisch möglich ist, ausreicht. Diese Haken werden zweckmäßig auch etwas breiter gemacht, als unser früheres Modell, d. h. 2,5 cm breit. Daß passendes Hakenmaterial für alle Unterbindungen der A. thyr. inferior wünschenswert und bei tiefem Sitz der Arterie unentbehrlich ist, das sei hier noch ganz besonders betont. Alle Kunst des Chirurgen kann hier an unzulänglichen Haken scheitern. Über eine andere kleine Modifikation in der Form des außen angelegten Hakens werden wir bei Besprechung des Schutzes des Sympathicus noch berichten.

Bezüglich des Vorgehens am Kropfe selbst ist dem von uns früher Gesagten nichts grundsätzlich Neues beizufügen. Wie oft wir die eine und die andere Methode benutzt haben, das werden wir bei Besprechung der Statistik sehen. Nur auf einen Punkt möchte ich noch einmal dringend hinweisen: Wenn man die Blutstillung der kleineren und mittleren Venenäste der Kropfkapsel der fortlaufenden Naht mit Catgut überläßt, so muß man am Schluß des Eingriffes den Patienten stets pressen lassen, damit man sieht, ob dieser Verschuß auch wirklich ein zuver-

lässiger ist. Daß dieser Akt Lokalanästhesie voraussetzt, ist selbstverständlich. Die Narkose kommt aber auch bei unseren Kropfoperationen bloß etwa in 1 Proz. der Fälle zur Anwendung.

Andererseits muß stets darauf geachtet werden, daß diese Naht nicht allzu fest angezogen wird, da sonst unnötig Gewebe zur Nekrose kommt, und da man dann genau wie bei den Quetschmethoden Abstoßung von nekrotischem Gewebe und von Ligaturmaterial und damit Fistelbildung auch ohne jegliche operative Infektion erleben kann.

III. Allgemeine Übersicht über die Statistik.

Unsere Statistik beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem unsere Methode so ausgebildet war, daß wir sie zur Normalmethode machten, d. h. mit dem 1. Juli 1911 und erstreckt sich auf die Fälle, welche bis zu Ende August 1913 zur Operation kamen, und welche wir entweder selbst nachuntersuchen konnten, oder über welche uns von ärztlicher Seite zuverlässiger Bericht gegeben werden konnte. Es betraf dies $\frac{2}{3}$ unseres Materials. Ganz besonders Gewicht legten wir auf eine zuverlässige laryngoskopische Nachuntersuchung. Dieselbe wurde denn auch in der Mehrzahl der Fälle von meinem laryngologisch vorgebildeten Assistenten, Dr. Hoessly, vorgenommen, der über die Resultate dieser Untersuchungen im Anschluß an diese Arbeit gesondert berichten wird. Die Zahl der Fälle wurde hierdurch nicht unwesentlich eingeschränkt, aber es kann nicht genug betont werden, daß nur eine auf laryngologische Nachuntersuchung gegründete Statistik für Beurteilung der Rekurrensschädigungen verwertet werden kann. Die übrige Nachuntersuchung wurde größtenteils von meinem Assistenten Herrn Dr. de Montmollin und von mir selbst vorgenommen.

Es blieben uns nach diesen Einschränkungen noch 250 Fälle zur Verwertung übrig.

In 21 Fällen waren bloß Unterbindungen vorgenommen worden, in 212 Fällen Resektionen, Enukleationen oder gemischte Eingriffe (Enukleationsresektion) zusammen mit Unterbindungen, und in 17 Fällen dieselben Eingriffe ohne Unterbindungen.

Es ergibt sich schon aus diesen drei Zahlen die Bedeutung, welche wir der bloßen Unterbindung mehrerer Gefäße und der präventiven Unterbindung derselben bei anderweitigen Eingriffen am Kropfe einräumen.

Die 21 Fälle der ersten Gruppe — bloße Unterbindungen — verteilen sich folgendermaßen:

Eine Inferior 2mal
 Beide Inferiores 2mal
 Eine Superior + eine Inferior 1mal
 Eine Superior + beide Inferiores 9mal
 Zwei halbe Superiores + beide Inferiores 3mal
 $1\frac{1}{2}$ Superior + beide Inferiores 3mal
 $\frac{1}{2}$ Superior + beide Inferiores 1mal.

Hierzu bemerken wir, daß unter $\frac{1}{2}$ Superior der vordere Ast dieser Arterie verstanden ist.

In allen Fällen von Inferiorunterbindung dieser Gruppe wurde die Operation extrafascial, also nach unserer Methode vorgenommen. Es handelt sich also um 39 Einzelunterbindungen dieser Arterie, wobei dieselbe 18mal gleichzeitig auf beiden Seiten unterbunden wurde.

In der zweiten Gruppe: Operationen am Kropf mit präventiver Ligatur, — 212 Fälle —, finden wir 44 Enukeationen, 89 Resektionen, 74 Enukeationsresektionen und 5 Excisionen von Lappen, immerhin mit Zurücklassung eines die Epithelkörperchen sichernden Stückes hinterer Kapsel. Was die dabei vorgenommenen Unterbindungen betrifft, so wurde die uns besonders interessierende Inferior 131mal einseitig und 64mal beidseitig unterbunden. Die Unterbindung wurde dabei in 176 Fällen extrafascial, also nach unserer Methode, in 26 Fällen intrafascial, also nach der alten Methode vorgenommen. Die übrigen 10 Fälle betreffen die Superior. Es ergibt sich hieraus, daß, wenn wir die Unterbindungen der ersten Gruppe hinzuzählen, die extrafasciale, also neue Methode in 197 Fällen, die alte intrafasciale Methode in 26 Fällen zur Anwendung kamen, die letztere mit anderen Worten noch in rund $\frac{1}{9}$ der Fälle. Die Gründe, welche in diesen 26 Fällen zur Anwendung der alten Methode Anlaß gaben, waren ungewöhnliche Größe des Kropfes oder ungewöhnlich tiefer Sitz der Inferior im Thorax. Endlich ist zu berücksichtigen, daß ein Teil dieser Fälle noch einigermaßen in die Zeit des Überganges fiel, wo wenigstens von meinen Assistenten bei etwas tieferm Sitz der Inferior noch nach altem System operiert wurde. Wie sehr sich das Verhältnis mit zunehmender Übung verschoben hat, das ergibt sich aus der Statistik unserer letzten 100 vor der Niederschrift dieser Arbeit (Ende 1914) unter präventiver Unterbindung der Inferior operierten Kröpfe: Hier wurde nur 5mal nach Luxation des Kropfes intrafascial unterbunden, und zwar aus folgenden Gründen:

Einmal weil die Struma retrosternal saß,
 einmal weil die Arterie direkt von unten her kam,

einmal weil man vor der Luxation beabsichtigte, auf die Unterbindung zu verzichten, und dieselbe nachträglich erst vornahm,

einmal weil bei extrafascialer Unterbindung die brüchige Arterie durchriß,

einmal ohne daß der Grund in der Krankengeschichte angegeben wäre.

Die übrigen 95 Fälle wurden nach unserer Methode unterbunden.

Es ergibt sich hieraus, daß anatomische Varietäten in der Lage und Ausbildung der Arterie und Lage und Größeverhältnisse des Kropfes nur in einem ganz kleinen Prozentsatz der Fälle die extrafasciale Unterbindung der untern Schilddrüsenarterie vor der Luxation des Kropfes unmöglich machen, und zwar bei einem Kropfmateriale, das keineswegs als leicht zu bezeichnen ist.

Für die zweite Gruppe ist ferner hervorzuheben, daß in 49 Fällen 3 und in 6 Fällen $3\frac{1}{2}$ Arterie unterbunden wurden (also 2 Inferiores, 1 Superior und der vordere Ast der andern Superior). Rechnen wir die entsprechenden Fälle der ersten Gruppe noch hinzu, so kommen wir auf 65 Fälle von Unterbindung von 3 Arterien, worunter 64mal die beiden Inferiores! und auf 9 Fälle von Unterbindung von $3\frac{1}{2}$ Arterien.

Die dritte Gruppe: Eingriffe ohne Ligatur, zählt nur 17 Fälle, worunter 7 Rezidivoperationen, 9mal handelte es sich um Enukektion, 5mal um Resektion und 3mal um gemischte Operationen.

Stellen wir die Zahlen der beiden letzten Gruppen zusammen, so kommen wir im ganzen auf 53 Enukektionen, 94 Resektionen, 77 gemischte Eingriffe und 5 Excisionen.

Was das gegenseitige Verhältnis von ein- und beidseitigen Eingriffen betrifft, so geht dasselbe aus folgender Übersicht hervor:

Einseitige Eingriffe 168

Beidseitige Eingriffe 31

Einseitige Eingriffe mit Einbeziehung des Isthmus 13

Beidseitige Eingriffe mit Einbeziehung des Isthmus 9

Eingriffe am Isthmus allein 7.

Diese Zusammenstellung bezieht sich ausschließlich auf die Eingriffe am Kropfe selbst. Zieht man auch die Ligaturen in Betracht, so beträgt die Zahl der Eingriffe an einem einzigen Lappen oder am Isthmus: 144, diejenigen der Eingriffe an beiden Lappen 106.

Wenn sich aus dieser allgemeinen Zusammenstellung irgendwelche Schlüsse ziehen lassen, so ist es wohl in erster Linie der, daß wir nicht nach irgendeiner Schablone arbeiten, sondern bloße Unterbindungen, Resektionen, Enukektionen und Enukektionsresektionen jeweilen so in Anwendung bringen, wie es die be-

sondere Form des Kropfes zu erfordern scheint. Daß wir dabei, im Gegensatze zu dem, was Alamartine von den Schweizer Chirurgen in globo sagt, gerade die einseitige Excision in den Hintergrund treten lassen und sehr ausgiebig beide Seiten berücksichtigen, das geht ebenfalls aus den oben gegebenen Zahlen hervor. Dieselben zeigen auch, daß in unserm Material nicht die leicht enukleierbaren Alpenkröpfe vorherrschen, sondern die Resektion erfordernden diffusen Strumen, bzw. die kleinknolligen Konglomeratstrumen.

Es mag auffallen, daß wir der vorgängigen Arterienunterbindung einen so breiten Raum zuweisen, und mancher wird den Einwand verschiedener Autoren unterschreiben, daß man bei einfachen Cysten und bei nicht stark vascularisierten diffusen Kolloidkröpfen auch ohne dieselben auskomme. Es ist kein Zweifel, daß die Operation sich in vielen Fällen sehr wohl ohne diese Unterbindung vornehmen läßt und sehr glatt geht. Wenn wir trotzdem so häufig präliminar unterbunden haben, so hat dies folgende Gründe:

1. Bei knotiger Struma erlebt man gelegentlich, auch wenn scheinbar alles ganz einfach ablaufen sollte, nach der Eukleation Blutungen, welche zu Umstechungen an der Hinterwand der Höhle zwingen. Gerade diese Umstechungen sind nun aber eine der Gelegenheiten, bei denen der Rekurrens so leicht zu Schaden kommt. Die vorgängige Unterbindung der Inferior schaltet die Notwendigkeit dieser Umstechungen mit größtmöglicher Sicherheit aus und vermindert dadurch die Gefährdung des Rekurrens.

2. Bei diffusen Kröpfen hat die vorgängige Unterbindung nicht nur die Aufgabe, die Blutung zu vermindern, sondern auch diejenige, das Parenchym zum Schrumpfen zu bringen, bzw. an weiterem Auswachsen zu hindern. Die Unterbindung ist also hier ein Unterstützungsmittel der Resektion und erlaubt es, diese letztere etwas weniger ausgiebig und auch mit Rücksicht auf die Epithelkörperchen schonender zu gestalten, als sie es ohne Unterbindung sein müßte.

Wir haben aus diesen beiden Gründen in den letzten Jahren absichtlich der vorgängigen Unterbindung ein großes Feld eingeräumt. Die Ergebnisse unserer Statistik werden zeigen, inwiefern dies gerechtfertigt war. Wir durften um so eher in der ange-

gegebenen Weise vorgehen, als der Einwand, daß durch die vorgängige Unterbindung der Inferior ein größerer Hautschnitt und sehr ausgedehnte Gewebstrennungen nötig seien, bei unserer Methode der Unterbindung dahinfällt. Daß die alte Drobnikische Unterbindung der Inferior nach außen vom Kopfnicker allerdings eine nicht geringe Erschwerung des operativen Eingriffs darstellt, das haben wir schon in unserer letzten Arbeit hervorgehoben und müssen es auch jetzt wieder tun. Wir glauben aber, daß diese Methode in Wirklichkeit beinahe nur noch auf dem Papier verteidigt wird.

IV. Die Resultate im Einzelnen.

Die allgemeine Statistik verlassend wollen wir nun noch auf die wichtigsten einzelnen Sonderfragen eingehen:

1. Die Nachblutungen.

Wir müssen bei der Bezeichnung: „Nachblutung“ unterscheiden zwischen dem einige Stunden dauernden Nachsickern von Blut und blutigseröser Flüssigkeit, wie es bei Resektion größerer diffuser Strumen unvermeidlich, aber auch belanglos ist, und jenen heftigen plötzlichen Nachblutungen, die vom Abgleiten einer Arterienunterbindung herrühren. Das erstere erlebt man selbstverständlich häufiger, wenn man, statt den einen Lappen glatt zu entfernen, aus beiden Lappen Teile reseziert. Wir haben es aber, dank der präventiven Arterienunterbindung nie in beunruhigendem Grade auftreten sehen. In keinem Falle unserer Statistik war eine nachträgliche Eröffnung der Wunde mit Ligatur eines Gefäßes notwendig.

Noch viel weniger haben wir eine eigentliche plötzliche Nachblutung erlebt. Eine Sicherung gegen derartige Ereignisse erhalten wir dadurch, daß alle unsere Unterbindungen größerer Kropfarterien Kontinuitätsunterbindungen sind. An der Thyreoidea inferior ist dies einigermaßen selbstverständlich. An der Superior dagegen wird von manchem Chirurgen die Arterie oberhalb des Oberhorns unterbunden und sodann durchtrennt. Wird der Stumpf etwas knapp bemessen, werden vielleicht auch noch Muskelfasern in denselben gefaßt, so kommt es nachträglich leicht zu einem Herausgleiten des Stumpfes aus der Ligatur. Es ist dies die weitaus häufigste Ursache der schweren Nachblutungen.

Sie läßt sich in einfachster Weise dadurch vermeiden, daß man mindestens ein Stückchen Oberhorn im Zusammenhang mit der Rückfläche des Lappens stehen läßt. Dadurch wird die Unterbindung zu einer Kontinuitätsunterbindung, und ein Abgleiten der Ligatur ist ausgeschlossen. Die schwere Nachblutung bei Kropfoperation ist also ein Ereignis, das sich bei richtiger Technik mit beinahe mathematischer Sicherheit vermeiden läßt. Sie ist uns in unserer chirurgischen Praxis noch nicht vorgekommen.

2. Die Tetanie.

Wie ich im historischen Abschnitte gezeigt habe, spielt die Furcht vor der Tetanie, selbst nach bloßen Unterbindungen, auch bei den erfahrensten Chirurgen immer noch eine große Rolle. Kocher spricht sich sehr bestimmt gegen die gleichzeitige Unterbindung der beiden Inferiores aus. Krecke sagt, daß eine sichere Schonung der Epithelkörperchen auf der andern Seite (d. h. nach Resektion der einen Seite mit Unterbindung der Inferior), nur dann möglich sei, wenn man erstens die Inferior der andern Seite ununterbunden lasse und zweitens die Gegend der Epithelkörperchen überhaupt nicht freilege. Mit letzterem Postulate bin ich völlig einverstanden, während die erstere Vorsicht bei unserer Unterbindungstechnik überflüssig ist. Schont man die Epithelkörperchen dadurch, daß man die Rückfläche des Lappens nicht aus der Schilddrüsenfascie ausschält, so kann man die Inferior, wenn das nützlich erscheint, ruhig beidseitig unterbinden. Die Unterbindung als solche schädigt, wenn genügend zentral ausgeführt, die Blutversorgung der Epithelkörperchen in keiner Weise. Es ist unbedingt Zeit, daß nicht mehr Fälle, die mit Tetanie gar nichts zu tun haben, wie dies noch Iversen tut, als „Tetaniefälle nach Unterbindung“ aufgeführt werden. Entweder handelt es sich, wie ich schon in meiner ersten Arbeit gezeigt habe, überhaupt nicht um Tetanie (die beiden Fälle von Roux-Kopp) oder es fand die Unterbindung so nahe am Schilddrüsen Gewebe statt, daß die Epithelkörperchen unmittelbar durch den operativen Akt geschädigt worden sind. Halsted selbst gibt dies nun für 4 seiner Tetaniefälle als Grund an. Wenn in unserer Statistik 82mal die beiden Inferiores gleichzeitig unterbunden wurden, 58mal zusammen mit einem Superior

und 9mal gleichzeitig mit $1\frac{1}{2}$ Superior, ohne daß je eine Spur von Tetanie beobachtet worden wäre, so wenig wie in noch zahlreicheren nicht in dieser Statistik enthaltenen Fällen, so dürfte wohl, dank der so ausgiebigen Kollateralzirkulation der Ausfall der Blutzufuhr aus den Schilddrüsenarterien belanglos sein, so lange noch eine oder wenigstens eine halbe Superior offen steht. Es ist sicher, daß in der Regel selbst die Unterbindung aller 4 Arterien, wenn sie an richtiger Stelle und in richtiger Weise vorgenommen wird, anstandslos vertragen würde. Wenigstens sprechen Beobachtungen verschiedener Chirurgen in diesem Sinne. Immerhin ließe es sich denken, daß bisweilen eine wenigstens vorübergehende Depression der Epithelkörperchenfunktion eintreten könnte, und wir haben deshalb den Versuch in keinem unserer Fälle gemacht. Er ist auch überflüssig, denn die Unterbindung von 3 bis $3\frac{1}{2}$ Arterien leistet alles, was man von der präventiven Blutstillung verlangen kann. Dagegen ist anzunehmen, daß die Unterbindung der 4. Arterie in einem zweiten Akte, nach Zustandekommen einer ausgiebigen kollateralen Blutversorgung wohl stets vertragen werden dürfte. Festzuhalten ist die Tatsache, daß wir die Epithelkörperchen nicht durch anatomisches Herauspräparieren schonen können, wie dies in rein theoretischer Weise Geis wollte, sondern nur dadurch, daß wir sie völlig unberührt in ihrer Umgebung lassen und die Arterienstämme möglichst weit weg von ihnen unterbinden. Es ist zu hoffen, daß sich diese Auffassung nun rascher Bahn brechen wird, nachdem der chirurgische Hauptvertreter der gegenteiligen Auffassung, Halsted, ihr auch beigetreten ist. Die exakten Beobachtungen an unsern 82 Patienten mit beiderseitiger Unterbindung der Inferior in einem Akte (eine Zahl, die sich seither ungefähr verdreifacht hat), sollte mindestens ebenso schwer in die Wagschale fallen, als theoretische Ableitungen aus Hunderversuchen und rein anatomisch, nicht physiologisch und chirurgisch gedeuteten Leichenpräparaten.

Wir wollen damit in keiner Weise den hohen Wert der anatomischen Untersuchungen über die Lage und Blutversorgung der Epithelkörperchen in Frage ziehen. Wenn sie uns auch nur einen unvollkommenen Aufschluß über die tatsächlichen Verhältnisse der Kollateralzirkulation geben, so zeigen sie uns doch, — und das

ist die Hauptsache, — welches bei Resektion von Schilddrüsengewebe die gefährliche Zone ist. In dieser Hinsicht sind ganz besonders auch die Untersuchungen von Iversen sehr dankenswert. Sie lassen uns, in Bestätigung der früheren Arbeiten, erkennen, wie ausgedehnt das Gebiet ist, in dem Epithelkörperchen gefunden werden können, und zeigen, daß es nicht genügt, nur ein kleines Stückchen Rückfläche des Lappens stehen zu lassen, wenn man nicht mit beinahe völliger Sicherheit zum mindesten eines der Epithelkörperchen opfern will. Wir haben es uns deshalb, wie schon in unserer früheren Arbeit gesagt wurde, zur Regel gemacht, wenn irgend möglich die ganze Rückfläche des Lappens, wenn auch oft nur in dünner Schicht, stehen zu lassen, und aus derselben durch Zusammenfallen wieder einen Lappen von ungefähr normaler Größe zu bilden. Dieser Vorsicht verdanken wir es, daß wir in den 40 Fällen unserer Statistik, in denen wir Teile von beiden Schilddrüsenlappen entfernten, nie auch nur eine Andeutung von Tetanie haben auftreten sehen. Diese Zahl würde sich reichlich verdreifachen, wenn wir auch diejenigen Fälle berücksichtigen würden, die wir nicht nachuntersuchen konnten und diejenigen, die wir seit dem Abschluß unserer Statistik operiert haben und bei denen ebenfalls nie Tetanie aufgetreten ist. Es mag dabei nicht zum mindesten auch der Umstand mitwirken, daß wir die Kollateralzirkulation nicht ganz unnötigerweise durch Unterbindung und Durchtrennung des Isthmus mit seinen Kollateralgefäßen beeinträchtigen. Die drei Hauptregeln unserer Technik: Vorgängige extrafasciale Unterbindung der Inferior, möglichstes Stehenlassen der ganzen Rückfläche des Lappens und möglichste Vermeidung der Unterbindung des Isthmus erlauben uns also, ohne Tetanie befürchten zu müssen, bei beiderseitigen Strumen auch beide Lappen zu reseziieren und den Eingriff trotzdem zu einem möglichst blutleeren, harmlosen zu gestalten.

Es ist selbstverständlich, daß wir gleichwohl die Gefahr der Tetanie nie aus dem Auge verlieren dürfen. Die Regel von Halsted bleibt deshalb immer noch beherzigenswert, daß die Operation an dem ersten Lappen so ausgeführt werden sollte, als wenn die Operation an dem zweiten bestimmt in Aussicht genommen wäre. Wenn die Erhaltung der Epithelkörperchen auf der einen Seite infolge besonderer anatomischer Verhältnisse nicht als ge-

sichert erscheint, so ist selbstverständlich die andere Seite besonders sorgfältig zu behandeln. Es geschieht dies übrigens nicht nur wegen der Gefahr der Entfernung von Epithelkörperchen, als auch deshalb, weil dieselben unter Umständen schon bei den Luxationsmanövern, wenn der Kropf retrosternal oder retrovisceral liegt, wenigstens vorübergehend durch Zerrung oder Druck geschädigt werden können. Daß nie die beiden Unterhörner völlig entfernt werden sollten, darin sind wir mit Kocher völlig einverstanden. Wenn man aber die Resektion beiderseits durch vorgängige Gefäßunterbindung unterstützt, so ist es auch leichter, sie schonend auszuführen.

Eine besondere Stellung nehmen mit Rücksicht auf die Epithelkörperchen die Rezidivoperationen ein, hauptsächlich, wenn die erste Operation, wie das bei Kropf so oft der Fall ist, von anderer Seite ausgeführt worden ist und man über die Einzelheiten derselben sich vielleicht keinen genauen Bericht verschaffen kann. War, wie so häufig, auf der einen Seite die Excision ausgeführt worden, war also alles weggenommen worden einschließlich der Epithelkörperchen, so beschränken wir uns selbstverständlich auf der nachträglich kropfig entarteten oder vielleicht schon von Anfang an kropfigen andern Seite auf das Unerläßlichste. In einem einzigen derartigen, nach Abschluß unserer Statistik operierten Falle, der von anderer Seite schon 2 mal operiert worden war, und bei dem eine tiefliegende Cyste wieder zu schweren Kompressionserscheinungen geführt hatte, sah ich nach rein intraglandulärer Ausschälung der Cyste, ohne irgendwelchen Eingriff an der Rückfläche des Lappenrestes und ohne Unterbindung, während einiger Tage subjektive Sensationen auftreten, welche möglicherweise als Andeutung von Tetanie gedeutet werden konnten. Objektiv nachweisbare Erscheinungen fehlten freilich, und die genannten Sensationen schwanden nach wenigen Tagen ohne weitere Behandlung, so daß es sich höchstens um vorübergehende Zirkulationsstörungen in dem vielleicht einzigen noch vorhandenen Epithelkörperchen gehandelt haben konnte. Von einer sicher diagnostizierbaren, selbst leichten Tetanie war keine Rede.

3. Das Verhalten des Rekurrens.

Daß der Rekurrens am besten dadurch geschont wird, daß

man es sorgfältig vermeidet, ihn überhaupt zu Gesichte zu bekommen, weil er ein gegen eine Berührung nicht minder empfindliches Gebilde ist, als die Epithelkörperchen, das ist zwar noch nicht allgemein anerkannt, fängt aber doch an, den Chirurgen zum Bewußtsein zu kommen. Ich habe diesen Punkt in meiner letzten Arbeit so ausführlich besprochen, daß ich hier nicht darauf zurückkommen will. Es handelt sich nur darum, zu untersuchen, ob meine damalige Auffassung durch die Nachuntersuchung unserer Fälle bestätigt worden ist.

Vorerst einige allgemeine Bemerkungen.

Bezüglich der Lage des Rekurrens habe ich dem früher Gesagten nichts weiter beizufügen. Nur zweimal erinnere ich mich, seit meiner ersten Arbeit einen vom gewöhnlichen Verlaufe abweichende weit seitliche Lage des Rekurrens beobachtet zu haben, wobei der Nerv den Stamm der Inferior in seinem horizontalen Abschnitte nahe an der Carotis kreuzte.

Auch wenn wir von den überflüssigen mechanischen Schädigungen absehen, denen der Rekurrens bei seiner Freilegung ausgesetzt sein kann, hat er doch immer noch in zweifacher Weise Gelegenheit, zu Schaden zu kommen:

Die eine Gelegenheit wird sich nie völlig ausschalten lassen, weil sie in den anatomischen Beziehungen des Nerven und in der Notwendigkeit gewisser operativer Akte begründet ist: Ich meine die bloße Zerrung. Wenn dieselbe auch bei der Luxation gewöhnlicher Kröpfe und Kropfknoten nicht eine derartige ist, daß sie den Nerven schädigen würde, so ist diese Gefahr unbedingt vorhanden, wenn Kropfteile retrosternal oder retrovisceral sitzen, besonders noch, wenn sie durch alte Entzündungsprozesse oder infolge anhaltenden Jodgebrauchs abnorm fest mit der Umgebung verwachsen sind. Je häufiger in einem Kropfmaterial derartige Fälle sind, umso öfter wird man also auch jene leichtesten Formen der Rekurrensschädigung beobachten, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Ganz besonders unangenehm ist die Situation, wenn sich Teile einer retrovisceralen Struma so um den Rekurrens herumgelegt haben, daß derselbe bei der Luxation mit emporgezogen wird. Beobachtungen, wie die folgende, sind jedem Kropfoperateur, der über ein großes Material verfügt, des öftern begegnet:

Tiefer, gleichzeitig retrotrachealer Kropf. Stimme nach extrafascialer Unterbindung der Inferior völlig klar. Luxation des Kropfes. Sofort völlige Aphonie. Der Rekurrens wird nun -- ausnahmsweise -- zur Kontrolle mit der größten Schonung bloßgelegt und findet sich intakt. Resektion des Lappens in gewohnter Weise. Gegen den Schluß der Operation gewinnt Stimme allmählich wieder an Klang, und als die Patientin, sofort nach der Operation, laryngoskopisch untersucht wird, funktionieren beide Stimmbänder völlig normal.

Diese prompte Wiederherstellung ist aber nicht die Regel. Häufiger beobachten wir folgendes:

Die im Momente der Luxation entstandene Aphonie oder Heiserkeit geht zwar schon im Verlauf der Operation wieder etwas zurück, aber wir finden bei der nachherigen laryngoskopischen Untersuchung Medianstellung des völlig fixierten oder nur wenig beweglichen Stimmbandes. Die Schädigung war also eine schwerere, aber auch sie geht im Verlaufe der Zeit wieder zurück. Dieser letztere Begriff ist nun freilich ein sehr dehnbarer, und die Parese kann unter ganz allmählicher Besserung Wochen, Monate, ja mehr als ein Jahr anhalten, um sich schließlich doch noch auszugleichen. Auch nach Rückkehr der Beweglichkeit des Stimmbandes bleibt oft längere Zeit Ermüdbarkeit beim Sprechen und Unmöglichkeit des Singens zurück. Oft sind die funktionellen Störungen bei derartiger Zerrung so geringe, daß wir sie am Klang der Stimme nicht erkennen, und daß sie nur durch die laryngoskopische Untersuchung klargelegt werden. In andern Fällen aber täuscht uns umgekehrt eine intermittierende oder anhaltende Heiserkeit Schädigung des Rekurrens vor, wo eine solche nicht vorhanden ist. Es gilt dies besonders von katharrhalischen Internusparesen, und von rein funktionellen, meist hysterischen Störungen.

Es wurde uns eine Patientin mit walnußgroßem retrovisceralem Knoten zugeführt, die an Anfällen von heftigem Stridor litt, trotzdem bei der zwischen den Anfällen vorgenommenen laryngoskopischen Untersuchung nichts Abnormes zu finden war. Die Anfälle erreichten bisweilen einen geradezu unheimlichen Charakter, und waren bis zur Operation derart, daß der Eingriff geradezu als dringlich erschien. Wir dachten freilich mit Rücksicht auf den laryngoskopischen Befund schon damals an eine reflektorische Beeinflussung durch den retrovisceralen Knoten, etwa im

Sinne einer Reizung der beidseitigen Fasern der Glottisverengerer. Am Schluß der Operation war die Atmung völlig frei, der Stridor wie weggeblasen. Gegen Schluß der Rekonvaleszenz trat er aber wieder ein, trotzdem das laryngoskopische Bild zwischen hinein völlig normal blieb, die Beweglichkeit beider Stimmbänder unverändert war, und trotzdem das seitliche Röntgenbild zeigte, daß der Knoten wirklich völlig entfernt war. Daß es sich hier um einen rein hysterischen Zustand handelte, das liegt auf der Hand.

Bei der zweiten Gruppe von Schädigungen wird der Nerv nicht nur indirekt durch Zerrung beschädigt, sondern unmittelbar, indem er entweder bei der Unterbindung der Inferior, oder bei Unterbindungen oder Umstechungen an der hintern Kapsel gefaßt oder bei der Auslösung von verwachsenen Knoten oder schwartigen Cysten angerissen wird. Die Beeinträchtigung der Funktion ist in diesen Fällen gewöhnlich schon von Anfang an eine viel schwerere, und wir finden deshalb am Schluß der Operation nicht bloß Posticusstellung, sondern Fixation in Kaderstellung. Weniger schwer ist die Schädigung bei bloßer Quetschung des Nerven durch Arterienklemmen, bei hastiger Blutstillung an der hintern Kapsel, oder, wenn der Nerv in eine Ligatur gefaßt, aber gleich wieder aus derselben befreit wird. Eine Innervationsschwäche kann aber auch hier jahrelang zurückbleiben.

Zur Vermeidung der Schädigungen dieser zweiten Gruppe kann die operative Technik viel beitragen. Einmal fallen die Schädigungen bei der Ligatur der Inferior ohne weiteres dahin, wenn diese Unterbindung extrafascial vorgenommen wird. Wir haben denn auch in unsern 250 Fällen und auch in mindestens ebenso vielen Fällen seither keine einzige Rekurrenslähmung im Anschluß an die extrafasciale Ligatur selbst zu verzeichnen. Auch die Schädigungen durch zu hastige Blutstillung an der hintern Kapsel fallen weg, wenn die Inferior vorher regelrecht unterbunden worden ist. Es bleiben also nur noch diejenigen Schädigungen übrig, welche auf Auslösungen von verwachsenen Lappen oder Knoten, besonders von Cysten mit schwartiger Wand zurückzuführen sind, von malignen Strumen selbstverständlich abgesehen. Hier kann es vorkommen, daß das gesamte Schilddrüsengewebe der Rückseite atrophisch geworden ist, so daß sich der Rekurrens unmittelbar an der Rückfläche der Cystenwand findet, mit derselben je nach

den stattgehabten entzündlichen Zuständen mehr oder weniger fest verwachsen. Einem solchen Zufalle ist denn auch der einzige Rekurrens zum Opfer gefallen, dessen bleibende Schädigung wir in unserer Statistik bei 276 extrafascialen Einzelunterbindungen der Inferior an 197 Fällen erlebt haben.

Wie aus der Zusammenstellung meines Assistenten, Herrn Dr. Hoessly, hervorgeht, hat die Nachuntersuchung unserer 250 Fälle 8 in Besserung begriffene, aller Wahrscheinlichkeit nach auf Zerrung, einmal auch Quetschung, zurückzuführende Paresen und 3 endgültige Lähmungen ergeben. Diese letzteren stellen 1,2 Proz. des gesamten Materials dar, also das beste Ergebnis der bis jetzt veröffentlichten, auf systematische Nachuntersuchung begründeten Statistiken. Zwei dieser völligen Lähmungen ereigneten sich bei intrafascialen Unterbindungen. Es handelte sich dabei um ganz besonders schwierige, große Kröpfe, bei denen der Arterie vor Luxation des Kropfes ihrer Lage wegen nicht beizukommen war. Auf die 197 Fälle von extrafascialen Unterbindungen ereignete sich die einzige oben erwähnte definitive Schädigung des Rekurrens, was einem Prozentsatz von 0,5 Proz. entspricht, oder 0,36 Proz. pro Einzelunterbindung.

Auch diese Resultate sind gewiß noch einer Verbesserung fähig. Immerhin beweisen sie, daß unsere Operationsmethode dem Rekurrens schon jetzt einen weitergehenden Schutz gewährt, als die bisher gebräuchlichen Methoden. Die einzige Statistik, welche annähernd ebenso gute Resultate aufweist, diejenige von R o u x (mitgeteilt von D u m o n t jun.) nämlich 1,38 Proz. bleibende Lähmung, unterscheidet sich von der unsrigen dadurch, daß der präventiven Unterbindung dort ein geringerer, der Enukleation ein größerer Spielraum eingeräumt wurde. Unsere Technik gibt größere Freiheit für die präventive Unterbindung einerseits und für den Eingriff am Kropfe andererseits. Es gereicht uns deshalb zu ganz besonderer Genugtuung, daß auch mit dieser Erweiterung und damit scheinbar größeren Gefahr für den Rekurrens unsere Resultate zum mindesten nicht hinter diejenigen der so vorzüglichen Technik und operativen Geschicklichkeit von R o u x zurückstehen.

4. Sympathicusstörungen.

Merkwürdigerweise ist dem Verhalten des Sympathicus bei Struma und bei Kropfoperationen bis jetzt nur sehr wenig Be-

achtung geschenkt worden. Größere statistische Zusammenstellungen über den Befund ante operationem liegen nicht vor, und auch in den Zusammenstellungen der Operationsergebnisse ist von keinem Autor hierauf systematisch geachtet worden, mit Ausnahme von P a m p e r l. Dieser letztere teilt ganz kurz seine diesbezüglichen Beobachtungen aus der Schlofferschen Klinik in Innsbruck mit.

Die anatomischen Verhältnisse bringen es mit sich, daß wir uns bei der Unterbindung der Inferior zwischen Scylla und Charybdis befinden. Je weiter wir vom Rekurrens und den Epithelkörperchen abrücken, um so mehr nähern wir uns dem Sympathicus, dessen beide untern Halsganglien sich hinter der Carotis am Übergang des aufsteigenden in den queren Abschnitt der Arteria thyroidea inferior befinden. Die Ganglien liegen hinter der genannten Arterie, ebenso der Hauptstamm des Sympathicus, doch geht eine Verbindungsart der beiden Ganglien vor der Arterie durch, so daß dieselbe in einer Sympathicusschlinge gefangen liegt. Diese Schlinge enthält nun auch die Fasern, welche als okulopupillare zum Ganglion ciliare hinziehen. Wir haben schon in unserer ersten Arbeit darauf aufmerksam gemacht, daß der Sympathicus an dieser Stelle durch den Druck des die Carotis nach außen ziehenden Hakens geschädigt werden könnte, wenn der Haken zu sehr auf die Wirbelsäule gestemmt wird. Die weitere Beobachtung und die Nachuntersuchung unserer Patienten hat dieser Vermutung recht gegeben. Die genauere Beobachtung der einzelnen Fälle hat uns ferner gezeigt, daß als postoperative Sympathicuserscheinungen von einiger Zuverlässigkeit bloß die Pupillenverengung und die sympathische Ptose, also die Lidverengung in Frage kommen. Anderweitige Symptome, wie vasomotorische Störungen, Anomalien in der Schweißsekretion, in der Tränsekretion fehlen entweder, oder sind so flüchtig und undeutlich ausgeprägt, daß sie sich nicht diagnostisch verwerten lassen. Es wurde deshalb bei der Nachuntersuchung ganz besonders auf die genannten beiden Punkte: Pupillendifferenzen und Lidspaltdifferenzen geachtet.

Leider war die Untersuchung der Patienten vor der Operation, weil, wie selbstverständlich, zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Assistenten besorgt, nicht mit derselben systema-

tischen Gleichförmigkeit vorgenommen worden, wie die Nachuntersuchung. Besonders war auf geringfügige Pupillendifferenzen nicht geachtet worden, während bei der Nachuntersuchung, die hauptsächlich von meinen Assistenten Dr. Hoessly und Dr. de Montmollin sehr sorgfältig besorgt wurde, auch die geringste Ungleichheit mitgezählt, und ganz besonders auch darauf geachtet wurde, daß die Untersuchung bei gedämpftem Lichte geschah, weil bekanntlich ein großer Teil der Pupillendifferenzen bei hellem Tageslicht nicht in die Erscheinung tritt. Eine Vergleichung der Untersuchungsergebnisse vor und nach der Operation ist also in diesem Punkte nicht möglich. Um diese Lücke auszufüllen, haben wir bei einer Reihe von 100 zufällig gewählten Patienten unserer Abteilung mit den verschiedensten Erkrankungen vergleichende Messungen beider Pupillen und Lidspalten unter den angegebenen Bedingungen vornehmen lassen. Diese von Frl. cand. med. Engler vorgenommenen Untersuchungen ergaben, daß bei gedämpftem Tageslicht Pupillendifferenzen von 0,5—1 mm in 18 Fällen zu beobachten waren, und zwar 14 mal verbunden mit einer gleichzeitigen Verkleinerung der Lidspalte um 1—2 mm auf der Seite der größeren Pupille. Verengerung einer Lidspalte bei Pupillengleichheit fand sich 9 mal vor.

Bei unsern Nachuntersuchungen nach Kropfoperation fanden wir, auch die allerleichtesten Unterschiede bei gedämpfter Beleuchtung mit eingerechnet, Anisocorie in 29 Fällen, d. h. in 11 Proz. der Gesamtzahl. Da diese Zahl bedeutend hinter derjenigen zurückbleibt, welche wir bei unserer Vergleichsstatistik erhoben, so können Kropf und Kropfoperation als Ursachen der Ungleichheit nicht wesentlich ins Gewicht fallen, und zwar um so weniger, als die engere Pupille sich durchaus nicht immer auf der Seite des Kropfes oder der Kropfoperation fand, wie dies bei einem lähmenden Einfluß auf den Sympathicus zu erwarten wäre. Es muß also zur Diagnose der Sympathicusläsion zum mindesten noch ein zweites Symptom herbeigezogen werden, nämlich die gleichsinnige Verkleinerung der Lidspalte bzw. die sympathische Ptose. Wir halten uns also nur dann für berechtigt, eine mechanische Schädigung des Sympathicus anzunehmen, wenn sowohl Miosis als Ptosis oder wenigstens Lidspaltenverengerung auf der operierten Seite nach dem Eingriffe aufgetreten sind. Dies

war nur in dem von uns nachuntersuchten Material im ganzen 4 mal der Fall. Wir wollen die Fälle hier, der Bedeutung der Frage wegen, ganz kurz charakterisieren:

Fall 1. E. D. St., 17 Jahre alt, Mechaniker. Struma nodosa. Operation 13. XII. 1911. Nachuntersuchung 2 Jahre später.

Operation: ENUKLEATION eines linksseitigen Knotens mit extrafascialer Unterbindung der Inferior.

Befund bei der Nachuntersuchung: Pupillenreaktion beiderseits gut, dagegen sowohl die linke Pupille als die linke Lidspalte um je $\frac{1}{2}$ mm verkleinert.

Es handelt sich also hier um einen sehr leichten Fall, bei dem die Veränderung nur durch genaue Untersuchung nachgewiesen werden konnte.

Fall 2. A. Z., 18 Jahre alt. Struma nodosa cystica. Operation 7. IV. 1913. Nachuntersuchung 5. VI. 1914.

Die Operation hatte in linksseitiger ENUKLEATION und in Unterbindung der linken Superior und der beiden Inferiores bestanden.

Die linke Lidspalte ist deutlich enger als die rechte und die linke Pupille bei guter Reaktion 1 mm enger als rechts.

Auch hier ist die Veränderung eine sehr geringfügige.

Fall 3. Frau L., 46 Jahre alt. Morbus Basedowii. Operiert am 18. IV. 1912. Nachuntersuchung am 11. XI. 1913.

Die Operation hatte in ENUKLEATION und RESEKTION rechtsseitig bestanden, mit Unterbindung der rechten Superior und extrafascialer Unterbindung der beiden Inferiores.

Die linke Lidspalte ist enger als die rechte, die Pupille um $\frac{1}{2}$ mm enger als rechts. Die Reaktion ist auf beiden Seiten gut, auch hier sind die Veränderungen sehr geringen Grades.

Fall 4. R. T., 36 Jahre alt. Struma parenchymatosa retrosternalis partim nodosa. Operation 30. XI. 1911. Nachuntersuchung 26. V. 1914.

Rechts Ptosis und Miosis bei erhaltener Pupillenreaktion. Pupillendifferenz bei gedämpftem Licht ca. 2 mm.

In 2 andern Fällen waren Ptosis und Miosis schon vor der Operation beobachtet worden. Dieselben zählen also hier nicht mit. Bei den 4 oben genannten Fällen ist in der Krankengeschichte vor der Operation nichts von Sympathicusveränderungen vorgemerkt. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß beim einen oder andern Fall die sehr geringfügigen Erscheinungen übersehen worden sind. Diese Möglichkeit liegt umso näher, als dieser Symptomenkomplex: Miosis von höchstens 1 mm Unterschied und Lidspaltenverengung bis 2 mm sich in 14 Proz. der

Fälle unserer Vergleichsstatistik ohne jegliche Operation vorfand. Wenn wir also diese leichten Veränderungen in unseren Fällen von Kropfoperation dieser letzteren zur Last legen, so geschieht es einmal, weil die Veränderungen sich auf der Seite der Ligatur fanden, und um unsere Statistik in keiner Weise günstiger erscheinen zu lassen als sie es bei Anlegung des strengsten Maßstabes sein müßte. Es ergibt sich also aus den 3 fraglichen und 1 sicheren Schädigung des Sympathicus ein Prozentsatz von 1,6 Proz. möglicher Beeinträchtigung dieses Nerven. Daß diese Gefährdung des Sympathicus wirklich besteht, das haben uns auch noch nach der hier berücksichtigten Operationsreihe mehrere Fälle gezeigt, in Übereinstimmung mit 2 Beobachtungen, die uns von einem benachbarten Kollegen mitgeteilt und zur Mitverwertung zur Verfügung gestellt worden sind. Dieselben werden ebenfalls in der Arbeit von Dr. Wölfflin (s. u.) mit berücksichtigt werden.

Der Sympathicus ist also entschieden bei extrafascialer Unterbindung der Arterie mehr gefährdet als bei der allgemein gebräuchlichen intrafascialen Unterbindung. Berücksichtigt man die anatomischen Verhältnisse, so erscheint es, wie wir schon in unserer ersten Arbeit gesagt haben, als unwahrscheinlich, daß die Fasern des Sympathicus oder die in ihn eingeschalteten Halsganglien direkt verletzt werden. Diese Gefahr läge vor, wenn man die Arterie weiter außen, an der von Wölfer, Drobnik Almartine empfohlenen Stelle unterbinden wollte. Almartine bemerkt denn auch in der Tat, daß man bei Anlaß der Unterbindung, wenn man es wünscht, bei Basedowkropf gleich auch den Sympathicus durchtrennen könne. Diejenigen Sympathicusfasern, welche bei der Unterbindung des horizontalen Teiles bzw. des Bogens der Inferior getroffen werden können, haben keine Bedeutung für die Augen, sondern sind vasomotorische Fasern für die Schilddrüse selbst, deren Unterbindung zum mindesten nicht schädlich sein dürfte. Die Ursache der Schädigung der Augenfaseru muß vielmehr entweder im Druck von seiten des Hakens oder in Zerrung liegen, das eine und andere besonders in denjenigen Fällen, in denen die Carotis sehr stark beiseite gezogen werden muß, d. h. in denjenigen, in welchen das Gefäßbündel weit von der Struma überlagert ist. Da die Frage auch

ophthalmologisches Interesse hat, so hat sich Herr Privatdozent Dr. Wölfflin in Basel als Ophthalmologe der Arbeit unterzogen, im Verein mit Herrn Prof. Dr. Metzner, Vorsteher des physiologischen Instituts, die traumatischen Schädigungen des Sympathicus klinisch und experimentell zu untersuchen.

Aus ihrer kürzlich erschienenen Arbeit¹⁾ geht hervor, daß bei ihren sämtlichen Versuchstieren sich die okulopupillären Symptome auch nach mehrmonatlicher Beobachtung nie vollständig zurückbildeten, wenn der Sympathicus oberhalb des Ganglion cervicale super. durchschnitten wurde. Wenn sie durch verschieden starke Quetschungen mittels anatomischer Pinzetten den Halssympathicus lädierten, so verschwanden in den meisten Fällen die vaskulären Symptome nach einiger Zeit, während die okulopupillären bestehen blieben. Bei einer weiteren Versuchsanordnung dehnten sie den möglichst vorsichtig freigelegten Halssympathicus durch verschieden große Gewichte, um dadurch den ausgeübten Druck genauer bestimmen zu können. Es wurde um den Nerven ein freier Faden geschlungen und an dessen Ende das betreffende Gewicht angehängt, wobei der Faden zur möglichsten Vermeidung von Reibung über eine Rolle lief. Metzner und Wölfflin fanden nun, daß bei ihren Versuchstieren (Kaninchen) eine Belastung von ungefähr 10 g während einer Minute dasjenige Maximum darstellt, welches ohne Reaktionserscheinungen von seiten des Nerven vertragen wird. Wurden die angehängten Gewichte wesentlich erhöht (15–20 g während 1 Min.), so treten regelmäßig vaskuläre und okulopupilläre Symptome auf, von denen die letztern nur in einigen Fällen sich wieder vollständig zurückbildeten.

Mit diesen Ergebnissen stimmt die klinische Erfahrung überein, daß in den von Dr. Wölfflin bis jetzt länger beobachteten Fällen von Druckschädigung bei Kropfoperationen ein Schwinden der Sympathicussymptome auch nach einem bis zwei Jahren noch nicht eingetreten ist.

Ich verweise für alle Einzelheiten auf diese Arbeit, da ich Herrn Wölfflin das ganze Material unserer Klinik, also auch einige nicht zu dieser Operationsreihe gehörenden Beobachtungen von Sympathicusstörungen bei Strumektomie, bei anderweitigen Eingriffen am Halse und bei nicht-operativen Verletzungen zur Verwertung übergeben habe.

¹⁾ Klinische und experimentelle Untersuchungen über Halssympathicuslähmung von Prof. Metzner und Privatdozent Dr. Wölfflin, Graefes Archiv 1915.

Es läßt sich nun noch die Frage aufwerfen, ob der oben gegebene Prozentsatz von im Maximum 1,6 Proz Sympathicuspareesen bzw. Lähmungen der okulopupillaren Fasern für uns ein Grund sein könnte, von unserer Methode abzugehen. Wir sind nicht dieser Ansicht. Einmal mag daran erinnert werden, wie schonungslos von einzelnen Chirurgen (Jaboulay, Jonnesco, Alexander u. a.) mit dem Sympathicus bei verschiedenen Erkrankungen, wie Basedowsche Krankheit, Glaukom, Epilepsie, verfahren worden ist. Wenn wegen Basedowschem Kropf der Halssympathicus

Fig. 2.

Zum Schutze des Sympathicus ausgeschnittener Wundhaken.

mancherorts, unbekümmert um die funktionellen Ausfallerscheinungen, kurzweg geopfert wird, so kann eine Operationstechnik nicht verurteilt werden, bei der der Sympathicus einmal auf 60 Fälle Gefahr läuft, durch Druck etwas geschädigt zu werden.

Andererseits darf uns die Tatsache, daß der Sympathicus zu therapeutischen Zwecken von manchen kurzweg geopfert wird, nicht davon abhalten, dem Nerven die nötige Schonung angedeihen zu lassen. Eine erste Schutzmaßregel wäre die, daß man, um Raum zu gewinnen, mehr die Struma nach innen zieht, als die Carotis nach außen, soweit wenigstens die Atmungsverhältnisse dies erlauben. Eine andere Schutzmaßregel kann in besserer Konstruk-

tion der Haken liegen. Wir haben deshalb unseren nach außen angelegten Haken so abgeändert, daß er der Wirbelsäule nicht mit einer längern Kante anliegt, sondern sich bloß an 2 Punkten auf dieselbe stützt (Fig. 2). Die Gefahr für den Sympathicus, zwischen Haken und Wirbelsäule gequetscht zu werden, wird dadurch ganz erheblich vermindert. Wir werden bei späterer Gelegenheit über die Erfolge dieser Maßnahmen Mitteilung machen.

5. Das funktionelle Resultat der Operation.

Wir trennen die Besprechung der funktionellen Resultate von derjenigen der Rezidive, weil die beiden Fragen sehr oft unabhängig voneinander sind: Es gibt Rezidive ohne Funktionsstörung und Funktionsstörungen ohne Rezidive, letzteres entweder einfach wegen unvollständiger Operation, oder als Äußerungen einer Neurose, oder als Folge anderweitiger Störungen, besonders von seiten des Herzens und der Lunge, die vom Patienten aber dem einstigen Kropfe zugeschrieben werden.

Wir beginnen mit den Störungen der Atmung. Wir finden solche vor der Operation in 204 Fällen angegeben. Bei der Nachuntersuchung finden sich 185 Patienten (91 Proz. derselben oder 74 Proz. der Gesamtzahl) völlig beschwerdefrei, in 54 Fällen (26 Proz. der Fälle mit Beschwerden, oder 22 Proz. der Gesamtzahl) wird angegeben, die Beschwerden seien seit der Operation geringer, und 11 mal (5,4 Proz. der Fälle mit Beschwerden, 4,4 Proz. der Gesamtzahl) wird angegeben, die Beschwerden seien unverändert geblieben. Interessant ist es, mit diesen Zahlen die von Dr. Hoessly gemachten Beobachtungen zu vergleichen: 148mal war vor der Operation Trachealkompression im tracheoskopischen Bilde nachweisbar, bei den Nachuntersuchungen dagegen bloß mehr in 12 Fällen.

Wenn wir uns die ungebesserten Fälle noch genauer ansehen, so ergibt sich folgendes:

Dreimal ergab sich ein laryngoskopischer Befund, der die Beschwerden einigermaßen erklärte, wenn schon auch hier dem laryngoskopischen Bilde nach eine deutliche Besserung eingetreten ist. In 8 Fällen gab dagegen das laryngoskopische Bild keine Erklärung für die angeblich noch bestehenden Atembeschwerden, so daß für dieselben entweder der Zustand des Herzens oder der Lunge oder nervöse Einflüsse verantwortlich gemacht werden müssen. Letzteres war besonders bei einer Patientin sehr ausgesprochen der Fall. An-

haltspunkte für intrathoracische, bei der Laryngoskopie nicht sichtbare Kompression lagen in diesen 8 Fällen nicht vor. Die gegenwärtig im Gange befindlichen Röntgennachuntersuchungen werden uns darüber noch bestimmteren Aufschluß geben.

Bezeichnend für die Bedeutung mancher nach der Operation angegebenen Atembeschwerden ist folgende nicht zu dieser Operationsreihe gehörige Beobachtung: Ein 62jähriger nervöser Mann kommt wegen einer die Luftröhre hochgradig verdrängenden und komprimierenden tiefen Cyste zur Operation. Nach dem Eingriffe sofortiges Schwinden der Atembeschwerden für einige Zeit. Dann berichtet der Mann wieder über schwerste Atemnot und hält das Resultat der Operation für verloren. Die objektive Untersuchung ergibt im Spiegel- und Röntgenbilde völlige Wiederherstellung der normalen Durchgängigkeit der Luftröhre. Der Patient leidet aber an Anfällen von typischem Bronchialasthma, deren Beginn schon auf Jahre zurückreicht.

Auf die Beziehungen zwischen Atembeschwerden, Rezidiv und Schonung des Isthmus werden wir noch zu sprechen kommen.

Daß „Narbenfixation der erweichten und verengerten Trachea an der Haut, den Muskeln oder dem Sternalrand“, wie sie als Ursache nachträglicher Dyspnoe Dobberty (D. med. Wochenschr. 1914, Nr. 29) beschreibt, bei unserer Methode nicht vorkommen können, das werden wir unten noch sehen.

Was die Schluckbeschwerden betrifft, so wurden solche vor der Operation von 82 Patienten angegeben, also in etwa $\frac{1}{3}$ der Fälle. Nach der Operation finden wir solche noch in 7 Fällen verzeichnet, aber auch da nur 4 mal deutlich ausgesprochen. In den drei andern Fällen wird angegeben: „Viel weniger als vor der Operation“, „wenig noch einige Zeit nach der Operation“, oder „ein wenig beim Trinken“. Zweimal lagen deutliche Rezidive vor. In den übrigen Fällen ließ sich ein mechanischer Grund für die Schluckbeschwerden nicht nachweisen. Auch hier, wie bei den Atembeschwerden, müssen wir in einem gewissen Bruchteil von Fällen mit rein nervösen Einflüssen rechnen. Jedenfalls ist es ein günstiges Resultat, wenn ausgesprochene Schluckbeschwerden bloß in 5 Proz. der früher mit Schluckbeschwerden behafteten Fälle — in 1,6 Proz. der Gesamtstatistik — zurückblieben oder wieder auftraten. Auf die Bedeutung dieses Resultates für die Frage von der Erhaltung des Isthmus werden wir noch zu sprechen kommen.

6. Die Rezidive.

Es ist über Rezidive bei Kropfoperationen schon so viel und zum Teil so Zutreffendes geschrieben worden, daß es hier nicht der Ort ist, diese Frage noch einmal in ihrer ganzen Ausdehnung aufzurollen. Unsere Nachuntersuchungen bieten hierfür auch keine genügende Grundlage dar, da die Beobachtungszeit für viele Fälle eine zu kurze ist. Immerhin habe ich mir bei unsern Nachuntersuchungen ein Bild von dem zu machen gesucht, was sich einige Zeit nach der Operation an den Operierten beobachten läßt. Ich habe dabei von vornherein darauf verzichtet, die Fälle in solche ohne und in solche mit Rezidiv einzuteilen, weil die Abgrenzung qualitativ und quantitativ in hohem Grade eine Sache der Willkür ist, und weil auch abgesehen hiervon, wie schon verschiedentlich hervorgehoben worden ist, der Begriff des Rezidivs durchaus kein scharf abgegrenzter ist.

Theoretisch könnte man das Rezidiv in allerweitester Form so umschreiben, daß hierzu alle nach der Operation wieder eintretenden Vergrößerungen der Schilddrüse gerechnet werden. Zur Bestimmung einer solchen Vergrößerung müßten wir aber jedenfalls einen brauchbaren Schlußstatus nach Beendigung der Behandlung besitzen. Wir stoßen hier aber auf eine praktisch kaum überwindbare Schwierigkeit: Das Endresultat der operativen Schilddrüsenverkleinerung wird nicht in dem Momente erreicht, wo der Patient aus der Klinik austritt, bei uns in der 2. Woche, oft selbst schon am Ende der ersten, sondern erst, wenn die Wiederherstellung der Gewebsverhältnisse in der Tiefe eingetreten ist, und die Schrumpfung der durch Unterbindung ihrer Ernährung zum Teil beraubten Schilddrüsenabschnitte ihren Höhepunkt erreicht hat. Dies hat aber frühestens einige Wochen nach der Operation statt, d. h. zu einer Zeit, wo wir den Patienten für den Nachstatus in den meisten Fällen nicht mehr zur Verfügung haben. Wir müssen deshalb unsere Vergleichspunkte aus einer Kombination des Status ante operationem, der Angaben des Operationsberichtes und des Entlassungsstatus herleiten und daraus ergibt sich ohne weiteres, selbst abgesehen von der subjektiven Einschätzung der verschiedenen Beobachter, die Schwierigkeit einer zuverlässigen Beurteilung.

Vor allem geht aus der gegebenen Definition hervor, daß wir nicht jede nach Jahr und Tag noch nachweisbare Vergrößerung der Schilddrüse oder einzelner Teile derselben als Rezidiv bezeichnen dürfen. Wir haben uns deshalb damit begnügt unter Berücksichtigung der genaueren Anhaltspunkte und der Angaben der Patienten unsere Fälle in die folgenden 5 Gruppen einzuteilen:

1. Hals normal: 89 Fälle.
2. Hals noch etwas größer als normal, aber ohne nachweisbares Wachstum seit der Operation: 92 Fälle.
3. Diffuse Wiederzunahme des Halses nach anfänglicher postoperativer Verkleinerung der Schilddrüse: 12 Fälle.
4. Vorhandensein eines oder mehrerer Knoten von mindestens Walnußgröße im Operationsgebiete: 29 Fälle.
5. Vorhandensein eines oder mehrerer Knoten von mindestens obiger Größe auf der nicht operierten Seite: 28 Fälle.

Betreffs der ersten Gruppe haben wir nicht viel beizufügen. Für den Begriff des Normalen kam selbstverständlich nicht der Halsumfang allein in Betracht, sondern in erster Linie die Palpation. Der Umfang wurde nur, wenn frühere zuverlässige Messungen vorlagen, als Anhaltspunkt zur Vergleichung verwertet. Ein Umfang von 37 cm zum Beispiel ist bei einem kurzhalsigen Fünfziger normal, bei einer schlanken jungen Frau dagegen viel zu groß.

Die zweite Kategorie faßt diejenigen Fälle in sich, bei welchen schon bei der Operation aus irgendwelchen Gründen nicht eine Reduktion der Schilddrüse auf normales Volumen angestrebt wurde. Hierher gehören vor allem die so zahlreichen Kröpfe mit ausgedehnt entartetem Schilddrüsengewebe, bei denen eine Reduktion auf normalen Umfang ohne weiteres ein Defizit an brauchbarem Schilddrüsengewebe bedeuten würde. Hierher gehören auch jene Fälle von Basedowschem Kropf und von Struma vasculosa ohne deutliche Basedowerscheinungen, bei denen wir uns, zum Teil weil die Verhältnisse ein weiteres nicht erlaubten (besonders bei schwerem Basedow), auf Unterbindungen beschränkt haben. Es ist nun von Interesse zu sehen, daß von unsern 21 reinen Unterbindungsfällen bloß 6 in unserer ersten Kategorie des normalen Halses figurieren, 14 dagegen

unter derjenigen des noch etwas zu groß gebliebenen Halses, kein Fall andererseits in der dritten Kategorie des nachträglichen Wachstums. Sind auch die Zahlen zu klein, um bindende Schlüsse zu erlauben, so zeigen sie doch, daß selbst bei der Unterbindung von 3 und $3\frac{1}{2}$ Arterien die Schilddrüse in der Regel nicht völlig auf ihr normales Volumen zurückgeht, sondern etwas zu groß bleibt, andererseits aber auch keine erhebliche Tendenz mehr zu weiterem Größerwerden aufweist. Die selbst ausgedehnten Unterbindungen haben sich also, gewiß infolge der ausgedehnten Kollateralzirkulation der Schilddrüse, als ein im Ganzen ungenügendes Mittel erwiesen, um die Schilddrüse wirklich zur Norm zurückzuführen. Sie haben sich aber andererseits auch, wenn wir die spezifischen Basedowerscheinungen berücksichtigen, als genügend herausgestellt, um in der Mehrzahl der Fälle selbst schwere Basedowsymptome zum Schwinden zu bringen und den Patienten ihre Arbeitsfähigkeit wieder zu geben.

Die dritte Kategorie — diffuses Nachwachsen einer operativ verkleinerten Schilddrüse — weist keine reinen Unterbindungsfälle auf, sondern bloß Fälle von mit Unterbindung kombinierten Verkleinerungen der Drüse durch Resektion oder Enukleation, ganz besonders die erstere, die bei diffuser Struma unsere Normalmethode ist. Es mag verwunderlich erscheinen, daß dieses Nachwachsen gerade bei Resektionsfällen beobachtet worden ist, und nicht bei der bloßen Unterbindung. Der Grund liegt aber, von Zufälligkeit abgesehen, einmal vielleicht darin, daß die bloße Unterbindung nur bei kleineren und mittleren Strumen in Anwendung kam, während die Resektion besonders für die stärkeren Hypertrophien aufgespart wurde. Wichtiger ist aber folgender Umstand: Unter den 12 diffus nachgewachsenen Fällen beschränkten sich die Unterbindungen 10 mal auf 2 und 1 mal auf $2\frac{1}{2}$ Arterien. Nur einmal wurden gleichzeitig 3 Arterien unterbunden.

Die 12 Fälle dieser Gruppe müssen als wirkliche Kropfrezidive bezeichnet werden. Dasselbe gilt — weit gefaßt — von denjenigen der 4. Gruppe: Vorhandensein von Knoten im Bereich des Operationsgebietes. Wenn wir hier die nicht unerhebliche Zahl von 29 finden, so rührt dies davon her, daß wir nicht nur die von dem Patienten als Rezidiv empfundenen größeren nachgewachsenen Knoten, sondern jedes umschriebene Gebilde von Wal-

maßgröße aufwärts mitgezählt haben. Gerade bei dieser Grenzbestimmung zeigte es sich, wie außerordentlich dehnbar der Begriff Rezidiv ist, und wie leicht es ist, eine rezidivarne Statistik zu bekommen, wenn man die untere Grenze hoch ansetzt. In der Regel wird es sich hier um Auswachsen von bei der Operation noch kleinen und deshalb übersehenen oder von absichtlich belassenen Knötchen handeln. Nur ausnahmsweise dürfte sich im Bett eines ausgeschälten Knotens aus dem komprimierten Kropfgewebe der Kapsel desselben ein neuer Knoten bilden.

Die 5. Gruppe mit 28 Fällen setzt sich aus denjenigen Fällen zusammen, bei denen man aus diesem oder jenem Grunde die Operation auf die eine Seite beschränkte und einen oft nur kleinen Knoten auf der andern Seite stehen ließ, der — auch unvergrößert — bei der Nachuntersuchung mitgezählt wurde, und aus denjenigen, bei welchen kleine, bei der Operation noch nicht bemerkte Knoten der andern Seite allmählich ausgewachsen sind. Es ist gewiß, daß gerade diese Kategorie bei einer längeren Beobachtungszeit noch einen merklichen Zuwachs erhalten hätte. Unsere Rezidivzahlen sind also noch keine endgültigen. Immerhin geben sie uns wertvolle Winke für unser weiteres Vorgehen.

Die Unterbindung selbst von 3 und $3\frac{1}{2}$ Arterien erweist sich bei mittelgroßen Kröpfen zwar als genügend, um weiteres Wachstum hintenan zu halten, aber nicht als genügend, um die Struma in wünschbarer Weise zum Schrumpfen zu bringen. Sie sollte deshalb im allgemeinen auf kleinere Strumen beschränkt bleiben und bei größeren nur dann angewendet werden, wenn, wie bei manchen Basedowfällen, Gründe gegen einen größeren Eingriff bestehen. Andererseits zeigen uns die Zahlen von Gruppe 3, daß auch Resektionen, wenn sie nicht durch ausgedehntere Gefäßunterbindungen unterstützt sind, vor weiterem Nachwachsen nur ungenügend schützen. Am mangelhaftesten scheint sich der Schutz der Unterbindungen gegen nachträgliches Auswachsen bei knotigen bzw. cystischen Formen zu zeigen. Die Zahlen von Gruppe 5 müssen uns also veranlassen, stets auch die auf der weniger erkrankten Seite vorhandenen Knoten zu entfernen, und sich bei denselben nicht auf die Einwirkung einer bloßen Unterbindung zu verlassen.

Wir werden also durch unsere Nachuntersuchungen, wie schon Brunner, unbedingt zu einer größeren Ausdehnung der beidseitigen Eingriffe gedrängt. Wir dürfen dieselbe aber auch auf Grund der mit unserer Methode gemachten Erfahrungen rückhaltloser empfehlen, als dies Brunner in seiner Arbeit tut.

Ganz unstatthaft erscheint es aber, auf Grund der Rezidivstatistiken über die größere Zweckmäßigkeit der Excision, Resektion oder Enukleation im allgemeinen zu diskutieren. Die Excision eines Lappens ist ein bequemer Eingriff, aber sie opfert oft ganz unnötig gesundes Gewebe, und bindet einem damit einigermaßen die Hand für das, was auf der andern Seite noch zu tun bleibt. Sie bringt ferner denjenigen Chirurgen in Verlegenheit, der später eine Rezidivoperation vornehmen soll. Das ist denn auch der Grund, weshalb die einseitige Excision in unserer Statistik nur mit 5 Fällen figurirt, also mit bloß 2 Proz. der gesamten Operationszahl. Es handelte sich um Fälle, in denen wirklich nichts mehr zu erhalten war, als etwas Kapsel mit den Epithelkörperchen. Was man dadurch, daß man auf der einen Seite Tabula rasa macht, für dieselbe an Rezidivsicherheit gewinnt, das verliert man eben, und in recht unerwünschter Weise, für die andere Seite.

Aus den Rezidivstatistiken aber für oder gegen Resektion oder Enukleation zu argumentieren, das ist deshalb sinnlos, weil es sich bei den beiden Operationsmethoden gar nicht um dasselbe Substrat handelt: An wirklich diffusen Strumen läßt sich nichts enukleieren, da muß reseziert werden, und da hängt die größere und die geringere Zahl der wirklichen und der scheinbaren Rezidive von der Ausdehnung des Eingriffes und der Zahl der unterbundenen Arterien ab. Bei rein knotigen Strumen muß der Hauptsache nach, man mag die Operation nun der Theorie zuliebe nennen wie man will, eben doch enukleiert werden, und da ist die geringere oder größere Zahl der Rezidive, d. h. des Nachwachsens von Knoten durch die Vollständigkeit oder Unvollständigkeit bedingt, mit der man die im Augenblick der Operation schon vorhandenen kleineren Knoten ausgeschält hat. Das alles ist so selbstverständlich, daß es eigentlich nicht gesagt zu werden brauchte. Der Streit kann sich höchstens um die kleinknotigen Konglomeratstrumen drehen, von denen man nicht weiß, ob man sie der diffusen oder der knotigen Struma

zuzählen soll. Was hier zu tun ist, das läßt sich durch keine Statistik entscheiden, sondern das muß der Operierende von Fall zu Fall bestimmen.

7. Die Erhaltung des Isthmus.

In unserer ersten Arbeit hatten wir nachdrücklich darauf hingewiesen, wie überflüssig und selbst nachteilig es in der Mehrzahl der Fälle ist, den Isthmus zu durchtrennen. Es war uns deshalb wertvoll, die Resultate der Schonung des Isthmus an der Hand unserer Statistik nachprüfen zu können.

Die von uns in allen Fällen befolgte Regel war die, den Isthmus nur dann anzugreifen, wenn er selbst an der Kropfbildung teilnahm, und ihn auch dann womöglich nicht in seinem ganzen Querschnitte zu durchtrennen, sondern seine Rückfläche mit den Randgefäßen stehen zu lassen. Dies führte uns, wie eingangs bemerkt, bloß in 13 Fällen dazu, einen Teil des Isthmus mit einem Teile eines Schilddrüsenlappens und in 9 Fällen einen Teil des Isthmus mit Teilen beider Schilddrüsenlappen wegzunehmen. Siebenmal wurde der Isthmus allein durch Resektion oder Enukeleation verkleinert. Er fiel also, allein oder mit andern Schilddrüsentteilen 29 mal (d. h. in etwa 12 Proz. der Fälle) unter das Messer.

Was die meisten Chirurgen veranlaßte, den Isthmus grundsätzlich zu durchtrennen, das war die Vorstellung von der schädlichen Umklammerung der Schilddrüse durch die hyperplastischen Gewebsmassen. Diese Vorstellung ist aber nur dann zutreffend, wenn die Seitenlappen nicht genügend verkleinert worden sind. Ist diese Verkleinerung besorgt, so brauchen wir uns um den Isthmus nicht besonders zu kümmern, wenn er nicht selbst ausgesprochen an der kropfigen Entartung teilnimmt.

Durchgehen wir nun unsere funktionellen Resultate und die Ergebnisse der laryngoskopischen Untersuchung, so können wir denselben entnehmen, daß vom Bestehenbleiben einer derartigen nachteiligen Umklammerung mit Kompression nicht die Rede ist. Eine laryngoskopisch nachweisbare Abplattung der Luftröhre ließ sich überhaupt nur 12mal nachweisen, und erklärte sich auch da in erster Linie durch die zu groß gebliebenen oder nachgewach-

senen Seitenlappen. Gehen wir nicht von den laryngoskopischen Befunden, sondern von den funktionellen Störungen aus, so finden wir unter den 11 Fällen, in denen angeblich keine Besserung der Atembeschwerden eingetreten war, nur 3, in denen eine deutliche Kompression nachweisbar war, und hier ging sie von Rezidiven in den Seitenlappen aus. Wir haben uns also davon überzeugen können, daß die Schonung des Isthmus unsere funktionellen Resultate nicht verschlechtert hat. Dieselben werden insofern im Gegenteil eher verbessert, als die von Dobberty als Ursache nachträglicher Dyspnoe angegebene Verwachsung der Trachea mit Muskeln, Haut, ja Sternum bei Schonung des Isthmus wegfällt.

Was wir von dem Einfluß unserer Technik auf die Atembeschwerden gesagt haben, das gilt, wie wir oben gesehen haben, in noch höherem Grade von den Schluckbeschwerden. Auch hier handelt es sich bei ungenügendem funktionellem Resultat in erster Linie um unvollständige Operation, bzw. um Rezidiv, nicht um das Stehenbleiben des Isthmus.

Wir kommen also zum Schlusse, daß wir unsere bisherige Praxis auch mit Rücksicht auf den Isthmus ruhig weiterführen dürfen, mit der selbstverständlichen Einschränkung, daß derselbe immer in Angriff genommen werden muß, wenn er selbst kropfig entartet ist und drückt.

8. Der Einfluß der Operation auf die Halsform.

Ist auch das ästhetische Moment für die Indikation zur Operation nicht ausschlaggebend, so spielt es doch beim weiblichen Geschlecht eine große und nicht unberechtigte Rolle. Es ist begreiflich, daß in klimatischen Kurorten, wo operierte Strumen, besonders Basedowfälle, zur Nachkur hinströmen, unsere Patientinnen ihre Narben und ihre Halsform vergleichen, und ihre kritischen Überlegungen über die betreffenden Chirurgen daran anschließen.

Kocher verdanken wir bekanntlich die vom ästhetischen Standpunkte aus allein gerechtfertigte quere Schnittführung im untern Halsteile, von der ich in den letzten Jahren auch bei den schwersten Fällen nie Anlaß hatte abzugehen. Ihm verdanken wir auch den Hinweis auf die Notwendigkeit möglicher Schonung

der kleinen Halsmuskeln, welche uns erlaubt, jene so unschöne tiefe Einsenkung nach innen vom Kopfnicker zu verhindern, wie wir sie so oft bei Kropfoperationen aus früherer Zeit sahen. Ein weiterer Fortschritt läßt sich in dieser Hinsicht gewiß auch bei den diffusen Formen dadurch erzielen, daß wir die einseitige Excision zugunsten der beiderseitigen Resektion einschränken, oder, wie dies bei unserm Kropfmateriale der Fall ist, sozusagen aufgeben. Die einseitige Excision läßt eben doch eine tiefe Lücke zurück, die entweder, trotz aller Schonung der Muskeln, unausgefüllt bleibt oder — dies ist in der Regel der Fall — durch Hinüberücken der belassenen Hälfte ausgeglichen wird. Damit ist aber eine für die Durchgängigkeit der Luftröhre nicht gleichgültige Verschiebung bzw. Ausbiegung derselben unausbleiblich, die wir denn auch im Röntgenbilde von einseitig excidierten Rezidivfällen oft so ausgesprochen zu Tage treten sehen. Es ist also auch im Interesse des Gleichgewichtes der Gewebsmassen im Halse und der Erhaltung der medianen Lage der Luftröhre entschieden wünschenswert, den Eingriff bei den diffusen Formen so oft wie möglich beidseitig zu gestalten. Auch die Schonung des nicht erkrankten Isthmus trägt das ihrige bei zur Erhaltung einer ästhetischen Halsform.

Auf einen Punkt haben wir bei unsern Nachuntersuchungen noch besonders geachtet, nämlich auf die Frage von der Notwendigkeit oder Überflüssigkeit einer besonderen Naht des Platysma. Da wir bei der Operation die Haut nicht vom Platysma ablösen, sondern nach glatter Durchtrennung der beiden stets Haut und Platysma zusammen nach oben bzw. nach unten abziehen, so haben wir auch eine gesonderte Naht des Platysma schon lange als überflüssig aufgegeben. Durch die Hautnaht werden die geschnittenen Platysmaränder sowieso unmittelbar aneinander gebracht. Wir konnten uns nun bei den Nachuntersuchungen davon überzeugen, daß das Unterlassen der Platysmanahnt nicht den mindesten nachteiligen Einfluß auf die spätere Halsform hat und konnten in diesem Resultat keinen Unterschied zwischen magern und fettleibigen Patienten erkennen. Hat die Frage von der Platysmanahnt auch keine größere Bedeutung, so gehört es doch immerhin zu einer guten Operationstechnik, daß jeder überflüssige Akt weggelassen wird.

9. Rezidivoperationen und Schonung des Schilddrüsengewebes.

Operationen bei Rezidiven wurden unter unsern 250 Fällen 15mal vorgenommen, jedesmal unter möglichster Berücksichtigung des frühern, meist auswärts vorgenommenen Eingriffes. Achtmal erlaubte es derselbe, die Rezidivoperation durch präventive Unterbindung von 1 bis $2\frac{1}{2}$ Arterien zu unterstützen, während in den 7 andern Fällen auf eine solche Unterbindung verzichtet wurde. Stets wurde selbstverständlich das gesunde Gewebe nach Möglichkeit geschont. Daß wir trotz der schon vorhandenen Reduktion des funktionstüchtigen Gewebes doch in mehr als der Hälfte der Fälle zu präventiven Ligaturen gegriffen haben, das beruht darauf, daß in mehreren dieser Fälle der Rekurrens der einen Seite nicht mehr völlig intakt war. Es mußte also unter allen Umständen der anderseitige Rekurrens geschont werden. Gerade im Interesse dieser Schonung mußten alle Anlässe ausgeschaltet werden, bei denen er besonders leicht zu Schaden kommt, besonders eine hastige Blutstillung im Bereiche der hintern Kapsel. Die beste Sicherung war also hier nicht etwa die Verzichtleistung auf die Unterbindung, sondern im Gegenteil die vorgängige Unterbindung der Arterie, außerhalb der gefährlichen Zone. Deshalb war uns die extrafasciale Methode gerade in Rezidivfällen von großem Wert. Daß wir Rezidive, soweit dies möglich war, enukleierten, das liegt auf der Hand. Bei diffusen Strumen mußte ebenso selbstverständlich reseziert werden.

Wir haben nun bei der Durchsicht unserer Fälle weder aus den schriftlichen Berichten der Patienten, noch aus unserer eigenen Untersuchung in irgendeinem Fall den Eindruck bekommen, daß Patienten durch Wegnahme von zu viel Gewebe oder durch zu ausgedehnte Unterbindungen geschädigt worden wären. Ich sage absichtlich „den Eindruck“, weil wir ja bis zum heutigen Tage für die Schilddrüsenfunktion keinen in Zahlen ausdrückbaren, praktisch verwendbaren Maßstab besitzen.

Dies führt uns darauf, auch die Frage des Funktionsausfalles bei Erstoperationen zu berühren. Es kommen für allfällige Schilddrüsenunterbilanz vor allem die Eingriffe mit $3\frac{1}{2}$ Unterbindungen in Frage. Bei keinem unserer 9 in dieser

Weise operierten Patienten ließ sich aber bei der Nachuntersuchung irgendein Symptom von Schilddrüseninsuffizienz nachweisen. Wir hatten vielmehr, wie schon oben auseinandergesetzt, eher den Eindruck, daß selbst eine so ausgedehnte Unterbindung auf das Volumen der Schilddrüse noch nicht den Einfluß ausübt, den man glaubt vor ihr erwarten zu dürfen. Der einzige Fall, der im Sinne einer Insuffizienz diskutiert werden könnte, war ein Fall, bei dem die Patientin angab, 1½ Jahre nach der Operation von anhaltenden Kopfschmerzen befallen worden zu sein. Ich glaube aber, daß schon dieses Intervall von 1½ Jahren genügt, um einen postoperativen Einfluß auszuschließen, ganz abgesehen davon, daß objektive Symptome einer Schilddrüseninsuffizienz nicht vorhanden waren. Es zeigt uns dies, daß wir in der präventiven Blutstillung auch mit Rücksicht auf die Schilddrüsenfunktion noch weiter gehen dürfen, als dies im allgemeinen Brauch ist. Wäre das Vorhandensein der A. thy. ima ein regelmäßiges, so dürften wir ohne weiteres die Unterbindungen auf alle 4 Hauptarterien ausdehnen.

10. Der Einfluß unserer Operationsmethode auf die Entfernung intrathoracischer Strumen.

Obschon unsere Statistik sich nicht besonders mit dieser Frage befaßt hat, so ist es doch hier noch am Platze, kurz mitzuteilen, inwiefern sich unsere Methode auch bei intrathoracischer Lagerung eines Kropfes benützen läßt oder sich bei derselben sogar als nützlich erweist. Wenn irgendwo, so wäre es in der Tat bei dieser Kropfform wünschenswert, den intrathoracischen Anteil schon vor der Luxation durch Gefäßunterbindung zu verkleinern und damit die Luxation sowohl leichter, wie auch blutloser zu gestalten. Diesem Wunsche steht nun allerdings in einzelnen Fällen die materielle Unmöglichkeit entgegen, die gerade in diesen Fällen besonders wichtige A. thy. inf. sich zugänglich zu machen. Man muß sich dann wohl oder übel mit der vorgängigen Unterbindung der Superior begnügen. Öfter aber, als man dies a priori erwarten könnte, läßt sich bei sorgfältigem Arbeiten auch die Inferior erreichen, da der intrathoracische Anteil des Kropfes meist ausschließlich dem Unterhorn angehört, ja man findet selbst bisweilen, wie schon oben angedeutet, die Inferior ziemlich

weit oben, so daß ihre Unterbindung sehr leicht gelingt. Hat man dieselbe einmal unterbunden, und, wie wir es bei ausgesprochen intrathoracischem Kropfe immer tun, auch den Stamm der Superior, so ist die Entbindung des retrosternalen Kropfanteiles, auch wenn er sehr fest ausfüllen sollte, ganz außerordentlich erleichtert, indem durch die beiden Unterbindungen das Volumen des Kropfes oft ganz wesentlich vermindert wird. Gleichzeitig wird auch die sonst bisweilen sehr unangenehme Blutung aus den Kapselvenen der Tiefe auf ein Minimum beschränkt, so daß der Eingriff sich weder blutiger noch technisch schwieriger gestaltet, als bei irgendeiner gewöhnlichen Kropfoperation.

Dieser doppelte Vorteil macht sich besonders bei den diffusen intrathoracischen Kröpfen geltend. Bei den intrathoracischen Kolloidknoten mit größtenteils abgestorbenem Gewebe und den Cysten gewinnt man den zwar auch nicht zu verachtenden Vorteil des blutleeren Arbeitens. Das Volumen des Kropfes wird dagegen nicht merklich beeinflußt. Sieht man sich vor einem solchen Falle, und bereitet die Luxation des Knotens des Raummangels wegen erheblichere Schwierigkeiten, so darf man unter dem Schutze der vorgängigen Arterienunterbindung ruhig zur Eröffnung der Kapsel des Knotens greifen und denselben durch teilweise Entleerung seines Inhaltes — Exenteration oder Punktion, je nach der Konsistenz dieses Inhaltes —, verkleinern. Man wird diesen Weg selbstverständlich auch dann betreten, wenn man nur die Superior unterbinden konnte, doch wird man sich dann auf etwas mehr Blutung bei der Auslösung gefaßt machen müssen.

Neuerdings wurde von J e h n aus der Sauerbruchschen Klinik zur Erleichterung der Luxation retrosternaler Strumen auch Längsspaltung des Manubrium sterni mit gleichzeitiger Anwendung von Überdruck empfohlen. Es ist klar, daß man sich durch Sternalspaltung den Akt der Entbindung des Kropfes erleichtern kann, aber es wird doch hierdurch die Schwere des Eingriffes erhöht. Ohne in Abrede stellen zu wollen, daß es Fälle geben kann, in denen man nach Erschöpfung aller einfacheren Mittel mit Vorteil zu diesem etwas gewaltsamen Notbehelf greifen wird, glaube ich doch sagen zu können, daß solche Fälle sehr selten sind, oder wenigstens durch die oben angegebene Methodik zu sehr seltenen

gemacht werden. Ich bin trotz unseres großen Kopfmaterials, bis jetzt noch nicht in den Fall gekommen, mich dieses Hilfsmittels bedienen zu müssen. Dagegen habe ich mich davon überzeugt, daß die Sauerstoffzufuhr unter Überdruck bei sehr enger Trachea eine wesentliche Erleichterung des Eingriffes schafft.

Schl u ß b e m e r k u n g.

Wenn ich mich zum Schlusse frage, ob sich uns die seit nunmehr 4 Jahren benützte Technik der Kropfoperation bewährt habe, so läßt sich dies unbedingt bejahen, und zwar sowohl mit Rücksicht auf die Einfachheit und anatomische Klarheit des Eingriffes, als auf die größere Blutlosigkeit. Von ein und demselben Hautabschnitte aus lassen sich unter Anpassung an die besonderen Erfordernisse des Falles alle Eingriffe: Unterbindungen, Resektion, Enukeleation ein- und beidseitig mit guter Übersicht und doch möglicher Schonung der Gewebe vornehmen. Die Schonung der Epithelkörperchen ist eine absolute, und diejenige des Rekurrens ergibt günstigere Resultate als alle bisher veröffentlichten, auf Nachuntersuchung beruhenden Statistiken. Für die Vermeidung der Rezidive ist nicht irgendeine Methode als solche, sondern die Anpassung der Technik an die besondere Kropfform und die möglichst ausgedehnte Verwendung beidseitiger Operation maßgebend. Gerade in letzter Beziehung schafft uns aber unsere Methode möglichste Freiheit. Auf Schonung des Sympathicus muß bei der Anwendung derselben besonders geachtet werden, von denjenigen Chirurgen wenigstens, welche eine Sympathicuslähmung als einen Nachteil ansehen — und zu diesen gehören auch wir.

Alles in allem dürfen wir die Methode denjenigen Chirurgen zur Berücksichtigung empfehlen, welche mit ihren eigenen Resultaten noch nicht völlig zufrieden sind, und welche größtmöglicher Sicherheit für Rekurrens und Epithelkörperchen, und für sich selbst ruhiges und blutloses Operieren erstreben.

Literaturverzeichnis.

1. Alamartine, H., Technique actuelle des opérations pour goître. *Revue de Chirurgie*. 1913, 10. avr.
 2. Balfour, D., The advantages of the double resection in certain types of goître. *Annals of Surgery* 1914, Vol 59, p. 671.
 3. Bossart, A., Über 1400 Strumaoperationen der Krankenanstalt Aarau. *Beitr. z. klin. Chir.* 1914, Bd. 89, S. 142.
 4. Frazier, Ch., A Review of 100 consecutive Operations for goître. *Annals of Surgery* 1914, Vol 60, p. 583.
 5. Ginsburg, N., The Surgical anatomy of the upper and lower poles of the thyroid gland with reference to thyroidectomy. *Annals of Surgery* 1915, Vol 61, p. 268.
 6. Halsted, W. S., Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. 1911, S. 45.
 7. — Excision of both lobes of thyroid gland for cure of Graves disease. *Transactions of the American Surgical Association* 1913.
 8. — Preliminary ligation of the Thyroid arteries and of the inferior in preference to the superior artery. *Transactions of the American Surgical Association* 1913.
 9. J e h n, Die operative Entfernung großer intrathorakaler Strumen. *Deutsche Zeitschr. f. Chir.*, Bd. 133, S. 25.
 10. Jones, E. O., A Method of controlling Haemorrhage in Thyroidectomy. *Surgery, Gynaecology and Obstetrics*. 1913, Nov. XVII, 642.
 11. I v e r s e n, T., Das Verhältnis der Glandulae parathyreoideae bei Struma und Morbus Basedowii. *Archives internationales de Chirurgie* 1913, VI, 3.
 12. K a u s c h, Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 1912, S. 323.
 13. K o c h e r, Th. Ebendasselbst.
 14. K r e c k e, Zur Technik der Strumektomie bei beiderseitigem Kropf. *Beitr. z. klin. Chir.* 1913, Bd. 83, S. 668.
 15. Petrow, N., Die vorläufige Unterbindung der untern Schilddrüsenarterie nach de Quervain bei Strumektomie. *Russki Wratsch*, 1914, Nr. 21. *Nach Zentralbl. f. Chir.* 1914, Nr. 42, S. 1605.
 16. de Quervain, I. Zur Technik der Kropfoperation. *Medizinische Gesellschaft Basel* 1911, 7. XII. *Korrespondenzbl. f. Schweizer Ärzte* 1912, Nr. 9.
 17. — 2. Zur Technik der Kropfoperation. *Deutsche Zeitschr. f. Chir.* 1912, Bd. 116, S. 574.
 18. — 3. Über den Schutz des Rekurrens und der Epithelkörperchen bei der Kropfoperation. *Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie* 1912, S. 318.
 19. Schloffer, Über die operative Behandlung der Basedowschen Krankheit. *Prager med. Wochenschr.* 1913, XXXVIII. Nr. 23.
-