(Aus dem physiologischen Institut der Universität Rostock.)

Zur Physiologie des Kniesehenreflexes.

Von

Prof. Dr. **U. Scheven**,
Privatdozent der Psychiatrie und Neurologie.

(Mit 6 Textfiguren und Tafel II.)

Nachdem im Jahre 1875 durch die Arbeiten von Erb und Westphal die Aufmerksamkeit auf die Sehnenphänomene gelenkt war, haben diese Erscheinungen, welche sich auch für die Pathologie des Nervensystems von grosser Bedeutung erwiesen, eine sehr eingehende Bearbeitung erfahren. Aber trotz aller Forschungen, welche sowohl von seiten der Physiologen wie der Pathologen angestellt wurden, und welche bereits eine äusserst umfangreiche Literatur hervorgerufen haben [s. die Literaturübersicht bei Sternberg¹⁾, aus der neueren Zeit besonders Gotch²⁾ und Sherrington³⁾], sind doch die Autoren über die Frage nach der Entstehung der Sehnenphänomene noch immer nicht zu einer Übereinstimmung gelangt. Die beiden Theorien, welche man über die Natur dieser Erscheinungen aufgestellt hat, bestehen noch nebeneinander fort. Die Diskussion ist noch nicht geschlossen über die Frage, ob die Sehnenphänomene rein reflektorischer Natur sind, wie dies von Erb⁴⁾ von vornherein angenommen wurde, oder ob diese Erscheinungen durch periphere, direkte Muskelreizung hervorgerufen werden, wie Westphal⁵⁾ von Anfang an behauptet hat. Nach der letzteren

1) M. Sternberg, Die Sehnenreflexe. 1893.

2) F. Gotch, Note on the so-called tendon reflex. The Journal of Physiology vol. 20. 1896.

3) C. S. Sherrington, The spinal cord i. Text-book of Physiologie ed. E. A. Schäfer. 1900.

4) W. Erb, Arch. f. Psychiatrie Bd. 5. 1875.

5) C. Westphal, Arch. f. Psychiatrie Bd. 5. 1875, und Bd. 12. 1882.

Erklärung wird die Muskelkontraktion durch den Reiz hervorgebracht, der durch das Vibrieren der Sehne bzw. die plötzliche Zerrung des Muskels gegeben wird. Aber es ist für diese direkte Auslösung der Muskelkontraktion neben einer Spannung des Muskels bzw. der Sehne von gewissem Grade und einer ausreichenden Schwingungsmöglichkeit der Sehne der reflektorisch unterhaltene Tonus des Muskels die wesentlichste Bedingung (Westphal u. a.). Nach Gowers¹⁾ ist es eine myotatische Erregbarkeit, d. h. eine durch die passive Spannung des Muskels reflektorisch bewirkte Erregbarkeit — die er für „wahrscheinlich identisch“ mit dem Muskeltonus hält —, bei welcher es durch lokale Reizung zu einer Muskelkontraktion, einer myotatischen Kontraktion kommt. Man kann die letzteren Theorien, nach welchen bei den Sehnenphänomenen die Muskelkontraktion durch lokale Erregung bei einem gewissen Spannungszustande des Muskels zustande kommt, als Tonustheorie der Reflextheorie der Sehnenphänomene gegenüberstellen.

Wenn nun eine endgültige Entscheidung darüber, welche von diesen beiden Theorien die richtige ist, herbeizuführen noch nicht gelungen ist, so liegt ein Grund dafür auch darin, dass nach beiden Theorien die Erscheinungen eine Abhängigkeit von dem reflektorischen Erregungen vermittelnden Rückenmark zeigen. So blieben die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen mit Nerven-, Wurzel-, Rückenmarksdurchschneidungen nach beiden Theorien einer Erklärung zugänglich: ebenso wie die Beobachtungen über das entfernte und gekreuzte Auftreten von Sehnenreflexen²⁾, wie auch die an pathologischem Material gewonnenen Befunde.

Man hat dann auch versucht, durch Bestimmungen der Reflexzeit bei der Auslösung der Sehnenphänomene die Frage nach der Natur der letzteren zur Lösung zu bringen. Eine grosse Reihe derartiger Untersuchungen hat aber ebenfalls zu übereinstimmenden, ausschlaggebenden Resultaten nicht geführt.

Im allgemeinen ist allerdings wohl anzunehmen, dass die Reflex-

1) W. R. Gowers, Handbuch der Nervenkrankheiten. Übersetzt von Grube. 1892.

2) Die letzteren kommen nach den Anhängern der mechanischen Theorie (Westphal, Waller u. a.) durch Übertragung der Schwingungen des beklopfen Knochens (Femur) durch Fortleitung im Knochensystem (Becken) auf die andere Extremität und direkte Erregung der Muskeln daselbst zustande. Dagegen sprechen aber die Versuche von Sternberg. Siehe Sternberg, l. c. S. 43 u. 47.

theorie der Sehnenphänomene die grösste Zahl von Vertretern gefunden hat, während ein kleinerer Kreis von Autoren, vor allem Engländer, Anhänger der Westphal'schen Theorie geblieben ist. Aber bei dem grossen Interesse, das diesen Erscheinungen in physiologischer Hinsicht zukommt, und bei der grossen Wichtigkeit, welche dieselben für die Neuropathologie erlangt haben, bleibt die endgültige Lösung der Frage nach der Natur der Sehnenphänomene ein erstrebenswertes Ziel. Diesem Ziele entgegenzuführen ist auch der Zweck meiner eigenen Untersuchungen, über die ich in folgendem berichte. Die denselben zugrunde liegenden Versuche sind im physiologischen Institut zu Rostock ausgeführt, dessen Leiter, Herr Professor Langendorff, ich mich für die mir gewährte Anregung und Unterstützung bei meinen Arbeiten zu grösstem Danke verpflichtet fühle.

Das hauptsächlichste Argument, welches gegen die Reflextheorie angeführt ist, ist die Kürze der Reflexzeit¹⁾ beim Sehnenphänomen, d. h. der Zeit, welche zwischen dem Moment der Sehnenperkussion und dem Beginn der Muskelzuckung verläuft. Nach den Untersuchungen einer Reihe von Forschern ist diese Zeit beim Kniephänomen an und für sich eine so kurze, dass sie eine direkte Muskelreizung zu beweisen scheint. Bald ergaben sich Zeitwerte, welche der Latenzzeit bei direkter Muskelreizung annähernd gleich kamen, bald wurde die letztere von der Reflexzeit beim Sehnenphänomen nur um ein so Geringes übertroffen, dass die sich ergebende Differenzzeit, wie ich sie weiter nennen will, für eine Fortleitung der Erregung durch den Reflexbogen zu kurz erscheint. Wie schon erwähnt, zeigen aber die von den einzelnen Autoren ausgeführten Zeitbestimmungen [Sternberg²⁾] keine derartige Übereinstimmung in ihren Resultaten, dass die letzteren für einwandfrei und unumstösslich sicher erscheinen und für die Frage nach der Natur der Sehnenphänomene ausschlaggebend sein könnten. In neuerer Zeit ist es besonders Gotch³⁾ gewesen, der bei seinen zeitmessenden Versuchen an Kaninchen für die Reflexzeit beim

1) Den allerdings eine Präsuntion enthaltenden Ausdruck „Reflexzeit“ gebrauche ich hier und im folgenden der Kürze und Übersichtlichkeit der Darstellung wegen, zugleich im Ausblick auf die Resultate meiner Untersuchungen, welche die Annahme eines Reflexes beim Sehnenphänomen bestätigen.

2) l. c. S. 30.

3) l. c. S. 322.

Sehnenphänomen und die Latenzzeit bei direkter faradischer Muskelreizung die gleichen Werte gefunden hat.

Bei der grossen Bedeutung, welche derartigen Zeitbestimmungen für die Theorie der Sehnenphänomene zukommt, habe ich bei meinen eigenen Versuchen zunächst eine möglichst exakte Bestimmung der Reflexzeit beim Sehnenphänomen in ihrem Verhältnis zur Latenzzeit bei direkter Muskelreizung angestrebt. In weiteren Versuchsreihen habe ich es unternommen, die durch rhythmische Sehnenperkussion ausgelösten Muskelkontraktionen fortlaufend graphisch darzustellen, sowohl bei gleichbleibendem Zeitintervall und gleicher Reizstärke wie bei in verschiedener Abstufung erfolgender Modifikation des Intervalls und der Reizstärke.

I. Bestimmungen der Reflexzeit.

A. Methodik.

Die Untersuchungen wurden am Kniesehnenreflex ausgeführt. Als Versuchstiere dienten Kaninchen. Die Tiere wurden zu Beginn des Versuchs mit Äther narkotisiert, oder es wurde bei ihnen eine Ausschaltung des Gehirns durch Injektion von Paraffinlösung in die Karotis vorgenommen¹⁾ — nach der Methode von Kronecker-Markwaldt²⁾, — deren auch ich mich schon bei früheren Untersuchungen bedient habe³⁾. Bei dem auf dem Operationsbrett aufgebundenen Tier wurde das Femur in flektierter Stellung von der Seite her fixiert. Diese Fixierung geschah durch eine eigens zu diesem Zweck konstruierte, kleine Zange, deren Branchen um den zugleich von Periost und Muskulatur befreiten Knochen in seiner Mitte herumgelegt und dann durch eine Schraube fixiert wurden. Von einem kleinen Hautschnitt an der Seitenfläche des Oberschenkels kann man leicht, mit stumpfer Gewalt die Streck- und die Beugemuskulatur voneinander trennend, ohne jede Blutung die zu fixierende Stelle des Knochens erreichen. Die angelegte Zange wurde an einem Stativ befestigt. Durch diesen kleinen Eingriff wird die Auslösung

1) Bei den Paraffininjektionen wurde stets eine totale Ausschaltung des Gehirns und der Oblongata angestrebt. Dass dies erreicht wurde, zeigte das Aufhören der Respiration und die Notwendigkeit fortgesetzter künstlicher Atmung.

2) M. Markwaldt, Zeitschr. f. Biol. Bd. 26.

3) U. Scheven, Arch. f. Psychiatrie Bd. 39 H. 1.

des Kniephänomens in keiner Hinsicht alteriert, sie erfolgt unmittelbar nach der Fixierung des Beines in normaler, lebhafter Weise. Während nach der Paraffininjektion der Versuch sogleich fortgesetzt werden kann, muss bei Ätherisierung des Tieres der Zeitpunkt abgewartet werden, wo mit dem Nachlass der Narkose die Reflexbewegung wieder eine ausgiebige, lebhafte geworden ist. Das Tier war während des Versuchs zum Schutz gegen stärkere Abkühlung in ein Tuch eingehüllt. Die weitere Versuchsanordnung ist auf folgender Abbildung schematisch dargestellt (vgl. auch die Abbildung der Versuchsanordnung auf S. 121, auf welcher die Schlagvorrichtung und die Registrierung der Unterschenkelbewegung ersichtlich ist) (Fig. 1).

Fig. 1. Schema der Versuchsanordnung bei den Zeitbestimmungen.

Die zu diesen Versuchen hergestellte Vorrichtung zur Perkussion der Patellarsehne besteht aus einem zweiarmigen Hebel aus Aluminium. Der längere Hebelarm trägt einen durch verschiedene Gewichte zu beschwerenden kleinen Hammer, der aus Kork besteht und mit Stanniol überzogen ist. Der kürzere Hebelarm trägt den Anker zu einem Elektromagneten. Wenn der zu dem letzteren führende Stromkreis geschlossen wird, so wird der Schlaghammer durch Herabziehen des kurzen Hebelarms gehoben. Wird nun mittelst eines Schlüssels eine momentane Stromunterbrechung vorgenommen, so fällt der Hammer auf die Sehne, er wird aber unmittelbar danach durch die wieder in Kraft tretende Wirkung des Elektromagneten gehoben. Auf diese Weise wird von dem Hammer ein kurzer, scharfer Schlag auf die Sehne ausgeführt. Die durch die

Kontraktion des Quadrizeps bedingte Schleuderbewegung des Unterschenkels wird durch einen Stirn-Schreibhebel auf dem Kymographion registriert. Dieser Schreibhebel steht durch einen über eine Rolle laufenden, an der Ferse befestigten Faden mit dem Unterschenkel in Verbindung. Der Schreibhebel schreibt die Unterschenkel-Streckbewegung in einer von der Abszisse sich erhebenden Kurve auf.

In demselben Augenblick, wo der Hammer die Patellarsehne trifft, über welcher die Haut rasiert und mit Schaumgold überzogen ist, wird ein zweiter Stromkreis geschlossen, in welchen ein Pfeil'sches Signal (Modifikation Zimmermann) eingeschaltet ist. Dies Signal markiert durch plötzliche Senkung seiner Kurve den Moment der Reizeinwirkung. Unterhalb der beiden genannten Kurven wird durch eine in einen dritten Stromkreis eingeschaltete Unterbrechungs-Stimmgabel die Zeitkurve gezeichnet, an welcher jede Schwingung $\frac{1}{100}$ Sekunde entspricht. So werden auf der Trommel zugleich drei übereinander verlaufende Kurven aufgezeichnet: die Zeitkurve, die Kurve des Reizsignals und die Kurve der Unterschenkelbewegung. Die Schreibhebel wurden bei Beginn des eigentlichen Versuchs so eingestellt, dass sie genau senkrecht übereinander standen, oder es wurde die Horizontaldifferenz der Anfangsordinaten genau bestimmt.

Es wurde nun bei meinen Versuchen in dieser Weise zur Berechnung der zwischen der Sehnenperkussion und der Muskelkontraktion verstreichenden Zeit eine Anzahl von Kurven der Unterschenkelstreckung zugleich mit Zeit- und Reizkurve aufgezeichnet. Im unmittelbaren Anschluss daran wurden zur Berechnung der Latenzzeit bei direkter Muskelreizung die Kurven der Unterschenkelbewegung bei faradischer Reizung der Streckmuskeln registriert. Die zu diesem Zwecke vorgenommene Modifikation der Versuchsanordnung ist sehr schnell auszuführen und bedingt — was nicht ohne Bedeutung ist — keinerlei Veränderung in der Lage des Tieres und in der Schreibhebeleinstellung. Nach Entfernung des Schlaghammers wurde eine Doppelnadel-Elektrode in den Quadrizeps eingestochen, welche mit der sekundären Rolle eines Induktoriums in Verbindung stand. In der zu der primären Rolle führenden Strombahn war ein Punkt-Schlüssel und das Pfeil'sche Signal eingeschaltet. Der Schlittenapparat wurde so eingestellt, dass die Unterschenkelbewegung, durch die faradische Reizung hervorgerufen, möglichst dieselbe Extension zeigte wie vorher bei Perkussion der Patellarsehne. Dann wurden die Ausschläge der Unterschenkelstreckung bei direkter Muskelreizung durch einen Schliessungsinduktionsschlag und zugleich der Moment

der Reizeinwirkung und die Schwingungen der Stimmgabel in derselben Weise wie vorher durch drei Kurven auf dem Kymographion registriert. Dem letzteren wurde eine möglichst grosse Umdrehungsgeschwindigkeit gegeben. Die folgende Abbildung zeigt zwei bei ein und demselben Versuche gewonnene, übereinander gepauste Kurven bei Perkussion der Patellarsehne und bei direkter Reizung des Quadrizeps (Fig. 2).

B. Versuchsergebnisse.

Die Zahl der bei der angegebenen Versuchsanordnung erhaltenen Kurven, welche zur Bestimmung der Latenzzeiten verwertet wurden, beträgt 74: davon sind 45 bei Perkussion der Patellarsehne und 29 bei faradischer Quadrizepsreizung gewonnen. Es wurde dabei unter

Fig. 2¹⁾. Zwei übereinander gepauste Kurven bei indirekter und direkter Reizung. a. Versuch IV (20. Juli 1903, Paraffininjektion). — 1 Reiz, 2 Zeit, 3 Direkte Muskelreizung, 4 Kniereflex.

den vorhandenen Kurven eine gewisse Auswahl getroffen, in dem nur diejenigen zur Berechnung verwandt wurden, deren Aufzeichnung in jeder Weise deutlich und vollständig erfolgt war. Die Berechnung der Latenzzeiten aus den Kurven wurde grösstenteils unter Lupenvergrösserung ausgeführt, mit Hilfe eines Kurvenmessers, welcher im hiesigen physiologischen Institut seit längerem in Gebrauch ist und sich auch bei diesen Bestimmungen vorzüglich bewährt hat. Die von mir vorgenommenen Berechnungen sind zur Erzielung möglichst objektiver Ergebnisse von Prof. Langendorff und dessen Assistenten zum Teil nachgeprüft worden.

Welcher Art die Resultate dieser Bestimmungen waren, mögen die folgenden ausführlich mitgeteilten Versuchsergebnisse dartun.

1) Leider ist die Wiedergabe der Originalkurve nicht völlig geglückt.

Versuch 1. Äther-Narkose.

Reflexzeit des Kniephänomens.

Tafel I.	Kurve 1: 0,0240 Sek.	} im Durchschnitt 0,0205 Sek.
	" 2: 0,0200 "	
	" 3: 0,0200 "	
	" 4: 0,0196 "	
	" 5: 0,0191 "	
Tafel II.	Kurve 6: 0,0182 Sek.	} im Durchschnitt 0,0200 Sek.
	" 7: 0,0230 "	
	" 8: 0,0181 "	
	" 9: 0,0200 "	
	" 10: 0,0200 "	
	" 11: 0,0203 "	
	" 12: 0,0210 "	
Tafel III.	Kurve 13: 0,0233 Sek.	} im Durchschnitt 0,0218 Sek.
	" 14: 0,0232 "	
	" 15: 0,0233 "	
	" 16: 0,0230 "	
	" 17: 0,0197 "	
	" 18: 0,0184 "	
<hr/> Kurven 18.		Gesamtdurchschnitt ¹⁾ 0,0207 Sek.

Versuch 2. Äther-Narkose.

A. Reflexzeit des Kniephänomens.

Tafel I.	Kurve 1: 0,0250 Sek.	} im Durchschnitt 0,0247 Sek.
	" 2: 0,0245 "	
Tafel II.	Kurve 3: 0,0250 Sek.	0,0250 Sek.
Tafel III.	Kurve 4: 0,0230 Sek.	} im Durchschnitt 0,0249 Sek.
	" 5: 0,0247 "	
	" 6: 0,0270 "	
Tafel IV.	Kurve 7: 0,0260 Sek.	} im Durchschnitt 0,0253 Sek.
	" 8: 0,0250 "	
	" 9: 0,0250 "	
<hr/> Kurven 9.		Gesamtdurchschnitt 0,0249 Sek.

B. Latenzzeit bei direkter Quadrizepsreizung.

Tafel I.	Kurve 1: 0,0120 Sek.	} im Durchschnitt 0,0125 Sek.
	" 2: 0,0130 "	
Tafel II.	Kurve 3: 0,0140 Sek.	0,0140 Sek.
Tafel III.	Kurve 4: 0,0135 Sek.	} im Durchschnitt 0,0117 Sek.
	" 5: 0,0100 "	

1) Bei diesen Berechnungen habe ich Durchschnittszahlen aufgestellt — obwohl denselben ein Wert in mathematischem Sinne keineswegs zukommt — lediglich im Interesse einer grösseren Übersichtlichkeit der Darstellung.

Tafel IV. Kurve 6: 0,0113 Sek. }
 " 7: 0,0140 " } im Durchschnitt 0,0121 Sek.
 " 8: 0,0110 " }

Tafel V. Kurve 9: 0,0100 Sek. }
 " 10: 0,0110 " } im Durchschnitt 0,0109 Sek.
 " 11: 0,0117 " }

Tafel VI. Kurve 12: 0,0130 Sek. }
 " 13: 0,0100 " } im Durchschnitt 0,0114 Sek.
 " 14: 0,0110 " }
 " 15: 0,0117 " }

Kurven 15. Gesamtdurchschnitt 0,0120 Sek.

Also: Reflexzeit des Kniephänomens . . . 0,0249 Sek.

Latenzzeit bei direkter Muskelreizung 0,0120 "

Differenz 0,0129 Sek.

Versuch 3. Äther-Narkose.

A. Reflexzeit des Kniephänomens.

Tafel I. Kurve 1: 0,0200 Sek. }
 " 2: 0,0222 " } im Durchschnitt 0,0209 Sek.
 " 3: 0,0197 " }

Tafel II. Kurve 4: 0,0214 Sek. }
 " 5: 0,0218 " } im Durchschnitt 0,0216 Sek.

Tafel III. Kurve 6: 0,0230 Sek. }
 " 7: 0,0221 " } im Durchschnitt 0,0225 Sek.

Kurven 7. Gesamtdurchschnitt 0,0216 Sek.

B. Latenzzeit bei direkter Quadrizepsreizung.

Tafel II. Kurve 1: 0,0150 Sek. }
 " 2: 0,0100 " } im Durchschnitt 0,0110 Sek.
 " 3: 0,0090 " }

Tafel III. Kurve 4: 0,010 Sek. }
 " 5: 0,009 " } im Durchschnitt 0,010 Sek.
 " 6: 0,013 " }

Kurven 6. Gesamtdurchschnitt 0,0105 Sek.

Also: Reflexzeit des Kniephänomens . . . 0,0216 Sek.

Latenzzeit bei direkter Muskelreizung 0,0105 "

Differenz 0,0111 Sek.

Versuch 4. Paraffininjektion.

A. Reflexzeit des Kniephänomens.

Tafel I. Kurve 1: 0,0220 Sek. 0,0220 Sek.

Tafel II. Kurve 2: 0,0183 Sek. }
 " 3: 0,0200 " } im Durchschnitt 0,0197 Sek.
 " 4: 0,0194 " }

Tafel IIa. Kurve 5: 0,0210 Sek. 0,0210 Sek.

Tafel III.	Kurve 6: 0,0200 Sek.	} im Durchschnitt 0,0200 Sek.
"	7: 0,0200 "	
Tafel IV.	Kurve 8: 0,0193 Sek.	} im Durchschnitt 0,0196 Sek.
"	9: 0,0200 "	
<hr/> Kurven 9.		Gesamtdurchschnitt 0,0204 Sek.

B. Latenzzeit bei direkter Quadrizepsreizung.

Tafel I.	Kurve 1: 0,0110 Sek.	
" II.	" 2: 0,0150 "	
" III.	" 3: 0,0120 "	
" IV.	" 4: 0,0130 "	
" V.	" 5: 0,0100 "	
" VI.	" 6: 0,0100 "	
" VII.	" 7: 0,0100 "	
<hr/> Kurven 7.		Gesamtdurchschnitt 0,0114 Sek.

Also: Reflexzeit des Kniephänomens . . . 0,0204 Sek.

Latenzzeit bei direkter Muskelreizung 0,0114 "

Differenz 0,0090 Sek.

Die bei den vorstehenden Latenzbestimmungen gefundenen Werte zeigen beim Vergleich der Resultate der einzelnen Versuche miteinander, wie auch beim Vergleich der aus den Kurven ein und desselben Versuches gewonnenen Berechnungen eine so grosse Gleichmässigkeit, dass sie im ganzen ein ziemlich sicheres Ergebnis darstellen. Die Schwankungen in den gemessenen Zeitwerten betragen im Maximum 0,005 Sekunden, bleiben aber meist weit geringer. Sie sind somit viel unbedeutender als die bei den meisten früher ausgeführten Latenzbestimmungen anderer Autoren verzeichneten.

Die Gesamtergebnisse für die Reflexzeit bei Sehnenperkussion wie für die Latenzzeit bei direkter Muskelreizung sind — wie auch aus den obenstehenden Versuchsergebnissen hervorgeht — auf die Weise gewonnen, dass zunächst Durchschnittswerte berechnet wurden von den aus den tadellosen Kurven eines jeden Trommelblattes, einer jeden Tafel bestimmten Zahlen — also aus Reihen von Kurven, welche fortlaufend ohne Veränderung der Einstellung der Schreibapparate aufgezeichnet sind. Aus diesen einzelnen Durchschnittszahlen sind dann für jeden Versuch Gesamtdurchschnittswerte für die Latenzzeiten berechnet worden (s. Anm. a. S. 115).

Es ergaben sich so in den vorliegenden Versuchen für die Reflexzeit beim Kniephänomen Werte von 0,0204 bis 0,0249 Sekunden, im Mittel 0,022 Sekunden, für die Latenzzeit der Unterschenkelstreckung bei direkter Quadrizepsreizung Werte von 0,0105 bis

0,0120 Sekunden, im Mittel 0,011 Sekunden. Es geht also aus meinen Versuchen hervor, dass die Reflexzeit beim Sehnenphänomen ungefähr doppelt so gross ist als die Latenzzeit bei direkter Muskelreizung. Für eine solche Vergleichung ist es von Wichtigkeit, dass die durch die Sehnenperkussion und die direkte Quadrizepsreizung hervorgerufene Muskelwirkung, der Ausschlag der Unterschenkelstreckbewegung bei beiden Reizarten annähernd von derselben Grösse war. Denn eine Abhängigkeit der Latenzzeit von der Stärke der Reizeinwirkung ist in gewissem Grade zweifellos vorhanden.

Die für die Latenzzeit gefundenen Zahlenwerte sind natürlich keine absoluten. Denn einmal kommt eine gewisse Verzögerung dadurch zustande, dass nicht von dem sich kontrahierenden Muskel direkt der Schreibhebel in Bewegung gesetzt wird, sondern erst die resultierende Unterschenkelbewegung auf der Trommel registriert ist. Ferner sind in den berechneten Zahlen auch die durch die verschiedenen Teile der Versuchsmechanik bedingten Zeitverluste, u. a. die Latenzzeit des Signals, enthalten. Aber alle diese Verzögerungen waren bei Sehnenperkussion genau dieselben wie bei direkter Muskelreizung. Somit ist die berechnete Differenzzeit ein absoluter Wert: sie stellt die Zeit dar, um welche die Reflexzeit beim Sehnenphänomen die Latenzzeit bei direkter Muskelreizung übertrifft. Diese Differenzzeit beträgt in den vorliegenden Versuchen 0,0090 bis 0,0129 Sekunden, im Mittel also 0,011 Sekunden.

C. Schlussfolgerungen.

Die vorstehenden Versuche haben gezeigt, dass die zwischen Reiz und Unterschenkelstreckung verstreichende Zeit bei einer als momentan anzusehenden Sehnenperkussion eine wesentlich grössere ist als bei direkter Muskelreizung durch einen einzelnen Induktionsschlag. Wir werden geneigt sein, dieses Ergebnis bei der schwebenden Frage nach der Natur des Kniephänomens, wie überhaupt der Sehnenphänomene, für die Annahme eines echten Reflexes bei diesen Vorgängen in die Wagschale zu werfen. Nach dieser Annahme muss in der von uns berechneten Differenzzeit einmal die Zeit enthalten sein, in welcher die Erregung die sensible Nervenbahn bis zum Rückenmark und von diesem die motorische Bahn zum Quadrizeps durchläuft, und ferner die Zeit der Reflexübertragung im spinalen Zentrum, d. h. die eigentliche oder reduzierte Reflexzeit. Zu einer Feststellung, ob die berechnete Differenzzeit genügend gross ist für

den Ablauf dieser Vorgänge, fehlen uns aber über die zeitlichen Verhältnisse bei den letzteren durchaus hinreichende und sichere Kenntnisse. Die Angaben über die Geschwindigkeit der Nervenleitung beim Säugetier schwanken für die motorischen Bahnen zwischen 30 und über 60 m in der Sekunde, und noch mehr differieren die Berechnungen der Leitungsgeschwindigkeit in den sensiblen Nerven, wenn man auch annehmen muss, dass die letztere der motorischen gleichkommt (Hermann¹⁾, Vierordt²). Ebenso fehlen uns hinsichtlich der reduzierten Reflexzeit vor allem für Warmblüter Zeitwerte, welche wir zu einer Prüfung der von uns gefundenen Zahlen heranziehen könnten. Zweifellos gibt es für die reduzierte Reflexzeit auch keinen einheitlichen Wert: sie wird bei den einzelnen Reflexen verschieden gross und vor allem abhängig sein von den anatomischen Verhältnissen der einzelnen Reflexzentren, der Zahl der bei der Übertragung in Anspruch genommenen Neurone — wie auch von der Art und der Stärke des Reizes.

Die Länge der Leitungsbahn von der Patellarsehne bis zum Rückenmarkszentrum (6. Lumbalwurzel) und von diesem zurück bis zur Mitte des Quadrizeps ist nach meinen Messungen — entsprechend den Berechnungen anderer Autoren [Rosenheim³]) — bei einem mittelgrossen deutschen Kaninchen auf durchschnittlich 32 cm zu schätzen. Wenn wir nun für die Geschwindigkeit der Nervenleitung den hohen Wert von 60 m in der Sekunde annehmen — und die hohen Werte sind unter den bisher berechneten vielleicht die richtigsten — so würde nur die Hälfte der von uns festgestellten Differenzzeit von der extraspinalen Erregungsleitung in Anspruch genommen werden. Es blieben also noch für die Zeit der Reflexübertragung im Rückenmark gerade 0,005 Sekunden übrig. An und für sich mag diese Zeit für den zentralen Vorgang sehr gering erscheinen. Aber sie darf doch nicht zu gering geschätzt werden, denn, wie eben erwähnt, kann sie genügen für die Fortleitung der Erregung durch eine Nervenbahn von 32 cm Länge.

Alles in allem können wir hinsichtlich der absoluten Grösse der Differenz zwischen der Reflexzeit des Kniephänomens und der Latenzzeit der Unterschenkelstreckung bei direkter Quadrizepsreizung folgendes

1) L. Hermann, Lehrbuch der Physiologie. 1905.

2) H. Vierordt, Anatom., physiol. u. physikal. Daten und Tabellen. 1906.

3) Th. Rosenheim, Arch. f. Psychiatrie Bd. 15 S. 184.

sagen. Es ist möglich, dass die gefundene Differenzzeit für die Fortpflanzung der Erregung durch den Reflexbogen ausreicht: aber bei dem heutigen Stande unserer Kenntnisse von der Geschwindigkeit der Nervenleitung und der reduzierten Reflexzeit können wir diese Annahme weder beweisen noch umstossen.

Andererseits spricht aber das Vorhandensein einer Differenz zwischen den Latenzzeiten bei beiden Reizarten an und für sich und insbesondere einer so bedeutenden Differenz für die reflektorische Natur des Kniephänomens. Denn wenn man trotzdem die Quadrizepszuckung bei der Sehnenperkussion als den Effekt direkter Muskelreizung auffassen wollte, so könnte doch die Differenz der Latenzzeiten nur durch die verschiedene Art des Reizes bedingt sein. Es erscheint aber mehr als unwahrscheinlich, dass die Grösse der Latenzzeit bei faradischer Muskelreizung von der bei mechanischer Reizung durch Sehnenperkussion sich ergebenden in solchem Grade abweichen könnte, wie dies unsere Versuchsergebnisse zeigen — vor allem auch in Rücksicht darauf, dass die Grösse der bei beiden Reizarten ausgelösten Bewegung, der Ausschlag der Unterschenkelstreckung, annähernd gleich war.

So kommen wir zu dem Ergebnis, dass die in den vorstehenden Versuchen ausgeführten Latenzbestimmungen zum mindesten als eine weitere Stütze der Reflextheorie der Sehnenphänomene aufgefasst und verwertet werden können.

II. Weitere Untersuchungen über den Kniereflex.

Allgemeine Methodik.

Es war die Aufgabe der folgenden Versuche, bei langsam laufendem Registrierzylinder den Ausschlag der Unterschenkelstreckung bei rhythmisch sich wiederholender Perkussion der Patellarsehne fortlaufend graphisch darzustellen bei gleichbleibender Reizstärke und gleichem Reizintervall, und so zunächst die Höhe der Kurven an sich und den Einfluss längerer Fortsetzung der Reizungen und weiter den Einfluss der Reizfrequenz und Reizintensität auf die Reflexgrösse festzustellen. Auch derartige Untersuchungen sind geeignet, die Frage nach der Natur der Sehnenphänomene der endgültigen Lösung näher zu bringen.

Die folgenden Versuche sind wiederum fast ausschliesslich an Kaninchen ausgeführt. Zur Narkose benutzte ich die zuerst von

Heffter¹⁾ dargestellte, besonders von Richet²⁾ empfohlene Chloralose, eine Verbindung von Chloral und Traubenzucker, welche, so weit ich sehe, zu physiologischen Zwecken bisher in Deutschland noch nicht in grösserem Maasse angewandt worden ist. Dosen von 0,09 bis 0,12 g dieses Mittels in warmer, alkoholischer Lösung in die Peritonealhöhle injiziert rufen bei Kaninchen ausnahmslos nach wenigen Minuten eine gleichmässige, anhaltende Narkose hervor. Diese ist dadurch ausgezeichnet, dass neben völliger Aurnhebung der Schmerzempfindung und der willkürlichen Bewegung die Reflex-erregbarkeit eine lebhaft bleibt, ja zuweilen gesteigert ist. Es er-

Fig. 3. Versuchsanordnung bei fortlaufender Registrierung des Kniereflexes.

scheint daher die Chloralose wie kaum ein anderes Narkosemittel gerade zu Reflexuntersuchungen geeignet.

Was die Versuchsanordnung betrifft, so erhellt aus der obenstehenden Abbildung (Fig. 3), dass die Registrierung der Unterschenkelbewegung dieselbe war wie in den früheren Versuchen. Die Rotation der Trommel wurde möglichst verlangsamt. Der Ausschlag des Stirn-

1) A. Heffter, Über Chloralglykose und ihre Wirkung. Berl. klin. Wochenschr. 1893. Nr. 20.

2) Ch. Richet, Le chloralose dans l'expérimentation physiologique. Arch. ital. de Biol. t. 21 p. 266. — M. Hanriot et Ch. Richet, De l'action physiologique du chloralose. Mémoires de la soc. de biolog. 1893. — M. Hanriot et Ch. Richet, Effets physiologiques du chloralose. Compt. rend. de la soc. de biol. 1893. Referate über diese beiden Arbeiten im Zentralblatt f. Physiologie 1893.

schreibhebels wurde meist dadurch etwas gedämpft, dass nach dem Prinzip von Grützner ein geringer elastischer Zug auf den freien Hebelarm ausgeübt wurde durch ein schräg — unter einem Winkel von 60° — zu dem Hebelarm verlaufendes Gummiband, oder dadurch, dass der freie Hebelarm durch ein kleines Gewicht belastet wurde. In dem zu dem Schlaghammer führenden Stromkreis war jetzt statt des Schlüssels eine Kontaktuhr eingeschaltet, welche in bestimmten Zeitintervallen durch momentane Stromunterbrechung einen

Reizintervall 10 Sek.

Fig. 4 a.

Reizintervall 20 Sek.

10 Sek.

1 Sek.

Fig. 4 b.

Fig. 4. Prüfung der Schlagintensität. *a* Bei gleichbleibendem mittleren Reizintervall (10 Sek.). *b* Bei sukzessiver Verkürzung des Reizintervalls (20—1 Sek.).

kurzen, scharfen Schlag des Hammers auf die Patellarsehne auslöste. Batterie und Uhr fehlen auf der Fig. 3.

Der Schlaghammer, dessen Konstruktion aus der Fig. 3 gut ersichtlich ist, lässt sich in sehr feiner Weise einstellen. Einmal kann durch eine Schraube an dem längeren Hebelarm, welche auf einen Stab schlägt, die Schlaghöhe modifiziert werden. Ferner kann die Stärke, mit der der Hammer auf die Sehne aufschlägt, auch durch Heben und Senken der ganzen Schlagvorrichtung mittels Zahn und Trieb eingestellt werden. Die Schlagvorrichtung erwies sich als ganz exakt arbeitend, wie dies für die vorliegenden Versuche ja notwendig war. Die Gleichmässigkeit der Schlagintensität habe ich wiederholt geprüft. Zu diesem Zwecke liess ich die von der Kontaktuhr aus-

gelösten Schläge des Hammers — auch bei verschiedenen grossen Zeitintervallen — auf eine Aufnahmekapsel fallen, welche durch einen Schlauch mit einem Marey'schen Tambour mit stark vergrösserndem Schreibhebel in Verbindung stand. Die in Fig. 4 wiedergegebenen Kurven zeigen die absolute Gleichmässigkeit der Schlagintensität.

A. Schwankungen der Reflexgrösse.

In einer grösseren Reihe von Versuchen wurde die Grösse der Unterschenkelbewegung bei Perkussion der Patellarsehne fortlaufend — auch bei verschiedenen grossem Reizintervall — auf dem Kymographion registriert. Je nachdem ein längeres oder kürzeres Reizintervall eingestellt war, wurde die Umdrehungsgeschwindigkeit der Registriertrommel verlangsamt oder beschleunigt. Es ergab sich dabei stets ein auffallender, unregelmässiger Wechsel in der Grösse der Reflexbewegung. Dies war in den Versuchen, in denen mittels Paraffininjektion eine Gehirnausschaltung vorgenommen war, ganz in derselben Weise der Fall wie bei Narkotisierung der Tiere mittels Chloralose. Die auf der Tafel II wiedergegebenen Kurven *a*, *b* und *c* zeigen diese Schwankungen der Reflexgrösse bei fortlaufender Registrierung der Sehnenreflexe und zwar bei einem Reizintervall von 30, 10 und 1 Sekunde.

Die unregelmässigen Schwankungen der Reflexgrösse bei gleichbleibender Stärke und gleichem Zeitintervall der Sehnenperkussionen lassen sich auch gut darstellen, indem man die Gipfel der Ausschläge auf den Kurven miteinander durch Linien verbindet. Ich habe zum Studium dieser Schwankungen eine ganze Anzahl solcher Gipfelkurven mit grösster Genauigkeit hergestellt. Von diesen sind einzelne auf Tafel II (*d*, *e* und *f*) wiedergegeben. Die Reizintervalle betrugen 30, 10 und 1 Sekunde.

Auch ein genaueres Studium dieser Schwankungen der Reflexgrösse an der Hand zahlreicher Kurven lehrt, dass dieselben eine irgendwie regelmässige Wellenform nicht zeigen. Eine gewisse Periodizität kommt ja in den Kurven zweifellos zum Ausdruck, aber dieselbe ist in jeder Hinsicht eine ganz unregelmässige. Weiter ergibt sich, dass die Variationen der Reflexgrösse eine deutliche Abhängigkeit von der Reizstärke nicht erkennen lassen. Noch auffallender ist der Befund, dass die Grösse des Reizintervalls keinen charakteristischen Einfluss auf die periodischen Schwankungen hat. Ver-

langsam man bei sehr grossem Reizintervall (bis zu 30 Sekunden) die Geschwindigkeit der Trommel derart, dass auf den Kurven die Abszissenabstände der Reflexbewegungen ebenso klein sind wie bei einem Reizintervall von 1 Sekunde, so weisen die Bilder der mit so verschieden grossem Reizintervall registrierten Kurven keine wesentlichen Differenzen auf.

Von einzelnen Autoren, welche sich mit der Untersuchung der Sehnenreflexe beschäftigt haben, ist es bereits als eine auffallende Beobachtung hervorgehoben worden, dass trotz gleichbleibender Stärke der Sehnenperkussion bei wiederholten Reizungen der Ausschlag der Reflexbewegung ein wechselnd grosser ist. Zu weiteren Untersuchungen haben diese Beobachtungen beim Sehnenreflex nicht geführt. Es ist ja auch bisher noch nicht unternommen worden, die Sehnenreflexe in so exakter Weise fortlaufend zu registrieren, wie dies in meinen Versuchen geschehen ist. Dagegen hat man bei anderen Reflexen schon früher Variationen der Reflexgrösse bei Registrierung von Reflexreihen beobachtet. So fand Biedermann¹⁾ in seinen Versuchen am Frosch bei elektrischen Reizungen des zentralen Ischiadicusstumpfes, dass nur bei sehr grossen Reizintervallen (2—4 Sekunden) wenigstens einige Zeit hindurch ziemlich gleich hohe Zuckungen auszulösen sind. Je höher die Reizfrequenz stieg, um so ungleicher fielen die Zuckungen aus, indem hohe und niedrige entweder ganz unregelmässig aufeinanderfolgten, oder seltener ein gewisser Rhythmus sich ausprägte, so dass auf eine oder einige höhere Zuckungen eine Reihe niederer folgten. Biedermann führt diese Erscheinungen darauf zurück, dass die Anspruchsfähigkeit des Zentralorgans nicht nur durch die allmählich sich entwickelnde Ermüdung beeinflusst wird, sondern auch eine Wechselwirkung der einzelnen Erregungen im Sinne einer Summation der Reize stattfindet.

Später hat Fano²⁾ bei der Schildkröte die bei elektrischen Hautreizungen von gleichbleibender Stärke und von bestimmtem, meist 30 Sekunden betragendem Intervall erfolgenden Reflexbewegungen fortlaufend registriert. Es ergaben sich dabei ziemlich erhebliche Schwankungen der Grösse der Latenzzeit und diesem entsprechende Schwan-

1) W. Biedermann, Beiträge zur Kenntnis der Reflexfunktion des Rückenmarkes. Pflüger's Arch. Bd. 80 S. 408.

2) G. Fano, Contribution à l'étude des réflexes spinaux. Arch. ital. de Biol. t. 39. 1903.

kungen der Höhe der Reflexbewegungen, deren Kurven den von mir beobachteten sehr ähnlich sind. Fano führt diese Schwankungen auf Variationen der Erregbarkeit der nervösen Zentren zurück. Diese sollen seiner Ansicht nach von periodischen, vom Kopfmarke ausgehenden Einflüssen abhängig sein, welche der Reflexfähigkeit des Rückenmarks einen oszillierenden, periodischen Charakter geben. Zu dieser letzteren Annahme führten ihn seine Versuchsergebnisse bei sukzessiver Abtragung des Zentralorgans. Die periodischen Variationen der reflektorischen Extremitätenbewegungen waren am ausgesprochensten und stärker als im Normalzustand des Zentralorgans, wenn auch die Lobi optici zerstört waren und so der automatischen Tätigkeit des Bulbus freier Spielraum gegeben war. Dagegen verminderten sie sich in bemerkenswertem Grade nach Durchschneidung des oberen Rückenmarks.

Etwas später als Fano beobachtete Pari¹⁾ ähnliche Oszillationen der Reflexgrösse bei Versuchen, in denen er beim dekapierten Frosch den Ischiadicus mit faradischen Strömen reizte und die reflektorischen Kontraktionen des Gastrocnemius der anderen Seite registrierte. Auch Pari fasst die Schwankungen der Reflexgrösse als eine Folge von Oszillationen der Erregbarkeit der Reflexzentren auf. Nach seinen Versuchen sind diese zentralen Oszillationen ziemlich regelmässige und zeigen in ihrer Abhängigkeit von der Reizfrequenz eine Tendenz, den Rhythmus der Reize anzunehmen. Seiner Ansicht nach sind die Erregbarkeitsschwankungen bedingt durch Modifikationen im Stoffwechsel der Zentren, speziell durch ein abwechselndes Prävalieren der assimilatorischen und der dissimilatorischen Prozesse.

Prof. Langendorff²⁾ hat vor einigen Jahren wiederum bei der Schildkröte, bei der Gehirn und oberes Rückenmark zerstört war, bei in bestimmten Intervallen erfolgenden elektrischen Hautreizungen von gleichbleibender Stärke Kurven von Reflexbewegungen der unteren Extremitäten aufgezeichnet, welche ähnliche, unregelmässig periodische Schwankungen der Reflexgrösse zeigen, wie sie sich in meinen Kurven darstellen.

1) G. A. Pari, Sur la tendance des oscillations automatiques de l'excitabilité des centres nerveux à se synchroniser avec les stimulus. Arch. ital. de Biol. t. 42. 1904.

2) O. Langendorff, Physiologie des Rücken- und Kopfmarks. Nagel's Handb. d. Physiol. Bd. 4 S. 246.

Nach den erwähnten Beobachtungen der Autoren und meinen eigenen Untersuchungen erscheint die Annahme berechtigt, dass die wesentliche Ursache der geschilderten Schwankungen der Reflexgrösse, in unregelmässiger Periodik erfolgende Variationen der Erregbarkeit der Reflexzentren bilden. Dass es sich um eine Erregbarkeitswelle in den spinalen Zentren handelt, lehren die Versuche Langendorff's wie meine Versuche, bei denen durch Paraffininjektion in die Karotis auch eine Ausschaltung der Medulla oblongata bedingt war (künstliche Atmung). So können bei diesen Schwankungen der Reflexerregbarkeit bulbäre Einflüsse eine wesentliche Rolle nicht spielen, wie es Fano angenommen hat, welcher übrigens bei Abtrennung des Kopfmarks auch nur eine Verminderung der Oszillationen der Reflexgrösse beobachtete. Die von mir in einer grossen Reihe von Versuchen festgestellte Tatsache, dass auch bei sehr grossen Reizintervallen jene Schwankungen der Reflexgrösse auftreten, zeigt weiter, dass diese Erscheinungen durch Summation von Reizen, wie Biedermann annahm, im wesentlichen nicht bedingt sein können. Die letztere wird nur bei sehr gesteigerter Reizfrequenz auf die Höhe der Schwankungen der Reflexgrösse einen gewissen Einfluss haben können. Zu weiteren Ergebnissen über die Art der Erregbarkeitsschwankungen der Reflexzentren führen meine Versuche nicht.

Ich habe es dann weiter unternommen, die sich in meinen Kurven darstellenden Schwankungen der Reflexgrösse mit anderen in gewissem Rhythmus erfolgenden Vorgängen zu vergleichen. Was zunächst die Atmungsbewegungen anbetrifft, so lehrten meine dahin gerichteten Untersuchungen, dass zwischen dem Rhythmus derselben und den sich aus meinen Kurven ergebenden wellenförmigen Schwankungen der Reflexhöhe in keiner Weise Beziehungen aufzufinden sind. Ich habe dann in einigen Versuchen auf derselben Trommel über den Reflexbewegungen den Blutdruck längere Zeit registriert. Der Zweck dieser Versuche war es, festzustellen, ob die in den Traube-Hering'schen Wellen — welche ja auf periodischen Schwankungen in den vasomotorischen Zentren beruhen — sich aussprechende Periodizität eine Übereinstimmung zeigt mit der von mir beobachteten Periodizität in den Schwankungen der Reflexgrösse. Eine solche Übereinstimmung war in diesen Versuchen jedoch in keiner Weise zu konstatieren. Schliesslich habe ich noch untersucht, ob gewisse Schwankungen in dem Tonus der Quadrizeps-Muskulatur vorhanden

sind, mit denen die Veränderungen der Reflexhöhe in Beziehung stehen können. Zu diesem Zwecke wurde die Quadrizepssehne dicht oberhalb der Patella durchschnitten und, nachdem sie mit dem angrenzenden Muskelteil frei präpariert war, durch Vermittlung einer Rolle mit einem stark vergrößernden Engelmann'schen Schreibhebel in Verbindung gebracht. Der Muskel wurde dabei in geringem Grade angespannt, indem auf den freien Hebelarm ein elastischer Zug ausgeübt oder derselbe durch ein kleines Gewicht beschwert wurde. Es ergaben sich nun bei sehr lange fortgesetzter Registrierung absolut gleichmässig gerade Linien, auch wenn der auf den Muskel ausgeübte Zug durch Steigerung seiner absoluten Belastung von 4 auf 10 g allmählich vergrößert wurde. So scheint auch der Spannungszustand des Muskels Schwankungen nicht unterworfen zu sein, mit welchen die Oszillationen der Reflexgrösse in Zusammenhang stehen könnten¹⁾.

B. Ermüdungserscheinungen.

Bei meinen Versuchen, in denen längere Zeit hindurch in bestimmten Reizintervallen und bei gleichbleibender Reizintensität die Reflexbewegungen bei Perkussion der Patellarsehne registriert wurden, war es auch meine Aufgabe, zu beobachten, ob und in welcher Weise sich eine Ermüdung des Reflexapparates darstellt. Zunächst zeigte sich an einer Reihe von Kurven, auch bei solchen mit geringer Reizfrequenz, dass die Höhe der Reflexbewegungen unter Schwankungen allmählich abnimmt (cf. Taf. II *a* und *d*). Dabei war die Zeitdauer der Reizungen, d. h. die Zahl der Reizschläge, nach welcher eine solche Abnahme der Reflexgrösse eintrat, in den einzelnen Versuchen eine sehr wechselnde. Es scheinen hier zweifellos individuelle Differenzen, der Gesamtzustand des Tieres und andere Momente eine grosse Rolle zu spielen. Fast noch häufiger aber war eine Abnahme

1) Auch den Einfluss der Apnoe auf die Kurve der Reflexhöhe zu ermitteln, habe ich in einzelnen Versuchen beabsichtigt. Es gelang mir jedoch trotz sehr intensiver künstlicher Ventilation der Lungen nicht eine, wenn auch nur kurze, Apnoe herbeizuführen. Vielleicht ist das Ausbleiben der Apnoe hier auf das Narkosemittel, die Chloralose, zurückzuführen, welche in diesen Versuchen angewandt wurde. Ich habe derartige Untersuchungen bisher nicht wiederholen bzw. fortsetzen können. Die Resultate derselben können von Wichtigkeit sein: denn der Nachweis einer Beeinflussung des Kniephänomens durch die Apnoe würde eine bedeutsame Stütze der Reflextheorie des Phänomens darstellen.

der Reflexgrösse, wie sie als Ermüdungserscheinung gedeutet werden könnte, nicht zu konstatieren. So wurden Kurven registriert bei Reizintervallen von 10 Sekunden, in denen nach 2—300 Reizungen eine Abnahme der Reflexhöhe in keiner Weise hervortrat (cf. Taf. II *b* und *c*). Besonders lehrreich ist die auf der Tafel wiedergegebene Kurve *c*, auf der über 900 Einzelreflexe fortlaufend bei einem Reizintervall von 1 Sekunde registriert sind, ohne dass eine nennenswerte Abnahme der Reflexhöhe zu erkennen ist. Diese Beobachtungen lehren, wie wenig der Reflexapparat auch bei lange fortgesetzter Tätigkeit und bei geringen Reizintervallen der Ermüdung unterworfen ist unter günstigen Bedingungen, d. h. unter Bedingungen, welche im Stoffwechsel der Reflexzentren einen gleichmässigen Ausgleich des Verbrauchs durch regenerative Vorgänge gestatten.

C. Einfluss der Reizfrequenz auf die Reflexgrösse.

Von besonderem Interesse sind die Ergebnisse einer Reihe von Versuchen, in denen es meine Aufgabe war, festzustellen, ob und in welcher Weise die Reflexgrösse von der Reizfrequenz bei sukzessiver Veränderung der letzteren abhängig ist. Es wurden bei diesen Versuchen die Reflexbewegungen in derselben Weise wie bisher fortlaufend registriert, aber dabei in bestimmten Abständen das Reizintervall von 30 bzw. 20 allmählich bis auf 1 Sekunde verringert. Mit dem jedesmal eingestellten Reizintervall wurde eine Reihe von 20 Reflexen aufgezeichnet. Die durch die Einstellung der Kontaktuhr auf ein neues Reizintervall bedingten Pausen zwischen den einzelnen Reflexreihen betrugen nur 5—10 Sekunden. Es zeigte sich hierbei, dass bei langen Reizintervallen von 30—10 Sekunden eine nennenswerte Veränderung der Reflexgrösse nicht zu konstatieren ist. Dagegen trat bei einer Verkürzung des Reizintervalls auf 5 Sekunden und darüber ein schnelles, staffelförmiges Ansteigen der Höhe der Reflexbewegungen ein. Dieser Anstieg erreichte bei einem Reizintervall von 1 bzw. 2 Sek. ein Maximum. Liess man, nachdem das letztere erreicht war, wieder eine sukzessive Verlängerung des Reizintervalls eintreten, so fiel die Höhe der Reflexkurve wieder staffelförmig ab, in ähnlicher Weise, aber langsamer, als der Anstieg der Reflexgrösse erfolgt war. Dies Ergebnis ist aus der folgenden Fig. 5 ersichtlich.

Diese Versuche lehren, dass beim Kniephänomen bei gleichbleibender mittlerer Reizintensität und suk-

zessiver Steigerung der Reizfrequenz die Reflexbewegungen um so grösser werden, je kleiner die Intervalle zwischen den einzelnen Reizen sind. Ein solcher Einfluss der Reizfrequenz auf die Reflexgrösse, wie er hier festgestellt ist, kann durch nichts anderes als durch die Wirkung einer Summation der Reize erklärt werden.

Fig. 5 a.

Fig. 5 b.

Fig. 5. Versuch vom 7. März 1904 (Kaninchen. Chloralose intraperiton. 0,12. Hebel 8:9). Sukzessive Verkürzung bzw. Verlängerung des Reizintervalls. Die durch Neueinstellung der Kontaktuhr bedingten Pausen betrugen bei Reflexreihe *a* 8 Sekunden, bei Reflexreihe *b* 5, 5, 5, 5, 15, 12, 10, 5, 10, 10 Sekunden.

Die Summation der Reize tritt darin hervor, dass die Erregbarkeit der Reflexzentren durch Reize, welche in nicht zu grossen Intervallen aufeinanderfolgen, gesteigert wird. Es ist hierbei anzunehmen, dass jeder einzelne Reiz eine gewisse Veränderung, einen gewissen Erregungszustand in der zentralen Nervensubstanz hinterlässt, welcher — im Gegensatz zu der Reizung peripherer Nerven — erst allmählich wieder abklingt. Jeder folgende Reiz wird von dem

in grössere Erregbarkeit versetzten Zentrum aufgenommen werden und so eine grössere Reflexwirkung herbeiführen, als dem Einzelreiz an sich zukommen würde. Um so mehr wird dies der Fall sein, je schneller die Reize aufeinanderfolgen. Dass zum Zustandekommen einer Summation der Reize die absolute Grösse der Reizintervalle maassgebend ist, sehen wir auch aus meinen Versuchen, in denen bei sehr langen Reizintervallen von 30, 20 und auch 10 Sekunden eine Steigerung der Reflexgrösse noch nicht eintrat.

Diese auch beim Kniephänomen gelungene Feststellung des Einflusses der Reizfrequenz auf die Reflexgrösse im Sinne einer Summation der Reize ist dadurch von besonderer Wichtigkeit, dass sie geeignet erscheint, in der Frage nach der Natur der Sehnenphänomene eine bedeutende Rolle zu spielen. Denn in der Summation der Reize tritt, wie in kaum einer anderen Erscheinung, ein fundamentaler Unterschied zwischen den physiologischen Vorgängen in der zentralen und in der peripheren Nervensubstanz zutage. Wir können deshalb die durch meine Untersuchungen am Kniephänomen festgestellte Erscheinung der Summation der Reize als einen Beweis ansehen für die Annahme, dass das Sehnenphänomen einen echten Reflex darstellt.

D. Einfluss der Reizintensität auf die Reflexgrösse.

Schliesslich waren eine Reihe meiner Versuche der Feststellung gewidmet, in welcher Weise die Höhe der Reflexbewegungen von der Intensität des Reizes bei sukzessiver Steigerung des letzteren beeinflusst wird. Es wurde zu diesem Zwecke ein Fallhammer konstruiert, welcher aus einer dünnen Metallröhre bestand, an deren Ende ein aus Kork bestehender Knopf angebracht war. Dieser Fallhammer, welcher ein Gewicht von 15,5 g hatte, bewegte sich in einer Führungshülse, in welcher er durch einen am Ende der Hülse angebrachten Elektromagneten festgehalten werden konnte, der einen in der Mitte des Fallhammers quer befestigten Metallstab anzog. Durch die in den zum Elektromagneten führenden Stromkreis eingeschaltete Kontaktuhr wurde in Intervallen von 5 Sekunden ein Fallen des Hammers auf die Patellarsehne herbeigeführt. Die Fallhöhe, d. h. der Abstand der Oberfläche des Korkknopfes von der Sehne, wurde durch einen seitlich aufgestellten Zentimeterstab vor jeder Reflexreihe bestimmt. Die Registrierung der Unterschenkelbewegung erfolgte in derselben Weise wie bisher. Die mit dem Fallhammer ausgelösten Reflexbewegungen wurden mit sukzessiver

Steigerung der Fallhöhe von 5 auf 7,5—10—15—20—25—30—35 mm auf der Trommel aufgezeichnet, indem bei den einzelnen Fallhöhen zehn Reflexe registriert wurden.

Es ergab sich nun bei diesen Versuchen, dass die Grösse der Reflexbewegungen, welche in den einzelnen Reihen ähnliche Schwankungen wie die oben geschilderten zeigt, mit der sukzessiven Steigerung der Fallhöhe, d. i. der Reizintensität, allmählich, anfangs schneller, dann langsamer ansteigt, um bei einer Fallhöhe von 30 mm ein Maximum zu erreichen. Wird über dieses hinaus die Fallhöhe noch weiter vergrößert, so zeigt die Kurve einen deutlichen Abfall. Ein derartiges Ergebnis zeigt die folgende Fig. 6.

Fig. 6. Versuch vom 18. März 1904. (Kaninchen. Chloralose intraperiton. 0,09. Schreibhebel 1:2.) Reflexreihe mit sukzessiver Steigerung der Reizintensität (Fallhöhe des Hammers). Reizintervall 5 Sekunden.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass innerhalb eines nicht unbedeutenden Bereichs der Reizstärke mit sukzessiver Steigerung der Reizintensität eine sukzessive Zunahme der Reflexgrösse eintritt. Der nach Überschreiten eines regelmässig auftretenden Reflexmaximums erfolgende Abfall der Reflexgrösse ist jedenfalls zum Teil dadurch herbeigeführt, dass die mechanische Druckwirkung des Hammers bei so grosser Fallhöhe eine Hautreizung verursacht, welche eine Hemmung des Sehnenreflexes in gewissem Grade bedingt.

Die Gesamtergebnisse der vorliegenden Untersuchungen können in der Frage nach der Natur der Sehnenphänomene nur zu einer

Bestätigung der Annahme dienen, dass es sich bei den Sehnenphänomenen um echte Reflexe handelt. So konnte die bei meinen Latenzbestimmungen sich ergebende bedeutende Differenz zwischen der Reflexzeit beim Sehnenphänomen und der Latenzzeit der Quadrizepskontraktion bei direkter Muskelreizung auch in Anbetracht der absoluten Grösse dieser Differenzzeit nur auf die reflektorische Auslösung der Muskelkontraktion bei Sehnenperkussion zurückgeführt werden. Ebenso waren die Schwankungen der Bewegungsgrösse beim Kniephänomen von unregelmässiger Periodizität, welche bei fortlaufender Registrierung derselben bei gleichen Reizintervallen und gleichbleibender Stärke auftreten, auf Erregbarkeitsschwankungen im Reflexzentrum zu beziehen. In dem Einfluss, den die Reizfrequenz bei sukzessiver Steigerung derselben auf die Reflexgrösse ausübt, kam die Wirkung der Summation der Reize zum Ausdruck, eine Erscheinung, in der sich ein prinzipieller Unterschied der Vorgänge in der zentralen und der peripheren Nervensubstanz manifestiert. Während die übrigen Befunde nur als eine Stütze der Reflextheorie der Sehnenphänomene angesehen werden können, liegt in diesem letzteren Ergebnis geradezu ein Beweis für die reflektorische Natur der Sehnenphänomene vor.

Tafel-Erklärung.

- a. Versuch vom 4. März 1904. Kaninchen; Chloralose intraperit. 0,12; Hebel 1:2. Reflexreihe bei Reizintervall: 30 Sekunden.
 - b. Versuch vom 21. Januar 1904. Kaninchen; Chloralose intraperit. 0,2. Reflexreihe bei Reizintervall: 10 Sekunden.
 - c. Versuch vom 7. März 1904. Kaninchen; Chloralose intraperit. 0,12; Hebel 8:9. Reflexreihe bei Reizintervall: 1 Sekunde. Die untere Reihe ist eine direkte Fortsetzung der oberen; die Unterbrechung (3 Minuten) ist durch Einsetzen einer neuen Trommel bedingt.
 - d. Gipfelkurve von a. Die Reizintervalle sind für die ersten 20 Reflexe auf der Abszisse angegeben. 100 Reflexe.
 - e. Gipfelkurve von b. 204 Reflexe.
 - f. Gipfelkurve von c (obere Reflexreihe). 258 Reflexe.
-

R. J. W.

Fig. b.

R. J. W.

Fig. c.

R. J. W.

Fig. a.

Fig. e.
(Fortsetzung)