vor dem Eintritt der Asphyxie¹⁾ aus den bekannten, hier doppelt motivierten Gründen, gehe möglichst langsam präparatorisch vor.

Als Operationsverfahren empfiehlt Ch. mit unseren Autoritäten die Tr. superior (gegen Monti), die durch Bose's Querablösung der Ilueter'schen Fascia thyreo-laryngea Raum genug gebe, und fügt den beherzigenswerthen Rath hinzu, wo es irgend angeht, den Ringknorpel zu schonen. Es ist empfehlenswerth, Canülen von 4mm Lichtung vorrätzig zu halten. Die Nachbehandlung²⁾ muss um so sorgfältiger sein, je jünger das Kind ist. Gegen die Schluckstörungen dürfte die vom Referenten empfohlene temporäre Tamponade (am besten mit Glycerin-Watte oberhalb der Canüle nach Israel) empfehlenswerth sein. Zwei werthvolle Tabellen sämtlicher geheilter Fälle beschliessen die treffliche Dissertation, die mit Recht den Ausspruch Asthley Cooper's citirt: „dass sich auch derjenige um das Menschengeschlecht verdient macht, der von hundert dem nahen Tode Geheilten nur einen einzigen rettet“.

VIII. Die Tracheotomie bei Kindern unter zwei Jahren. Inaug.-Dissert. von Gustav Chaym, Berlin 1883 (abged. im Jahrb. f. Kinderhke. 1884). Ref. Pauly (Posen).

Von Trousseau, le veritable promoteur de la tracheotomie, stammt (aus dem Beginn seiner Praxis)¹⁾ der Satz, dass bei Kindern unter 2 Jahren die Operation wegen Diphtheritis wegen des fast unvermeidlichen Misserfolges contraindicirt sei; auch in Deutschland galt das Princip (z. B. bei dem um die Tracheot. so hochverdienten Wilms). Es bedurfte eines sehr grossen Materials, um auch diese letzte Contraindication siegreich aus dem Felde zu schlagen, die aufrichtig gesagt, bei einer lebensrettenden Operation nie zu Macht bestand.

Auf Prof. Küster's Anregung hat Coll. Chaym das ganze Material (beinahe 1000 Fälle) mit einer gerade für dieses Thema wünschenswerthen Wärme der Darstellung in seiner Doktordissertation gesammelt. Die Hauptgegengründe waren 1) die in den anatomischen Verhältnissen des Halses 1—2jähr. Kinder begründeten Schwierigkeiten und Gefahren, so dass der nicht gehörig vorbereitete Arzt aus der an und für sich einen geringfügigen Eingriff darstellenden Operation eine das Leben bedrohende Verletzung machen kann; 2) die hohe Mortalität. — Was letzten Punkt betrifft, so sind von 56 tracheot. Kindern des 1. Lebensjahres 84 Proc., von 921 des 2. 85 Proc. gestorben, während die Durchschnittsmortalität der Trach. bei Diphth. zwischen 67 Proc. und 75 Proc. schwankt. Die öfter ventilirte Frage, ob die Operation in der Privatpraxis oder im Hospitale bessere Chancen hat, dürfte mit Rücksicht auf die Ernährung mit der Mutterbrust zu Gunsten der Privatpraxis entschieden werden. Die geringere Widerstandsfähigkeit des Säuglingsalters, die bekannten physiologischen Vorgänge (Dentition etc.), die Disposition zu Reflexkrämpfen, die Schwierigkeit der Ernährung und so manches Andere sind zweifellos die Gründe der hohen Sterblichkeit, und diese reicht hin, um croupkranke Kinder der qualvollsten aller Todesarten, dem Erstickungstode widerstandslos preiszugeben.“ —

Was den ersten Punkt anlangt, so können das enge anatomische Terrain, die extreme Beweglichkeit, die Weichheit und Enge der Luftröhre allerdings zu den verhängnissvollsten Irrthümern Anlass geben: seitliche Durchschneidung, Verletzung des Oesophagus, Verschluss des Tracheal-lumens durch Anziehen des Häkchens.

Howard Marsh nennt die Tracheotomie bei einem jungen Kinde mit kurzem und fettem Halse vielleicht die furchtbarste und mühsamste Operation; — doch sind alle Schwierigkeiten von dem in jeder Beziehung wohl vorbereiteten Arzte zu überwinden. Man operire möglichst früh, noch

¹⁾ Ende der sechziger Jahre sprach T. sich für die Operation in jedem Alter aus.