Epoca Angulo Distancia No. Peso

Σ 2745. Mag. 5.6, 7.7.

$\alpha = 20^h 58^m 8^s$ $\delta = -6^\circ 13'$.

1900.668 188° 56' 2"47 2 3
Sensiblemente fija.

Σ 2799. Mag. 6.6, 6.6.

$\alpha = 21^m 24^m 0^s$ $\delta = +10^\circ 39'$.

1900.791 120° 0' 1"21 2 3
Muy sensible movimiento.

β 1212. Mag. 6.3, 7.1.

$\alpha = 21^h 34^m 4^s$ $\delta = -0^\circ 31'$.

1900.668 205° 5' (est.) 0"50 4 3

Considero seguro el alargamiento, no obstante no pueden conciliarse mis observaciones con el ángulo dado por Mr. Aitken (A. N. 3584) $p = 269^\circ 0'$, 1898.78.

β 276 = η Piscis Austrini. Mag. 6.5, 7.0.

$\alpha = 21^h 55^m 1^s$ $\delta = -28^\circ 56'$.

1900.769 111° 58' 1"68 3 3
Dos medidas de distancia. Fija.

β 172 = γ Aquarii. Mag. 5.6, 5.7.

$\alpha = 22^h 18^m 9^s$ $\delta = -5^\circ 20'$.

1900.654 356° 7' (est.) 0"6 3 2
1900.663 8 32 0.6 4 3
1900.66 4 24 0.6

Difícil, pero por momentos la desdoble bien. Binaria.

Hh 762 = γ Aquarii. Mag. 6.0, 6.0.

$\alpha = 22^h 21^m 2^s$ $\delta = -17^\circ 15'$.

1900.668 308° 19' 6"34 2 3
Binaria.

Σ 2909 = ζ Aquarii. Mag. 4.0, 4.1.

$\alpha = 22^h 23^m 7^s$ $\delta = -0^\circ 32'$.

1900.663 321° 33' 2"93 4 3
Binaria.

Barcelona, Observatorio Privado, 23 octubre 1900.

Epoca Angulo Distancia No. Peso

Σ 2915. Mag. 8.5, 8.7.

$\alpha = 22^h 27^m 6^s$ $\delta = +6^\circ 54'$.

1900.608 150° 34' 11"98 2 3
Movimiento retrógrado.

h 5367 = γ Piscis Austrini. Mag. 4.5, 9.0.

$\alpha = 22^h 47^m 0^s$ $\delta = -33^\circ 24'$.

1900.769 268° 42' 3"75 2 3
Lento movimiento retrógrado.

Howe 117 = β 772 = δ Piscis Austrini.

Mag. 4.2, 10.0.

$\alpha = 22^h 50^m 4^s$ $\delta = -33^\circ 4'$.

1900.769 239° 18' — 2 3

La distancia es imposible de medir. Sensiblemente invariable.

β 279 = ω^2 Aquarii. Mag. 5.0, 11.0.

$\alpha = 23^h 37^m 5^s$ $\delta = -15^\circ 6'$.

1900.772 90° 17' — 4 1

La distancia es imposible medirla por la pequeñez de B.

h 5417 = G. 26 Sculptoris. Mag. 6.0, 10.2.

$\alpha = 23^h 39^m 3^s$ $\delta = -26^\circ 48'$.

1900.756 324° 22' 7"81 2 1

Una sola medida de distancia. Lento movimiento.

107 Aquarii = Hh 807. Mag. 5.3, 6.5.

$\alpha = 23^h 40^m 8^s$ $\delta = -19^\circ 14'$.

1900.663 140° 49' 5"10 4 3

1900.750 136 58 5.61 2 3

1900.71 138 54 5.30

En la primera noche hay dos medidas de ángulo. Sensiblemente fija.

85 Pegasi. Mag. 6.0, 9.0.

$\alpha = 23^h 56^m 8^s$ $\delta = +26^\circ 34'$.

1900.682 340° 13' 35"01 2 3

Rápido movimiento.

J. Comas Solá.

Pianeta (1) Cerere

osservato nell'opposizione 1900 in Arcetri all' Equatoriale di Amici.*)

Obiettivo 284 mm. Micrometro a lamine 19"45. Ingr. 124.

1900	T.m.Arcetri	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cf.	α app.	P	R	δ app.	P	R	Red. ad l. app.	*
Lugl. 25	11 ^h 57 ^m 44 ^s	-0 ^m 23 ^s 79	-13' 56"7	16.8	21 ^h 2 ^m 41 ^s 19	-6	+4	-29° 6' 11"8	+43	-28	+4 ^s 63 + 22'0	1
25	11 57 44	-1 55.08	-12 47.2	16.8	21 2 41.26	-6	+4	-29 6 14.6	+43	-26	+4.63 + 22.0	2
26	11 29 2	-0 31.21	+10 33.0	12.8	21 1 49.34	-8	-5	-29 12 22.3	+42	+24	+4.66 + 21.8	3
26	11 29 2	-1 58.64	+ 0 49.3	12.8	21 1 49.39	-8	-0	-29 12 19.7	+42	+ 2	+4.66 + 21.8	4

*) Nell'occasione che si pubblicano queste osservazioni si desidera ricordare che nel prossimo gennaio 1901 si compie il centenario della famosa scoperta del Piazzi a Palermo (che fu fondamentale nella storia degli Asteroidi), la scoperta di Cerere.

1900	T.m.Arcetri	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cf.	α app.	P	R	δ app.	P	R	Red. ad l. app.	*
Lugl. 27	11 ^h 16 ^m 12 ^s	-1 ^m 23 ^s 66	+ 4' 30" 8	16.8	21 ^h 0 ^m 56 ^s 92	-9	-2	-29° 18' 24" 7	+42	+11	+4.69 + 21.6	3
27	11 16 12	-2 51.09	- 5 14.7	16.8	21 0 56.97	-9	+3	-29 18 23.9	+42	-12	+4.69 + 21.6	4
28	11 34 6	+3 2.39	+ 5 25.4	16.8	21 0 3.03	-6	-2	-29 24 26.3	+43	+12	+4.71 + 21.4	5
28	11 34 6	+1 46.44	+ 7 41.6	16.8	21 0 2.84	-6	-3	-29 24 25.6	+43	+16	+4.71 + 21.4	6
29	11 10 18	+2 9.46	- 0 22.8	16.8	20 59 10.11	-8	+2	-29 30 14.5	+42	- 1	+4.72 + 21.4	5
29	11 10 18	+0 53.59	+ 1 51.9	16.8	20 59 10.00	-8	-1	-29 30 15.3	+42	+ 4	+4.72 + 21.4	6
30	11 12 7	+1 15.14	- 6 10.7	16.8	20 58 15.80	-8	+3	-29 36 2.5	+42	-14	+4.73 + 21.3	5
30	11 12 7	—	- 3 54.0	-8	—	—	—	-29 36 1.3	+42	- 9	+4.73 + 21.3	6
31	10 54 29	+0 21.43	-11 45.5	16.8	20 57 22.10	-9	+7	-29 41 37.3	+42	-30	+4.74 + 21.3	5
31	10 54 29	-0 54.45	- 9 29.8	16.8	20 57 21.98	-9	+6	-29 41 37.1	+42	-24	+4.74 + 21.3	6
Agos. 1	11 21 17	+2 19.43	+ 4 11.9	16.8	20 56 26.22	-6	-1	-29 47 20.3	+43	+ 9	+4.76 + 21.1	7
2	11 6 39	+1 25.08	- 1 10.4	16.8	20 55 31.90	-7	+1	-29 52 42.7	+43	- 3	+4.79 + 21.0	7
3	10 36 31	-0 27.39	+ 8 48.8	14.8	20 54 38.34	-9	-6	-29 57 53.0	+42	+24	+4.81 + 20.9	8
3	10 36 31	-0 30.61	+10 5.7	14.8	20 54 38.22	-9	-7	-29 57 54.9	+42	+27	+4.81 + 20.9	9
7	11 21 15	+1 43.42	+12 59.5	16.8	20 50 57.35	-3	-2	-30 17 50.4	+43	+28	+4.87 + 20.2	10
7	11 21 15	+1 12.57	+12 11.1	16.8	20 50 57.46	-3	-2	-30 17 49.2	+43	+26	+4.87 + 20.2	11

P = Parallaxe in centesimi di secondo di tempo per l'ascensione retta, ed in decimi di secondo d'arco per la declinazione.

R = Rifrazione nelle suddette unità.

Grand. media, 7^m 4, corrispondente alla data luglio 30^d 74.

Luglio 25, 26, 27. Sereno. — Luglio 28. Brutto sereno. — Luglio 29, 30, 31. Splendidissimo. — Agosto 1. Splendi-

dissimo. — Agosto 2, 3. Sereno mediocre. — Agosto 7. Splendidissimo, chiaro di luna prossima al Plenilunio. In questa sera in cui per causa dello splendor di luna non si vedono le piccole stelle si giudica con sicurezza che Cerere splende assai più di * 10 (in Cord. DM. posta di 7^m 8), e che * 10 splende assai di più di * 11 (8^m 3) quindi si conclude esser Cerere quasi di 7^m cioè più grande di quello che dà il Naut. Almanac 7^m 8.

Stelle di confronto.

*	α 1900.0	δ 1900.0	Autorità	*	α 1900.0	δ 1900.0	Autorità
1	21 ^h 3 ^m 0 ^s 35	-28° 52' 37" 1	1/12 (5 Cord. GC. + 4 ZC. + 3 Stone)	7	20 ^h 54 ^m 2 ^s 03	-29° 51' 53" 3	1/4 (3 Cord. GC. + ZC.)
2	21 4 31.71	-28 53 49.4	1/6 (4 Cord. GC. + 5 ZC.)	8	20 55 0.92	-30 7 2.7	1/10 (5 Cord. GC. + 2 ZC. + 3 Stone)
3	21 2 15.89	-29 23 17.1	Cord. ZC. 21 ^h 18	9	20 55 4.02	-30 8 21.5	1/14 (9 Cord. GC. + 2 ZC. + 3 Stone)
4	21 3 43.37	-29 13 30.8	Cord. GC. 29008	10	20 49 9.06	-30 31 10.1	1/2 (Cd. ZC. + AWe. 16474)
5	20 56 55.93	-29 30 13.1	1/6 (4 Cord. GC. + 2 ZC. + 3 Stone)	11	20 49 40.02	-30 30 20.5	1/2 (Cd. ZC. + AWe. 16481)
6	20 58 11.69	-29 32 28.6	1/6 (3 Cord. GC. + 3 ZC.)				

Confronto delle osservazioni coll'effemeride del Nautical Almanac 1900 (O - C).

1900	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	1900	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	1900	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$
Lugl. 25	+2.02	+5.1	Lugl. 28	+1.83	+8.9	Agos. 1	+2.03	+3.0
25	+2.09	+2.5	29	+2.12	+6.5	2	+1.86	+3.5
26	+1.58	+4.3	29	+1.98	+6.2	3	+1.94	+7.0
26	+1.68	+4.7	30	+2.07	+4.9	3	+1.81	+5.4
27	+1.75	+4.1	30	—	+6.6	7	+1.79	+5.4
27	+1.85	+2.6	31	+2.18	+4.7	7	+1.90	+6.4
28	+2.03	+7.8	31	+2.05	+5.5			

Questa serie di O - C [osservazione meno effemeride] non presenta alcuna variazione proporzionale al tempo. Malgrado che le osservazioni abbiano per fondamento posizioni di stelle con differente grado di bontà tuttavia gli O - C possono riguardarsi tutti di egual peso, eccettuati quelli di ascensione retta del 26 luglio a cui si può dare il peso 1/2

perchè basati non solo su posizioni di stelle dedotte da un unico catalogo, ma anche su 12 confronti anzichè su 16, che è il numero normale adottato per un'osservazione tipo in circostanze pienamente favorevoli. Facendo dunque il medio di tutti gli O - C si ottiene per la data media luglio 30^d 74

$$\Delta\alpha = +1.94 \quad \Delta\delta = +5.3.$$

Arcetri-Firenze, 1900 Ottobre.

A. Abetti.