(Aus dem Physiologischen Institut zu Königsberg i. Pr.)

Eine Methode, die Belegzellen der Magenschleimhaut isoliert zu schwärzen.

Von

Otto Weiss.

(Hierzu Tafel XII Fig. 8.)

Gelegentlich der vorstehend geschilderten Untersuchungen wurde eine neue Methode gefunden, die Belegzellen des Magens durch Fixation zu färben.

Es gelingt dies, wenn man Präparate der Magenschleimhaut zuerst in 4% iger Lösung von Formaldehyd fixiert und dann in eine Lösung von Osmiumsäure einlegt. Das Gewebe nimmt dabei einen olivgrünen Ton an, während die Belegzellen intensiv schwarz werden. Die Schwärzung erreicht nicht bei allen Zellen den gleichen Grad. An den weniger geschwärzten sieht man häufig einen hellen Fleck in der Zelle; dieser entspricht dem Zellkern.

Nach der beschriebenen Methode sind bis jetzt Belegzellen im Magen des Hundes, des Igels und der Schildkröte dargestellt worden.

Zur Illustration diene die Figur 8 der Tafel.

Die Methode wird gegenwärtig an einem grösseren Material erprobt. Nähere Mitteilungen werden später an anderer Stelle erfolgen.

Erklärung der Figur.

Fig. 8. Fundus eines Hundemagens. Belegzellen schwarz. Fixierung in 4% igem Formaldehyd, danach in 1% iger Osmiumsäurelösung. Leitz. Obj. 3 Ok. 4.

Die Zeichnung ist von Fräulein Gertrud Burdach ausgeführt worden, der ich auch an dieser Stelle bestens danke.

Paar 2.

M

Paar 3.

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9