mit kauftischem Kali schmilzt und die geschmolzene Masse mit Salzsäure und Wasser behandelt, bis man eine klare Flüssigkeit erhalten hat. Eine solche Auflösung gab durch Hydrothionsäure ein Schwefelantimon, welches bestand aus

Theorie. Versuch.

1 Mt. Ant.	55,28	55,45
4 „ Schwefel	66,72	66,55.

Die dritte Sulfurationsstufe ist der Goldschwefel, Antimon mit 5 Mt. Schwefel, welcher der Antimonsäure entspricht, und folglich aus

Antimon	61,59
Schwefel	58,41

besteht. Seine verschiedene Bereitungen sind bekannt. Man erhält ihn auch, wenn man durch Auflösungen, die Antimonsäure enthalten, z. B. durch die des flüssigen Chlorantimons in Wasser, welches Weinsäure enthält, Schwefelwasserstoffgas streichen läßt. Der Niederschlag hat eine orangefarbene Farbe, nur wenig heller, als wie der Niederschlag, welchen man mittelst Antimonoxyd erhält. Nach dem Trocknen behält er seine Farbe. Herr R. untersuchte dieses Schwefelantimon auf mehrfache Weise. Die erhaltenen Resultate stimmten aber stets mit der berechneten Zusammensetzung sehr nahe überein.

Antimonisulfurid und Antimonoxyd.

Notbschick:
glauzer;
Crocus u.
Vitrum An-
timoni

Die Verbindungen dieser Körper sind in den Apotheken bekanntlich Crocus Antimonii und Vitrum Antimonii, in welchen das Schwefelantimon mit dem Anti-

mon-

monoxjde in vielen Verhältnissen verbunden seyn kann. nach H. Rose.
Man hat auch bekanntlich den Kermes manchmal für eine solche Verbindung gehalten. Eine natürliche Verbindung dieser Art ist das Rothspießglanzerz. Herr H. Rose (Poggendorfs Annal. III. 453) hat auch dieses analysirt und darin gefunden:

69,86 Schwefelantimon

30,14 Antimonoxjd

= Sb + 2Sh S³, eine deshalb merkwürdige Zusammensetzung, weil sie das einzige Beispiel eines krystallisirten und in der Natur vorkommenden Oxysulphureturns ist.

Wenn Kermes und neutrales weinsteinfaures Kali, Kermes u. und Antimonfalze in Wasser aufgelöst und verbreitet auf weinstein- saure Salze einander wirken, so findet eine Zersetzung des Kermes statt und in der Flüssigkeit findet sich Antimonoxjd. Diese Beobachtung des Herrn Guéranger zu Maas fand Herr Lassaigne bestätigt. Sie wird die Aerzte aufmerksam machen, bei der Verordnung von Kermes mit neutralen weinsteinfauren Salzen hierauf Rücksicht zu nehmen. Die Art der Reactionen, die bei dieser Zersetzung vor sich gehen, verdient übrigens noch näher untersucht zu werden (Journ. de Chim. med. etc. I. 396. 398).

Brechweinstein.

Herr N. Bakkernagel bemerkt (in Kastner's Archiv V. 316), daß er mehrmals beobachtet habe, daß die Besondere Krystalle beim Brechweinstein.
nach dem ersten Abkühlen der Flüssigkeit an den innern Gefäßwänden sich absetzenden Brechweinstein, Krystalle an der

der Luft ihre Helligkeit und Durchsichtigkeit behielten, während gewöhnlich der Brechweinstein angegriffen wird und nach und nach zerfällt. Diese Krystalle stellten sechs- gliedrige Doppelpyramiden dar mit und ohne Säulen, auch vollkommene Säulen ohne alle Anlage zur Pyramidenform auch Apatit ähnliche Krystalle befanden sich darunter. Der Winkel zwischen den Pyramiden und Säulen betrug $47\frac{1}{2}^{\circ}$. Die geringe Menge dieser Krystalle erlaubte eine chemische Untersuchung derselben nicht, und bei späterer Darstellung des Brechweinsteins erhielt Herr W. dieselben nicht wieder. Vor dem Löthrohre decrepirt dieses Salz heftig und giebt auf der Kohle einen dunkelgelben Schmelz. Die Natur dieses Salzes war nicht näher zu bestimmen, daher auch nicht, ob es Brechweinstein ohne Krystallwasser oder eine ganz andere Verbindung sey.

Bestands-
theile des
Brechwein-
steins nach
R. Phillips.

Herr Richard Phillips hat eine neue Analyse des Brechweinsteins veranstaltet, und darin gefunden:

1 At. saures weinsteinsaures Kali	180	49,56
3 „ Antimon: Protopyd (52×3)	156	42,97
3 „ Wasser (9×3)	27	7,15
	<hr/> 363	<hr/> 100,00.

(Annals of Philos. IX. 375, Kastner's Arch. VI. 60, Férussac Bullet. des Sc. phys. IV. 128).

Beste Ver-
reitung
des Brech-
weinsteins
nach Henry.

Herr Henry hat eine vergleichende Reihe von Untersuchungen über die beste Darstellungsmethode des Brechweinsteins angestellt und giebt unter allen Methoden der Vorschrift der Dubliner Pharmacopoe den Vorzug. Diese schreibt vor:

Mi.

Nitro: Muriat (Subchlorür) von Antimon	125 Lb.
Bitartrat von Kali	, , , , 137 ,
Destillirtes Wasser	, , , , 1125 ,
Zur Bereitung des Nitro: Muriates schlägt sie vor:	
Schwefelantimon	, , , , 125 Lb.
Salzsäure	, , , , , 690 ,
Salpetersäure	, , , , , 8 ,

Die Auflösung werde durch eine große Menge Wasser gefüllt und der entstandene weiße Niederschlag getrocknet. Er wiegt 100. Henry erhielt nach diesen Verfahren unter Anwendung von 100 Nitro: Muriat des Antimon 125 Weinslein und 1000 Wasser nach der Auflösung durch Kochen einen Rückstand, welcher 13 Gran unangegriffenes Nitro: Muriat enthielt. Die filtrirte Flüssigkeit gab beim ersten Aufschuß sehr schöne weiße Krystalle von Brechweinslein, die vollkommen rein waren und keiner Umkrystallisation bedurften und 115 Lb. betrugen. Die Mutterlaugen gaben noch 32 Lb. Die Mutterlaugen waren sauer und enthielten Salzsäure, kein Eisen, Kalk, etwas Weinslein und Antimon.

Diese Methode, glaubt Herr Henry, welche bereits Macquer und Bergmann mit aller Genauigkeit beschrieben haben, verdiene daher mit den nöthigen Verbesserungen, der sie noch fähig seyn dürfte, wieder aufgenommen zu werden, da die Bewegungsgründe, welche die Nichtbefolgung derselben veranlaßten, der zu hohe Preis des Algarothpulvers nicht in Betracht gezogen werden könnten und jetzt auch nicht mehr gültig sey. Mit Vergnügen sehen wir den weiteren Versuchen des Herrn Henry

Henry über diesen Gegenstand entgegen (*Journal de Chim. med.* 1. 521).

A r s e n i k.

Reagen-
tien auf
Arsenik.

Die Entdeckung und Ausmittelung des Arseniks, besonders in gerichtlichen Fällen von so außerordentlicher Wichtigkeit, hat bekanntlich von jeher die Aufmerksamkeit der Chemiker in Anspruch genommen, um vollkommen unzweideutige Reagentien auf dieses Metall zu erhalten. Es ist aber nur eine Stimme darüber, daß die Reduction zu Metall stets das wichtigste Kriterium abgeben müsse.

Die Anwendung der zu diesem Behuf vom Herrn Professor Fischer empfohlenen einfachen electrischen Kette fand Herr Hofrath Buchner indeß nicht genügend, weil dabei stets ein bemerklicher Theil des Arseniks in Gasform als Arsenik-Wasserstoffgas sich verflüchtigt (*Kastner's Arch.* IV. 446, *Repertor.* von Buchner XXII. 14), und Herr Professor Meischl in Prag zeigte, daß diese Methode gar nicht anzuwenden sey (*Buchner's Repert.* 443. 447. Vergl. ferner v. Lotosiewicz in *Leimberg in Buchner's Repert.* XXI. S. 1 u. s. w.).

Herr Christison hat über die Ausmittelung des Arseniks mehrere Versuche angestellt, die sich wesentlich auf die Anwendung des Schwefelwasserstoffs und die Reduction beschränken. Wenn das Verhältniß des Giftes auch nur den 5000sten Theil einer Flüssigkeit beträgt, so ist der Niederschlag, welchen das Schwefelwasserstoff darin hervorbringt, doch immer noch sehr charakteristisch, und
wenn

wenn derselbe auch bei gemischten Flüssigkeiten nicht so deutlich seyn sollte; so ist er doch sehr geeignet, den Arsenik in einer schicklichen Form zur Reduction sich zu verschaffen. Ist die verdächtige Substanz fest, so wird sie mit Wasser einigemal ausgekocht und dann die Flüssigkeit der Wirkung des Schwefelwasserstoffs ausgesetzt. In vielen Fällen ist es aber nothwendig, folgende zwei vorbereitende Arbeiten vorangehen zu lassen. Zuerst muß man der Flüssigkeit Essigsäure zusetzen, um vorhandenes freies Alkali zu beseitigen und aufgelöste organische Stoffe, die durch die Säure gerinnen, abzuscheiden und dann die Flüssigkeit einige Minuten kochen, um die Stoffe, welche durch die Säure nicht gefällt wurden, zum Gerinnen zu bringen, und auch allenfalls vorhandene Kohlensäure, welche die Wirkung des Schwefelwasserstoffgases erschwert, zu entfernen. Durch die filtrirte Flüssigkeit wird dann ein Strom Schwefelwasserstoffgas geleitet und die Flüssigkeit erhitzt, um den Ueberschuß des Reagens zu entfernen, wodurch der Niederschlag bestimmter wird und leichter zu Boden fällt. Dieser wird dann gesammelt und getrocknet und mittelst schwarzen Fluß auf die, in unserm vorigen Jahresberichte S. 98 nach R. Phillips erwähnte, Methode der Reduction unterworfen. Die Arsenikkruste, welche sich dadurch bildet, hat folgende physische Eigenschaften: Ihre äußere an der Glasröhre sitzende Fläche gleicht genau stark polirtem Stahle, und ihre innere Oberfläche dem Bruch des feinen Stahls; ist die Kruste sehr dünn, so hat sie ein dunkelbleygraues Ansehn, unter einer Loupe aber erscheint sie glänzend und krystallinisch gleich dem Bruche des Stahls. Ist die Menge zu klein,

so

so kann man den Theil der Röhre, wo sich der Arsenik angelegt hat, gröblich pülvern und in einer Röhre von kleinerem Durchmesser aufs neue der Sublimation unterwerfen. Um jeden möglichen Zweifel an der Wirklichkeit des Arseniks zu entfernen, ist die Analyse mit folgendem Versuche zu schließen. Der Theil der Röhre, an welcher sich die Kruste angelegt hat, wird in Stücke zerbrochen und einige Stunden hindurch in ein Uhrglas gelegt, welches eine verdünnte Auflösung von schwefelsaurem Kupferammoniak enthält. Das Glas wird bedeckt, um das Verdunsten zu verhindern. Nach 4 bis 5 Stunden ist die metallische Kruste grasgrün. An der bloßen Luft wird dieselbe graulichschwarz und verliert ihren Glanz, welches Verhalten ebenfalls ein Erkennungsmerkmal abgeben kann (The Edinb. med. and Surgical Journ. Jun. 1824, The Edinb. philos. Journ. Oct. 1824, Schweigger's Journal N. R. XIII. 347, Geiger's Magazin XI. 22).

Herr Schumann hat in Schweigger's Journal a. D. dieser Abhandlung einige sehr nützliche Bemerkungen hinzugefügt. Er zeigt, nach den Versuchen von Buscholz und Gärtner, die Unzuverlässigkeit des Kupferammoniaks als Reagens. Gefärbte Flüssigkeiten behandelte Herr Chr. mit Chlor oder Kohle, ohne des Verfahrens von Rose, Behandlung mit Salpetersäure u. s. w., so wie der Methode von Ficinuz zu gedenken (Behandlung mit Salpeter u. s. w.). Die Anwendung des Natriums nach Rose zur vollständigeren Auflösung des Arseniks in thierischen Materien, besonders wenn, wie so häufig der Fall, Fett zugegen ist, und auch wenn die Vergiftung mit Schwefelarsenik geschah, wo von West

Kd.

Königswasser zur Ausziehung empfiehlt, ist keinesweges zu verwerfen. Die Wichtigkeit des Schwefelwasserstoffgases hat Kohlöff schon lange hervorgehoben, aber auch bemerkt, daß wegen der Sublimationsfähigkeit des Schwefelarseniks die Reduction desselben Schwierigkeiten mit sich führe, wogegen Rose beim Gebrauch des Kaltwassers stets die angewandte Menge Arsenik wieder erhielt und auf diese Weise selbst $\frac{1}{3}$ Gran dieses Giftes, mit welchem er thierische Substanzen absichtlich verfälscht hatte, unverkennbar wieder ausschied. Das Erhitzen der mit Schwefelwasserstoff gesättigten Flüssigkeit zur besseren Abscheidung des Schwefel-Arseniks ist allerdings sehr zu rathen, aber noch vorzüglicher fand Herr Schumann, eine solche sehr verdünnte schwefel-arsenikhaltige Flüssigkeit, nach Waff's Versuchen, gefrieren zu lassen. Eine schwache arsenikalische Flüssigkeit, welche, durch Schwefelwasserstoff gelb gefärbt, durch Kochen keinen Niederschlag absetzte, gab einen reichlichen Bodensatz, nachdem sie gefroren war und wieder aufthauete. Wenn endlich die Vergiftung durch Arseniksäure oder deren Salze geschah, so kann, nach dem bekannten Verhalten dieser Säure zum Schwefelwasserstoff, letzterer nicht mehr als empfindliches Reagens für dieses Gift betrachtet werden (Vergl. weiter unten Arseniksäure).

Herr Gieseke hat über einige der wichtigsten Reagentien auf Arsenik mehrere Versuche angestellt. Berzelius bemerkt, daß, wenn die verdächtige Flüssigkeit sauer und durch kauftisches Alkali neutralisirt worden sey und nun Kaltwasser hinzugesetzt werde, kein Niederschlag entstehe, weil die arsenigsaure Kalkerde von dem Alkali
in

in der Auflösung zurückgehalten werde. Schon Hahnemann zeigte, daß der arseniksaure Kalk in den schwächsten Säuren auflöslich sey, und in Bezug auf diese beiden Angaben wird in den Gemischnen Handbüchern (wie in Geiger's Handbuche der Pharmacie, in Buchner's Toxikologie u. a. W.) bemerkt, daß die mit Kalkwasser auf Arsenik zu prüfenden Flüssigkeiten weder alkalisch noch sauer seyn dürften. Es kann aber, wie schon Fischer gezeigt hat, ein großer Ueberschuß von Kalkwasser vorhanden seyn, ohne daß der Erfolg gestört werde, und nach ihm ist ein solcher gerade empfehlenswerth. Auch Schweigger fand gegen Berzelius, daß der arsenigsaure Kalk selbst durch einen großen Ueberschuß von Alkali nicht aufgelöst werde, und daß in mit Arsenik vergifteten Flüssigkeiten, denen sowohl Aetkali und Aetnatron als Ammoniak zugesetzt worden war, durch Kalkwasser ein reichlicher Niederschlag entstehe. Um diesen Widerspruch zu lösen, stellte Herr Professor Schweigger mehrere Versuche an, aus denen hervorging, daß, wenn die arsenikalischen mit Alkali versetzten Flüssigkeiten mit einer Säure, z. B. Salpetersäure, gesättigt würden, so daß die Alkalien noch vorherrschten, in den Flüssigkeiten mit Natron und Kali durch das Kalkwasser ein Niederschlag entstehe, nicht aber in der nun Ammoniaksalz enthaltenden Ammoniakflüssigkeit; wenn man daher Salmiak oder salpetersaures Ammoniak in eine arsenikalische Flüssigkeit bringt; so bringt das Kalkwasser keinen Niederschlag hervor.

Es ist also ganz richtig, daß Berzelius keinen Niederschlag erhielt, wenn er die salpetersaure arsenikalische

sche

Die Flüssigkeit mit Ammoniak neutralisirte, dessen er sich wahrscheinlich bediente, aber nicht das Ammoniak als kohlensaures, sondern das entstandene salpetersaure Al. verhinderte die Entstehung des Niederschlages. Wo also dieses Salz in der Flüssigkeit vorhanden ist, da darf man dieselbe nicht mit Kaltwasser präcipitiren, und hierin liegt es, daß Mohr, wenn er die Salpetersäure bei diesen Prüfungen mit kochendem Kali oder Ammoniak zu neutralisiren empfiehlt, und wenn er sich des letztern vorzugsweise bediente, das Schwefelwasserstoffgas vorzugsweise bei diesen Prüfungen anzuwenden empfiehlt.

Herr Giesecke zeigte, daß das essigsaure und schwefelsaure Ammoniak eben so sich verhielten als das salpeters- und salzsaure Ammoniak. Alle diese Salze lösten den arsenigsauren Kalk vollkommen auf, und wenn derselbe gut ausgetrocknet war und in der gewöhnlichen Temperatur die genannten Ammoniaksalze denselben im Wasser verbreitet nicht auflösten, so fand dieses doch beim Kochen bald statt. Bei Anwendung von kohlens- oder phosphorsauren Ammoniak bleibt ein Niederschlag, der aber aus kohlens- oder phosphorsauren Kalk besteht, während sich arsenigsaures Ammoniak auflöst. Dieses Verhalten der Ammoniaksalze hängt also von einer Zersetzung durch Doppelanziehung ab. Der arseniksaure Kalk verhielt sich nach Pfaff eben so (Schweigger's Journal XIV. N. R. S. 96).

Brugnatelli machte zuerst darauf aufmerksam, daß die Jodstärke als Reagens auf arsenige Säure angewendet werden könne, indem sie durch arsenige Säure und Sublimatlösung entfärbt, durch concentrirte Schwefelsäure

re

re aber bei der arsenigen Säure ihre Farbe wieder hergestellt werde, nicht aber beim Sublimat, so daß die Jodstärke als sicheres Unterscheidungsmerkmal dieser beiden Gifte dienen könne. Herr Giesecke und Herr Hecker stellten bei Gelegenheit hierüber einige Versuche an, und fanden, daß die Blausäure, das blausaure Quecksilber, so wie das salpetersaure Quecksilberoxydul ebenfalls die Jodstärke entfärbten. Die Arseniksäure entfärbt selbige aber nicht, obwohl arseniksaures Kali und arseniksaures Ammoniak dieses bewirken, worauf ein Zusatz von Schwefelsäure die blaue Farbe wieder herstellt. Auch die rauchende Nordhäuser Schwefelsäure, sowohl concentrirte als verdünnte, entfärbt die Jodstärke vollkommen, durch sie kann daher die blaue Farbe nicht wieder hergestellt werden, sondern nur durch die rectificirte. Dieses liegt aber nicht in dem rauchenden Wesen der Nordhäuser Schwefelsäure, sondern lediglich in der schweflichten Säure, die sie enthält, denn ist das rauchende Wesen gänzlich von selbiger befreit, so entfärbt es die Jodstärke nicht mehr, und die durch die rauchende Schwefelsäure entfärbte Jodstärke wird auch an der Luft wieder blau. Will man aber die Jodstärke als Reagens auf Arsenik anwenden, so ist es nothwendig, selbige frisch bereitet zu nehmen, denn selbst nur einen Tag alt leistet sie nicht mehr Genüge. Die Ursachen dieser Veränderung in der Jodstärke denkt Herr G. noch näher zu prüfen.

Herr G. untersuchte auch noch die bekanntlich mehrmals erwähnte Aehnlichkeit der Reactionen von Arsenik und einer Zwiebelabkochung, worüber Herr Dr. Wittig in dieser Zeitschrift schon früher mehrere Versuche angestellt hat, und fand, daß der Zwiebelabsud gegen die rothe

Lösung des Chanklions, gegen die des Supferammoniums und gegen Kobaltste sich eben so verhält wie eine Auflösung von artemiger Säure, daß aber Hydrochlorionssäure, Kupferwasser und salpetersaures Silber deutlich unterscheidet. Hydrochlorionssäure veränderte den Zwietselgub nicht; Kupferwasser bewirkte eine gelbe Färbung und nach einigem Stehen einen gelben Niederschlag, der sich aber nicht wie der arsenigsaure Kalk in Ammoniasalzen wie der auflöste (Schweiggers Journ. N. R. XIII. 575).

Folgender Vorhang rücksichtlich verunreinigter Zergistung mit Arsenit und der Auflösung desselben verdiente große Aufmerksamkeit: Die Mittwe Kurent zu MontereNCY war angestrichen worden, ihren Ehemann zehn Jahre nach der Zergistatung mit Arsenit vergiftet zu haben. Die Mergite, welche die Section gemacht hatten, schlossen, daß Kurent an einer Zergistung mit Arsenitform geformt sey. Zwei Mergite und ein Apotheker waren nicht dieser Meinung und konnten sich von der Gegenwart des Arsenits nicht überzeugen. Die Zergisten Kurent, die Kurent und Zergist wurden deshalb erstickt, die Untersuchungen der verbleibenden Untersuchungen auf neue Untersuchungen, und sie fanden ebenfalls keinen giftigen Stoff darin. Zergist wurde darauf gebeten, bei dem Zergisthofe zu Kropes zu erscheinen, um bei den Zergisten assistieren zu können.

Es wurden ihm folgende Fragen vorgelegt:

- 1) Zeigen die Mergite der ersten Zergistatier, daß die aus dem Mergiten des Kurent gezogene Substanz wirklich weisses Arsenitform gewesen sey?
- 2) Gene mit der Zergistung des Cadavers beauftragten

Ärzte hatten ausgesagt, eine pulverige Substanz gefunden zu haben, welche auf glühenden Kohlen detonirte, mit Flamme braunte und nach Knoblauch gerochen habe. Hieraus hatten sie geschlossen, daß diese Substanz weißes Arsenikoxyd sey.

Dieser Schluß ist irrig, denn das Arsenikoxyd detonirt nicht und brennt nicht mit Flamme auf glühenden Kohlen. Der bloße Geruch nach Knoblauch ist nicht allein entscheidend, weil es nicht unmöglich ist, daß sich im Magen während der Digestion andere Substanzen entwickeln können, welche dieselbe Eigenschaft besitzen. Die körnige Substanz hätte weiter untersucht werden müssen.

- 2) Können sich im Digestionscanale eines Menschen, welcher nicht durch weißes Arsenikoxyd vergiftet worden ist, Substanzen finden, welche diesem Gifte ähnlich aussehen?

Der Magen des Laurent konnte eine Substanz enthalten, welche alle oben bemerkten Eigenschaften besaß, ohne Arsenik zu seyn. Man hat mehrmals beobachtet, daß die Schleimhaut des Magens und der Eingeweide mit einer Menge glänzender Punkte besetzt war, die aus Fett und Eyweiß bestanden. Herr Orfila führt mehrere Fälle an, wo selbige Verdacht einer Arsenikvergiftung erregt hatten, aber bei ihrer Untersuchung keine Spur desselben zeigten, sondern als animalische Materien sich bewiesen, die rücksichtlich ihres Fettgehaltes auf Kohlen brannten und detonirten.

- 3) Kann man daraus, daß ein Huhn, dem man von einer Gerste zu fressen gegeben, von der man eine
Zi.

Zisane zubereitet hatte, nach dem Genuße derselben starb, schließen, daß dieselbe vergiftet gewesen sey?

Laurent war 5 Tage lang krank gewesen, nachdem er zuvor einen Eyerfuchen gegessen hatte, der vergiftet gewesen seyn sollte. Nach der Anklage hatte sich in diesem das Gift befinden sollen. L. nahm während dieser Zeit mehrere von seiner Frau zubereitete Zisane. Einer der Aerzte war betroffen von dem schlechten Geschmack des Gerstendekokts, ließ deshalb von den Körnern desselben einem Huhne mehrere verschlingen. Es starb am folgenden Tage. Es war nothwendig zu bestimmen, bis zu welchem Punkte diese Umstände die Existenz des Arseniks oder eines andern Giftes beweisen können. Die Erfahrung lehrt, a) daß wenn man gepülverte Gerste mit Arsenikoxyd in Wasser kochen läßt, das Dryd sich schnell auflöst und die Flüssigkeit vergiftet, die Körner sich aufblähen, einen Theil der Auflösung absorbiren und also giftig werden. b) Wenn man aber die Gerstentisane wie gewöhnlich bereitet, und dann, wenn sie noch warm ist, etwas weißen gepulverten Arsenik hineingiebt, so löst sich eine hinlängliche Menge desselben in der Flüssigkeit auf, aber die durch das Wasser schon vollkommen aufgequollenen Körner absorbiren keine Spur des Giftes mehr, wovon man sich durch ihre Analyse überzeugen kann, wenn man sie von dem arsenikalischen Staube, der auf der Oberfläche sich möglicher Weise befinden könnte, sorgfältig gereinigt hat. c) Um so weniger wird man also in der Gerste Arsenik finden, wenn man das Gift in die noch warme Zisane giebt und unmittelbar nachher die Flüssigkeit abgießt.

Die Antwort auf obige Frage war also: Das Arsenikoxyd, welches nach der Anklageacte erst in die schon gefertigte Tisane gegeben seyn sollte, mußte im Wasser aufgelöst bleiben, und die Geste konnte nichts davon enthalten, immerhin war es aber möglich, daß auf der Oberfläche der Frucht sich unaufgelöstes Arsenikoxyd befinden konnte, und dann mußte das Huhn sterben.

- 4) Unter den Blutegeln, welche dem Kranken in die Gegend des Epigastriums gesetzt worden waren, waren zwei unmittelbar darauf, und die übrigen am andern Morgen in dem Glase, in welches sie gegeben worden waren, gestorben; kann man hieraus ähnliche Schlüsse machen?

Diese Thatsache hat kein Gewicht; denn wir sehen täglich, daß Blutegel auf den Leib von Kranken applicirt, welche reizende Gifte verschlungen haben, in keinem größern Verhältnisse sterben, als wenn sie bei anderen Krankheiten gebraucht werden. In Vergiftungsversuchen mit Hunden starben angelegte und gesogen habende Blutegel. Der Tod der dreizehn während der Krankheit des L. angelegten Blutegel kann als kein Beweis der Vergiftung angesehen werden.

- 5) Zeigen die während der Krankheit beobachteten Symptome des im *Visum repertum* angegebenen Zustandes des Cadavers Beweise der Vergiftung?

Laurent hatte Symptome gezeigt, welche denen einer Vergiftung durch Arsenik ähnlich sind, aber man kann auch in Krankheiten ähnliche Symptome beobachten, ohne daß Gift angewandt worden wäre. Man hat Fälle gehabt, wo man im Magen Arsenik fand, ohne daß das

Su-

Individuum ein Zeichen von Vergiftung hätte wahrnehmen lassen. Die Symptome reichen also nicht aus, die Vergiftung zu beweisen, wenn man keine giftige Substanz gefunden hat, eben so wenig als die Abwesenheit derselben die Vergiftung verneinen kann, wenn man nach dem Tode in dem Verdauungscanale des Individuums Gift findet.

„Der Körper des L. zeigte blaue, gelblichgrüne und bleygraue Flecken und alle Eingeweide waren entzündet und eingeschrumpft.“ Es ist wahr, das Arsenikoxyd bewirkt häufig eine Entzündung der Häute des Verdauungscanals, besonders der Schleimhäute, aber ähnliche Erscheinungen treten auch bei vielen andern Krankheiten ein, und sie können auch beim Arsenik gänzlich fehlen. Der Dr. Misa, ein ausgezeichnete Arzt zu Coiffons, erzählt einen in dieser Hinsicht wichtigen Fall, wo ein alter Mann sich mit Arsenik vergiftet hatte, an den Folgen der Vergiftung starb und beim Öffnen des Leichnams sich fand, daß alle Eingeweide ein natürliches Aussehn besaßen, die Schleimhäute keine Inflammation, Röthe oder Veränderung der Textur zeigten, und im Duodenum sich noch etwas Arsenik fand. Aus allem diesen geht hervor, daß der erste Bericht unvollständig und wenig geeignet war zu beweisen, ob der Kranke vergiftet sey oder nicht, daß es aber Pflicht der medicinal-polizeylichen Behörden sey, die Untersuchung von Gegenständen dieser Art nur tüchtigen Leuten zu übertragen. — Die Wittwe L. wurde übrigens freigesprochen (*Journal de Chim. med.* I. 56).

Herr Payen hat folgenden interessanten Versuch angestellt: Man stellte bekanntlich häufig Arsenik oder so

ge

genannten Kobold mit Wasser zur Tödtung der Fliegen aus. Man hat mehrmals behauptet, daß solche Fliegen, wenn sie auf Speisen oder Getränke fielen, böse Zufälle, Coliken u. s. w. veranlassen könnten. 300 auf diese Art vergifteter Fliegen gab Herr P a y e n einem Hunde, und eben so viel einem Huhne, beide verspürten davon nicht das Geringste an üblen Folgen. Mit diesem Resultate soll übrigens keinesweges der Gefährlosigkeit dieses Mittels das Wort geredet seyn (Journal de Chim. med. I. 198).

Arsenikmetall.

Erhitzen durch Stoß nach Schwabe. Ueber die außerordentliche Wärme, welche beim Stoßen des Arsenikmetalls in einem eisernen Mörser unter Befeuchtung mit Wasser entsteht, hat Herr S c h w a b e in W a n f r i e d ein merkwürdiges Beispiel in B. XI. S. 262 dieser Zeitschrift mitgetheilt.

Arsenik und Sauerstoff.

Zu empfehlende Vorsicht bei gepulvertem Arsenik nach Voget. Herr Apotheker Voget in Heinsberg bemerkte nach dem Ausfüllen von gepulvertem Arsenik, daß von dem dabei entstandenen auf der Oberfläche der Hand sich angesetzt habenden Staube ein pustelartiger Ausschlag entstand, und räth daher, bei dergleichen Arbeiten die Hände mit Handschuhen zu schützen (S. diese Zeitschrift B. XIV. 169).

Oxydation arsenigsaurer Salze. Wird arsenigsaures Kupferoxyd (Schweinfurter Grün) mit Natriumalkali gelöst, so löst es sich nach und nach auf, die Flüssigkeit wird blau, darauf bildet sich ein goldgelber Niederschlag, der nach und nach roth wird, wie chromsaures Merkur. Dieses ist Kupferoxydul, und in
ber