mit Aufsatzrohr und Kühler verbunden und dann werden aus dem Öl-bade 75 cc übergetrieben. Man fängt das Destillat in einem 100 cc-Kölbchen auf und ermittelt das spezifische Gewicht nach dem Auffüllen auf 100 cc bei 15° mit der Mohr'schen Wage.

Gnehm und Kaufler¹⁾ bemerken zu diesen Ausführungen Bamberger's, dass der von ihnen benutzte Formaldehyd 31-prozentig war, während Bamberger eine 38-prozentige Ware benutzte. Erhöht man die anzuwendende Menge von sulfanilsaurem Natrium von 90 auf 110 g, gelöst in 40 cc Wasser, so ergeben sich auch bei hochprozentigem Formaldehyd Zahlen, welche mit denen der Bamberger'schen Methode innerhalb der Fehlergrenzen übereinstimmen. Unter diesen Umständen gibt also die Sulfanilsäuremethode brauchbare Resultate. Da der käufliche Formaldehyd ungesättigte Verbindungen unbekannter Natur enthält, so lässt sich eine ganz genaue Übereinstimmung der nach verschiedenen Untersuchungsmethoden erhaltenen Resultate nicht erwarten. Es scheint, dass bei der Bisulfitmethode ein grösserer Teil dieser Verbindungen ebenfalls kondensiert wird, woraus sich die höheren Werte dieser Methode erklären. Die Bamberger'sche Methode dürfte wegen ihrer Billigkeit und bequemen Ausführbarkeit den Vorzug verdienen, obgleich keineswegs entschieden ist, welche der beiden Methoden die genaueren Resultate gibt.

IV. Spezielle analytische Methoden.

1. Auf Lebensmittel, Gesundheitspflege, Handel, Industrie und Landwirtschaft bezügliche.

Von

L. Grünhut.

Ein Hilfsbuch für agrikulturchemische Untersuchungen hat kürzlich P. Krische²⁾ herausgegeben. Dasselbe enthält eine vollständige Zusammenstellung der auf analytische Methoden und Beurteilungs-

¹⁾ Zeitschrift f. angew. Chemie 18, 93.

²⁾ Die Untersuchung und Begutachtung von Düngemitteln, Futtermitteln, Saatwaren und Bodenproben nach den offiziellen Methoden des Verbandes landwirtschaftlicher Versuchsstationen im Deutschen Reiche. Eine Einführung in das agrikulturchemische Kontrollwesen. Mit 5 Textabbildungen. XVI und 255 Seiten. Berlin. Paul Parey.

normen sich erstreckenden Beschlüsse des Verbandes landwirtschaftlicher Versuchsstationen im Deutschen Reiche, die für das gesamte agrikulturchemische Kontrollwesen maßgebend sind. Den in extenso mitgeteilten Beschlüssen ist nicht nur in jedem Falle ein Auszug aus dem Gange der sich darauf beziehenden Verhandlungen, sondern auch eine kurze Charakteristik der einzelnen Dünge- und Futtermittel beigelegt. In der Einleitung wird eine ganz kurze Skizze der Entwicklung der Agrikulturchemie und des landwirtschaftlichen Versuchswesens gegeben.

Bei einzelnen vorgenommenen Stichproben erwiesen sich die Angaben des Buches als durchaus zuverlässig, und so möchte ich es als wertvolles und bequemes Hilfsmittel für den täglichen Gebrauch allen mit einschlägigen Untersuchungen betrauten Laboratorien warm empfehlen.

Zur Bestimmung der schwefeligen Säure im Hackfleisch. H. Lührig¹⁾ stellte Versuche darüber an, ob die Gegenwart von Schwefelwasserstoff bei der Destillationsmethode²⁾ einen Einfluss auf das analytische Ergebnis auszuüben vermag. Es zeigte sich, dass das nicht der Fall ist. Bei Anwesenheit von Schwefelwasserstoff trübte sich zwar die Jodlösung in Folge reichlicher Abscheidung von Schwefel, aber auch nach einstündiger Erhitzung dieses Destillates auf dem Wasserbade wurden aus demselben keine irgend in Betracht kommenden Mengen Baryumsulfat erhalten. Von einer Oxydation des abgeschiedenen Schwefels durch Jodlösung kann hiernach keine Rede sein.

Auch die Frage, wie lange schweflige Säure im Hackfleisch nachgewiesen werden kann, war Gegenstand einiger Versuche. Zu je 50 g Hackfleisch wurden 0,1 und 0,2 g Natriumsulfit ($\text{Na}_2\text{SO}_3 + 7\text{H}_2\text{O}$) zugesetzt und die Proben in Glasgefäßen bei Luftzutritt aufbewahrt. Nach 30 Tagen fand man durch Destillation in der ersten Probe 24 Prozent, in der zweiten 58 Prozent der zugesetzten Menge wieder. Beide Proben waren in stinkende Fäulnis übergegangen.

H. Matthes und Fr. Müller³⁾ arbeiteten gleichfalls über die Fehlerquellen der Destillationsmethode. Im Jod des Handels konnten geringe Mengen Schwefelsäure nachgewiesen werden. Dagegen wurde niemals beobachtet, dass durch den Schwefelgehalt des Leucht-

¹⁾ Chemiker-Zeitung **29**, 5.

²⁾ Vergl. diese Zeitschrift **42**. A. V. u. E. 20.

³⁾ Bericht über die Tätigkeit des Nahrungsmittel-Untersuchungsamtes der Universität Jena in den Jahren 1903 u. 1904 S. 12.