Aus der Abteilung für Haut- und venerische Krankheiten des
St. Stephanspitals in Budapest.

II.

Nosokomialgangrän.¹⁾

Von

Prof. Dr. S. Róna.

(Hiezu Taf. XIII—XVI)

Was wissen wir heutzutage über Nosokomialgangrän und Wunddiphtherie? Gibt es denn noch überhaupt eine Nosokomialgangrän? Und wenn ja, was für ein Krankheitsprozeß ist das, wo ist er zu beobachten? Wer kennt dies heute mehr? Darauf müssen wir antworten.

Wie wir wissen, trat während den Feldzügen der Alten, in Kasernen, Krankenhäusern die Nosokomialgangrän massenhaft auf.

Fock war der erste, der diese Krankheit unabhängig von Feldzügen und Krankenhäusern bei 7 Privatkranken beobachtete. Seitdem wurde eine ganze Reihe derartiger Beobachtungen mitgeteilt. Doch sind diese Mitteilungen sehr spärlich. Seit der antiseptischen Ära war man allgemein so überzeugt davon, daß die Nosokomialgangrän ausgestorben sei, daß man sich überhaupt nicht mehr mit derselben beschäftigte. Schon in meinen Studentenjahren wurde nicht mehr davon gesprochen. Wohl hatte ich später einzelne Fälle beobachtet, in welchen ich den fraglichen Prozeß zu erkennen glaubte, aber dies nur auf Grund des darüber gelesenen.

Besonders blieben mir die während meiner Assistentenzeit (1884) im Barakkenspitale gemachten Beobachtungen in Erinnerung. Aber mit Bestimmtheit hätte ich nicht behaupten können, daß es sich tatsächlich um Nosokomialgangrän handle.

Die Krankheit wurde also nicht gelehrt und demgemäß auch gar nicht erkannt, was um so leichter geschehen konnte, da die neuere Wundbehandlung ein Umsichgreifen oder tödlichen Verlauf derselben nahezu ausschloß.

¹⁾ S. auch S. Róna: Der gangrän.-diphtherit. Schanker etc. Dieses Archiv. 1903. Bd. LXVII. Heft 2.

Schon die älteren Auffassungen gehen hinsichtlich der Schwere und Kontagiösität auseinander. Von einigen wurden auch sehr leichte Fälle beschrieben. Die Meinungen waren auch darüber geteilt, ob die sogenannte Wunddiphtherie in das Krankheitsbild der Nosokomialgangrän einzubeziehen sei oder nicht.

Was die Ansteckungsfähigkeit anbelangt, so wurde diese von einigen behauptet, von anderen geleugnet. Die ersteren führten dieselbe auf Mikroorganismen zurück. An dieser Anschauung hält man jetzt noch allgemein fest.

Es wäre ganz zwecklos an dieser Stelle die Richtigkeit der älteren Beschreibungen, beziehungsweise der einheitlichen Ätiologie der verschiedenen Formen und eben deshalb auch die älteren bakteriologischen Befunde ausführlicher zu besprechen.

Unter den älteren Befunden kommen die Fischers (1874) den allerletzten Befunden noch am nächsten.

Von den seither ausgeführten Untersuchungen verdienen die größte Anerkennung die von Vincent 1896¹⁾ auf klinischer, histologischer und bakteriologischer Grundlage ausgeführten, exakten Untersuchungen, und werde ich mich deshalb, als mit einer grundlegenden Arbeit, eingehender damit befassen.

Er hatte Ende 1895 und anfangs 1896 in Algier, im Dey.-Spitale viele von Madagaskar heimgekehrte kabyllische und arabische Begleiter gegen Hospitalbrand behandelt; aber nur die Begleiter, ein anderer erkrankte nicht daran. Die Infektion trat zu sehr geringfügigen Hand- und Fußwunden hinzu. Die schmutzigen, leichtsinnigen Kranken nahmen die Verbände herab und brachten ihre Wunden mit Kleidungsstücken oder auch Erde in Berührung. In der Folge entwickelten sich dann sehr rasch gangränöse, um sich greifende stinkende Geschwüre, von einem grauen, pulpösen oder pseudomembranösen Exsudat bedeckt. Einige Kranken lagen abgesondert in einem Lazareth, da sie an schrecklicher, bis auf die Knochen reichender Gangrän litten. Es wurden von ihm 47 Fälle bakteriologisch untersucht, darunter 9 sehr schwere. Untersuchung des Geschabes: Das vom Detritus genommene Geschabe wurde mit Karbolfuchsin, Karbol-Methylenblau oder Thionin gefärbt und war der bakteriologische Befund, obwohl die Kranken zu verschiedener Zeit und an verschiedenen Orten infiziert worden waren, immer der gleiche: ein 4—8 μ langer, 1 μ breiter Bazillus in großer, manchmal sehr großer Anzahl. Diese Bazillen sind zumeist gerade oder leicht gebogen, in einigen Präparaten auch S-förmig. Die kürzesten sind 3—4 μ lang, doch sieht man zuweilen auch filamentöse Formen.

Der Form nach erinnern sie einigermaßen an den *vibrio septicus*, doch sind sie an beiden Enden verjüngt oder abgerundet und nicht so eckig, wie der *vibrio Pasteur*. Viele Bazillen sind segmentiert oder zu Paaren verbunden. Das Protoplasma der mit Methylenblau sich

¹⁾ Annales de l'institut Pasteur 1896.

ungleich färbenden Bazillen zeigt sich quasi pseudosporuliert. Nach Ziehl gefärbte Präparate zeigen dieses Bild nicht. Auch Involutionsformen wurden häufig angetroffen, besonders bei antiseptischer Behandlung der Kranken.

Hier waren die vacuolarisierten und spindelförmig deformierten, an beiden Enden verjüngten Bazillen sehr ähnlich einer nicht kultivierbaren Bazillenart, welche man zuweilen bei einer gewissen diphtheroiden Angina trifft. Dieser Mikrobe wird nach Gram entfärbt. Der Bazillus findet sich immer sehr zahlreich, doch steht die Anzahl desselben im Verhältnis zur Schwere des Falles. In leichten Fällen 20—30 in einem Gesichtsfelde, in schweren kolossale Massen: die weiche, pseudomembranöse Pulpa bildet ein Bazillen-Purée, oder, besser gesagt, eine Reinkultur. Im Verhältnis zur antiseptischen Behandlung nimmt die Zahl derselben ab und das jauchige Sekret wird eitrig. An den Rezidiv-Stellen neuerliche Bazillenmassen. Der Mikrobe schien gegen Antiseptica eine große Widerstandskraft zu bekunden. Am raschesten verschwanden sie nach Auskratzung des Geschwüres und Einstreuung mit 10prozentigem Chlorkalzium-Pulver.

Ein aus der frischen Pulpa genommenes Teilchen zeigte in Bouillon und sterilem Wasser unbewegliche Bazillen. Gleichzeitig, jedoch nicht konstant, sieht man auch einzelne Mikrokokken oder schmale Bazillen, aber ein sehr häufiger Genosse (unter 47 Fällen in 40) war ein feines Spirillum, welches schwer färbbar, nach Gram negativ und nicht kultivierbar ist. In einigen Präparaten war es sehr spärlich, in anderen massenhaft vertreten. Charakteristisch für den Krankheitsprozeß ist nach Vincent der Bazillus. In 7 Fällen war nur der Bazillus zu finden. Die außer dem Spirillum noch anwesenden übrigen Bakterien sind akzessorischer Natur.

Histologie: In 12 Fällen untersuchte er auch das Gewebe. Schon bei schwacher Vergrößerung treten an den doppelt gefärbten Präparaten (Karbolfuchsin und Fluoreszin oder Safranin) 2 Zonen hervor: eine oberflächliche, $\frac{1}{2}$ —3 mm dicke, welche von dem diphtheroiden Exsudate gebildet wird; diese Schichte ist in ihrem freien Teile von grau-bläulichen und dunkleren Streifen durchzogen und sehr zellarm; in ihren tieferen Teilen ist sie von dunkelblauer Farbe; an diesem Punkte findet man die aktive Schichte der Bakterien-Proliferation in Gestalt eines dichten Strauches, von welchem Zweige und Fortsätze in das tiefere Gewebe der Pseudomembrane ziehen. Durch die kolossale Entwicklung dieser Mikroben-Schichte erklärt es sich, warum der Prozeß so akut verläuft und innerhalb Tagen eine Extremität zerstören kann.

Die tiefere Zone wird unterhalb der ersteren von abgestorbenem Gewebe gebildet und ist von Blut durchtränkt. Wie auch immer die Natur dieses Gewebes beschaffen sein mochte, so war in einer gewissen Tiefe jede Spur einer bestimmten Struktur verloren. Unterhalb der

Mikrobenschicht und in unmittelbarer Nachbarschaft derselben fand sich eine überaus reichliche Menge embryonaler Zellen, eine Art Schutzbarriere, welche der Organismus gegen die Bakterien-Invasion errichtet, was schon Heine 1874 konstatiert hat.

Bei stärkerer Vergrößerung sieht man in der membranösen Schichte, wo die Mikroben am reichlichsten sind, den spezifischen, obigen Bazillus mit denselben Eigentümlichkeiten. Der Bazillus ist an der Oberfläche des Exsudates, wo er minder zahlreich, zuweilen verlängert und fadenartig; in der Tiefe aber, wo er dichte Bündel bildet, wird er kürzer.

Fast in sämtlichen untersuchten Fällen war dieser Bazillus allein zu sehen. Die Gram-Färbung zeigte nur spärliche, isolierte Kokken auf der Oberfläche der Pseudomembrane. In der Tiefe der letzteren sah Vincent in 3 Fällen gleichzeitig auch Spirillen; aber noch tiefer, wo das Gewebe beginnt, war der Bazillus absolut allein.

An dieser letzteren Stelle breiten sich die Bazillusschwärme fächerartig aus. Die Bazillen bilden dort dichte Reihen, ziehen sehr häufig in senkrechten Kolonnen in das unterhalb gelegene Gewebe und senden feine Fortsätze in die Tiefe. Gegen den freien Rand hin aber nehmen sie stetig ab.

Diese pathogene Bazillen-Lokalisation erinnert an die des Löfflerschen Bazillus in der Pseudomembrane. Doch zeigt die mikroskopische Untersuchung einiger Nosocomialgangränfälle, daß dieser Bazillus nicht ausschließlich an der Oberfläche der Wunden sich aufhält, sondern auch in das Gewebe selbst dringt, wo er diffuse Kulturen bildet, oder diffuse Haufen, welche den Lauf der Gefäße zu folgen scheinen. Besonders in den letzteren Fällen konstatiert man gleichzeitiges Vorhandensein von Staphylokokken und Spirillen, welche eben das in die Tiefe Dringen des pathogenen Bazillus zu begünstigen scheinen.

Wie schwer auch das Leiden sein mag, so bleibt es doch stets lokal; der Bazillus dringt eben nicht sehr weit und generalisiert sich nicht im Blute. Das Blut, einige Zentimeter weit von der Wunde genommen, zeigt niemals Bazillen; die regionäre Drüsen werden nicht geschwellt. Auch das Herzblut eines Verstorbenen zeigte keinen Bazillus.

Pathologische Anatomie. Leichte Fälle. Schwache Vergrößerung.

Die mit Pikrokarmine oder Haematein gefärbten Schnitte zeigen unmittelbar neben dem Geschwürsrande eine dünnere Epithelschichte; an einzelnen Präparaten sieht man im Gegenteil ein dickes Stratum lucidum. Die Malpighische Schichte atrophisch, die Papillen abgeflacht und das Protoplasma der obersten Zellen dieser Schichte hat das normale körnige Aussehen verloren und ist hyalinartig geworden; das Eleidin fehlt, aber die Zellkerne gut erhalten. Im Corium und subkutanen Bindegewebe sind die Bindegewebs- und elastischen Fasern, wie

auch die Lymphspalten von einer Masse junger Zellen durchsetzt, welche gegen das Geschwür hin immer massenhafter erscheinen. Diese eingewanderten Zellen bilden um die von der Subcutis nach oben sich schlängelnden Kapillaren und besonders in der vaskulären (subpapillaren) Schichte große Haufen. Die Konturen der Schweißdrüsenknäuel verschwimmen in den Zellhaufen, die Drüsenzellen sind geschwellt. Das Lumen von stark gefärbten kleinen Zellen verschlossen. Die Arterien zeigen Peri- und Endoarteritis. Einzelne Blutgefäße sind in neugebildetem Bindegewebe eingeschlossen und durch endotheliale Proliferation obliteriert. Die Venen thrombotisiert. Diese Affektion der Blutgefäße trägt sehr viel zur progressiven Nekrose des Gewebes bei.

Am Boden des Geschwüres und unterhalb des pseudomembranösen Exsudates sind die embryonalen Zellen stark degeneriert. Die Bindegewebszellen zeigen die Erscheinungen der Koagulationsnekrose. Sie bilden zusammen eine körnige, schlecht gefärbte Schichte, in welcher jede anatomische Gewebsdifferenzierung unmöglich geworden. An diesen Stellen sind die Hautschichten, die *Tela cellulosa*, die aponeurotischen, fibrösen Elemente, die Muskeln bis zur Unkenntlichkeit in eine körnige verwandelt, welche allmählich mit der grau-rötlichen Pseudomembrane verschmilzt.

Schwere Fälle: Das Ensemble des Präparates (vom gangränösen Gebiete) bietet das Bild eines wirklich cavernösen Gewebes, so groß ist nämlich das hämorrhagische Infiltrat. Gleichzeitig sieht man die degenerierten Bindegewebszellen und Leukocyten im schlecht erhaltenen Gewebe und einzelne Blutgefäße, deren hyalinartige, nekrotische Wände für das Blut leicht durchlässig geworden sind. Diese Degeneration der Gefäße und Kapillaren, wie auch die Thrombose der Venen erklärt das enorme hämorrhagische Infiltrat zur Genüge. Ferner macht die Degeneration der größeren Gefäße auch die zuweilen schweren, ja fondroyant tödtlichen Blutungen beim Hospitalbrand erklärlich.

Der Hospitalbrand ist in der Tat ein nekrogener mit Hämorrhagie einhergehender Prozeß.

Das Bindegewebe und die Muskulatur ist ebenso affiziert, stellenweise auseinander gedrängt von mosaikartig angeordneten Gruppen roter Blutkörperchen, oder auch degeneriert, verschwommen. In den Thionin-Präparaten ist das Protoplasma der roten Blutkörperchen zu kleinen, regelmäßig runden, blaß-gräulichen Kügelchen verschmolzen. Das durch die Hämorrhagie erweiterte Bindegewebe ist nur durch einzelne Fasern und kernlose, hyalinartig gewordene Zellen vertreten. Einige von diesen letzteren Zellen besitzen Ausläufer, ähnlich den Zellen der echt diphtheritischen Pseudomembrane und bilden miteinander vereint einen diphtheroiden, unregelmäßigen Filz, erfüllt von geronnener fibrinöser Lymphe.

Erreicht die Gangrän die tiefere, weiche Schichte, so verliert letztere jede Spur einer Struktur. Die Muskelschichte ist durch eine amorphe, oder hyalinartige Masse ersetzt.

Zuweilen dringen die Bazillen in das Muskelparenchym und bilden dort baumartige Verzweigungen, welche den intramuskulären Räumen folgen.

Das pulpöse Exsudat ist das Ergebnis der molekulären Alteration der durch die bazilläre Diastase (Ferment) verdauten Gewebe. Es besteht aus einer körnigen Substanz, schließt das Gerüst zahlreicher roter Blutkörperchen in sich, deren Hämoglobin diffundiert ist, und ist von dem geschwürigen Gewebe durch eine kleine, kolorierte und zahlreiche Leukocyten enthaltende, sich kaum färbende (Karminfärbung) Schichte getrennt. In dieser Zwischenschicht geht besonders die Proliferation des Bazillus von statten.

Bakteriologie. Der Bazillus konnte nicht gezüchtet werden, trotz der zahlreichen Versuche auf den üblichen Nährböden, auf Serum-Bouillon, Blut u. s. w.

In anaerobem Nährboden mochte sich wohl eine schwache Kultur entwickelt haben, doch eine Weiterimpfung derselben gelang nicht mehr. Auch in Gemeinschaft mit Streptokokken und Staphylokokken war die Kultur derselben negativ. Auch die in sterilisierte Tuben aufgefaßte gangränöse Pulpa zugeschmolzen und in den Thermostat gegeben ergab ein negatives Resultat. Der Bazillus zeigte keine Sporulation.

Das Leiden wird nicht durch das Zusammenwirken von Schmutz, Luft und Eitermikroben hervorgerufen, denn die letzteren werden nur an der Oberfläche gefunden, in der Tiefe aber nicht.

Die Kontagiosität der Nosocomialgangrän steht nach den Beobachtungen von Danilo, A. Larey, Delpech, Olivier, Wolff u. a. ganz außer Zweifel. Mehrere Chirurgen haben sich das Leiden zufällig und Olivier mit Willen zugezogen. Demgegenüber wird dies von anderen geleugnet. Willommen gelang die Überimpfung nie und wird die Übertragbarkeit auch von Percy, Riche-
raud, Dupuytren, Marny, Hirsch, v. Pitha bestritten.

Auch die Überimpfung auf Tiere gelingt nicht. Vincent versuchte das Virus auf Hasen, Meerschweinchen, weiße Ratten zu übertragen, doch gelang ihm dies auf keine. Die Nosocomialgangrän ist eine spezielle Menschenkrankheit doch konnte sie nicht einmal auf den Menschen übertragen werden. Wie es scheint, gehören zu Infektion besondere unbekannte Umstände, Hilfsfaktoren.

Für die Pathogenität des Bazillus spricht dessen absolut konstante Gegenwart in ungeheuren Mengen und zuweilen in ausschließlicher Weise in den Läsionen. Dieser Beweis verliert an Wert dadurch, daß der Bazillus nicht gezüchtet und nicht auf Tiere überimpft werden kann.

Indessen kam es einmal bei einer Überimpfung auf einen tuberkulotischen Hasen zur Bildung einer Blase und eines Geschwüres, welche dieselbe Bazillenart in enormen Massen zeigte; auf demselben Tiere gelang auch zum zweiten Male die Impfung

Der Boden ist aber die Hauptsache, ferner die Gegenwart der begleitenden Mikroorganismen. So hat das Gemisch des gangränösen Produktes mit *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Bact. coli*, *b. pyocyaneus*, *b. Friedländer* ein positives Resultat ergeben.

Auch beim Menschen wird in dem schwächlichen, kränklichen, ausgehungerten Organismus von anderweitigen Bakterien der Boden für den Gangränbazillus vorbereitet, um dann das Feld völlig letzteren zu überlassen. Ein ähnliches Verhältnis findet sich auch bei anderen Bakterien (*Tetanus*, *Anthrax*, *Cholera*, *Vibrio septique*). Wahrscheinlich spielt hier das *Spirillum* die vorbereitende Rolle.

In der älteren Zeit mochten in den Krankenhäusern, Feldzügen das Eiterfieber, Erysipelas und andere akzidentelle Infektionen, Diarrhoen, Sumpffieber, Erde und schmutzige Wäsche, das Hungern, die Ermüdung u. s. w. die Häufigkeit der gangränösen Wundinfektion verursacht haben. Auch der modernen Chirurgie gelang es nur durch die Herabsetzung und Abwehr der Aktivität eines großen Teiles dieser Adjutoren die Nosokomialgangrän von der Tagesordnung abzusetzen.

Die Untersuchungen Vincents waren für die weiteren Forschungen richtunggebend. Zuerst bestätigte Coyon (1898) die Angaben Vincents durch die Beobachtung eines Falles. Die zweite Bestätigung erfolgte durch Brabec (1902).

Brabec bemerkt sehr richtig, daß der Name „Hospitalbrand“ es ist, welcher die Diagnose desselben behindert, da ja diese Krankheit heutzutage als nicht existierend, oder, wie sich Tavel¹⁾ (1901) ausdrückt, als äußerst seltenes und nur historisches Interesse besitzendes betrachtet wird.

Ich beschloß, fürderhin jeden einzelnen, für Wunddiphtherie und Nosokomialgangrän verdächtigen Fall auf Vincentische Bakterien zu untersuchen. Und meine Untersuchungen waren denn auch in der Tat mit Erfolg begleitet.

I. Fall. Am 21. Dezember 1902 gelangte K. J., 59jähriger Fleischhauer, mit einer gangränösen Komplikation auf meine Abteilung.

Anamnese: Seit Jahren bemerkter starkes Schwellen der Unterschenkel nach vielem Gehen, so daß er sich Abends Umschläge darauf geben mußte. Wunden waren aber nicht auf denselben. Vor 2½ Monaten erhielt er einen Schlag auf die äußere Seite des rechten Unterschenkels neben der Kante der Tibia, erlitt dort eine Abschürfung, welche er öfters mit Speichel benetzte, sich sonst aber nicht mehr weiter kümmerte, wiewohl die Wunde nicht heilte. Nach 2–3 Wochen aber begann die Wunde Stelle und deren Umgebung zu schmerzen, die Haut und die Wunde wurde dunkelrot und die Haut des Fußes und Unterschenkels stark geschwellt.

Die Wunde wurde immer größer und allmählich ragte eine männerfaustgroße Geschwulst über den Wundboden hervor. Die ganze Wunde

¹⁾ Tavel, 1901. Encyklopädie der gesamten Chirurgie. Kocher-Quervain.

wurde überaus leicht blutend, begann seit zirka $2\frac{1}{2}$ Wochen zu stinken und war von einem verschiedenfarbigen, aber am meisten grünlich-schwärzlichen Belage bedeckt. Das Geschwür wurde seitdem noch schmerzhafter und nahm stetig an Umfang zu. Vor zwei Wochen hatte er wiederholte Schüttelfröste. In der letzteren Zeit appetitlos aber Stuhl regelmäßig.

Status praesens; Der rechte Fuß geschwollen, ödematös; der Unterschenkel vom Knöchel an bis zum oberen Drittel ebenfalls geschwollen, Fingereindrücke behaltend. Im oberen Drittel rostbraune Fleckchen, als Spuren erfolgter Haemorrhagien; ähnliche Fleckchen auch auf dem übrigens gesunden linken Unterschenkel. An beiden Unterschenkeln die Venen ein wenig erweitert. Zwischen dem unteren und mittleren Drittel des rechten Unterschenkels, ungefähr 10 cm über dem äußeren Knöchel, wo die Entzündung am stärksten ist, ein ovales (in vertikaler Richtung) 10 cm langes (in Querrichtung) 15 cm breites gangränöses Gebiet, an welchem man folgende Details unterscheidet: Der neben der Tibienkante befindliche mediale Rand, wie auch der im mittleren Drittel befindliche obere Rand in Demarkation begriffen, von wo das gleich zu beschreibende gangränöse Gewebe sich bereits abgehoben hat, ja stellenweise gänzlich fehlt, und unter der dünneren grau-weißlichen Pseudomembrane rosafarbene Granulationen durchscheinen, während sich aus der Mitte des gangränösen Gebietes ein mit weißlich-gelblichem, stellenweise grünlichem bis grünlich-schwärzlichem, mehrere Millimeter dickem zerfallendem Detritus bedeckter, zirka 5 cm langer und ebenso breiter, flach halbkugelförmiger, derb elastische körnige, höckerige Oberfläche besitzender Tumor erhebt (welcher sich bei der späteren histologischen Untersuchung als aus Granulationsgewebe bestehend erwies); von hier nach außen und unten ist das ganze Gebiet von einem zirka $\frac{1}{2}$ cm dicken, grünlich-schwarzen, zusammenhängenden und nur zur Gänze und mit Gewalt abtrennbaren, gangränösen Gewebe bedeckt. (S. Figur.) Die Gangrän ist hier in Demarkation begriffen, aber an diesen Stellen gleichwohl relativ am frischesten, indem die am stärksten hyperämischen Ränder von einem weißlich-gelblichen, 1—2 mm dicken, stark haftenden, eine blutende Fläche zurücklassenden Belage bedeckt sind. Das ganze Gebiet riecht nach faulendem Fleische. Der Gestank ist so intensiv, daß man ihn schon von weitem spürt. Der Verband auf dem Geschwüre von schmutziger Jauche durchtränkt. Das ganze erkrankte Gebiet äußerst schmerzhaft und sehr leicht blutend. Die rechtsseitigen Cruraldrüsen auffallend vergrößert; die Inguinaldrüsen etwas größer, als die jenseitigen. Subjektives Befinden ziemlich gut, Patient schläft gut, ist aber appetitlos. Die Brust und Bauch-Organen zeigen nichts besonderes; Urin enthält kein Eiweiß. Temperatur Morgens 37.5° C.

Bei dem Kranken nahm ich am 21. Dezember die folgenden Untersuchungen vor:

1. Ich machte Abstreifpräparate aus der Pulpa von den progredierenden Rändern: hier erhielt ich Massen von mehreren

Bakterienarten, aber überall dominierte ein fusiformer Bazillus und ein Spirillum, ja stellenweise waren dieselben sogar in reiner Kultur zu sehen.

2. Machte ich, nach vorsichtiger Abhebung der gangränösen Pulpa, von der Grenze des entzündeten nekrotischen Gewebes, und zwar zu wiederholten Malen Abstreifpräparate. Ich fand darin fast in reiner Kultur prächtige, verschieden große, aber zumeist 4–8 *m* lange und zirka 1 *m* dicke fusiforme, zumeist gekrümmte Bazillen in ungeheurer Zahl, und in geringerer Menge große Spirillen. (S. farbige Tafel).

Am 23. Dezember schnitt ich für Kultur- und Untersuchungszwecke von dem unteren, noch frischesten Rande $\frac{1}{2}$ *cm* breites und ebenso langes Stück, zum größten Teile mit der entzündeten, aber nicht gangränösen Partie zusammen heraus. Die Ausschnittsstelle bedeckte ich mit gangränösem Gewebe und verband das Ganze, ohne vorherige Desinfektion, mit steriler Gaze. Beim Herausschneiden war die Wundfläche rein, rot, blutend — nach 24 Stunden aber war dieselbe mit einem stinkenden, grünlich-schwarzen, stark haftenden, 1–3 *mm* dicken nekrotischen Belage bedeckt, welcher nach Entfernung mit der Meißelsonde eine stark blutende Fläche zurückließ; ein ähnlicher, aber schmutzigweißer Belag bedeckte den, gestern noch scharf geschnittenen, heute aber unregelmäßigen zackigen Rand.

Am 24. Dezember nahm ich aus diesem neugebildeten gangränösen Herde nach Entfernung der diphtheroiden Membrane Geschabe, wobei ich große Mengen fusiformer Bazillen fand. Am selben Tage exstirpierte ich ein Stück aus der Grenze des am 23. angeschnittenen und infizierten Gebietes, und zwar wieder zusammen mit der entzündeten Umgebung und verband bloß mit steriler Gaze. Am 25. war auch dieses Gebiet von einer diphtheroiden Membran überzogen, in und unter welcher wieder fast in reiner Kultur fusiforme Bazillen und Spirillen zu finden waren. An diesem Tage skarifizierte ich die gesunde Haut in einer 4 und 8 *cm* weiten Entfernung vom gangränösen Gebiete, impfte von der jauchigen Masse ein, bedeckte beide Stellen mit einem gangränösen Gewebsstücke, und verschloß das Ganze mit Heftpflaster. An demselben Tage Untersuchung des auch von den übrigen sich reinigenden, aber noch immer belegten Stellen genommenen Geschabes. 2 Deckglaspräparate: a) Ungeheure Mengen verschiedener Bakterienarten, zur Hälfte fusiforme Bazillen. b) In spärlicher Anzahl, jedoch unvermischt, fusiforme Bazillen. Am 26. Dezember (aus später mitzuteilenden Gründen) Deckglaspräparate vom Rande des Zahnfleisches des Kranken. Enorme

Mengen verschiedener Bakterienarten, sehr viele mächtige fusiforme Bazillen und Spirillen, welche den, im gangränösen Gebiete gefundenen völlig ähnlich waren. Die Präparate wurden zum Teile mit Karbolfuchsin, zum Teile mit Sahli-, oder Löffler-, oder Karbol-Methylenblau gefärbt.

27. Dezember. Der Kranke blieb bisher fieberfrei. Das Bild des Geschwüres kaum verändert, bloß der an der Exstirpationsstelle entstandene diphtheroide Belag dünner und nicht mehr progressiv. Die Stellen der auf der gesunden Haut gemachten Scarificationsimpfungen hyperämisch und mit einem dünnen, grauen Belage bedeckt; Guttapercha-Verschluß. Am 29. Dezember war dieser Belag bereits dicker, die Umgebung hyperämischer. Das mikroskopische Bild des Belages: Ungemein viel Bakterien der verschiedensten Art, viele fusiforme Bazillen, aber jedoch nirgends dominierend, spärliche Spirillen; die Bazillen ziemlich kleiner, als in dem ursprünglichen Geschwüre.

1. Jänner 1903. Neuerliches mikroskopisches Präparat von der Scarifications-Impfstelle und dem Belage: wenig fusiforme Bazillen und Spirillen. Der Kranke fiebert, rechter Fuß geschwollen, die Haut des Fußrückens stark hyperämisch.

5. Jänner. Phlegmone des Fußrückens. Inzision und Jodoform-Verband; letzteren auch auf das geschwürige Gebiet des Unterschenkels. Das scarifizierte Gebiet geheilt. Im Eiter der Phlegmone nur spärliche Strepto- und Staphylokokken, sowohl mikroskopisch als kulturell.

Die Kulturversuche auf Agar, Glycerin-Agar, Blut-Agar, Rinds- u. Pferdeserum, aerobem u. anaerobem Nährboden; ob nun Jauche oder Gewebsstücke auf den Nährboden gelegt wurden, blieben hinsichtlich der fusiformen Bazillen und Spirillen negativ.

Auch das Überimpfen auf Tiere (Maus und Meerschweinchen) blieb negativ.

Die histologische Untersuchung der exstirpierten Stücke (Lithionkarmin-Weigert), bot vollkommen dasselbe Bild, welches Vincent als für Nosocomialgangrän charakteristisch beschrieben hat. Dies wäre also der erste Fall gewesen, welchen ich nach den Angaben Vincents für Nosocomialgangrän halten dürfte. Ich bemerke indessen schon jetzt, daß dieser Fall gleichzeitig auch das Bild der Wunddiphtherie bietet, so daß also beide Krankheitsformen zusammen waren.

Nun stand ich vor der Frage, ob ich diese Bakterien nicht auch bei anderen gangränösen Prozessen oder Wundinfektionen fände. In dieser Beziehung hätte mich wohl, sowohl die Erklärung Matzenauers, wie auch Brabecs beruhigen können, nachdem sie sich aber nicht auf eigene, in dieser Beziehung ausgeführte Untersuchungen berufen haben, forschte ich weiter.

Bereits bei *Ulcus gangraenosum* der Genitalien hob ich ¹⁾ hervor, daß bei der im Anschlusse an gonorrhöischer Periurethritis entstandenen Gangrän, ferner bei dem durch Urininfiltration entwickelten Gangrän des Penis und Skrotums weder die Gewebsstruktur, noch die Bakterienflora mit der des *Ulcus gangraenosum* identisch war, und, wie ich jetzt noch hinzufügen will, auch nicht mit der, der von Vincent benannten Nosokomialgangrän.

Seitdem habe ich noch zwei im Anschlusse an Erysipelus und Phlegmone auftretende Gangräne, eine Gasphlegmone, eine diabetische Gangrän, 2 Erfrierungs-Gangräne, 3 Decubitus-Gangräne, und eine, trotz der Amputation weiterschreitende senile Gangrän — mit negativem Ergebnisse.

Ich untersuchte ferner außer den nekrotischen Belägen zahlreicher Ekthymata noch die grau-grünlichen Beläge einer ganzen Reihe von *Ulcus cruris* infizierten Wunden und putriden Geschwüre. Nirgends war in dem Geschabe auch nur eine Spur von fusiformen Bazillen oder Spirillen zu finden. Von den letzteren Fällen hebe ich noch zwei hervor, in welchen ich nicht nur Geschabe, sondern auch exstirpiertes Gewebe untersucht habe. Der eine Fall betrifft ein inoperables Penis-carcinom mit Nekrose.

Der Kranke kam aus der Provinz und war seit Tagen mit einem schmutzigen Fetzen verbunden. Der Geschwürszerfall führte zu einer Urethrafistel, aus welcher stinkende Jauche floß, die Umgebung der Fistel war mit einem schmutzigweißen oder graugrünlichen, dem Schimmel des Rocfort-Käses ähnlichen Belage überzogen.

Und hier konnte ich trotz wiederholter Detritus- und Gewebsuntersuchungen weder fusiforme Bazillen, noch Spirillen finden. — Der zweite Fall bezieht sich auf ein *Ulcus cruris*, welcher mäßig stark und stellenweise mit einem 2 bis 3 mm dicken, zerfallenden, schmutzig-weißen bis grünschimmelfärbigen Belage bedeckt war; an den Rändern des Geschwüres keine reaktive Entzündung. Weder in dem Geschabe des Be-

¹⁾ S. Róna. Der gangr. diphtherit. Schanker der Autoren. Dieses Archiv. Bd. LXVII. Heft 2. 1903.

lages, noch in den exstirpierten Gewebsstücken war eine Spur von fusiformen Bazillen zu finden.

Hingegen begegnete ich diesen Bazillen noch in folgenden Fällen:

II. Fall. B. M., 45jähr. Tagelöhner, gelangte am 26. Dezember 1902 auf meine Abteilung. Vor 6 Jahren Geschwüre auf dem linken Unterschenkel, welche damals heilten; vor zwei Jahren entstanden an derselben Stelle Geschwüre, welche aber seitdem nicht mehr heilen wollten; deshalb begab er sich ins Spital.

Status praesens: Die Haut des linken Unterschenkels im oberen und mittleren Drittel, an der vorderen Seite exulceriert. Das Geschwür zeigt eine höckerige Oberfläche und ist stellenweise von einer schmutzig-weißen oder grünlichschwärzlichen, moderartigen, mehrere mm dicken, stinkenden, nekrotischen Rinde bedeckt. Auf der Mitte der Tibia führt eine kronengroße, mit einer graugrünlichen, nekrotischen Membrane ausgekleidete Höhle in die Knochenhöhle, aus welcher sich sehr stinkende, bräunlichrötliche Jauche entleert. Bei der Sondierung profuse Blutung. Auf dem ganzen oberen Drittel der Tibia Periostosen. Starke Abmagerung, Schwäche, Anämie. Fieberfreier Zustand.

Sowohl in den äußeren stinkenden Massen, wie auch in der aus der Knochenhöhle genommenen Jauche in dominierender Anzahl fusiforme Bazillen und Spirillen

In diesem Falle hatten wir es also nur mit der diphtheroiden Form der Wunddiphtherie zu tun.

III. Fall. Frau L., Wäscherin, aufgenommen am 26. Jänner 1903. Anamnese: Seit 20 Jahren häufige Exulceration des Fußes, die gegenwärtige Wunde besteht seit 6 Jahren. Als Wäscherin muß sie viel stehen, wobei ihr die Adern schwellen. Litt nicht an Abführen.

Status praesens: Fieberfreier Zustand. Auf der Innenfläche des linken Unterschenkels ein handtellergroßes, scharfrandiges, narbig umgrenztes, von einem grauweißlichen, stellenweise kohlschwarzen, schmierigen Belage überzogenes Geschwür; am Boden des Geschwürs stellenweise lebhaft Granulation. Mäßiger Gestank. Auf dem oberen und mittleren Drittel des Unterschenkels ist die Haut schwärzlich pigmentiert; geringe Varicosität. Stärker Varices am linken Schenkel. Der linke Fuß und die Zehen elephantiasisch geschwollen, von noch einmal so großem Umfange, als der rechte Fuß. Auf dem rechten mäßige Varices.

Im Geschabe fusiforme Bazillen fast in reiner Kultur, aber keine Spirillen. Gewebe wurde nicht exstirpiert.

Am 27. Jänner. Abreibung des Geschwürs mit sterilem Gaze und Verband. Heute kein Belag mehr. Geschabe von den oberflächlichen nekrotischen Granula; in 8—10 Gesichtsfeldern 1 fusiformer Bazillus; kein Spirillum. Fieberfreier Zustand. Die Kranke wurde geheilt entlassen.

IV. Fall. Frau A. St., 65jähr. Tagelöhnerin, aufgenommen am 11. März 1903. Anamnese: Stach sich vor 3 Jahren mit einer Weinrebe in den rechten Unterschenkel, welcher seitdem stets wundig sei. Vor 7 Wochen begann sich die Wunde in der Mitte zu schwärzen und stark zu stinken. War schon in mehrfacher ärztlicher Behandlung.

Status praesens: Fieber, Unwohlsein. Auf der Außenseite des rechten Unterschenkels ein handtellergroßes Geschwür, welches in der Mitte in einer kindeshandtellergroßen Ausdehnung gangräneseziert ist.

In dem unter der Pulpa genommenen Geschabe rein Vincentsche Bazillen.

Verlauf: Am dritten Tage an der Demarkationsstelle eine tiefe Exulceration. Bei der Aufnahme Abends 37.7° C., am 12-ten Morgens 37° , Abends 37.2° , am 13-ten Morgens 37.8° , Abends 37.4° . Weiterhin blieb sie fieberfrei und fühlte sich wohl. Keine Diarrhoe.

Histologische Untersuchung: Wir exstirpierten vom Rande des progressiven Geschwürs einen mehrere Zentimeter großen Teil zusammen mit der gesunden Grenze. An den Schnitten war sowohl das pathologisch-anatomische Bild, wie auch der Bakterienbefund derselbe, wie er von Vincent beschrieben wird. (Siehe farbige Tafel.) Spirillen habe ich in den Schnitten nicht gesehen (Weigert-Färbung).

Die Kranke wurde geheilt entlassen.

V. Fall. J. S., 1jähr. Zigeunerknabe, aufgenommen am 27. Juni 1903. Anamnese: Leidet seit Dezember 1902 an Ohrenfließen. Vor 5 Wochen bemerkte die Mutter beim Kinde hinter dem rechten Ohre, am Gesichte ein kleines Geschwür, welches immer größer wurde. Man legte bloß Watte darauf.

Status praesens: Ein wenig schwächlich entwickelter Knabe. Aus dem Ohre entleert sich ein gelbgrünliches Sekret. Auf der Gesichtseite des rechten äußeren Ohrenganges der äußere knorpelige Teil fehlend. Die ganze rechte Gesichtshälfte bis zu 1 Drittel des rechten Augenhides und hinab bis zum rechten Kieferwinkel exulceriert. Der Rand des Geschwürs ist gegen das Ohr hin von gesunder Haut begrenzt, gegen die Nase hin von einem lebhaft hyperämischen-ödematösen Hof umgeben. Das Geschwür ist zum größten Teile mit blaßrosafarbenen, lebhaften Granula bedeckt, während der, gegen die Nase gerichtete Rand in einer ca. $1\frac{1}{2}$ —3 cm großen Ausdehnung von einem graubräunlichen, stellenweise grünlichschwärzlichen, fetzigen, stinkenden Belage bedeckt ist, welcher die Haut, das subkutane Binde- und Fettgewebe in sich schließt (s. Figur). Augenlider rechterseits hyperämisch, ödematös. Lidspalte geschlossen. Rechte Mundhälfte infolge des Ödems difformiert. Seit einigen Tagen Appetitlosigkeit, Diarrhöen. Auf der rechten Seite des Nackens eine haselnußgroße, auf der linken Seite und in den Inguinal-

regionen mehrere bohngroße Drüsen. Abendliche Temperatur 38·4° C. 28. Juni. Der Prozeß breitet sich gegen das Auge, die Nase, den Kiefer und den Schädel hin aus, besonders gegen den letzten hin in Form einer typischen Gangrän in einer Breite von 2—3 mm. Rechterseits die Augenlider stark ödematös, nicht aufschließbar. Morgentemperatur 37·1° C.

Mikroskopische Untersuchung: In dem, vom progressiven Rande genommenen Geschabe zahlreiche Spirillen und typische Vincentsche Bazillen.

Histologische Untersuchung: Von den progressiven Rändern wurden mit der gesunden Grenze zusammen mehrere zentimeterlange Stückchen extirpiert. Histologischer und bakteriologischer Befund völlig identisch mit dem Vincents (s. farbige Tafel). Spirillen habe ich in den Schnitten nicht gesehen (Weigert-Färbung).

Verlauf: Auf Jodoformverband stand der Prozeß still und der Kranke konnte schließlich geheilt entlassen werden.

VI. Fall. A. P., 16jähr. ledige Magd, aufgenommen 7. Juni 1903. Anamnese: Seit 8 Jahren ist ihr linker Fuß wund. Das Leiden begann am Fußrücken und zog sich von dort auf die Zehen. Seit einem Jahre begannen die Zehen zu schwellen und seit einem Monate zu stinken.

Status praesens: Schwach entwickeltes, anämisches Mädchen. Am linken Fußrücken geringe Elephantiasis mit ausgebreiteten Narben. Sämtliche Zehen geschwollen, von papillären Wucherungen bedeckt. Auf dem unteren Teile des großen Zehens und auf der Mitte der Sohle lupöse Plaques. Die untere und innere Fläche der Zehen exulceriert und das ganze Gebiet von einem stinkenden, schmutziggelblichschwärzlichen, stellenweise schwarzrötlichen, mehrere Millimeter dicken Belage überzogen, welcher sehr leicht herabzukratzen geht.

Im Geschabe fast in reiner Kultur immense Mengen fusiformer Bazillen und Spirillen.

Die histologische Untersuchung ergab genau denselben Befund, wie der von Vincent bei der Nosocomialgangrän beschriebene. (Lithionkarmin-Weigert.) (Siehe farbige Tafel.)

Also innerhalb der kurzen Zeit einiger Monate 6 solche Fälle, in welchen ich den von Vincent bei Nosocomialgangrän für charakteristisch gehaltenen Mikroben entweder in reiner Kultur oder in dominierendem Verhältnisse gefunden habe. Damit glaube ich die Beobachtungen von Vincent, Ceyon und Brabec bestätigt zu haben, daß es nämlich noch heutzutage auch extragenitaliter derartige gangränöse und nekrotische Formen

gibt, welche sich durch ihren klinischen Charakter, am meisten aber durch ihre Bakterienflora von jedem anderen Prozesse unterscheiden und der klinischen Erscheinung und der histologischen Struktur nach, einem Teile der von den Alten unter den Sammelnamen Wunddiphtherie und Hospitalbrand gefaßten Prozesse entsprechen. Es ist dies ein heftiger Entzündungsprozeß, welcher rasch zu Kongulationsnekrose führt. Und diese Fälle gelangen, wie wir gesehen haben, nicht gar so selten zur Beobachtung. Sämtliche Fälle gelangten von außen ins Krankenhaus; und wenn wir daher nicht jeden putriden oder gangränösen Fall in der dargelegten Richtung untersuchen, so können uns viele, echte Vincentsche Nosokomialgangränen unerkant entgehen, welche man dann freilich bloß mit dem Namen „ichoröses“ oder „gangränöses“ Geschwür belegt. Ich erwähnte oben, daß ich in einigen mit putridem oder grau-grünlich nekrotischem Belage bedeckten Geschwüren nicht diese Bakterien gefunden habe, wohl aber zahlreiche andere Arten, Kokken, Bazillen mit einander vermengt; es ist also gewiß, daß die Wunddiphtherie der Alten keine einheitliche Ätiologie und Pathogenese besitzen konnte. Ferner wissen wir heute bereits, daß die sogenannte „Wunddiphtherie“ auch durch Streptokokken und Bakt. coli hervorgerufen werden kann und daß überhaupt eine ganze endlose Reihe von Bakterien zur Gangrän führen können.

Gegenüber allen diesen nimmt die in Rede stehende Gangrän eine Sonderstellung ein, wiewohl es schwer sein mag, dieselbe klinisch, besonders in leichten Fällen, zu differenzieren. Aber die bakteriologische Untersuchung ist so leicht, der Befund so charakteristisch, daß man sich sofort aller diagnostischen Zweifel entledigen kann.

Wir haben oben gesehen, daß die Kontagiosität des Prozesses außer Zweifel steht, obwohl die Infektion an gewisse Bedingungen geknüpft ist; während nämlich die in dem entzündeten, ödematösen Gebiete gesetzte Wunde das Virus in 2 Fällen prompt aufnahm und sich zu einem, dem Mutterherde völlig ähnlichen Krankheitsherde umbildete, so trat auf der gesunden Haut nach der Scarifications-Impfung derselben bloß eine sehr oberflächliche Nekrose auf, welche nach einigen Tagen spurlos verschwunden war.

Daß es sich hier um eine spezifische Infektion handelt, beweist auch der Umstand, daß die besagten Bakterien in das gesunde oder entzündete Gewebe dringen und mit ihrer Vermehrung Nekrose, Gangrän und allgemeine Erscheinungen hervorrufen, indem die Nekrose den Bakterien sozusagen auf dem Fuße folgt.

Wenn wir nun die Vincentsche Nosocomialgangrän mit dem Matzenauerschen genitalen Ulcus gangraenosum vergleichen, so muß ich konstatieren, daß beide auf lokaler Infektion beruhen, identische klinische Formen und eine identische bakteriologische Basis besitzen.

Auch darin stimmen die beiden Krankheitsformen überein, daß im Geschabe fast ausnahmslos die Bazillen mit den Spirillen zusammen gefunden werden (s. farbige Tafel), in den Schnitten aber bloß die Bazillen allein.

Bloß ein Unterschied wäre, daß nämlich dort die Bazillen etwas kleiner, hier durchschnittlich größer sind, aber sonst verhalten sie sich hinsichtlich der Verteilung im Gewebe und tinktoriell völlig analog.

Ich sage deshalb durchschnittlich, weil auch die Vincentschen fusiformen Bazillen zuweilen halb so groß sind, als gewöhnlich, im Gewebe aber eben kleiner sind, als an der freien Oberfläche. Es ist daher wahrscheinlich, daß beide, wenn auch nicht ganz identische, aber doch Varietäten ein und derselben Art darstellen. Beide Krankheitsprozesse unterscheiden sich auch nicht hinsichtlich der allgemeinen Symptome. Nervosität, Diarrhoe ist weder hier, noch dort eine regelmäßige Erscheinung. Wir haben

also bereits 2, einander völlig ähnliche, lokal infektiöse, mit septischer Intoxikation einhergehende Krankheitsformen kennen gelernt, bei welchen wir auf einen fast identischen bakteriologischen Befund stießen, in einem solchen Verhältnisse, daß wir unwillkürlich daran denken, daß die Bakterien in einem kausalen Nexus mit dem Prozesse stehen.

Immerhin sind aber noch weitere Forschungen unbedingt nötig. Wir haben oben gesehen, daß Vincent die Bazillen der Nosokomialgangrän als seinen Angina-Bazillen sehr ähnliche bezeichnet. So gelangte ich zum Studium der Vincentschen Angina.

Anmerkung während der Korrektur. H. Vincent veröffentlicht im Junihefte 1904 der *Annales de Dermatologie* seine Befunde bei Balanitis. Es ist ihm gelungen, sehr kleine Bazillen anaerob zu züchten und er gibt auch eine Zeichnung dieser Bazillen. Ich zweifle nicht daran, daß es dieselben Bazillen sind, die ich bei Balanitis gefunden und in Bd. LXVII, Heft 2, p. 268, 1903 dieses Archivs beschrieben, und die ich von den bei *Ulc. gangraen. penis* gefundenen und auf oben angegebener Tafel abgebildeten Bazillen, weder tinktoriell noch morphologisch unterscheiden konnte.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XIII—XVI.

Figur 1. Abstreifpräparat von einem *Ulcus gangraenosum penis*. Fusiforme Bazillen und Spirillen. Leitz $\frac{1}{16}$ Im. 4 Oc. Zusammen- geschob. Tubus. Zu meinem Artikel: *Ulc. phagedaen. diphth. etc.* in diesem Archiv. Bd. 67 H. II.

Fig. 2. Schnittpräparat von einem *Ulc. gangraen. penis*. Nur fusiforme Bazillen in Reinkultur. Leitz $\frac{1}{16}$ Im. 4 Oc. Zus. Tubus. Zu meinem obgenannt. Artikel.

Fig. 3. *Gangraena nosocomialis* am rechten Unter- schenkel. Fall I.

Fig. 4. *Gangraena nosocomialis* der rechten Gesichtshälfte. Fall IV.

Fig. 5. Abstreifpräp. von Fall I der Nosocomialgangrän. Leitz $\frac{1}{16}$ Im. 4 Ok. Zus. Tubus.

Fig. 6. Schnittpräp. von Fall IV der Nosocomialgangrän. Leitz $\frac{1}{16}$ Im. 4 Ok. Zusam. Tubus.

Fig. 7. Schnittpräparat von Fall V der Nosocomialgangrän. Leitz $\frac{1}{16}$ Im. 4 Ok. Z. Tubus.

Fig. 8. Schnittpräp. von Fall VI. der Nosocomialgangr. Leitz $\frac{1}{16}$ Im. 4 Oc. Ausgezogener Tubus.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 5.

Fig. 6.

Róna : Nosocomialgangræn.

K. u. k. Hoflithoer. A. Haase, Prag.

Fig. 7.

Fig. 8.