Über drei Fälle von Eventration.

Von

Dr. A. Rischpler.

(Aus dem pathologischen Institut zu Marburg.)

Mit Tafel XXXII und 2 Figuren im Text.

Eingegangen am 28. März 1898.

Fälle von mangelhafter Abschnürung des Nabels sind im Laufe der Zeit in großer Anzahl theils als Eventrationen, theils als Nabelschnurbrüche beschrieben worden. Ein strenger Unterschied wurde zwischen beiden zumeist nicht gemacht, um so weniger, als selbst gewichtige Autoren in der Begrenzung der *Hernia funiculi umbilicalis* weit aus einander gehen. Während z. B. FÖRSTER¹⁾ nur die Bauchspalten, die sich auf die Nabelgegend beschränken und bei »denen die Ober- und Unterbauchgegend frei« ist, als Nabelschnurbrüche bezeichnet, rechnet AHLFELD²⁾ zu diesen selbst hohe Grade von Eventration mit starker Knickung der Wirbelsäule und kindskopf-großem Bruchsack, der alle Theile der Bauchhöhle und eventuell sogar das Herz enthält. Mit MARCHAND³⁾ möchte ich die Bezeichnung *Eventratio s. Ektopia viscerum* im Gegensatz zum Nabelschnurbruch auf alle jene Fälle anwenden, in denen der Nabel so weit ist, dass der größte Theil des Abdomens, ja selbst ein Theil der Brusthöhle offen bleibt und der amniotische Sack die Mehrzahl der Bauchorgane enthält.

Ihr entspricht demnach etwa folgendes Bild:

Über dem Abdomen wölbt sich ein an Größe variabler Sack vor, dessen Wandung im Allgemeinen aus zwei Blättern besteht, von denen das äußere vom Amnion gebildet wird. Dieses geht in die Haut der Bauchwand über, die mit einem deutlich erkennbaren Rande aufhört, und bildet andererseits die Nabelschnurscheide.

¹⁾ FÖRSTER, Die Missbildungen des Menschen. Jena 1865. pag. 110—113.

²⁾ AHLFELD, Die Missbildungen des Menschen. 1882. pag. 196—204.

³⁾ MARCHAND, Missbildungen in EULENBURG's Realencyklopädie der ges. Heilkunde. 3. Aufl. XV. pag. 555—556.

Das innere Blatt soll zuweilen fehlen, stellt in der Regel aber eine Fortsetzung des Peritoneums dar und kann von dem äußeren leicht getrennt werden. Dabei zeigt sich, dass zwischen beiden eine gallertig sich anfühlende, theilweise faserige Zwischenschicht existirt.

Die Nabelschnur ist meist kurz, inserirt bald central, bald peripherisch und enthält oft nur eine Arterie und eine Vene, die rechts oder links, meist aber links im Sack verläuft. In anderen Fällen ist es gar nicht zur Bildung eines eigentlichen Nabelstranges gekommen und die Wand des Sackes geht auf die Placenta über.

Als Inhalt finden sich gewöhnlich Darm und Leber, oft Magen und Milz, in vereinzeltten Fällen das Herz und in ganz seltenen Theile der Lunge. Letzteres meist bei gleichzeitiger partieller Spaltung des Brustbeines.

Häufiger trifft man bei den Eventrationen lordotische und skoliotische Knickungen der Wirbelsäule an. Des öftern sind Verwachsungen der Abdominalorgane beobachtet worden und es pflegt insbesondere die Leber in größerer oder kleinerer Ausdehnung mit der Wand des Sackes verbunden zu sein.

Letzterer reißt bei der Geburt, zuweilen schon während der Schwangerschaft ein, mit oder ohne Eröffnung des Peritoneums.

Die verschiedensten Momente wurden zur Erklärung des unterbliebenen Bauchwandschlusses, zur Deutung des Nabelschnurbruches und der Eventration herangezogen. So hat nach RUYSCH¹⁾, RICHTER²⁾ und FÖRSTER³⁾ das Vorliegen der Unterleibseingeweide einen Fehler der ersten Bildung zur Ursache. »Die Bauchwandungen sind, so weit der Umfang der Bruchsackes reicht, defekt, indem an dieser Stelle Muskeln und Haut gar nicht gebildet wurden.«

MORGAGNI⁴⁾ äußert sich folgendermaßen: »Intestinorum autem effusio, cujus culpa nonnunquam in rudes violentasque obstetricum, infantes eduentium, contrectationes, pressionesque conjecta est, hic certe, ubi nihil harum esse potuerat, ipsi foetus abdomini tribuenda erat, aut nunquam, aut non satis ocluso. A primordiis enim, ut Harveus in pectorum quoque, ut vocant, animalium embryonibus, et nos certe in caninis vidimus, apertum est. Postea autem nisi peritoneum, muscoli et integumenta communia prorsus et firmiter occludant; perfecto autem apertum maneat, aut in marsupium laxetur

¹⁾ RUYSCH, Obs. 71. pag. 92. cit. nach MECKEL.

²⁾ RICHTER, Anfangsgründe der Wundarzneykunst. Bd. V. pag. 433. Frankenthal 1799. cit. nach MÜLLER.

³⁾ FÖRSTER, a. a. O.

⁴⁾ MORGAGNI, De sedibus et causis morborum. 1765. Epist. XLVIII. Art. 54.

et si tenuissimum fit, facile disrumpatur ab ipso viscerum pondere, necesse est.«

SANDIFORT¹⁾ dagegen beschuldigte äußere Gewalt, welche die Mutter traf und stützte sich dabei auf Fälle, in denen, wie er wusste, die Frauen während der Schwangerschaft zu Fall gekommen waren. Diese Ansicht hat in neuester Zeit einen Vertreter in HENNIG²⁾ gefunden, der den »mechanischen Stoß, eine Erschütterung der Schwangeren, namentlich eine oft wiederholte wie beim Plätten und Eisenbahnfahren, aber auch heftige Gemüthsbewegungen« anklagt, die wie ein Stoß wirken sollen. Sie riefen eine Wehe hervor, »deren krampfhafte Bewegung im Fruchtwasser eine dem zarten Embryo gefährliche Sturmwelle hervorbringe«.

LASSUS³⁾ dagegen glaubt, dass die beträchtlich vergrößerte Leber den Bauchwandschluss hindere und SCARPA⁴⁾ wieder sucht die Ursache »in der verspäteten und unvollkommenen Entwicklung und Ausbildung der Bauchmuskulatur und ihrer Sehnen, verbunden mit einer außerordentlichen Anschwellung der Eingeweide des Unterleibes und besonders der Leber«. Als begünstigendes Moment wird »die Kürze und Spannung der Nabelschnur, die um den Hals oder einen anderen Theil des Fötus geschlungen ist«, und »eine langdauernde und schwere Geburt« angenommen.

Nachdem OKEN⁵⁾ den physiologischen Austritt des Darmes in den Nabelstrang, wie wir ihn bei Embryonen von 10 mm, also etwa vom Anfang der vierten Woche an kennen, beobachtete und noch in der achten Woche Schlingen außerhalb des Leibes sah, lag es nahe, zunächst den Nabelschnurbruch wegen seiner Ähnlichkeit mit diesem beim Fötus normaler Weise beobachteten Zustand auf eine Persistenz desselben zurückzuführen. Das geschah vielfach, ohne auf die Ursache dieses Stillstandes in der Entwicklung einzugehen [HESSELBACH⁶⁾, SAINT-HILAIRE⁷⁾].

1) SANDIFORT, *Observ. anat. path.* Lib. III. 1779. cit. nach TARUFFI u. OKEN.

2) HENNIG, in GEHRHARDT's Handbuch der Kinderkrankheiten. Bd. II. pag. 77—83. 1877.

3) LASSUS, *Mém. de l'institut nat.* Tom. III. pag. 378—392. cit. nach MECKEL.

4) SCARPA, Über die Brüche. Übersetzt v. SEILER, Halle 1822. Abh. 5. § 5.

5) OKEN, Preisschrift über die Entstehung und Heilung der Nabelbrüche. Landshut 1810.

6) HESSELBACH, Die Lehre von den Eingeweidebrüchen. Würzburg 1830. cit. nach KRÄMER.

7) GEOFFROY ST.-HILAIRE, *Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux.* Paris 1832—36. pag. 373. cit. nach CRUVEILHIER.

OKEN¹⁾ selbst sucht »die Hauptsache des Nichtzurückziehens der Därme in ihrer Erschlaffung, in dem Verlust ihrer Elasticität, durch die sie zusammengerollt und zurückgeschoben werden«. Dieser Ton der Därme geht nach ihm durch unaufhörliches Anstoßen des Leibes beim Plätten, durch Fieber und Unpässlichkeit der Mutter und dergleichen mehr verloren. »Wenn dieses vor dem Einziehen der Därme statthat, so können diese vor dem Nabelring liegen bleiben und dadurch Anhäufung, Erweiterung des Nabelringes, Herausziehen des Magens und der daran hängenden Milz und wohl durch Zerreißung der weißen Linie bis an den Thorax« große Unordnung hervorbringen.

MECKEL²⁾ dagegen findet als dreifachen Grund entweder, dass der Darm »sich selbst nicht zurückrollt, oder sich die Unterleibswand zu frühe schließt, oder diese offen bleibt. Die erste und letzte Bedingung fallen wahrscheinlich gewöhnlich zusammen«.

MÜLLER³⁾ fand in einem Fall die Nabelschnur zweimal um den Hals des Fötus geschlungen und schreibt darüber: »eben dieselbe Wirkung der übergroßen und anhaltenden Spannung musste nothwendig auch auf den kindlichen Theil der Nabelschnur geübt und dadurch die Gelegenheit zu der nicht zur gehörigen Zeit erfolgten normalen Zurückziehung der Eingeweide in die Bauchhöhle gegeben werden, welche der naturgemäßen Schließung und Verwachsung der letzteren vorausgehen muss.«

KRÄMER⁴⁾ dagegen glaubt den Mechanismus des Zurücktrittes der Eingeweide »auf keine andere Weise erklären zu können, als dass die Mesenterien und Suspensionsapparate der Eingeweide sich bei ihrer Ausbildung allmählich verkürzen, wie sich das Narbengewebe bei weiterer Organisation zusammenzieht, und die Eingeweide zurückziehen. Somit läge der letzte Grund dieser Hemmungsbildung in der mangelhaften Verkürzung der Mesenterien der Eingeweide«.

OSTERLOH⁵⁾ fand in einem Fall die rechte Niere drei- bis viermal so groß als gewöhnlich und kommt im Anschluss daran zur Meinung, dass »die Entstehungsursache hier jedenfalls in der abnorm großen

¹⁾ OKEN, a. a. O.

²⁾ MECKEL, Handbuch der path. Anatomie. Bd. 1. 1812. pag. 99 u. ff.

³⁾ MÜLLER, RUST's Magazin für d. gesammte Heilkunde. Bd. 15. pag. 69—71. Berlin 1823.

⁴⁾ KRÄMER, Zeitschr. f. rationelle Medicin. Bd. 3. Heidelberg 1853.

⁵⁾ OSTERLOH, WINCKEL's Berichte und Studien aus dem Kgl. Sächs. Entbindungsinstitute in Dresden. pag. 217.

rechten Niere zu suchen sei, die die Dünndarmschlingen verhinderte, zur Zeit, als die Bauchwand sich schließen wollte, vollständig in der Bauchhöhle Platz zu finden«.

Einen Gegner fand die von OKEN geschaffene Theorie in CRUVEILHIER¹⁾, der bei einem Embryo von 5 oder 6 Wochen keine Darmschlingen außerhalb des Leibes sah, diesen im Gegentheil geschlossen fand. Er führt dann auf Grund einer ihm damals übersandten Eventration Folgendes aus: »L'arrêt de développement me paraît donc devoir être rejeté quant à l'interprétation des éventrations ombilicales. Si on me demande une explication, je répondrai qu'une mauvaise attitude du fœtus, qu'une compression, à laquelle il aurait été soumis dans cette attitude, par exemple dans une renversement du tronc en arrière, pourrait très bien rendre compte de la sortie de l'intestin à travers l'anneau ombilical et de la distension des membranes d'enveloppe du cordon, qui constituent le sac herniaire.«

Schwer verständlich bleibt DAVAINÉ²⁾, wenn er sagt: »La brièveté du cordon ombilical et le défaut de réunion de ses vaisseaux tendent à produire la scission de la paroi abdominale et l'exomphale.«

Der meisten Anerkennung erfreute sich in letzter Zeit die Theorie, welche AHLFELD³⁾ aufgestellt hat. Er sagt darin ungefähr Folgendes:

Normaler Weise liegen bis zur 10. Woche eine oder mehrere Darmschlingen im Nabelstrang und zwar das Ende des Ileums und der Anfang des Coecums. Am weitesten ragt die Ansatzstelle des Dotterganges hinein. Durch Ausdehnung des Amnions wird die Dotterblase vom Fötus abgedrängt, der Dottergang wird dünner und reißt schließlich ab. Wird die Trennung verzögert oder bleibt sie ganz aus, so bleiben Darmschlingen liegen und es kommt zur Bildung eines Nabelschnurbruches. Handelt es sich aber um Brüche, die Leber, Milz und Magen enthalten, so ist anzunehmen, dass nach Abhebung des Amnion in der dritten Woche durch eine plötzliche starke Füllung der Dottersack schnell vom Bauche des Embryo abgedrängt wird und es treten, wenn dabei der Dottergang nicht reißt, die Darmschlingen tiefer als gewöhnlich in die Nabelschnur, weitere folgen und schließlich die anderen Abdominalorgane.

¹⁾ CRUVEILHIER, Anatomie pathologique du corps humain. Paris 1829—35. 7^e liv. pl. V, 24^e liv. pl. V—VI, 31^e liv. pl. V.

²⁾ DAVAINÉ, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Tom. IX. Monstres. Paris 1875.

³⁾ AHLFELD, a. a. O.

Sekundäre Erscheinungen sind neben Darmzerreißung und Atresia ani die totale oder partielle Vergrößerung der Leber, die auf die Erweiterung der Leibeshöhle zurückzuführen ist. Die Drüse sinkt deshalb oder wuchert in den Nabelschnurbruch hinein. Das Zwerchfell ist entweder nach unten vorgewölbt oder defekt, so dass das Herz in die Bauchhöhle wandert, die Wirbelsäule durch Zug der Dotterblase bei den großen Brüchen für gewöhnlich nach vorn eingebuchtet, zuweilen so bedeutend, dass der Steiß neben die Schulter zu liegen kommt.

Gegen diese Theorie wandte BUSCHAN¹⁾ mit Recht ein, »dass einerseits Darmdivertikel, die doch als Überreste des vorhandenen Zusammenhanges zwischen Darm und Nabelbläschen häufig genug vorkommen könnten, nur sehr selten beobachtet wurden, und dass andererseits der Nabelstrang in der unverhältnismäßig größten Anzahl nicht mitten auf dem Tumor, sondern an seiner Peripherie inserirt, trotzdem der Zug auf den Embryo senkrecht ausgeübt wird«. Auch TARUFFI²⁾ macht darauf aufmerksam, dass sich meist keine Spur von dem Gange mehr auffinden lässt. Schwerwiegender ist sein Einwurf, dass der Zug am unteren Theile des Ileums überhaupt nicht ausreiche, das Duodenum herabzuziehen, dass sich die Leber aber gleichsam konstant im Bruchsack befindet und in einzelnen Fällen von Nabelschnurbruch den alleinigen Inhalt bildet. Hier hat die Erklärung von NEUGEBAUER³⁾ etwas für sich. Von Fällen ausgehend, in denen die Leber unmöglich sich aus ihrer Lage entfernt haben konnte, versucht er an der Hand eines Fötus mit folgenden Verhältnissen zu beweisen, dass das Organ an der eingenommenen Stelle gebildet sei. Das Colon liegt links, der Dünndarm rechts, das Duodenum ist zum Nabel herabgezogen. Die Nabelvene verläuft auf der rechten Seite der Gallenblase, die Leber ist in der Nabelschnurscheide fixirt und ihre Venen münden sämmtlich in den Ductus venosus Arantii ein. Er macht die Leberentwicklung von der Lage des Duodenums und der Vereinigungsstelle der Nabel- und Dottervene abhängig. Die Möglichkeit zum Herabsteigen des Duodenums sieht er in dem Mangel an Fixation durch das Quercolon, d. h. dem Verlauf des Dickdarmes in der linken Seite. Eine Vereinigung der Venen wird im Nabelstrang angenommen und so sind die Bedingungen

1) BUSCHAN, Über Hernia funiculi umbilicalis. In.-Dissert. Breslau 1887.

2) TARUFFI, Storia della Teratologia. pag. 395. Tom. VII. Bologna 1894.

3) NEUGEBAUER, Über das Auftreten der Leber im Nabel als Fehler der ersten Bildung. Neue Zeitschr. f. Geburtskunde. Berlin 1850.

gegeben, die Leber im Bruchsack entstehen zu lassen. Diese Theorie ist schon um desswillen interessant, weil in ihr zum ersten Male der Gefäßverlauf zur Erklärung mit herangezogen wird.

In gleicher Weise ist das von ASCHOFF¹⁾ geschehen, der auf Grund des Verlaufes der Umbilicalvenen und des normalen Verhältnisses der ausmündenden Lebervenen zum Ductus Arantii eine Lageveränderung der Leber ausschließt und zu dem Resultat kommt, dass die Drüse am abnormen Fundort gebildet und ihre Verwachsung mit der Wand des Bruchsackes als mangelhafte Abschnürung anzusehen sei. Für die überwiegende Mehrzahl der Fälle führt er die abnorme Anlage der Leber auf eine Störung in der Bauchwandanlage als Ursache zurück und kommt bezüglich der bei den Nabelschnur- und Bauchbrüchen beobachteten Einziehungen der Lendenwirbelsäule zu der Ansicht, dass sie das ursächliche Moment für die übrigen Entwicklungsstörungen bilden und auf eine Persistenz der Rückenkrümmung bei Embryonen mit zwei Kiemenspalten zurückzuführen sind. Wo diese fehlt, werden Amnionverwachsungen als Ursache angenommen.

Eine weitere Erklärung für das Zustandekommen dieser Missgeburten wurde von MARCHAND²⁾ gegeben, auf die an anderer Stelle noch genauer eingegangen werden soll.

Hier sei nur hervorgehoben, dass bereits KRÄMER³⁾ für seinen Fall den Mangel der äußeren Haut und der Bauchmuskulatur ausdrücklich bestritten hat und von AHLFELD durch Präparation und Messung die Unrichtigkeit dieser Auffassung nachgewiesen worden ist.

Die Annahme, dass die beträchtlich vergrößerte Leber die Ursache für das Offenbleiben des Leibes sei, hat von MECKEL, der mechanische Insult durch Fall, den SANDIFORT in Betracht zieht, von OKEN an den angeführten Fällen selbst eine eingehende Widerlegung erfahren.

In gleicher Weise wurde die Vergrößerung der Niere und der Zug an der Nabelschnur als Ursache der Brüche von AHLFELD zurückgewiesen.

Die sekundäre Schwächung des Darmtractus der Frucht (OKEN), die mangelhafte Retraktion des Mesenteriums (KRÄMER) und die mechanischen Insulte (HENNIG) halten wohl kaum einer ernsthaften Kritik stand.

¹⁾ ASCHOFF, über das Verhältnis der Leber und des Zwerchfells zu den Nabelschnur- und Bauchbrüchen. VIRCHOW'S ARCHIV. Bd. 144. pag. 511. Berlin 1896.

²⁾ MARCHAND, a. a. O.

³⁾ KRÄMER, a. a. O.

Die Einwürfe gegen die AHLFELD'sche Theorie sind bereits erwähnt worden.

Die Erklärung NEUGEBAUER's reicht vielleicht aus bei großen Bruchsäcken auch andere Abdominalorgane neben der Leber als Inhalt verständlich erscheinen zu lassen, sie lässt aber ganz im Stich, wenn Darmschlingen allein den Inhalt bilden.

Die große Zahl der angeführten Theorien beweist zur Genüge, dass durch keine eine befriedigende Antwort auf die Frage nach der Entstehung dieser Missgeburten gegeben worden ist. Das wird auch nicht eher geschehen können, als bis im einzelnen Falle eine genaue anatomische Untersuchung nicht nur des groben Körperbaues und der Lage der Organe, sondern auch der Gefäßverläufe stattfindet.

Die Entwicklungsgeschichte giebt uns weiterhin die Möglichkeit an die Hand, das Zustandekommen der gefundenen Abnormitäten zu verstehen und damit die Zeit zu bestimmen, in welcher ihre Anlage erfolgt sein musste.

Danach erst können wir auf Grund der anatomischen Verhältnisse jener Embryonalstufe die Faktoren aufstellen, welche zum Abweichen von der Regel führen und die Missgeburten entstehen lassen konnten.

Doch gehen wir nunmehr zur Betrachtung des uns vorliegenden Materials über.

Von den drei Fällen von Eventration, welche mir Herr Geh.-Rath MARCHAND zur näheren Untersuchung übergab, ist der erste von Herrn Dr. HEILBRUN in Kassel am 29. I. 97, der zweite am 2. III. 97 von Herrn Dr. TÜRK in Oberhausen dem pathologischen Institut übersandt worden, beide leider ohne Placenten, die man bei der Beurtheilung solcher Missgeburten nicht gern entbehrt.

Der dritte ist ein älteres Präparat aus der Sammlung des Institutes.

Die Gefäße wurden bei I und II von dem Nabelstrang aus mit rother bzw. blauer Injektionsmasse gefüllt, die Föten zum größeren Theile von Herrn Geh.-Rath MARCHAND präparirt.

Bei III waren die Gefäße nicht injicirt. Eine gewisse Präparation war aber auch hier vorausgegangen. Das Sternum war durchtrennt und die Brustorgane freigelegt worden. Der Magen fand sich längs der großen Curvatur eröffnet, der Darm im Verlaufe des Colon descendens durchschnitten und in weiter Ausdehnung von den fixirenden Bändern abgelöst.

Fötus I.
($\frac{1}{2}$ natürl. Größe.)

Erklärung der Buchstaben:

<i>A.u.s</i>	Art. umbilicalis sinistra.	<i>St</i>	Sternum.
<i>Ca</i>	Art. carotis sin.	<i>T</i>	Thymus.
<i>C</i>	Herz.	<i>Th</i>	Thyreidea.
<i>G</i>	Magen.	<i>V.d</i>	rechter } Vagus.
<i>H</i>	Leber.	<i>V.s</i>	linker }
<i>J</i>	Darm.	<i>V.j.c</i>	V. jugularis communis sin.
<i>L</i>	Milz.	<i>V.t.i</i>	Venae thyreoideae inferiores.
<i>S</i>	Sackwand (Umschlagsstelle).	<i>V.u.d</i>	V. umbilicalis dextra.

I.

Eventration mit Skoliose und Lordose der Wirbelsäule. — Persistenz der rechten Nabelvene, Schwund der linken. — Fehlen der rechten Nabelarterie. — Abnormer Verlauf der Pfortaderfortsetzung in der Leber. — Abnorme Streckung und Lage der linken Tube und des linken Ovariums. — Peritonitische Auflagerungen und Verwachsungen der Abdominalorgane.

Sektionsprotokoll.

Etwas macerirter nahezu reifer Fötus weiblichen Geschlechtes, 41 cm lang. Rumpf sehr stark deformirt, mit vollständiger Einknickung der Wirbelsäule nach hinten und rechts, so dass der Steiß dem Nacken anliegt.

Der Kopf ist verhältnismäßig groß, stark behaart und etwas unsymmetrisch. Die linke Stirnhälfte ist etwas abgeflacht, die rechte tritt stärker hervor. Die hintere Hälfte des linken Scheitelbeins ist ebenfalls abgeplattet.

Die Haut ist mit sehr reichlicher Vernix bedeckt, die Epidermis theilweise in Fetzen abgelöst.

Der rechte Arm und beide Beine sind nicht deformirt.

Der linke Arm ist im Ellbogen nicht vollständig streckbar, seitlich abgeflacht und mit Flughautbildung versehen.

Die Wand des Bauches und der Brust zeigt einen umfangreichen Defekt, durch welchen fast sämtliche Bauchorgane und nach aufwärts das Herz, das in einem serösen Sack liegt, hervortreten.

Rechts unmittelbar unter dem Herzen findet sich die Leber, die aus einem rechten abwärts gekehrten größeren und linken aufwärts gerichteten kleineren Lappen besteht, zwischen denen ein Einschnitt verläuft. Von dem nach aufwärts gekehrten Lappen setzt sich die Kapsel unmittelbar auf den serösen Überzug des Herzens fort.

Links davon liegt der umfangreiche Magen, ebenfalls von einem glatten Überzug bedeckt, der sich aufwärts in den des Herzens fortsetzt.

Auf der linken Seite des Magens findet sich die Milz, die ebenfalls von einem glatten fibrösen Überzug bedeckt ist, der kontinuierlich in den des Magens übergeht.

Weiter nach hinten liegt ein rundlicher, weicher Körper, anscheinend die Niere.

Am oberen Umfange des Defektes tritt in der glatten serösen

Auskleidung der Hinterwand der Bauchhöhle ein Gebilde hervor, das einem stark gerötheten Fimbrienende einer Tube entspricht und nach aufwärts in einen ausgefranzten Streifen, ähnlich wie die *Fimbria ovarica*, sich fortsetzt.

Ein Ovarium ist hier zunächst nicht deutlich zu erkennen.

Der Magen geht in ein sehr weites Duodenum über, auf das ein verhältnismäßig kurzer dicker, weiter Dünndarm folgt, dessen Schlingen dicht an einander gezogen und vielfach mit einander verwachsen sind. Daran setzt sich ein kurzer ebenfalls unregelmäßig gelagerter Dickdarm.

Auf der rechten Seite tritt aus der Tiefe neben der Wurzel des Mesenteriums ein Gebilde hervor, das dem rechten Tubenende entspricht.

Vom Uterus ist ohne weitere Präparation nichts erkennbar.

Am rechten Umfang des Bauchwanddefektes liegt die Insertion des Nabelstranges, welcher in einer Länge von 15 cm erhalten ist, aber nur an der Außenseite einen glatten Überzug besitzt und gegen seine Insertion flach ausgebreitet ist. Darin verläuft eine weite Vene und eine ebenfalls weite und gegen die Bauchhöhle hin stark geschlängelte Arterie. Die Scheide des Nabelstranges setzt sich unmittelbar in eine dünne vielfach eingerissene Membran fort, die am Rande des Defektes inserirt. Nach innen davon breitet sich eine zweite Membran aus, welche vielfach gelbliche Einlagerungen einschließt, die wie veränderte Fettläppchen aussehen. Die Insertion dieser Membran erstreckt sich am oberen Umfang des Defektes bis zu dem dem Herzen entsprechenden Vorsprung, hört dann aber auf. Vom Nabelstrang aus setzt sie sich nach unten hin breiter werdend fort.

Links fehlt diese Membran im oberen Theile des Umfanges größtentheils, doch finden sich hier noch einige augenscheinlich nekrotische, missfarbene Fetzen, die sich am Rande der Haut inseriren.

Hier erstreckt sich der Bauchwanddefekt bis in die Nähe der Achselhöhle.

Die Thoraxwand ist an dieser Stelle sehr deformirt, bildet nach dem Rücken hin einen ziemlich starken Vorsprung, in dem einige knöcherne Theile, die anscheinend der Wirbelsäule und Rippenrudimenten entsprechen, durchzufühlen sind.

Befund nach der Präparation.

Der Sack ist nur auf der rechten Seite erhalten und reicht mit intakter Insertion von der Mitte des oberen Umfanges des Defektes

bis in die Nähe der Knickungsstelle der Wirbelsäule. Dort schlägt er sich nach innen um und geht ohne nachweisbare Grenze in ein Blatt über, das am aufsteigenden Ast der von der Umbilicalarterie im Nabelstrang gebildeten Schlinge mit deren Scheide in Verbindung steht. Blatt und Scheide lassen sich leicht trennen und eine gallertig sich anfühlende Zwischensubstanz erkennen. Von der Umschlagsstelle bis nahe an die Arterien Schleife steht der medial gelegene Theil des Sackes weder mit dem äußeren Theile, noch mit dem Rande der Abdominalwand in Verbindung. Dabei besteht er caudal der Nabelschnur allenthalben nur aus einer Membran und fühlt sich an den einander zugekehrten Seiten gallertig an.

Das mit der Nabelschnur in Verbindung stehende Blatt setzt sich cranialwärts mit abnehmender Breite bis zur angegebenen Stelle fort und hängt mit dem äußeren noch theilweise durch eine schleimig sich anfühlende Zwischenschicht zusammen. In ihm finden sich die bereits erwähnten Einschlüsse. Am Abdominalrand geht es in das Peritoneum über.

Die am meisten cranial gelegene Partie des Sackes besteht aus zwei Blättern, die gleichfalls durch eine gallertig sich anfühlende Zwischensubstanz verbunden sind.

Die Scheide des Nabelstranges geht in das äußere Blatt, das vom Amnion gebildet wird, über, doch steht er nur auf seiner Endstrecke mit diesem in Verbindung, das periphere Stück ist frei. Zwei rauhe Linien aber an der caudalen und cranialen Seite des Stranges weisen darauf hin, dass auch hier eine Verbindung bestanden hat.

Das Amnion setzt sich in die Bauchwand fort. Letztere ist dabei deutlich von ihm abzugrenzen.

In Folge der hochgradigen Knickung der Wirbelsäule haben fast sämtliche Organe der Brust- und Bauchhöhle eine wesentliche Lageveränderung erfahren und sind zum größten Theil durch den Bauchwanddefekt nach außen getreten.

Dabei ist das Herz nach abwärts verschoben und sieht mit seiner Spitze fast gerade nach vorn. Der Herzbeutel ist eröffnet worden. Das Organ ist etwas um seine Achse von rechts nach links gedreht.

In dem engen Raume zwischen Herz und Rippenbogenrudiment liegt die linke Lunge. In sie tritt von oben her der zugehörige Ast der Pulmonalarterie ein. Die Pleurahöhle ist nicht eröffnet.

Rechts vom Herzen und caudalwärts von ihm findet sich die Leber. Sie ist deformirt und von etwa birnförmiger Gestalt. Ihr längster, dem eigentlichen queren entsprechende Durchmesser, von

links oben nach rechts unten gerichtet, beträgt 9, der darauf senkrechte $5\frac{1}{2}$ und der Dickendurchmesser 4 cm. Eine Furche auf der Vorderfläche theilt sie in zwei Lappen, einen größeren rechten, der nach rechts und abwärts, und einen kleineren linken, der nach links und aufwärts gerichtet ist.

Durch Einreißen des Omentum minus ist der sehr große Lobus Spigelii sichtbar gemacht. Er entspringt auf der nach links und dorsal gerichteten Seite der Leber mit breiter Basis von der Mitte des linken Lappens bis zur Eintrittsstelle der Pfortader und reicht von vorn nach hinten abgeflacht caudalwärts bis zum unteren Drittel des Magens und nach links bis zur Milz.

Eine Gallenblase ist nicht vorhanden.

Auf der Oberfläche des Organs finden sich einzelne Auflagerungen und Bindegewebsanhängsel.

Ein Lig. suspensorium existirt im cranialen Theile der erwähnten Leberfurche und stellt eine Verbindung des Organs mit dem Sack her. Es geht in ein querverlaufendes derbes Gewebe über, das eine Fortsetzung der Leberkapsel darstellt und die Drüse in einer Ausdehnung von 5 cm an den Herzbeutel und die Abdominalwand rechts davon befestigt.

Dieser Gewebspartie caudalwärts angelagert verläuft die Umbilicalvene vom Rande des Defektes zur Leber und verschwindet in dieser an einer Stelle der Dorsalfäche, die der Grenze zwischen oberem und mittlerem Drittel der Oberflächenfurche entspricht.

Die Pfortader tritt mit der Art. hepatica an der Grenze beider Lappen etwas dorsalwärts von dem nach links und unten gerichteten Rand der Drüse ein. Der Fortsetzung der ersteren entsprechend ist die Leber aus einander präparirt.

Nach unten und links von dieser findet sich der Magen, der mit der deformirten Milz fest verwachsen ist. Auf seiner Vorderfläche sind einzelne rauhe Auflagerungen konstatirbar.

Der Darmtractus ist von regellosem Verlauf. Seine Schlingen zeigen gelblich körnige Auflagerungen und vielfache Verwachsungen unter einander.

Rechts vom Rectum vor der Aorten- und Cavatheilung ist der Uterus als rundlicher, vorn flacher Körper erkennbar, von dem aus die rechte Tube seitlich an der Bauchwand emporzieht.

Cranialwärts von ihr liegt das Ovarium.

Die linke Tube verläuft als ein etwa 2 mm breiter Strang vom Uterus aus lateral und aufwärts unter den Darmschlingen hin, vor

der linken Niere in die Höhe und endet etwas oberhalb derselben mit dem beschriebenen Tubenende, das eine feine Öffnung trägt, in der die Sonde bis zur Ampulle vordringen kann.

In der Nierengegend liegt medial vom Eileiter ein hellerer etwas röthlicher Streifen, der sich mikroskopisch als das langgestreckte Ovarium feststellen lässt.

Die linke Niere und Nebenniere sind ungleich größer als die entsprechenden Organe der rechten Seite und liegen an der Knickungsstelle der Wirbelsäule.

Der Thorax ist deformirt, ein ausgedehnter Rippendefekt auf der linken Seite vorhanden. Die Weichtheile sind vom Rande der Bauchwand bis zum Kinn gespalten worden, das kurze knorpelige Sternum ist bloßgelegt. Es wird nur vom Manubrium gebildet, misst $1\frac{1}{2}$ cm und ist zur Präparation der Hals- und Brustorgane durchtrennt worden.

Die Vagi und Carotiden sind wie die Trachea, Larynx und Thyroidea freigelegt, ebenso die großen Venenstämme.

Die Thymus ist relativ klein und bedeckt die rechte Vena anonyma, die weit schwächer entwickelt ist als die linke.

Die rechte Pleurahöhle ist eröffnet, die Lunge bei seitwärts gebogener Thoraxwand sichtbar.

Gefäßverlauf.

Die V. umbilicalis verläuft in der rechten Seite des Sackes bis nahe zum Rand des Bauchwanddefektes, biegt dann nach vorn um und tritt an der beschriebenen Stelle in die Leber ein. In dieser wendet sie sich nach links und oben, wobei sie kleine Äste in die Drüse schickt, zieht etwa 2 cm unterhalb des rechten Vorhofes sich plötzlich stark verjüngend im Bogen nach rechts und mündet in einen kurzen starken Venenstamm, der in der Hauptsache durch Venae hepaticae gebildet wird. Als bald nach Eintritt in die Leber nimmt sie eine starke von unten her kommende Vene auf, welche die Fortsetzung der Pfortader darstellt.

Diese setzt sich aus den Mesenterialvenen und der Lienalis zusammen, verläuft dorsalwärts vom Magen zum linken Leberrand und tritt etwas hinter diesem, zwischen beiden Lappen in die Drüse ein. Ihre Fortsetzung bildet ein starker Venenstamm, der einen dem nach abwärts gerichteten Leberrand parallelen Bogen beschreibt, in dessen Verlauf er mehrere Ästchen abgibt und an angegebener Stelle in die Umbilicalvene einmündet.

Von rechts unten nach links oben verlaufende Venae hepaticae, die sich zu drei größeren Stämmen vereinigen, ziehen quer über und unter ihm hin. Der tiefer gelegene tritt zur Cava inferior direkt, die beiden anderen konfluieren und münden unter der V. umbilicalis hinziehend in eine starke Vene, die von rechts her kommt und den Haupttheil des gemeinsamen Venenstammes ausmacht.

In letzteren mündet von links her eine schwächere Vene aus dem SPIGEL'schen Lappen.

Die Cava inferior, aus den beiden Iliacae entstanden, nimmt die unbedeutende rechte und etwas weiter oben die starke linke Nierenvene auf, um bald nachher der Wirbelsäule entsprechend nach rechts in einem Winkel von etwa 80° umzubiegen und nach Aufnahme jener tiefen Lebervene zum Vorhof zu verlaufen. Am erwähnten großen Venenstamm ist sie nicht sichtbar.

Nur eine Nabelarterie ist vorhanden, die stark geschlängelt mit der V. umbilicalis bis nahe zum Bauchwanddefekt verläuft, dann nach links sich wendet und von der Mitte des POUPART'schen Bandes medianwärts zur Innenseite der linken Iliaca communis zieht.

Die rechte Iliaca, ein schwächeres Gefäß, verläuft in gewöhnlicher Weise vor der gleichnamigen Vene.

Die Aorta giebt, so weit sie der Untersuchung zugänglich ist, nach rechts die distal der Vene gelegene Art. renalis, nach links in gleicher Höhe zwei Mesenterialarterien ab.

Die linke Renalis verläuft dorsalwärts von der starken Nierenvene, hinter deren Einmündungsstelle in die Cava die Aorta verschwindet.

Eine Mesenterica superior findet sich unterhalb der Pfortader, Äste der Hepatica oberhalb derselben. Der eine geht zur Fortsetzung der Vena portae und zum rechten Leberlappen, ein anderer zum linken.

Die großen Gefäße oberhalb des Herzens zeigen außer der starken Ausbildung der linken V. anonyma keine Abnormitäten.

Mikroskopischer Befund der peritonitischen Verwachsungen.

Zum Zwecke der mikroskopischen Untersuchung wurden Stücke theils freier, theils mit einander verwachsener Dünndarmschlingen herausgenommen, weiterhin eine kleine vorspringende Falte der hinteren Abdominalwand.

Letztere war verkalkt und wurde desshalb zunächst in EBNER'sche Flüssigkeit gelegt, im Übrigen aber wie die anderen Stücke in

Alkohol gehärtet und in Celloidin eingebettet. Die Färbung der Schnitte erfolgte theils mit Hämatoxylin, theils nach der VAN GIESON'schen Methode.

Bei der Betrachtung zeigt sich, dass das Serosaeepithel der adhärennten Darmschlingen verloren gegangen ist. Ohne erkennbare Grenze geht das Bauchfell in eine Schicht über, die theils aus Bindegewebe, theils aus einem Netz von Fibrinbalken besteht. Sie ist am mächtigsten zwischen beiden Schlingen und wird nach der freien Oberfläche des Darmes zu dünner. An dieser Stelle besteht sie, wie in den tiefen Lagen zwischen den Darmschlingen aus Bindegewebe, in welches Lanugohaare und zahlreiche Epidermiszellen eingeeilt sind.

Diese erschienen bei Färbung mit Hämatoxylin als tief dunkelblaue Schollen und ließen sich erst mit Hilfe der VAN GIESON'schen Methode deutlich erkennen. Ihre Kerne sind vielfach erhalten, oft aber fehlen sie auch.

Von anderen Elementen, deren Struktur theilweise undeutlich geworden ist, sind Wanderzellen zu erwähnen, von denen jedoch nur eine relativ geringe Anzahl gefunden wird.

Das Fribinnetz liegt auf der Bindegewebsschicht, besteht aus dicken Balken und bildet bald große, bald kleine Maschenräume, die viele Epidermiszellen und einzelne Lanugohaare enthalten.

Die Darmwand zeigt in ihrer peripheren Zone auf größere Strecken hin nur wenig Wanderzellen, an anderer Stelle wieder hat eine Ansammlung von solchen stattgefunden.

Ungefähr denselben Befund bieten die anderen Präparate, nur mit dem Unterschied, dass die tiefen Schichten der Auflagerung in größerem Umfange bald schon organisirt sind, bald sich noch im Stadium der Organisation befinden.

Dabei treffen wir in Schnitten von einem Stück freier Darmwand zwischen deren Oberfläche und der Auflagerung einen bräunlich gefärbten Streifen an, welcher der Grenze der Serosa entspricht, eine Gewebsstruktur aber nicht erkennen lässt.

Auf der Oberfläche der Bauchwandfalte ist das Epithel ebenfalls verloren gegangen. Die Organisation ist hier am weitesten fortgeschritten. Haare und Wanderzellen fehlen. Dagegen finden sich trotz der vorausgegangenen Behandlung noch Kalkablagerungen in einzelnen Epidermiszellen, die sich in Folge dessen tief dunkelblau gefärbt haben. Kleinere Konkremeente liegen um jene herum.

Der Nabelstrang liegt im unteren Umfange desselben und ist gleich unmittelbar am Rande des Defektes abgeschnitten. Er lässt eine weite Vene und zwei Arterien erkennen.

Befund nach der Präparation.

Die Weichtheile sind parallel den Rippenbögen durchtrennt, der Schnitt auf den Oberschenkel jeder Seite fortgeführt und so die Eingeweide, die außerhalb des Sackes in Brust- und Bauchhöhle liegen, sichtbar gemacht.

Den oberen Raum der Brusthöhle füllen die Vorhöfe mit den großen Gefäßen aus.

Vor der V. cava superior liegt die relativ kleine Thymus; zwischen beiden Carotiden der Larynx, nach unten die Trachea, von welcher der linke Bronchus zur Lunge verfolgt werden kann. Links neben ihm liegt der Vagus und weiter lateralwärts der Ösophagus.

Unter diesem ist durch Einreißen einer serösen Membran ein platter Hohlraum eröffnet, der die rechte Pleurahöhle darstellt. Sie ist vollständig abgeschlossen. Die Lunge liegt retroperitoneal vor der Aorta descendens.

Caudalwärts von der Lunge finden sich die linke Niere und Nebenniere. Der Ureter zieht quer über die Art. umbilicalis in das kleine Becken. Seine Lage zu den Gefäßen ist normal.

Auf der rechten Seite verläuft der Vagus zwischen der V. cava superior und der Pleura, die auch hier eingerissen ist und die Lunge auf dieser Seite erkennen lässt. Weiter abwärts liegt in intakter Kapsel die Niere und distal von dieser im Sack, der hier eingerissen ist, das Tubenende und das Ovarium.

Der etwa orangengroße Sack geht in die Brust- und Bauchwand über, welche dabei jedoch deutlich von ihm abgegrenzt erscheint. Er besteht aus zwei Membranen, von denen die äußere dem Amnion entspricht und die Nabelschnurscheide bildet, die innere in das Peritoneum sich fortsetzt. Sie lassen sich leicht trennen und eine gallertig sich anfühlende Zwischenschicht erkennen. Der Sack ist vorn weit geöffnet, die Leber nimmt seine vordere rechte Hälfte ein.

Sie ist von halbkugelige Gestalt und zeigt an ihrem proximalen Rande eine breite Einkerbung, die zur Aufnahme des Herzens dient. Auf der Unterfläche finden sich zwei Furchen, eine distale rechte mit der Gallenblase, und eine proximale linke, in der das Lig. hepatogastricum inseriert, ein Ductus Arantii aber nicht zu finden ist. Rechts

II.

Craniorhachischisis mit ausgedehnter Eventration und starker Lordose der Wirbelsäule. — Fehlen der V. cava inferior. — Abnormer Verlauf der linken Nabelvene, die keine Verbindung mit der Leber besitzt, in den Bahnen der Venae cardinales.

Sektionsprotokoll.

Weiblicher Fötus von ungefähr 6 Monaten. Länge 20 cm, wovon 12 auf die untere Extremität kommen.

Das Gesicht ist nach aufwärts gerichtet, das Schädelgewölbe fehlt. Die Schädelbasis liegt größtentheils frei und ist von einer gefäßreichen außen glatten Membran bedeckt. In ihrem mittleren Theile hängt noch eine lockere weiche Masse in einem schlaffen Sack hervor.

Die Wirbelsäule zeigt eine scharfe lordotische Knickung im oberen Theile, die sich durch einen rechtwinkligen Vorsprung vom unteren absetzt.

Die Bogentheile fehlen bis zum Sacrum vollständig, ebenso die Haut, die durch eine glatte, glänzende, seröse Membran ersetzt wird, in welcher ein etwa 1,2 cm breiter etwas weißlicher Streifen, dem flach ausgebreiteten Rückenmark entsprechend, hervortritt.

Brust und Bauch zeigen eine ausgedehnte Spaltung der Vorderwand. Das Sternum scheint vollständig gespalten zu sein.

In dem etwa 3 cm breiten Zwischenraum liegt das vom Perikard und einer äußeren serösen Schicht bedeckte Herz vor.

Nach links davon findet sich die flach ausgebreitete linke Lunge, nach abwärts die Leber, die stark deformirt ist, ferner Milz, Magen und Darmkanal.

Diese Theile sind mit der sackförmig erweiterten Nabelschnur-scheide umgeben, die nach aufwärts in die den Spalt ausfüllende durchscheinende Membran übergeht.

Die linke Lunge klebt sich an der Innenfläche dieser Membran an der Seite des hier fixirten linken Leberlappens in dem oberen Umfange des Sackes fest.

An einer Stelle der Außenseite des Sackes haften einige deutliche Placentarreste. In dieser Gegend geht von seinem Rande ein feiner Gefäßstrang zum Mesenterium dicht unterhalb des Magens, ein zweiter Faden erstreckt sich von anderer Stelle des Mesenteriums zur Innenfläche des Sackes.

Der Nabelstrang liegt im unteren Umfange desselben und ist gleich unmittelbar am Rande des Defektes abgeschnitten. Er lässt eine weite Vene und zwei Arterien erkennen.

Befund nach der Präparation.

Die Weichtheile sind parallel den Rippenbögen durchtrennt, der Schnitt auf den Oberschenkel jeder Seite fortgeführt und so die Eingeweide, die außerhalb des Sackes in Brust- und Bauchhöhle liegen, sichtbar gemacht.

Den oberen Raum der Brusthöhle füllen die Vorhöfe mit den großen Gefäßen aus.

Vor der V. cava superior liegt die relativ kleine Thymus; zwischen beiden Carotiden der Larynx, nach unten die Trachea, von welcher der linke Bronchus zur Lunge verfolgt werden kann. Links neben ihm liegt der Vagus und weiter lateralwärts der Ösophagus.

Unter diesem ist durch Einreißen einer serösen Membran ein platter Hohlraum eröffnet, der die rechte Pleurahöhle darstellt. Sie ist vollständig abgeschlossen. Die Lunge liegt retroperitoneal vor der Aorta descendens.

Caudalwärts von der Lunge finden sich die linke Niere und Nebenniere. Der Ureter zieht quer über die Art. umbilicalis in das kleine Becken. Seine Lage zu den Gefäßen ist normal.

Auf der rechten Seite verläuft der Vagus zwischen der V. cava superior und der Pleura, die auch hier eingerissen ist und die Lunge auf dieser Seite erkennen lässt. Weiter abwärts liegt in intakter Kapsel die Niere und distal von dieser im Sack, der hier eingerissen ist, das Tubenende und das Ovarium.

Der etwa orangengroße Sack geht in die Brust- und Bauchwand über, welche dabei jedoch deutlich von ihm abgegrenzt erscheint. Er besteht aus zwei Membranen, von denen die äußere dem Amnion entspricht und die Nabelschnurscheide bildet, die innere in das Peritoneum sich fortsetzt. Sie lassen sich leicht trennen und eine gallertig sich anfühlende Zwischenschicht erkennen. Der Sack ist vorn weit geöffnet, die Leber nimmt seine vordere rechte Hälfte ein.

Sie ist von halbkugelige Gestalt und zeigt an ihrem proximalen Rande eine breite Einkerbung, die zur Aufnahme des Herzens dient. Auf der Unterfläche finden sich zwei Furchen, eine distale rechte mit der Gallenblase, und eine proximale linke, in der das Lig. hepatogastricum inseriert, ein Ductus Arantii aber nicht zu finden ist. Rechts

von dieser liegt der kleine SPIGEL'sche Lappen. Zwischen beiden Furchen, die leicht eine einzige S-förmig gekrümmte vortäuschen, liegt die Leberpforte.

Vom Rande des Organs setzt sich, der Wand des Sackes angeheftet, ein ungefähr 3 cm langer, $1\frac{1}{2}$ cm breiter zungenförmiger Lappen nach links und cranialwärts fort. An diesen schließt sich ein Strang an, der ebenfalls an die Wand des Sackes befestigt ist, bis zur Mitte des linken Umfanges des Bauchwanddefektes verläuft und aus quergestreifter Muskulatur besteht. Er stellt offenbar eine rudimentäre Anlage des Zwerchfells dar.

Die Leber haftet auf ihrer Oberfläche noch am Sack fest, in geringerer Ausdehnung mit dem rechten, in größerer mit dem linken Lappen. Der letzteren entspricht auf der Außenfläche des Sackes eine rauhe Stelle, auf der mikroskopisch Placentarzotten nachweisbar sind.

Eine Vena hepatica communis tritt rechts vom SPIGEL'schen Lappen aus dem proximalen Rande der Leber und verläuft direkt zum rechten Vorhof.

Die Lig. hepato-duodenale und hepato-gastricum sind durchschnitten worden. Die distale Partie enthält die Lebergefäße und den Ductus choledochus, die proximale steht mit dem Herzbeutel und der linken Lunge in Verbindung. Die Kapsel der Leber setzt sich rechts von der Einbuchtung des proximalen Randes in das Perikard fort.

Dieses ist noch uneröffnet und hängt an seiner cranialen und seiner rechten Seite mit dem Sack zusammen.

Das Herz sieht mit der Spitze gerade nach vorn. Von unten her tritt eine Hepatica communis in seinen rechten Vorhof ein, eine Cava inferior ist nicht zu finden.

Dicht oberhalb des Herzens spannt sich, der Wand fest angeheftet, von rechts herüber zur linken Seite ein massiver Strang aus und steht dort mit dem Perikard in Verbindung. Er setzt sich nach vorn und abwärts in eine zweite, dem Sack gleichfalls fest angeheftete Gewebspartie fort, die dreieckig auf dem Durchschnitt distal sich verjüngt und schließlich links vom linken Leberrand ausläuft. Sie entspricht der linken Lunge.

Darunter liegt mit ihr und dem Perikard durch das Omentum minus verbunden der Magen, der weiter keine Abnormität aufweist, links daneben die Milz und eine kleine Nebenzugmilz.

Das Netz hängt als kleiner hohler Gewebszipfel vom Magen herab.

Das Duodenum bildet nach dem Nabelstrang zu eine Schlinge mit parallelen Schenkeln, einem längeren ab- und kürzeren aufsteigenden. Ein Rest des Ductus omphalo-entericus findet sich nicht.

Der Dünndarm setzt sich links an und geht an der Milz, wo Coecum und Processus vermiformis freiliegen, in das Colon über, das an die hintere Wand des Sackes fixirt, mit wenigen Windungen in das kleine Becken hinabsteigt.

Vor ihm befindet sich der Uterus mit den cranialwärts gerichteten, der Wand anliegenden Tuben und Ovarien.

Gefäßverlauf.

Der Arterienverlauf ist bis auf das Fehlen der Mesenterica superior normal, die Venenbahnen dagegen sind in sehr eigenthümlicher Weise umgestaltet.

Die Nabelvene tritt vom Nabelstrang aus in die linke Fossa iliaca und nimmt dort die linke Iliaca externa auf. Ein Venenstamm von 7 mm Durchmesser bildet ihre Fortsetzung. Er wendet sich vor der Art. iliaca communis sin. cranialwärts, biegt hinter dem unteren Nierendrittel angelangt nach rechts um, kreuzt die Aorta auf ihrer Rückseite und verläuft weiterhin rechts von ihr vor den Wirbelkörpern nach oben, um nach Art einer V. azygos in die V. cava sup. einzumünden.

In seinem Verlauf nimmt dieses Sammelgefäß nach Kreuzung der Aorta zunächst die Iliaca communis dextra und etwas weiter cranialwärts eine V. renalis communis auf. Die Bahn der letzteren ist besonders auffallend.

Die linke Renalis kommt mit zwei Schenkeln aus dem Nierenbecken, nimmt die von vorn kommende Suprarenalis auf und biegt dann in der Höhe des Ursprunges der Art. mesaraica inferior vor der Aorta medialwärts in die Tiefe um. Dort vereinigt sie sich mit einer von rechts kommenden gleichstarken Vene zu einem kurzen Stamm, der in die Hauptvene einmündet.

Eine Cava inferior findet sich nirgends angelegt.

In die Leber mündet mit der Art. hepatica nur die Pfortader. Ein Ductus Arantii fehlt. Als ausführendes Gefäß finden wir eine kurze aber starke Hepatica communis, die zum rechten Vorhof führt.

Die beiden erwähnten feinen Stränge zwischen Sack und Mesenterium stellen Reste der Dottervenen dar.

III.

Craniorhachischisis mit Eventration, Lordose und Skoliose der Wirbelsäule. — Persistenz der rechten Nabelvene, Schwund der linken. — Verlauf der Cava inferior zum Theil in der Bahn der V. cardinalis sin.

Befund.

Männlicher Fötus von ungefähr 7 Monaten; 27 cm lang.

Craniorhachischisis mit starker Lordose der unteren Brust- und oberen Lendenwirbelsäule, die durch einen rechtwinkligen Vorsprung vom unteren Theile abgesetzt ist. Daneben besteht eine links konvexe Skoliose mit geringer Drehung des Oberkörpers um die Längsachse von links und hinten nach rechts und vorn.

Der Bauchwanddefekt ist etwa fünfmarkstückgroß; der Sack unvollständig und fehlt auf der linken Seite vom Rippenbogen bis zur Leistengegend. Er besteht zum Theil noch aus zwei Blättern, die sich trennen lassen und durch eine gallertig sich anfühlende Zwischenschicht verbunden sind.

Letztere wird auch dort gefunden, wo das innere Blatt fehlt.

Das äußere entspricht dem Amnion, das innere setzt sich in das Peritoneum fort. Die Nabelschnurgefäße, zwei Arterien und eine Vene, verlaufen in einer Scheide, die vom äußeren Blatt gebildet wird, in der unteren Cirkumferenz des Sackes. Die Vene biegt kurz vor der Bauchwand nach rechts und oben um und tritt von rechts her in die Oberfläche der Leber ein. Die Arterien verlaufen normal.

Am Rande des Defektes geht der Sack in die Bauchwand über, die sich deutlich von ihm absetzt.

Es liegen vor das Herz, die linke Lunge, Leber, Magen, Milz und der größte Theil des Darmes.

Das Zwerchfell ist nicht ausgebildet.

Das Herz ist nach abwärts verschoben und mit seiner Spitze nach vorn gerichtet. Das Perikard steht auf der rechten Seite in größerer Ausdehnung mit dem Sack in Verbindung und ist mehrfach eingerissen.

Nach links davon findet sich die linke Lunge als flacher dreieckiger Lappen mit serösem Überzug der Innenseite des Sackes angeheftet. In sie tritt an der proximalen Spitze der linke Ast der Pulmonalarterie ein.

Vor der Lunge verläuft von der Wand des Sackes, in der er noch etwa 5 cm weit nach rechts verfolgt werden kann, ein feiner Strang, die linke Dottervene, vor Magen und Milz herunter zum Mesenterium.

Der Magen ist längs der großen Curvatur aufgeschnitten und bietet nichts Abnormes; die Milz, mit ihm durch ein Lig. gastrolienale verbunden, liegt links daneben. Reste des Omentum majus hängen als Gewebszipfel von der großen Curvatur herab.

Die Ligg. hepato-gastricum und hepato-duodenale sind durchtrennt und nur am Magen noch theilweise vorhanden.

Die Leber ist nach dieser Seite hin vollständig ohne Verbindung und lässt an der etwas macerirten Pforte die Eintrittsstellen der Gefäße mit Sicherheit nicht mehr feststellen. Das Organ ist deformirt, von Kartenherzform, aber etwa normaler Größe.

Seine Basis ist cranialwärts gerichtet und zeigt dort eine breite Furche zur Aufnahme des Herzens. An der Grenze zwischen dem mittleren und rechten Drittel der cranialen Partie tritt an der Oberfläche die Nabelvene ein. Auf der Dorsalseite finden sich zwei Furchen, eine proximale linke, in welcher der eröffnete Ductus Arantii verläuft, und eine distale rechte, in der die Gallenblase liegt. Beide werden durch die Porta hepatis getrennt und erscheinen bei oberflächlicher Betrachtung als eine einzige S-förmig gestaltete Rinne. Durch sie wird die Leber in einen größeren linken und etwa halb so großen rechten Lappen getheilt.

Der Lobus Spigelii liegt rechts vom Ductus Arantii und besitzt normale Größe und Gestalt. Die Lebervenen münden mit dem Ductus in die Cava inferior ein.

Einzelne Gewebsetzen finden sich auf der Oberfläche des Organs vom Eintritt der V. umbilicalis nach links und oben verlaufend und entsprechen Resten des Lig. suspensorium. Am proximalen Rand ist die Drüse durch eine Gewebspartie, der nach links die Cava inferior anliegt, am Perikard und der Wand des Sackes rechts von jenem befestigt. Diese Partie entspricht dem proximalen Reste des Lig. suspensorium und einem Lig. coronarium.

Der Darm ist im Verlauf des Colon descendens durchtrennt und in größerer Ausdehnung von den fixirenden Bändern abgelöst worden.

Die Radix mesenterii ist durchschnitten und das Peritoneum der hinteren Bauchwand eingerissen. Die beiden Nieren mit Ureteren und Gefäßen sind freigelegt.

Den seitlichen Bauchwänden liegen die Hoden mit den Gubernaculis an.

Die rechte Pleurahöhle ist vorn eröffnet. Die Lunge liegt zwischen Herz und großen Gefäßen und erstreckt sich nach links hinüber bis in die Nähe der Thoraxwand, wo sie durch Eröffnung der Pleurahöhle ebenfalls sichtbar gemacht ist.

Die sehr große Thymus füllt den vorderen und linken oberen Theil des Thorax aus.

Gefäßverlauf.

Der Verlauf der großen Gefäße an und über dem Herzen ist bei offenem Ductus Botalli normal. Der linke Ast der Pulmonalis geht nach abwärts zur Lunge. Die Aorta descendens schickt eine Coeliaca nach vorn, giebt die beiden Renales ab und theilt sich in gewöhnlicher Weise in die beiden Iliacae, welche die Umbilicales zum Nabelstrang senden. Die Mesenterica inferior fehlt, die Mesaraica superior ist ohne Entfernung der Cava nicht nachweisbar.

Diese setzt sich links hinter der Aortentheilung aus den beiden Iliacae zusammen, steigt auf dieser Seite zur linken Niere empor und wendet sich nach Aufnahme der in Folge dessen sehr kurzen Vena renalis sin. vor der Aorta nach rechts. Sie nimmt etwas weiter cranialwärts neben anderen Venenstämmchen die rechte Nierenvene auf und mündet mit dem Ductus venosus Arantii zu einem kurzen Stamm vereinigt in den rechten Vorhof.

Die rechte Nabelvene giebt mehrere Äste in die Leber ab und kann durch diese bis zum Ductus Arantii verfolgt werden.

Die Pfortader und die Leberarterie sind im Lig. hepato-duodenale vorhanden, ihre Eintrittsstellen in die Drüse aber nicht mehr mit Sicherheit nachzuweisen.

Ein Vergleich der Föten unter einander lässt folgende Punkte hervorheben:

Die Bauchdecken gehen in den Sack über, sind aber mit deutlichem Rande von diesem abgesetzt.

Die Nabelschnur verläuft in den zwei letzten Fällen unten, bei I rechts seitlich in der Wand des Sackes. Ihre Scheide wird vom Amnion gebildet.

Die Wand besteht bei II in ganzer Ausdehnung, bei I und III aber nur zum Theil noch aus zwei Blättern, die durch eine gallertig sich anfühlende Zwischenschicht verbunden sind. Das äußere Blatt

entspricht dem Amnion, das innere dem Peritoneum, die Schicht zwischen beiden bietet unter dem Mikroskop das Bild eines bald mehr, bald weniger entwickelten Schleimgewebes.

Es ist anzunehmen, dass der Sack bei I und III ursprünglich in allen seinen Partien die gleiche Struktur besessen hat. Dafür spricht, dass sich die Innenfläche der einfachen Membran vielfach gallertig anfühlt. Sein Fehlen am linken Umfange des Bauchwanddefektes bei I ist, wie die abgestorbenen Fetzen an der Insertionsstelle beweisen, auf Nekrose eines Theiles zurückzuführen. Damit und durch die Ablösung des benachbarten, distal gelegenen Theiles von der Insertion wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die mobil gewordene Wand in der Gegend der linken Niere nach innen umschlagen konnte und Verwachsungen der Membranen eintraten, wie wir sie jetzt vorfinden.

Der Bau des Sackes wird nicht von allen in gleicher Weise angegeben. So lässt nach KRÄMER¹⁾, SÖMMERING²⁾ die Zwischenhaut zwischen Peritoneum und Amnion »eine schnigte Ausbreitung der Bauchmuskeln« sein, und dieser wieder weist auf BUCHHOLZ³⁾ Angabe: »erat in hoc exemplo triplex herniae saccus, e funiculo textu-tendinoso et peritoneao compositus« hin. KRÄMER selbst glaubt, dass das Peritoneum von einer Fortsetzung der Fascia transversalis bedeckt sei. Eine Unterlage für diese Meinung lässt sich aber aus seiner Beschreibung nicht herauslesen.

Späterhin sind Angaben, welche diese Befunde bestätigten, nicht mehr gemacht worden. Die einen, wie FÖRSTER⁴⁾ und THÖRNER⁵⁾, führen überhaupt nur Amnion und Peritoneum an, andere, wie CRUVEILHIER⁶⁾, SCARPA⁷⁾, AHLFELD⁸⁾, BERWALD⁹⁾ und TRIBUKAIT¹⁰⁾ konstatiren eine seröse oder Gallertschicht zwischen beiden Blättern.

Man wird wohl kaum fehlgehen, wenn man annimmt, dass die ersteren auf eine genaue Angabe gerade dieser Verhältnisse keinen

¹⁾ KRÄMER, a. a. O.

²⁾ SÖMMERING, Preisschrift über die Ursache, Erkenntnis und Behandlung der Nabelbrüche. Frankfurt a. M. 1811. cit. nach KRÄMER.

³⁾ BUCHHOLZ, De Hepato-omphalocele congenita. Argentorati 1758. cit. nach KRÄMER.

⁴⁾ FÖRSTER, a. a. O.

⁵⁾ THÖRNER, 13 Fälle von Nabelschnurbruch. In.-Dissert. Marburg 1873.

⁶⁾ CRUVEILHIER, ⁷⁾ SCARPA, ⁸⁾ AHLFELD, a. a. O.

⁹⁾ BERWALD, Ein Fall von Nabelschnurbruch. In.-Dissert. Marburg 1879.

¹⁰⁾ TRIBUKAIT, Zwei Fälle von Hernia funiculi umbilicalis. In.-Dissert. Königsberg 1893.

Werth legen; der vorliegende Befund lässt wenigstens glauben, dass die Ansicht derer, welche eine dreifache Schicht — Amnion, Gallertschicht und Peritoneum (AHLFELD) — annehmen, die richtigere ist.

Der Sack enthält das Herz, die linke Lunge, Leber, Magen, Milz und Darm.

Es hat bei sämtlichen Föten neben einer Verschiebung der Eingeweide zugleich eine gewisse Drehung von links nach vorn und rechts stattgefunden. Die rechte Lunge hat sich deshalb nach hinten und links im Thoraxraum entwickelt und erreicht bei II und III fast die linke Brustwand. In Folge dessen liegt die linke Lunge außerhalb der Brusthöhle. Sie ist mehr oder minder verunstaltet, in die Pleura eingeschlossen und bietet in allen Fällen eine gewisse Ähnlichkeit in ihrer Lokalisation links neben dem Herzen. Bei II und III haftet sie dabei an der Innenseite des Sackes fest.

Das Herz ist vom Herzbeutel umgeben und in den zwei letzten Fällen nach abwärts verschoben. Es ist mit der Spitze gerade nach vorn gerichtet und weist bei II in so fern eine Abnormität auf, als die einmündenden Gefäße eine Abweichung von der Regel zeigen.

Das Zwerchfell ist nicht ausgebildet. Interessant ist die rudimentäre Anlage einer Muskelschicht, die bei II im linken oberen Quadranten des Sackes in Form eines soliden Stranges zur Leber verläuft.

Diese ist in allen Fällen stark deformirt und liegt am weitesten vor. Sie ist entweder noch am Sacke adhärent, oder trägt Residuen dieses Zustandes in Gestalt von Gewebszipfeln. Stets existirt eine Verbindung mit dem Perikard.

Die Lagerung der Dünndarmschlingen bei II in der rechten, die des Coecum und des Colon in der linken Seite des Abdomens erinnert an Verhältnisse, wie sie NEUGEBAUER bei seinem Fall gefunden hat.

Der bei demselben Fötus beobachtete hohe Sitz der Nieren ist wohl als Folge der Eventration bei gleichzeitiger Wirbelsäulenverkürzung anzusehen, und auf die gleiche Ursache die ventrale Lage der Nebennieren zurückzuführen.

Die inneren Genitalien sind in allen Fällen ausgebildet und finden sich (Hoden bei III, Ovarien und Tuben bei I und II) cranialwärts vom kleinen Becken der Bauchwand angelagert. Auffallend ist bei I die stark ausgezogene linke Tube und das medial davon gelegene ebenfalls langgestreckte Ovarium, sowie die cranialwärts vom Tubenende gelegene Fimbria ovarica.

Ein besonderes Interesse beanspruchen:

- bei demselben Fötus die ausgedehnten peritonitischen Verwachsungen der Abdominalorgane,
- die bei allen vorhandene erhebliche Verunstaltung der Wirbelsäule, und
- die abnormen Gefäßverläufe.

Unter diesen wieder kommen in Betracht:

- die Persistenz der rechten Nabelvene und der abnorme Verlauf der Pfortaderfortsetzung bei I,
- die ungewöhnliche Bahn der linken V. umbilicalis, die in keiner Verbindung mit der Leber steht, und das Fehlen der unteren Hohlvene bei II,
- die Persistenz der rechten Nabelvene und der abnorme Verlauf der Cava inferior bei III.

Die Ausbildung der venösen Bahnen steht zum guten Theil mit der Entwicklung der Leber in engem Zusammenhang, und es lohnt sich, zur Erklärung der Gefäßanomalien auf jene näher einzugehen.

Die Leberanlage ist ursprünglich ein einfaches Divertikel des Entodermrohres unmittelbar hinter dem Herzen. Sie ist doppelt, doch treten die beiden Schläuche nach einander, wenn auch fast gleichzeitig auf. Sie bilden durch immer neue Ausstülpungen in enger Verbindung mit den Dottervenen die Leber.

Die Gallenblase geht aus dem caudalen Divertikel hervor und ist beim Menschen bereits im zweiten Monat vorhanden.

Die Entwicklung geht in der caudalen Seite des Septum transversum vor sich, das dort eine Verdickung zeigt, die von KÖLLIKER¹⁾ als Leberwulst, HIS²⁾ als Vorleber und HERTWIG³⁾ als vorderes Darmgekröse bezeichnet wird, und greift auf die Bauchwand über. Die Abschnürung von dieser und dem Zwerchfell erfolgt später durch Zwischentreten des Peritoneums.

Die Venae omphalo-mesentericae verlaufen nach HOCHSTETTER⁴⁾ bei Kaninchenembryonen von 10 Tagen zu beiden Seiten des Darmrohres, fassen die Verbindung von Leber und Darm zwischen sich und münden kopfwärts von der Leberanlage mit der Nabelvene ihrer

¹⁾ KÖLLIKER, Entwicklungsgeschichte des Menschen u. der höheren Thiere.

²⁾ HIS, Anatomie menschlicher Embryonen.

³⁾ HERTWIG, Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbelthiere.

⁴⁾ HOCHSTETTER, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Venensystems der Amnioten. III. Säuger. Morpholog. Jahrb. Bd. 20. Leipzig 1893.

Seite, die in der Leibeswand eingebettet verläuft, zu einem kurzen Stamm vereinigt in den entsprechenden Ductus Cuvieri.

Die Bildung der Leberschläuche beginnt am 11. Tage. Diese wachsen in das erwähnte embryonale Bindegewebe (Vorleber etc.) ein und lagern sich zum größeren Theil an die ventrale Seite der Dottervenen, um diese aber auch sehr bald dorsalwärts zu umwachsen. Zugleich bilden sich Gefäßbahnen zwischen den Leberschläuchen, die mit den Venen zusammenhängen.

Caudalwärts von der Pankreasanlage und dorsal vom Darm kommt es zu einer Anastomosenbildung zwischen beiden Venen, die sich rasch erweitert.

Weiterhin stellt sich eine Bahn von der gemeinsamen Mündung der rechten Dotter- und Nabelvene nach links und caudalwärts her, die den Lebergang an seiner cranialen Seite kreuzt und in die linke V. omphalo-mesenterica einmündet. Sie liegt in der hinteren Leberwand an der Haftlinie des ventralen Magengekröses und stellt den Ductus Arantii vor. Auch dieser steht mit den Lebervenen im Zusammenhang.

Jetzt wird die linke Nabelvene enger, die rechte erweitert sich.

Am 12. Tage verschmelzen die beiden Venae omphalo-mesentericae vor dem Darm und bilden so einen Ring um diesen. Sein rechter Schenkel beginnt aber, wie der Abschnitt der linken Dottervene, der zwischen Ring und Leber liegt, sehr bald schwächer zu werden und schwindet schließlich.

Die Leber ist inzwischen größer geworden und bedarf zu ihrer Ernährung neuer Blutbahnen. Die Umbilicalvenen treten in Verbindung mit ihrer ventralen Partie und es gewinnt die linke besondere Mächtigkeit. Sie hat sich nämlich dort entwickelt, wo die linke Dottervene sich in den Ductus Arantii fortsetzt. Dieser wird erweitert und zur Fortsetzung der linken Umbilicalvene, die wie die rechte die Verbindung mit ihrem proximalen Ende verliert, das von Leberschläuchen umwachsen zur Vena hepatica revehens wird.

Der neugebildete Leberabschnitt der V. umbilicalis sin. tritt innerhalb der Leber kopfwärts vom Lebergang mit der rechten Dottervene in Verbindung, die sich nun rasch erweitert.

Der distale Theil der rechten Nabelvene verliert bald seine Verbindung mit der Dottervene, jedenfalls in Folge der durch die Einmündung in den Ductus venosus günstiger gewordenen Cirkulationsverhältnisse in der linken Vena umbilicalis. Unmittelbar vor dem Nabel kommt eine Kommunikation zwischen beiden Umbilicalvenen

zu Stande mit dem Endresultat, dass die rechte eine zur linken führende Bauchwandvene wird.

Der Sinus venosus, ursprünglich an der Leber gelegen, schnürt sich jetzt von dieser und dem Zwerchfell ab. Die kleinen selbständigen Venenmündungen in ihm verschwinden. Die Abschnürung schreitet links rascher als rechts fort und führt unter Verschiebung des gemeinsamen Stammes der linken Dotter- und Nabelvene nach rechts zur Bildung einer *Hepatica communis*, die den Ductus venosus, sowie die gemeinsamen Stämme der linken und rechten Dotter- und Nabelvenen aufnimmt und später die Fortsetzung der Cava inferior darstellt.

Bei Menschenembryonen kommt es zur Entwicklung eines weiteren Venenringes proximal von jenem, indem die beiden Dottervenen sich nach der Vereinigung alsbald theilen, nach oben und vorn verlaufen und über dem Lebergang zu einem gemeinsamen Stamm zusammenfließen, der nach Lage und Verlauf dem Ductus Arantii entspricht. Dabei geht von der rechten Dottervene nahe der oberen Vereinigungsstelle mit der linken eine stärkere Vene ab, die in den rechten Leberabschnitt eindringt und sich dort auflöst. Vom unteren Ring geht der rechte, vom oberen der linke Schenkel verloren, der spiralförmige Verlauf der Dottervene um den Darm bleibt derselbe.

Mit dieser Schilderung stimmt die von His nicht ganz überein. Er lässt zunächst eine Anastomose zwischen dem cranialen Venenring und der Umbilicalvene auftreten und dann erst käme es zur Ausbildung des Ductus venosus Arantii. Nach den von HOCHSTETTER erhobenen Einwänden gegen diese Entwicklung scheint jedoch die Ansicht des letztgenannten den Vorzug zu verdienen.

Die Cava inferior bildet sich als Spross der *V. hepatica communis* oder noch genauer der rechten *Omphalo-mesaraica*. Sie entwickelt sich in dem Hohlvenengekröse distalwärts, kommt zwischen Aorta und rechte Urniere zu liegen und schickt ungefähr in deren Mitte zwei Äste zu den beiden Cardinalvenen, den einen direkt rückwärts zur rechten, den anderen vor der Aorta herum zur linken.

Proximal von dieser Stelle kommt es zur Theilung der Cardinalvenen in einen unteren und einen oberen Abschnitt, aus welchem letzterem Azygos und Hemiazygos hervorgehen. Die distalen bilden eine Anastomose nahe der Aortentheilung, worauf die rechte die Zuleitung des Blutes zur Cava übernimmt und als deren Fortsetzung erscheint, während die linke allmählich schwindet. Auch dabei scheinen die leichteren Strömungsverhältnisse rechts ausschlaggebend zu sein.

Interessant ist der causale Zusammenhang der Entwicklung der einzelnen Venenbahnen. Immer sind es mechanische Ursachen, die zur Ausbildung der späteren Zustände führen. Die linke Umbilicalvene persistirt, weil sie die besseren Strömungsverhältnisse durch den Ductus Arantii gewinnt; die rechte Cardinalvene wird zur Bildung der Cava inferior benutzt, weil sie deren Fortsetzung bildet und damit zugleich der unzweckmäßige Verlauf vor der Aorta und quer über diese hinweg vermieden wird.

Ähnliche Gründe lassen sich für die Erhaltung der betreffenden Schenkel der Venenringe ins Feld führen und dergleichen mehr.

Gewichtige Ursachen müssen es daher sein, welche eine Änderung in der Anlage hervorrufen, und zwar abnorme Verhältnisse, die entweder zur Zeit der Entwicklung eintreten oder bereits vorhanden sind, die die gewohnten Strömungsgebiete beeinträchtigen und andere günstigere schaffen.

Die meisten Schwierigkeiten bietet die Deutung der Gefäßanomalien bei II. Einen ähnlichen von LITTRE¹⁾ beschriebenen Fall citirt MECKEL²⁾.

Bei ihm trat »die Nabelvene in der linken Weichengegend in den Unterleib. Sie stieg längs der linken Seite desselben empor, ging neben dem letzten Rückenwirbel durch das Zwerchfell in die Bruthöhle und öffnete sich in die obere Hohlvene, nachdem sie die beiden Hüftvenen, die Lendenvenen und Nierenvenen aufgenommen hatte, ohne in die Leber zu treten oder sich mit der Pfortader zu verbinden«.

Es stellt dieser Fötus gewissermaßen eine Zwischenstufe zwischen II und dem von KOLLMANN³⁾ beschriebenen Fall von Mangel der Cava inferior dar, in so fern als die von diesem für das Fehlen der unteren Hohlvene aufgestellten Characteristica:

- a) Verlauf des vikariirenden Sammelgefäßes durch die hintere Hälfte des Zwerchfelles, Verlauf durch die Bruthöhle und Einmündung in das Gebiet der Vena cava superior,
- b) gesonderte Einmündung der Lebervenen in den rechten Vorhof, auch darin zutreffen, dass die Umbilicalvene ihren Weg durch das hier vorhandene Zwerchfell nimmt, der Fötus aber außerdem einen ausgedehnten »Nabelschnurbruch« aufweist.

¹⁾ LITTRE, Mem. de l'acad. des sciences. 1709. pag. 10. cit. nach MECKEL.

²⁾ MECKEL, a. a. O.

³⁾ KOLLMANN, Abnormitäten im Bereich der Vena cava inferior. Anatom. Anzeiger. VIII. Jahrg. (1893.) Nr. 2 u. 3.

In allen drei Fällen fehlt die Cava inferior. Vikariierend sind bei II analog dem Baseler Präparat KOLLMANN's die Cardinalvenen eingetreten, cranialwärts die rechte, caudalwärts die linke. Der Verbindungsbogen liegt tiefer als dort. Das braucht indessen nicht aufzufallen, da »eine starke Variation in der Persistenz der Abschnitte vorkommt«.

Wollen wir nun, und es liegt nach dem Ausgeführten nahe, das zu thun, die Ursache für das Fehlen der unteren Hohlvene in günstigeren mechanischen Verhältnissen suchen, so müssen wir annehmen, dass die Ableitung des Blutes aus der hinteren Leibesregion durch die abnorme Bahn der linken Nabelvene so vorthellhaft ist, dass das Bedürfnis nach einem besseren Weg nicht vorliegt und dessen Anlage entweder unvollständig bleibt oder ganz in Wegfall kommt.

Wie aber kam diese Bahn zu Stande? Sie wird verständlich, wenn wir eine Anastomosenbildung zwischen der linken Umbilical- und der linken Cardinalvene in Betracht ziehen. Diese beiden Gefäße liegen am proximalen Ende des Bauchstieles nahe zusammen. Eine weitere Annäherung wäre denkbar, wenn der Embryo mit der Ventralfläche zum Chorion hingezogen würde oder aber eine gewisse Drehung um die Längsachse erführe. Die Ursache dazu würde in einer abnormen Verbindung des Amnions mit dem Chorion zu suchen sein.

Die Folge der erlangten Kommunikation wäre schließlich Benutzung der Cardinalbahn und sekundärer Schwund der Umbilicalvene.

Denkbar scheint das aber nur so lange, als die Leberbahnen nicht entwickelt sind und der günstige Weg durch den Ductus Arantii noch nicht existirt. Es müsste also der abnorme Verlauf der Umbilicalvene vor Ausbildung der Lebergefäße, die supponirte Ursache, die Verwachsung des Amnions mit dem Chorion, bereits bei Anlage der Leber bestanden haben.

Warum aber die linke Umbilicalvene und damit die linke Cardinalvene persistirt, lässt sich nicht sagen, der Regel dagegen entspricht es, dass die rechte bei Erhaltung der linken schwindet.

Die Einmündung der rechten Iliaca communis in die rechte Cardinalvene ist ohne Weiteres verständlich.

Die Nierenvenen bilden sich aus, wenn die Organe mit ihrer Wanderung zu Ende sind. Sie stellen eine Verbindung mit dem abführenden Sammelgefäß her, und das ist in diesem Fall die rechte Cardinalvene. Daraus erklärt sich der bogenförmige Verlauf

der linken Renalis vor der Aorta und das Zustandekommen eines gemeinsamen Endstammes, indem zwei ursprünglich getrennte Venen bei ihrem dorsalwärts gerichteten Verlauf rechts von der Aorta nahe an einander zu liegen kommen und schließlich verschmelzen.

Dass cranialwärts die rechte Cardinalbahn persistirt, scheint beim Fehlen der Cava Regel zu sein und ist wohl durch die Ausbildung des Herzens und die Verlagerung der ursprünglich links gelegenen großen venösen Bahnen nach rechts bedingt.

Leichter erscheint die Deutung der Gefäßanomalien bei I und III. Wir finden beide Male die rechte Nabelvene erhalten. Es liegt nahe, zur Erklärung eine dahingehende Änderung der Leberbahnen anzunehmen, dass der Ductus Arantii mehr nach rechts zu angelegt wird oder analog dem sonstigen Verhalten, von rechts unten nach links oben verläuft. Als Folge träte allmählicher Schwund der linken, ein noch stärkeres Überwiegen und schließliche Persistenz der rechten Nabelvene ein.

Auf welches ätiologische Moment aber ist diese Änderung zurückzuführen? Wenn wir unsere Föten betrachten, so finden wir bei beiden eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule. Da die Nabelschnurgefäße in der unteren Hälfte bei III, bei I rechts seitlich im Sack verlaufen, so wäre es nicht unwahrscheinlich, dass der nunmehr verkürzte Weg, den die rechte V. umbilicalis zur Leber zurückzulegen hat, die Ursache für ihre Persistenz abgäbe, und das um so mehr, als sie in jener Zeit zunächst mehr Blut führt als die linke. Beide Faktoren zusammen könnten vielleicht die bestehenden Verhältnisse so zu Gunsten der rechten Nabelvene umgestalten, dass sie die bessere Abflussbahn der linken aufwögen und es zur nachträglichen Umbildung im Verlaufe des Ductus käme.

Wenn wir aber die von ASCHOFF angeführten Fälle betrachten, so finden wir die rechte V. umbilicalis nicht selten (Fall 1, 2, 12, 13, 16) auch dort erhalten, wo eine Skoliose nicht vorhanden ist und damit die Verkürzung des Weges fortfällt. Eine allgemeingültige Erklärung lässt sich danach aus dem vorliegenden Material nicht geben, und man muss sich darauf beschränken, für den einzelnen Fall die an ihm gefundenen Verhältnisse zu verwerthen.

Der Ductus tritt als Fortsetzung des cranialen Venenringes auf, wenn beide Vv. omphalo-mesaraicae sich in der Leber in ein Kapillarnetz aufgelöst haben. Es ist denkbar, dass durch ein primäres Überwiegen des rechten Schenkels des oberen Ringes oder noch besser der in den rechten Leberlappen abgehenden V. advehens eine Ände-

rung in der Anlage der Blutbahnen der Leber zu Gunsten der rechten Seite herbeigeführt wird. Jenes aber wäre durch eine vermehrte oder erleichterte Blutströmung im Gebiete der Dotter- und Mesenterialvenen von links nach rechts statt von unten nach oben möglich und dieses wieder würde eine zur Zeit bestehende Verlagerung der Organe, wie sie die Skoliose bedingt, verursachen können.

Der Gedanke an eine solche Entwicklung wird nahegelegt, wenn wir die Lage und weit bessere Ausbildung der Gefäße und Organe der linken Hälfte des Fötus I sehen und den abnormen Verlauf der Pfortaderfortsetzung in der Leber betrachten.

Die erste kann ein Produkt späterer Zeit sein, allein die Betrachtung ist auf Grund eines Befundes bei III nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen. Hier ist die linke Cardinalvene an die Stelle der Cava inferior getreten. Ihre Anlage schließt sich direkt an die Entwicklung der Lebervenen an und es spricht die Benutzung jener Gefäßbahn dafür, dass damals schon und doch jedenfalls in Folge der Skoliose die Raumverhältnisse der linken Seite günstiger gewesen sind als rechts. Man wird deshalb bei I die gleiche Möglichkeit zugeben müssen, d. h. die Skoliose kann zur Zeit der Entwicklung der Lebervenen bestanden haben.

Weiterhin dürfte der abnorme Verlauf der Pfortaderfortsetzung, die bei I im rechten Leberlappen jenen großen dem Rande parallelen Bogen beschreibt, um von unten her in die Umbilicalvene einzumünden, kaum anders zu erklären sein, als dass die Blutströmung durch die Skoliose und sekundäre Verlagerung der Organe oder ihrer Anlagen derart geändert wurde, dass sie in erster Linie ihren Weg durch die rechte Vena advehens in die Leber nahm. Danach erscheint es erklärlich, dass der Ductus rechts angelegt wurde und es so zur Persistenz der rechten Nabelvene kam.

Man darf daher annehmen, dass die Knickung der Wirbelsäule auch bei I zur Zeit der ersten Anlage der Leber, richtiger wohl vorher bestanden hat.

An Wahrscheinlichkeit gewinnt diese Ansicht durch einen weiteren Befund: die ausgezogene linke Tube und das langgestreckte Ovarium.

Hier kann nicht gut von einer Dehnung nach erfolgter Ausbildung die Rede sein, es muss ein Fehler in der ersten Anlage vorliegen. Und zwar war dazu nöthig, dass bereits das Peritonealepithel an der medialen Seite der Urniere, aus welchem das Ovarium hervorgeht, sowie das ihrer ventralen Fläche, welches den MÜLLER-

sehen Gang bildet, mitsammt der Urniere selbst eine abnorm gestreckte Form besaßen.

Was aber liegt näher als anzunehmen, dass die seitliche Knickung des Embryo bereits bei Anlegung der Urniere bestanden hat, ist doch durch diese eine langgestreckte Gestaltung der Organe der linken Seite ohne Weiteres verständlich.

Konnten wir also aus der abnormen Bahn der Cava inferior bei III schließen, dass die Wirbelsäulenknickung zur Zeit der Leberentwicklung vorhanden sein musste, so lehren uns die Befunde bei I, dass die Skoliose einer noch früheren Periode angehört und ihr Zustandekommen in die erste Zeit des Embryonallebens fällt.

In Folge einer Einknickung der Wirbelsäule nach vorn oder nach der Seite zugleich kommt es zu einer Raumbeschränkung im Abdomen oder Thorax oder beiden. Die weitere Folge ist eine Verschiebung der Organe oder ihrer Anlagen ventral oder seitlich zur noch bestehenden Leibesöffnung hinaus. Dadurch wird der Schluss des Abdomens erschwert, weil eine größere Bauchwandfläche gebildet werden muss. Die Bauchhöhle bleibt länger offen als gewöhnlich, der Schluss bleibt möglicher Weise ganz aus. Hierbei kommt der Grad der Krümmung in Betracht, wie es denn auch von ihm und dem Sitz der Knickung abhängt, welche Organe und wie weit diese vorgedrängt werden.

Dem Herzen folgt bei der Verlagerung in so früher Zeit die intermediäre Portion des Septum transversum und damit die Leberanlage. Die Drüse wächst normaler Weise an der Bauchwand oder an dem diese ersetzenden Sack entlang und zwar wird sie sich nach dieser Seite hin um so mehr ausdehnen, je weniger sie dabei auf Widerstände stößt, wie sie ihr der eingeknickte Rücken entgegensetzt. Ziehen wir in Betracht, dass das normale Verhalten der Vv. hepaticae und des Ductus Arantii zu Cava und Herz, sowie der Verlauf der Umbilicalvene bei I und III keine Berechtigung geben, auf eine sekundäre abnorme Verlagerung zu schließen, so gelangen wir zu der Auffassung von NEUGEBAUER und ASCHOFF, nämlich, dass die Leber an der Stelle, an welcher sie gefunden wird, angelegt und gebildet wurde.

Aus der Entwicklungsgeschichte wissen wir, dass das Organ sich von der Bauchwand durch Umschlagen des Peritonealüberzuges auf seine Oberfläche abschnürt. Wenn sie nun wie bei II in größerer Ausdehnung noch am Sacke adhärirt, so ist das Nächstliegende und wohl auch Richtige, diese Erscheinung auf eine mangelhafte Abschnürung zurückzuführen.

Das ist indessen in den meisten Fällen nicht geschehen, es wurde im Gegentheil die Fixation der Leber mit den zuweilen beobachteten Verwachsungen der Abdominalorgane unter einander und mit dem Bauchfell identificirt. So glaubte THÖRNER, dass diese Verbindung in den von ihm beschriebenen Nabelschnurbrüchen »durch Entzündungsreiz, den die vorliegenden Eingeweide auf die Wandung des Bruches ausüben, hervorgerufen sei. Daher käme auch die Beobachtung, dass Adhäsionen der Leber so viel häufiger wären, wie die des Darmes, denn dass die pralle große Leber einen stärkeren Entzündungsreiz ausübe, wie der weiche Darm, sei wohl leicht verständlich«.

Schade nur, dass seine Beschreibungen so wenig eingehend sind, vielleicht würden sich die Verwachsungen der Eingeweide doch auf andere Ursachen zurückführen lassen.

In einem anderen Falle fand WITTIG¹⁾ peritonitische Verwachsungen zwischen den einzelnen Organen, dabei Darm am Peritoneum und die Leber am Bruchsack adhärent. Das Mesenterium »fiel weniger durch seine Länge als durch seine entzündliche Injektion und starke Schwellung der Drüsen auf«. Ein Flüssigkeitserguss war im Abdomen nicht vorhanden. Das beschriebene Kind wurde in der Frauenklinik zu Königsberg von einer gesunden Mutter geboren und starb am 11. Tage. Ein Einreißen des Bruchsackes erfolgte nicht. »Am 7. Tage zeigten sich einzelne Pemphigusbläschen am Scrotum und Gesicht, eine am linken Fuß. Dieselben verschwanden indessen außer letzterer in der nächsten Zeit.«

Da drängt sich doch unwillkürlich die Frage auf, ob man es nicht mit einer kongenitalen Syphilis zu thun hatte, die recht wohl peritonitische Erscheinungen hervorrufen kann.

Ein ander Mal führt HERTZFELD²⁾ Verwachsungen der Abdominalorgane auf Reizung durch Lageveränderung der Eingeweide zurück und schließt aus ihrer Festigkeit, dass sie bereits lange bestanden haben. Nach seiner Beschreibung »beobachtete man an der Bauchfläche ein Konvolut von Intestinis in der Größe einer Mannesfaust frei zu Tage liegen«.

Es ist möglich, dass bei der ausgeführten Operation — Wendung bei Placenta praevia — der Sack zerrissen ist, aber da »bei der Aufnahme die Herztöne nicht mehr hörbar waren und auch die Kreißende seit etwa zwei Wochen die während der ganzen Gravi-

¹⁾ WITTIG, Über einen Fall von Hepatomphalos. In.-Dissert. Königsberg 1888.

²⁾ HERTZFELD, Ein Fall von Nabelschnurbruch. In.-Dissert. Königsberg 1892.

dität undeutlich auftretenden Kindsbewegungen nicht mehr gefühlt hat«, so ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der Sack bereits früher defekt geworden ist. Vielleicht hat sogar der Tod mit diesem Vorgang in causalem Zusammenhang gestanden. Eine mikroskopische Untersuchung der Verwachsungen, die Licht hätte bringen können, hat allem Anscheine nach nicht stattgefunden.

Derartige Fälle ließen sich leicht mehr aufzählen, die angeführten genügen indessen zu erkennen, wie weit die Theorie von der sekundären Verwachsung, hervorgerufen durch den Entzündungsreiz der vorliegenden Eingeweide, begründet ist.

In unseren Fällen finden wir nur bei I solche Adhäsionen und zwar sind die Darmschlingen unter einander und die Milz mit dem Magen in fester Verbindung. Daneben finden sich, wie erwähnt, Auflagerungen auf den Organen und der Abdominalwand, weiterhin Einschlüsse in dem medial gelegenen Blatt des Sackes.

Wie wir durch die mikroskopische Untersuchung der Verwachsungen wissen, handelt es sich um die Folgen einer Fremdkörperperitonitis.

Ihre Entstehung ist leicht verständlich. Ein Theil des Sackes war schon während der Schwangerschaft oder gegen das Ende hin nekrotisch geworden und hat das Fruchtwasser mit Lanugohaaren, Vernix und Meconium in die Bauchhöhle treten lassen. Diese haben zur Bildung fibrinöser und bindegewebiger Auflagerungen geführt und Adhäsionen einzelner Organe unter einander hervorgebracht, von denen die Fixirung der Milz an den Magen, sowie der dicke bindegewebige Überzug, der sich auf der Oberfläche beider findet, besonders hervorzuheben sind.

Gewiss muss zugegeben werden, dass Verwachsungen in der embryonalen Periode leicht vor sich gehen, wenn aber schon das Vorliegen genügen soll, Verbindungen zwischen Sack und Abdominalorganen und zwischen diesen unter einander herbeizuführen, so ist schwer verständlich, dass Verwachsungen der Darmschlingen und der Organe, so weit sie in steter Berührung sind, einen nur ausnahmsweisen Befund darstellen und für gewöhnlich fehlen.

Mit ASCHOFF glaube ich, dass die Fixirung der Leber auf eine mangelhafte Abschnürung zurückzuführen ist; die Verwachsungen der anderen Organe finden hier ihre Erklärung im freien Zutritt von Fremdkörpern in das Abdomen, d. h. in dem von Fruchtwasser nach Einreißen des Sackes. In anderen Fällen mag eine kongenitale Syphilis die Ursache sein, dass aber das einfache Aneinanderliegen der Eingeweide zu Verwachsungen führt, halte ich für ausgeschlossen.

Einer exakten Untersuchung muss es überlassen bleiben, im einzelnen Falle die Causa nocens festzustellen.

Nachdem wir gesehen haben, dass die Knickungen der Wirbelsäule einer frühen Embryonalperiode angehören, und dass in ihnen der Grund für die abnorme Lage der Organe liegt, ist das Nächste, nach den Ursachen der Deviationen zu suchen und zu prüfen, ob und wie weit diese Bauchspalten hervorbringen können.

Die Ansicht FÖRSTER's, »dass der Wirbelsäule theils der zu ihrer geraden Stellung nöthige Druck der Eingeweide fehle, theils die Masse der vorgefallenen Eingeweide einen Zug auf die Mitte der Wirbelsäule ausübe und sie nach vorn knicke«, kann ebenso wenig richtig sein, als die von AHLFELD aufgestellte Theorie. Die Knickung existirt bereits vor der Ausbildung der Eingeweide und vor Anfang der dritten Woche.

ASCHOFF zog die lordotische Krümmung der Wirbelsäule bei Embryonen mit zwei Kiemenspalten in Betracht und sah in ihrer Persistenz eine Ursache für diese Missgeburten. Hrs bildet eine Reihe solcher Embryonen ab und giebt dazu ungefähr folgende Erklärung. Die Krümmungsverhältnisse entsprechen der jüngsten Stufe in so fern, als diese einen eingezogenen Rücken und ein den Bauchstiel frei überragendes Beckenende zeigt. Die Ursache liegt darin, dass das Amnion im Ansatzgebiet am Leibesnabel im Wachsthum hinter dem des Embryo zurückbleibt. In Folge dessen wird dieser entweder ventral oder dorsal gebogen. Der Ausgleich der ventralen Einbuchtung geschieht durch Zurückschnellen in die konvexe Rückenkrümmung, im Ausbleiben liegt der Grund für gewisse Missbildungen.

Man wird die Möglichkeit zugeben müssen, dass durch die ventrale Einbuchtung der Bauchwandschluss verzögert, eventuell sogar verhindert wird, mit Sicherheit aber ist das Unterbleiben desselben nicht darauf zurückzuführen, denn es finden sich Craniorhachischen mit Lordose und Verkürzung der Wirbelsäule genug ohne Eventration oder Nabelschnurbrüche.

Weiterhin ist von MARCHAND mit Recht hervorgehoben worden, dass eine vorübergehende Krümmung bei Thierembryonen nicht vorkommt, und doch trifft man bei ihnen Eventrationen an mit lordotischer Knickung der Wirbelsäule, die so hochgradig sein kann, »dass der vordere und hintere Theil des Rumpfes bis zur Berührung einander genähert sind«. Das spricht wenig für einen solchen Entwicklungsgang, der überdies für eine seitliche Verkrümmung keine Erklärung hat.

Bei II mussten wir zur Deutung der Gefäßanomalien eine abnorme Verbindung des Amnions mit dem Chorion, eine Verwachsung oder mangelhafte Abschnürung beider von einander, in Betracht ziehen. Wenn wir nun überlegen, wie sich die Entwicklung eines Embryo unter solchen Verhältnissen gestalten muss, so gelangen wir zu der Annahme, dass in jener die Ursache für die Entstehung der Wirbelsäulenknickung und damit der ganzen Missgeburt liegt.

Zunächst bedingt sie wohl nur ein mangelhaftes Wachsthum des beim Menschen schon frühzeitig geschlossenen Amnions, in der Folgezeit aber verhindert sie nicht nur das Zustandekommen der normalen Rückenkrümmung, sondern erschwert auch weiterhin den Bauchwandschluss, der ganz ausbleibt, wenn die Verbindung der Eihäute und damit die Hemmung der Entwicklung des Amnions einen größeren Umfang annimmt.

Bei dem raschen Längenwachsthum des Rückens nämlich müssen das craniale und caudale Ende des Embryo, besonders das erstere, in Folge seiner stärkeren Entfaltung auf das mangelhaft entwickelte Amnion treffen. Dieses bildet für eine weitere Krümmung ein unüberwindliches Hindernis und jene unterbleibt. Da aber ein Stillstand im Wachsthum nicht eintritt, so muss der Rücken dorsal oder ventral ausbiegen. Es geschieht das letztere, weil das Amnion, das obenein noch zum Theil in der Substanz des Chorions steckt, nicht in der Lage ist, eine dorsale Ausbiegung zu gestatten. Auf diese Weise wird nicht nur das Zustandekommen der hochgradigen Lordose, sondern auch die abnorme Richtung des Gesichtes und die rudimentäre Anlage des Gehirns verständlich.

Es liegt nunmehr nahe, weiterhin zu untersuchen, welche Folgen ungewöhnliche Verbindungen zwischen Amnion und Chorion an anderer Stelle haben müssen, und da finden wir, dass solche auf der Seite des Embryo zu Skoliosen, über dem Rücken zu Lordosen führen. Damit ist aber auch die Antwort auf die Frage nach dem Zustandekommen der Wirbelsäulendeviationen bei I und III gegeben.

Es ist anzunehmen, dass in beiden Fällen eine abnorme Verbindung zwischen den Eihäuten auf der rechten Seite und zugleich in der Rückengegend stattgefunden hat, wodurch eine freie Entfaltung des Rückens und der rechten Körperhälfte verhindert und eine Knickung der Wirbelsäule nach links und vorn herbeigeführt wurde.

Damit gelangen wir zu dem Schluss, dass die Ursache der Verkrümmung des Embryo in einer frühzeitigen regelwidrigen Verbindung des Amnions mit dem Chorion zu suchen ist, dass es aber von

der Ausdehnung dieser Verwachsung abhängt, ob der Schluss der Bauchwand zu Stande kommt oder nicht.

Gehen wir nunmehr auf die folgende von MARCHAND aufgestellte Theorie ein:

»Wahrscheinlich ist, dass in allen Fällen von umfangreichen Nabelstrangbrüchen eine abnorme Zerrung stattgefunden hat, welche nur vom Dottersack oder vom Amnion ausgegangen sein kann. Wenn man die Verhältnisse dieser Theile in frühen Stadien berücksichtigt, so kann man zunächst an eine abnorme Verbindung des Dottersackes mit dem Chorion denken, bei welcher eine ungewöhnliche Festigkeit der Fasern des Magma sehr wohl eine Rolle spielen könnte. Die mangelhafte Abschnürung der Bauchdecken vom Amnion würde erst die sekundäre Folge sein, welche um so stärker hervortreten würde, je stärker der Embryonalkörper mit der Ventralfläche an das Chorion herangezogen wäre. Andererseits kann eine unvollständige Lösung des Amnion vom Chorion an seiner Dorsalfläche, oder was auf dasselbe hinauskommen würde, eine abnorm feste Verbindung des Amnion mit dem Chorion, eine mangelhafte Ausdehnung des ersteren in der Längsrichtung des Embryo, abnorme Annäherung des Kopfes an das Caudalende, lordotische Krümmung der Wirbelsäule mit starker Vordrängung der Bauchorgane und mangelhaften Schluss des Nabelringes zur Folge haben. Auf diese Entstehungsweise dürften diejenigen Fälle von Eventration zurückzuführen sein, welche mit Cranioschisis, umfangreicher Encephalocele posterior, Rhachischisis verbunden sind. In einer dritten Reihe von Fällen weisen zahlreiche amniotische Adhäsionen, Hautbrücken und andere sekundäre Missbildungen auf eine Entstehung des Nabelstrangbruches durch frühzeitige Verwachsungen zwischen Amnion und Körperoberfläche hin, wodurch eine Verkrümmung des Embryonalkörpers und Zerrung der Bauchwandungen stattfand«,

so gelangen wir auf Grund der bei der Untersuchung unserer Fälle gewonnenen Resultate zu der Ansicht, dass sie von den aufgestellten allein Anspruch auf allgemeine Geltung besitzt, weil sie nicht nur den richtigen Zeitpunkt für die Anlage ins Auge fasst, sondern auch alle Faktoren in Betracht zieht, welche bei der Entstehung jener Missgeburten eine Rolle spielen.

Wir kommen zu folgendem Ergebnis:

Es ist anzunehmen, dass abnorm ausgedehnte Verwachsungen

zwischen Amnion und Chorion die Ursachen der Wirbelsäulenknickung und der Eventration sind. Deviation wie Verwachsungen aber haben bereits in einer sehr frühen Embryonalperiode bestanden, noch vor Anlage der Leber und ihrer Gefäßbahnen.

Dieses Organ bildet sich nicht dort, wo Nabel- und Dottervenen sich vereinigen, es treten vielmehr die Venae umbilicales erst nach seiner Anlage im Laufe der Entwicklung mit seinen Gefäßen in Verbindung.

Die bei I gefundenen Verwachsungen der Abdominalorgane sind auf eine Fremdkörperperitonitis zurückzuführen, die nach Einreißen des Sackes in Folge freien Zutrittes von Fruchtwasser in die Bauchhöhle entstanden ist.

Die abnorme Fixirung der Leber bei II dagegen hat man als eine mangelhafte Abschnürung des Organs von der Wand des Sackes aufzufassen.

Zum Schlusse erfülle ich die angenehme Pflicht, Herrn Geheimrath Prof. Dr. MARCHAND für die gütige Unterstützung bei der Abfassung dieser Arbeit meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel XXXII.

Halbschematische Darstellung der bei den Föten I, II und III gefundenen Gefäßverläufe.

Erklärung der Buchstaben:

<i>A</i>	Aorta.	<i>D.A</i>	Ductus Arantii.
<i>A.a</i>	Art. anonyma.	<i>D.B</i>	Ductus Botalli.
<i>A.c</i>	Art. coeliaca.	<i>F.V.p</i>	Fortsetzung der Pfortader in der Leber.
<i>A.c.s</i>	Art. carotis sinistra.	<i>H</i>	Leber.
<i>A.d</i>	rechter Vorhof.	<i>J</i>	Darm.
<i>A.h</i>	Art. hepatica.	<i>L</i>	Milz.
<i>A.i.d</i>	Art. iliaca dextra.	<i>L.s</i>	Lobus Spigelii.
<i>A.i.s</i>	Art. iliaca sinistra.	<i>R.d</i>	rechte Niere.
<i>A.m.i</i>	Art. mesaraica inferior.	<i>R.s</i>	linke Niere.
<i>A.m.s</i>	Art. mesaraica superior.	<i>U</i>	Ureteren.
<i>A.P</i>	Art. pulmonalis.	<i>V.c.i</i>	V. cava inferior.
<i>A.r.d</i>	Art. renalis dextra.	<i>V.c.s</i>	V. cava superior.
<i>A.r.s</i>	Art. renalis sinistra.	<i>V.ca.d</i>	V. cardinalis dextra.
<i>A.s.s</i>	Art. subclavia sinistra.	<i>V.ca.s</i>	V. cardinalis sinistra.
<i>A.u</i>	Arteriae umbilicales.	<i>V.f</i>	Gallenblase.
<i>A.u.s</i>	Art. umbilicalis sinistra.		

<i>V.h.c</i>	V. hepatica communis.	<i>V.p</i>	V. portae.
<i>V.h.r</i>	V. hepatica revehens.	<i>V.r.d</i>	V. renalis dextra.
<i>V.i.d</i>	V. iliaca dextra.	<i>V.r.s</i>	V. renalis sinistra.
<i>V.i.s</i>	V. iliaca sinistra.	<i>V.s.r</i>	V. suprarenalis sinistra.
<i>V.i.s.e</i>	V. iliaca externa sinistra.	<i>V.u.d</i>	V. umbilicalis dextra.
<i>V.l</i>	V. lienalis.	<i>V.u.s</i>	V. umbilicalis sinistra.
<i>V.m.i</i>	V. mesaraica inferior.	<i>V.v.i</i>	V. iliaca communes.
<i>V.m.s</i>	V. mesaraica superior.	<i>V.v.h.r</i>	Venae hepaticae revehentes.

Schematische Darstellung dreier Entwicklungsstadien
einer Eventration (4, 5, 6).

Erklärung der Buchstaben:

<i>A</i>	Aorta.	<i>J</i>	Darmkanal.
<i>Am</i>	Amnion.	<i>P</i>	Placenta.
<i>A.u</i>	Art. umbilicalis.	<i>Pe</i>	Peritoneum.
<i>B</i>	Bauchstiel.	<i>V</i>	Verwachungsstelle.
<i>C</i>	Herz.	<i>V.o.m</i>	V. omphalo mesaraica.
<i>C.A</i>	Amnionhöhle.	<i>V.s.v</i>	Dotterbläschen.
<i>Ch</i>	Chorion.	<i>V.u</i>	V. umbilicalis.
<i>Fu</i>	Nabelstrang.	<i>Sv</i>	Dottersack.
<i>H</i>	Leber.		

Das Ei ist der Länge des Embryonalkörpers nach durchschnitten gedacht.

4.

Der Embryo hängt mit dem Bauchstiel am Chorion fest. Er liegt ventral dem Dottersack auf und ist dorsal vom Amnion umschlossen. Letzteres ist bei *V* in größerer Ausdehnung mit dem Chorion verwachsen und kann in Folge dessen mit der Entwicklung des Embryo nicht gleichen Schritt halten. Dieser trifft mit dem cranialen und caudalen Ende auf das Amnion und knickt bei fortschreitendem Längenwachsthum nach vorn ein.

5.

In Folge der mangelhaften Entwicklung des Amnions ist die Bildung der Brust- und Bauchwand gestört. Die Organe (Herz, Leber, Darm und Dotterbläschen) liegen ventral unbedeckt vor. Das Peritoneum breitet sich an der Innenfläche des Amnions aus. Das Endresultat der mangelhaften Entwicklung des letzteren ist das Unterbleiben des Brust- und Bauchwandschlusses und es entsteht das Bild der Eventration.

6.

Der Sack umschließt die Eingeweide (Herz, Leber, Darm etc.) und geht direkt auf die Placenta über. Die Nabelschnurgefäße verlaufen in seiner unteren Cirkumferenz. Die äußere Schicht seiner Wandung bildet das Amnion, die innere das Peritoneum.

17.

19.

18.

21.

20.

22.

23.

Fig. 9.

B.

Fig. 10.

B.

C.

C.

A.

Fig. 11.

B.

A.

Fig. 12.

B.

Fig. 13.

A.

B.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

5. Rippe rechts.
Harnack 1 bc. 2 mit Linsen. grz.
Vergr. 15:1.

19.

20.