bisher nur Theile des aufsteigenden Zweiges der Epochen 0, 10 und 22 zur Beobachtung gelangten, aus denen auch die Periodenlänge abgeleitet wurde.

Der eigentliche Lichtwechsel dürfte sich auf 12 Stunden erstrecken und zwischen 6^m5 und 9^m1 erfolgen.

Heliocentrische Minima.

Epoche	1902	M. Z. Gr.	Epoche	1902	M. Z. Gr.
25	Jan. 24	17 ^h 58 ^m	95	Sept. 18	6 ^h 34 ^m
30	Febr. 10	15 27	100	Oct. 5	4 2
35	27	12 55	105	22	1 30
40	März 16	10 23	110	Nov. 7	22 59
45	April 2	7 51	115	24	20 27
50	19	5 20	120	Dec. 11	17 55
55	Mai 6	2 48	125	28	15 23
60	23	0 16			
65	Juni 8	21 44			
70	25	19 13			
75	Juli 12	16 41			
80	29	14 9			
85	Aug. 15	11 37			
90	Sept. 1	9 6			

Vielfache der Periode.

2	6 ^d 18 ^h 11 ^m 30
3	10 3 16.95
4	13 12 22.60
5	16 21 28.25

Ilmenau, 1902 Januar 18.

F. Schwab.

Oppositions-Ephemeride des Planeten (258) Tyche.

12^h M. Z. Berlin.

1902	α	δ	$\log A$	Ab.-Zeit	1902	α	δ	$\log A$	Ab.-Zeit
Jan. 31	10 ^h 19 ^m 34 ^s 12	-7° 51' 48".3	0.33578	18 ^m 0 ^s 1	Febr. 21	10 ^h 2 ^m 54 ^s 36	-6° 7' 32".6		
Febr. 1	18 51.94	7 48 50.3			22	2 4.61	6 0 40.2	0.32330	17 ^m 29 ^s 5
2	18 8.93	7 45 39.4	0.33357	17 54.6	23	1 15.06	5 53 39.8		
3	17 25.11	7 42 15.7			24	10 0 25.75	5 46 31.5	0.32355	17 30.1
4	16 40.55	7 38 39.2	0.33155	17 49.6	25	9 59 36.74	5 39 15.9		
5	15 55.28	7 34 50.1			26	58 48.07	5 31 53.2	0.32405	17 31.3
6	15 9.35	7 30 48.4	0.32974	17 45.2	27	57 59.79	5 24 23.9		
7	14 22.80	7 26 34.2			28	57 11.94	5 16 48.4	0.32479	17 33.1
8	13 35.68	7 22 7.8	0.32814	17 41.3	März 1	56 24.58	5 9 7.0		
9	12 48.04	7 17 29.3			2	55 37.75	5 1 20.1	0.32577	17 35.5
10	11 59.94	7 12 38.8	0.32676	17 37.9	3	54 51.51	4 53 28.2		
11	11 11.41	7 7 36.8			4	54 5.91	4 45 31.7	0.32698	17 38.5
12	10 22.51	7 2 23.4	0.32560	17 35.1	5	53 20.98	4 37 31.1		
13	9 33.30	6 56 58.8			6	52 36.77	4 29 26.7	0.32842	17 42.0
14	8 43.82	6 51 23.2	0.32466	17 32.8	7	51 53.31	4 21 18.9		
15	7 54.12	6 45 37.0			8	51 10.67	4 13 8.2	0.33008	17 46.0
16	7 4.27	6 39 40.5	0.32396	17 31.1	9	50 28.88	4 4 55.0		
17	6 14.31	6 33 33.9			10	49 47.98	3 56 39.7	0.33197	17 50.7
♂ 18	5 24.28	6 27 17.4	0.32350	17 30.0	11	49 8.02	3 48 22.9		
19	4 34.25	6 20 51.5			12	48 29.11	3 40 4.9	0.33407	17 55.9
20	3 44.26	6 14 16.4	0.32328	17 29.5	13	47 51.08	3 31 46.1		
21	10 2 54.36	-6 7 32.6			14	9 47 14.18	-3 23 27.0	0.33638	18 1.6

Grösse = 12.0. — Die Störungen durch Jupiter sind berücksichtigt.

Breslau, 1902 Jan. 23.

P. Neugebauer.

Berichtigungen zu Luther's Reductionstabeln für Bessel's Zonen.

Zone 478 und 479. Alle d' -Werthe erhalten das umgekehrte Vorzeichen (37. Abth. II. Theil, S. 54).

Bonn, 1902 Jan. 17.

F. Deichmüller.