*	α 1903.0	δ 1903.0	Autorité
17	4 ^h 52 ^m 19 ^s 24	+25° 56' 24.9	AG. Cambr. 2242
18	4 48 45.11	+25 34 13.9	» » 2216
19	4 44 17.68	+25 10 34.1	» » 2189
20	6 22 25.95	+19 5 24.7	AG. Berlin A. 2162

*	α 1904.0	δ 1904.0	Autorité
21	14 ^h 23 ^m 48 ^s 69	-42° 5' 18.8	Cordoba ZC. 1394
22	14 14 49.66	-41 59 0.1	Cordoba GC. 19390
23	14 8 44.06	-41 40 59.6	Cordoba ZC. 445

Über eine merkwürdig niedrige Sternschnuppe.

Am 12. August 1904 machte ich eine 5¹/₂ stündige Aufnahme des Andromedanebels und zwar gleichzeitig mit den zwei sechszölligen Voigtländerobjektiven, die dem sechszölligen Refraktor aufmontiert sind. Während der Aufnahme durchkreuzte eine ziemlich helle Perseide das Gesichtsfeld und wurde auf beiden Platten festgehalten. Eine Sternschnuppe ist für den photographierenden Astronomen gewöhnlich ein unwillkommenes Objekt, da sie die schönsten Platten verderben kann. Diese Sternschnuppe aber hat großes Interesse, weil sie trotz des geringen Abstandes der zwei photographischen Objektive voneinander eine beträchtliche Parallaxe zeigt. Schon mit bloßem Auge erkennt man auf den beiden Platten eine ganz merkbare Verschiebung. Im Stereokomparator schwebt die von ihr hinterlassene Spur

weit vor der Ebene der Fixsterne. Die Spur ist geradlinig, dagegen zeigt sie in der dritten Dimension eine starke Krümmung so, daß die konvexe Seite gegen den Beschauer gekehrt ist. Professor *Wolf* fand am Stereokomparator eine mittlere parallaktische Verschiebung von 28"12. Eine Nachmessung am Repsold'schen Meßapparat bestätigt das Resultat und gibt für verschiedene Punkte der Lichtspur Parallaxen von

$$28''26 \quad 37''31 \quad 27''78 \quad 25''20 \quad 17''14 \quad 10''00$$

Die Basis der Dreiecke Sternschnuppe-Voigtländer I-Voigtländer II wird von dem Abstand der beiden Objektive gebildet, deren Mittelpunkte 68 cm voneinander entfernt sind. Daraus folgt für die Abstände der Sternschnuppe

	4.98	3.78	5.05	5.57	8.27	14.03 km
in den Koordinaten	$\alpha = 0^h 28^m 2$	$0^h 22^m 0$	$0^h 19^m 2$	$0^h 16^m 8$	$0^h 10^m 7$	$0^h 7^m 7$
	$\delta = +43^\circ 13'$	$+42^\circ 1'$	$+41^\circ 28'$	$+40^\circ 58'$	$+39^\circ 47'$	$+38^\circ 59'$

Die Entfernung des Explosionspunktes kann nicht direkt festgestellt werden, da er außerhalb des Gesichtsfeldes der beiden Objektive liegt. Wohl aber liegt er noch auf der Platte der kleinen am Pointer befestigten Kamera mit dem Zeißschen Unar vom Öffnungsverhältnis 1:4 und befindet sich in der Richtung der abnehmenden Parallaxen, also in größter Entfernung vom Beobachtungsort. Dieselbe ergibt sich durch Extrapolation mit obigen Werten zu 35.5 km. Die Spur verläuft von $\alpha = 0^h 33^m 6$ und $\delta = +44^\circ 17'$

nach $\alpha = 23^h 52^m 2$ und $\delta = +35^\circ 28'$, dem Explosionspunkt, der sich in zwei bis zur zweiten Größenklasse anschwellenden Maxima zu erkennen gibt, die unmittelbar nebeneinander liegen. Das erste ist etwas länger als das zweite. Im Pointer war die Sternschnuppe nicht wahrzunehmen. Bei dem großen Intervall von 5¹/₂ Stunden, innerhalb dessen sie gefallen sein kann, ist daher jede eingehendere Rechnung zu verwerfen.

Großh. Astrophys. Observatorium Königstuhl-Heidelberg, 1904 Aug. 19.

P. Götz.

Über den Variablen 146.1904 Vulpeculae.

Das nebenstehende Kärtchen zeigt die Umgebung des in A. N. 3965 angezeigten neuen Variablen 146.1904 Vulpeculae; 2 mm entsprechen einer Bogenminute.

Der Veränderliche ist identisch mit BD. +22°41'37, dessen Größe in der Bonner Durchmusterung zu 9^m2 angegeben ist. Er fehlt in sämtlichen übrigen uns zur Verfügung stehenden Sternkatalogen. Seine Koordinaten sind nach A. N. 3965 für 1900.0:

$$\alpha = 20^h 34^m 29^s 77 \quad \delta = +22^\circ 54' 23''.6$$

Photographisch ist der Variable im Minimum schwächer als der mit 1 bezeichnete Stern, im Maximum heller als Stern 2.

Die bisherigen visuellen Beobachtungen geben noch keinen Aufschluß über die Natur der Lichtschwankung. Jeden-

falls war der Stern nach seinem photographisch konstatierten Minimum 1904 Juli 8 am 10. August bereits wieder im Maximum. Die Periode kann also nur wenige Tage betragen.

Meine bisherigen Schätzungen am 6z. Reinfeldern ergaben:

1904	M. Z. Kgst.	Stufenschätzung			Himmel
		*2-x	*3-x	*4-x	
Aug. 6	9 ^h 7 ^m	+2		+5	2
8	9 7	+2	+1	+6	zwischen. Wolk.
10	9 7	-1		+2	1
11	10 7	-1.5		+2.5	zwischen. Wolk.
12	8 45	0	-1	+3	1
13	9 7	-1.5		+2	1
15	9 30	+1		+3.5	1
16	9 25	-1.5		+2	1

1904	M. Z. Kgst.	Stufenschätzung			Himmel
		*2-x	*3-x	*4-x	
Aug. 17	9 ^h 7 ^m	-1		+3	1
29	8 22	-1	-2	+2	1
29	9 35	-2.5	-2	+3	1 C ₁
29	10 40	-3.5	-2	+2	1 C ₂
29	11 55	-2	-1	+2	2 C ₃
30	8 22	-3	-2	+2	1
Sept. 5	7 53	-3.5	+1	+3	2
10	10 21	-1.5	+1	+3	4

Über die Anschlußsterne vergleiche man die Karte. Es ist 2 = BD. +37°41'40", 3 = +37°41'41", 4 = +37°41'34".

Großh. Astrophys. Observatorium Königstuhl-Heidelberg, 1904 Sept. 27.

P. Götz.

Über den Veränderlichen 156.1904 Ceti.

Mitteilung von Dr. W. Luther, Direktor der Sternwarte in Düsseldorf, vom 5. Oktober:

»Der von mir 1904 Sept. 18 gefundene Stern ist seit Sept. 20 wesentlich schwächer geworden, die Veränderlichkeit unterliegt also keinem Zweifel mehr. Ich verglich ihn Sept. 30 9^h 25^m M. E. Z. mit 7 Nachbarsternen und erhielt seine Helligkeit in der Skala der BD. im Mittel gleich 9^m7 gegen 9^m0 am 20. September. Okt. 3 schätzte ich ihn 9^m8.«

Mitteilung von Herrn P. Moschik, Assistent an der Astrometrischen Abteilung der Großh. Sternwarte Königstuhl-Heidelberg, vom 20. Oktober:

»Da die herrschende Witterung weitere Messungen des von Herrn Luther angezeigten Variablen in Cetus vorläufig anscheinend nicht erlaubt, ist es vielleicht zweckmäßig, die bis jetzt erhaltenen Beobachtungen mitzuteilen. Sie wurden gewonnen mit einem Zöllnerschen Photometer, das ich in Verbindung mit dem 8zöll. Merzchen Refraktor zur Verfolgung langperiodischer Veränderlicher benutze.

Als Vergleichsterne dienten:

$$a = \text{BD.} - 2^{\circ}159 \quad b = \text{BD.} - 2^{\circ}161$$

und zwei weitere nahestehende Sterne, deren Größe ich aus Anschlüssen an a und b bestimmte. Es fand sich, wenn man $a = b = 9^{\text{m}}0$ setzt

$$c = 10^{\text{m}}69 \quad d = 10^{\text{m}}56 \quad (\text{BD.} - 2^{\circ}158)$$

Die Beobachtungen ergaben mit den angenommenen Werten für a und b , bei Berücksichtigung einer mittleren differentiellen Extinktion

1904		a	b	c	d	Mittel
Okt. 13.48	M. Z. Kgst.	9.90	9.88	(9.57)	9.84	9 ^m 87
14.48	»	10.05	10.05	10.26	10.14	10.12
16.42	»	10.61	10.44	10.63	10.69	10.59
19.43	»	10.92	11.14	10.82	10.78	10.92

Der Luftzustand war an allen Beobachtungstagen nicht sehr günstig; Bestimmung aus c und d schwierig, besonders Okt. 16 und 19, wo der Mond von störendem Einfluß war.«

Über den Veränderlichen 159.1904 Pegasi.

Mitteilung von Prof. E. Millosevich, Direktor der Sternwarte des Collegio Romano in Rom, vom 13. Oktober:

»Paragonata con BD. +29°46'53" e BD. +29°46'61" la grandezza venne stimata dal Dr. Bianchi e da me fra 9.6 e 9.7 il 12 ottobre 1904 10^h Roma. In confronto con AG. Cambr. 13435 si ha:

$$\begin{aligned} &\text{Var. 159.1904 Pegasi.} \\ &1904.0 \quad 22^{\text{h}}21^{\text{m}}12^{\text{s}}58 + 29^{\circ}59'50'' \text{ M} \\ &\quad 22 \ 21 \ 12.57 + 29 \ 59 \ 5.0 \text{ B} \end{aligned}$$

La stella AG. Cambr. 13435 è preceduta di 0.5 da una stella più debole 1' circa al nord. Questa non trovasi in BD., ma bensì in AG. Cambr., che la stima di 9.1. Detta stellina appariva di eguale splendore della variabile, cioè di circa 9.7.«

Mitteilung von Prof. A. Abetti, Direktor der Sternwarte in Arcetri-Firenze, vom 17. Oktober:

»La posizione dedotta all'equatoriale di Amici con parecchi confronti colle due stelle, *1 = BD. +29°46'55" 9.1 AG. Cambr. 13432, e *2 = +29°46'59" 8.8 AG. Cambr. 13435, risulta pel 1904.0 come segue:

$$\begin{aligned} V_1 &= 22^{\text{h}}21^{\text{m}}12^{\text{s}}68 + 29^{\circ}59'52'' \\ V_2 &= 22 \ 21 \ 12.60 + 29 \ 59 \ 5.1 \end{aligned}$$

La grandezza fu ripetutamente giudicata la 10^a o meno nelle due sere splendide del 13 e 15 ottobre; e circa eguale a quella di due stelline che stanno accanto alla *2 e che si ricordano, l'una pochissimo precedente, forse 1^a e più boreale 1', l'altra seguente una decina di secondi ed 1' più australe.