Über die Entwicklung der Gesellschafts-Morphologie

Author(s): Eduard Rubel

Source: *Journal of Ecology*, Vol. 8, No. 1 (Mar., 1920), pp. 18-40

Published by: British Ecological Society

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2255211>

Accessed: 26-06-2016 09:26 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
<http://about.jstor.org/terms>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

British Ecological Society, *Wiley* are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Journal of Ecology

ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFTS-MORPHOLOGIE

Mitteilungen aus dem Geobotanischen Institut Rübel in Zürich

VON EDUARD RÜBEL (ZÜRICH, SCHWEIZ).

Die Lehre von den Pflanzengesellschaften, die Pflanzensoziologie, ist eine relativ neue Wissenschaft, sie hat wohl bei Humboldt schon Anklänge, doch tritt sie erst bei Grisebach, bei Sendtner, Lorenz und besonders bei Kerner selbständig auf und findet ihre Ausgestaltung bei Hult, 1881, Schröter, 1892, und Warming, 1895. Die Pflanzengesellschaft ist an den Standort gebunden, der Standort steht mit ihr in ursächlichem Zusammenhang, der Standort (habitat) ist das Haus, der Oikos, der Pflanzengesellschaft. Es ist daher nicht zu verwundern, dass die Pflanzensoziologie aus der ökologischen Pflanzengeographie hervorgegangen ist, ja bis in die neueste Zeit als ein Teil dieser ökologischen Pflanzengeographie empfunden wird. Die Pflanzensoziologie hat sich aber so mächtig entwickelt, dass sie über diesen Rahmen hinausgewachsen ist. Neben dem Ökologischen, das der Soziologie doppelt anhängt als Forschungsproblem und als eine der wichtigsten Ursachen des Gegenstandes, der Pflanzengesellschaft, fordern auch die anderen biologischen Forschungsprobleme dringend ihre Ausgestaltung. Vor allem stellte sich die Raumfrage nach der Verteilung der Pflanzengesellschaften auf der Erde, es bildete sich eine chorologische Soziologie heraus, ferner eine genetische Soziologie, indem die Veränderungen der Pflanzengesellschaften, ihre Entwicklung verfolgt wurde in der Sukzessionslehre. Diese drei Zweige haben sich schon ziemlich selbständig gemacht. Wie wir bei den Einzelpflanzen als grosse Probleme eine Morphologie und eine Systematik haben, so muss logisch wie praktisch auch bei der Forschung, bei der eine Gemeinschaft, die Pflanzengesellschaft, statt der Pflanzenart den Forschungsgegenstand bildet, sich eine Morphologie und eine Systematik entwickeln. Dem ist auch so; nur werden diese Teile bisher nicht selbständig behandelt, sondern die Beobachtungen, die ihnen angehören, eingeflochten. Ich möchte nun versuchen, die Gesellschafts-Morphologie nach ihren Anfängen, ihrer Entwicklung, kurz nach ihrer Geschichte herauszuschälen.

Fängt man an, eine Pflanze zu untersuchen, so beschreibt man erst ihr Äusseres, ihre Gestalt; so sieht der Stengel aus, so das Blatt, so die Blüte; die Blätter sind als Rosetten vereinigt, oder am Stengel verteilt, die Blüten

einzelnen oder in Büscheln u.s.w. Also zur Untersuchung werden morphologische Merkmale beschrieben. Die Morphologie hat von jeher eine grosse Rolle bei der Untersuchung der Pflanzen gespielt. Ganz gleich müssen wir bei der Soziologie vorgehen. Was bei der Einzelpflanze die Stellung der Organe, der Blätter, der Blüten, das vereinzelter oder gedrängte Vorkommen dieser Organe ist, das ist bei der Gesellschaft die Stellung der Arten in der Gesellschaft, das soziale oder vereinzelter Vorkommen, die Mengenverhältnisse der Arten, ihre Konstanz, ihre Treue. Die Morphologie muss also die Gesellschaft qualitativ und quantitativ untersuchen; die Gestalt ist bedingt durch die vorkommenden Arten und ihre Lebensform, durch ihre Mengenverhältnisse, durch ihre Konstanzverhältnisse, durch ihre Treueverhältnisse. In den Untersuchungsmethoden finden wir den Faden der Gesellschafts-Morphologie. Willdenow, Humboldt, Grisebach, die Väter der Pflanzengesellschaften, gründeten diese auf die Physiognomie. Dies war vortrefflich, aber gefährlich. Man kann die Physiognomie durch bequeme oberflächliche Beschreibung etwa schildern, es ist dies im Laufe des Jahrhunderts ausgiebig geschehen, und es wurde dadurch die ganze physiognomische Betrachtung in Verruf gebracht; man kann die Physiognomie aber auch eingehend als Ausdruck der Gestalt der Gesellschaft studieren, dazu braucht es die Betrachtung der Mengenverhältnisse der Arten, ihrer Verteilung u.s.w., aber in besonderem Masse das Studium der Lebensformen; so wird die Physiognomie ein wesentlicher Bestandteil der Morphologie der Gesellschaft.

Um die Geschichte der Morphologie verfolgen zu können, müssen wir die Fragen, um die es sich handelt, zusammenzustellen versuchen. Morphologische Fragen an die Gesellschaft seien folgende gestellt:

1. Was für eine Bedeutung kommt jeder Art durch Gestalt oder Zahl der Individuen zu? *Mengenverhältnisse.*

(a) In wieviel Exemplaren in einem Bestand kommt die Art vor?

Abundanz s. str.

(b) In welchem Grade herrscht die Art im Bestande?

Dominanz und Deckungsgrad.

(c) In welcher Häufungsweise tritt die Art auf?

Geselligkeit.

2. Wie regelmässig zeigt sich die Art in verschiedenen Aufnahmen derselben Pflanzengesellschaft? *Konstanz.*

3. Wie eng ist die Art an bestimmte Gesellschaften gebunden?

Gesellschaftstreue.

4. Welche Lebensformen treten in der Gesellschaft auf und zu was für Gruppen vereinigen sich diese? *Lebensformen und Schichten (Synusien).*

Die Unterscheidung dieser verschiedenen Fragen hat sich naturgemäss erst in neuerer Zeit auseinandergeschält. Früher wurden einige davon mehr oder weniger klar voneinander getrennt, öfter aber nicht auseinandergehalten, im Gegenteil noch vermischelt mit der forschungshistorisch älteren, nicht soziologischen Frage nach der geographischen Verbreitung der einzelnen Art.

In bunter Vermischung wurden für die verschiedensten Dinge die Ausdrücke "häufig," "verbreitet," "zerstreut" u.s.w., gebraucht. Neben der geographischen Einzelverbreitung wurde seit Schouw und Heer auf die Mengenverhältnisse Rücksicht genommen und aus dem allgemeinen Ausdruck "verbreitet" herausgeschält. Es spielt da schon das Berücksichtigen der noch nicht ausdrücklich genannten Pflanzengesellschaft mit, indem von der gewöhnlichen geographischen Verbreitung die Verbreitung innerhalb der betrachteten Gesellschaft, also das Mengenverhältnis abzweigte. Im Laufe der Zeit dachte der eine Forscher bei seinen Bezeichnungen mehr nur an die geographische Verbreitung, der andere schon mit an die soziologische. Dieselben Ausdrücke schliessen bald mehr, bald weniger ein, es entstehen Divergenzen, sodass man die Vegetation verschiedener Länder nach den Literaturangaben meist nicht ohne weiteres vergleichen kann. Aber auch nachdem sich durch das Abtrennen der autochorologischen Verbreitung die Lage etwas geklärt hatte, blieben die Fragen nach Abundanz und Konstanz fast stets gemischt und sind es grossenteils heute noch. Sie können auch nicht bei allen Arbeiten vollständig getrennt werden; bei eingehenden Studien wohl, und dort sollte es auch stets geschehen, bei mehr skizzenhaften Gesellschaftsdarstellungen hingegen lässt sich die synthetische Konstanz nicht klar ausführlich abstrahieren, da Einzelbestand und Bestandestypus meist nicht mehr reinlich getrennt erscheinen. Bei solchen Vegetationsaufnahmen wird meist statt Abundanz- und Konstanzbestimmungen ein Mittelweg eingeschlagen, um ein anschauliches Bild ohne zu grossen Zeitaufwand zu erhalten. Statt vieler Einzelbestände werden die als zur gleichen Gesellschaft gehörig geschätzten Bestände zusammen aufgenommen, was auf der Gesellschaft verbreitet vorkommt als konstant taxiert. So diese floristischen Fragen an die Gestalt der Pflanzengesellschaft.

Ähnliche Umwege machen auch die ökologischen Gestaltsfragen nach den Lebensformen und deren Gruppierungen in der Pflanzengesellschaft. Bald treten sie rein autökologisch auf, bald als Physiognomie der Pflanzengesellschaft mit historischen und phylogenetischen Komponenten vermischt, bald mit formalen Grösßenmerkmalen zu Schichten gruppiert u.s.w.

Wir wollen nun in der Geschichte der morphologischen Soziologie diese beiden Fragenkomplexe, den floristischen und den lebensformlichen, wenn man so sagen darf, verfolgen.

Humboldt 1807¹ erkennt aus der zahllosen Menge der Gewächse eine Reihe von "Grundgestalten oder physiognomischen Abteilungen," auf die man wahrscheinlich alle übrigen Gestalten zurückführen könne, er begnüge sich, 17 derselben aufzuzählen. Es sind dies:

1. Bananenform	3. Form der baumartigen Farrenkräuter
2. Palmenform	4. Aloe-Form

¹ **Al. v. Humboldt.** *Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemälde der Tropenländer.* Tübingen und Paris, 1807.

5. Pothosform	12. Cactusform
6. Form der Nadelhölzer	13. Casuarinenform
7. Form der Orchideen	14. Gras- und Schilf-Form
8. Mimosenform	15. Form der Laubmoose
9. Malvenform	16. Form der Blätterflechten
10. Rebenform	17. Form der Hutschwämme
11. Lilienform	

Diese physiognomischen Abteilungen hat später Grisebach vermehrt. Die Vermehrung brachte aber keine Verbesserung, sondern es entstanden eine Menge Formen, die auf Sippensystematik gegründet waren. Die Physiognomie enthält eben zwei Gruppen von Merkmalen: epharmonische oder Anpassungsmerkmale, die für die Lebensformen wie für die Soziologie besonders wichtig sind, und konstitutionelle Merkmale, die in der ökologischen Lebensform nicht viel zu suchen haben. Die Betonung vieler systematisch-konstitutioneller Merkmale hat zeitweise die Physiognomik auf ein totes Geleise geführt.

Unterdessen wird bereits den Mengenverhältnissen Beachtung geschenkt. **Schouw** 1823¹ spricht von *plantae sociales*, *plantae gregariae*, *plantae solitariae*.

Viel ausführlicher geht **Heer** 1835² vor. Er charakterisiert seine Höhenstufen durch die Anzahl der Arten in Lebensformengruppen, die durch die "Grösse der Individuen" unterschieden sind, also durch Schichten. Er schreibt (S. 78): "Man teilt bekanntlich die Pflanzen hinsichtlich der Grösse der Individuen in Kräuter, Halbgesträuche, Gesträuche und Bäume. In welchem Verhältnisse diese in den verschiedenen Regionen zueinander stehen, zeigt uns folgende Übersicht:

	Bäume	Gesträuche	Halbgesträuche	Kräuter
Die montane Region hat	21	33	22	479
die subalpine " "	6	11	19	323
die alpine " "	1	6	21	284
die subnivale " "	0	0	15	201
die nivale " "	0	0	0	12"

Daneben geht er in der floristischen Charakterisierung von Standorten, wir dürfen schon sagen Pflanzengesellschaften, sehr weit. Zum ersten Mal treffen wir auf die scharfe Unterscheidung von Abundanzverhältnissen und Geselligkeitsverhältnissen. Er erfindet für beide Arten Zahlenskalen und zwar die Zahlen 1–10. Es sei wörtlich zitiert (S. 144): "Durch die Zahlen, welche in den Randkolonnen stehen, suchte ich eine Idee zu geben, durch wieviele Individuen jede Art repräsentiert sei und wie dieselben verteilt sind.

¹ **Joakim Frederik Schouw**. *Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie*. Berlin, 1823.

² **Oswald Heer**. "Die Vegetationsverhältnisse des südöstlichen Teils des Kantons Glarus; ein Versuch, die pflanzengeographischen Erscheinungen der Alpen aus klimatologischen und Bodenverhältnissen abzuleiten." *Fröbels und Heers Mitteilungen aus dem Gebiete der theoretischen Erdkunde*, 1, 3. Zürich, 1835.

Mit der ersten Zahl nämlich suchte ich auszudrücken, ob eine Form in vielen oder wenigen Individuen sich entfaltet habe. So zeigt z.B. 1 an, dass diese Art eine unbedeutende Rolle hinsichtlich der Individuenzahl spiele, 10 dagegen, dass sie ein hervorstechendes Moment in der Pflanzendecke bilde. Die zweite Zahl gibt an, ob die Art vereinzelt dastehe oder aber gruppenweise die Erde bekleide. Mit 1 : 10 will ich daher gesagt wissen, dass eine Pflanze sehr selten sei, wo sie aber einmal vorkomme, in Masse die Erde bekleide; mit 10 : 1 aber, dass sie überall sich finde (natürlich nur auf der vorn angegebenen Lokalität), aber nur ganz vereinzelt ins Kleid der Erde eingewoben sei."

Alle die Angaben über Abundanz und Geselligkeit gibt Heer leider nicht im Text bei der Besprechung der Pflanzengesellschaft, für die er den Ausdruck "Lokalität" gebraucht, sondern erst in der sippensystematisch geordneten Florenliste. Von jeder Art gibt er dort an, in welchen Pflanzengesellschaften und in welchen Höhenstufen sie vorkommt und welches ihre Abundanz und Geselligkeit in jeder Gesellschaft ist und dies noch für jede Höhenstufe gesondert. Ein Beispiel möge dies erläutern. Wir finden für *Soldanella alpina* folgende Angaben:

Soldanella alpina kommt im Sernftal (Kanton Glarus) auf Weiden und in Schneetälchen vor; auf Weiden in der montanen, subalpinen, alpinen und subnivalen Stufe (genannt regio), in Schneetälchen in der alpinen und subnivalen Stufe; in der montanen Weide 1 : 3, also sehr selten aber in kleinen Gruppen; auf subalpinen Weiden 3 : 4, also mässig häufig und truppweise, auf alpinen Weiden 4 : 5, also häufiger und geselliger, auf subnivalen 3 : 4, also wieder weniger häufig und truppweise; in Schneetälchen kommt sie vor: in alpinen Schneetälchen 5 : 8, also ziemlich häufig und in grossen Heerden, in subnivalen Schneetälchen 4 : 6, also etwas weniger häufig und in weniger grossen Scharen, immerhin in grösseren als auf irgend einer Weide. Diese Angaben sind von einer Reichhaltigkeit, wie sie von Florenlisten sonst kaum je erreicht wird. Es liegen die Materialien vor, um eine moderne Beschreibung der Pflanzengesellschaften zu geben, aber diese Materialien sind nicht dazu gruppiert worden.

Auf rein floristischem Gebiet hatte als erster **Dumont D'Urville** 1825¹ Skalen von Zahlen angewandt. Er schätzte die Prozentzahlen der Verbreitung der Pflanzen auf den Falklandinseln (Malwinen) und schätzte an jeder Fundstelle die Art nach ihrer Massenhaftigkeit wiederum in Prozentzahlen. Durch Multiplizieren der beiden Prozentzahlen erhielt er eine Zahl, die er die wirkliche Verbreitung nannte. Obwohl dies gar nichts mit Gesellschaftslehre zu tun hat, könnte das den jungen Heer, falls er D'Urilles Publikation gekannt haben sollte, auf den Gedanken gebracht haben, Mengenverhältniszahlen für die Pflanzen eines "Standorts" zu verwenden.

¹ **Dumont D'Urville**. "Flore des Malouines." *Mém. Soc. Linn. de Paris*, 4, 598, 1825; in extenso zitiert in **Briquet**. "Les méthodes statistiques applicables aux recherches de floristique." *Bull. de l'herbier Boissier*, 1, 4, 1893.

Thurmann in Pruntrut im Berner Jura 1849¹ übernimmt die beiden Heerschen Skalen, aber da er nicht wie Heer an Pflanzengesellschaften, sondern nur an die Gegend als ganzes denkt, werden die Zahlen Verbreitungszahlen und Mengenverhältnisse.

Für die Mengenverhältnisse benutzt auch **Lecoq** 1844² die Zahlen 1 : 10; diese 10 Zahlen fasst er dann noch in vier Wortausdrücke zusammen: 10 = espèces dominantes, 9–6 = espèces essentielles, 5–3 = espèces accessoires, 2–1 = espèces accidentelles. Im speziellen Teil benutzt er aber weder die Zahlen noch die Ausdrücke. Auch **Sendtner** 1854³ benutzt eine Skala für die Dichtigkeit des Vorkommens: κ^1 in Unzahl, κ^2 in Menge, κ^3 in Gesellschaft, κ^4 in Spärlichkeit, κ^5 in Einzelheit. Daneben verwendet er eine ähnliche Skala für die floristische Verbreitung.

Mit **Kerner** 1863⁴ findet die Morphologie nach Lebensformen eine Ausgestaltung, einen grossen Fortschritt. Auch er stellt eine Reihe von "Grundformen" auf, die nach der Physiognomie gewählt sind, doch empfindet er sie wirklich ökologisch, sodass die meisten Formen auf epharmonischen Merkmalen aufgebaut sind, daher als Lebensformen wirken. Er sucht nicht alle Formen der Erde auf einmal zu umfassen, sondern nur die der "heimischen Pflanzenwelt," welche "etwa folgende" Grundformen ergeben: Bäume, Sträucher, Stauden, Filzpflanzen, Kräuter, Blattpflanzen, Schlinggewächse, Fadenpflanzen, Rohr, Halmgewächse, Schwämme, Krustenpflanzen. In vielfach verschlungenem Formengewirre seien diese Grundformen wieder durch Mittelstufen miteinander verknüpft. Mehrere dieser Grundformen seien für die Physiognomie der Landschaft wichtig, andere erscheinen trotz Häufigkeit nicht selbständig und unabhängig, sondern als Beiwerk. Kerner unterscheidet aber nicht nur diese Grundformen, sondern geht noch einen grossen Schritt weiter in der Morphologie der Pflanzengesellschaften. Es sei dies wegen der grossen Wichtigkeit wörtlich zitiert (S. 11):

"Die grösste Wichtigkeit für die Landschaft erlangen die Grundformen natürlich dann, wenn sie ein geselliges Wachstum zeigen und sich zu ganzen Pflanzenmassen von gleichem Ausdruck ineinander schlingen und aneinanderreihen. Man bezeichnet dann solche von einer und derselben Grundform gebildete Pflanzenmassen mit dem Namen *Bestände* und mag diese wieder, je nachdem sie als vollständig geschlossene Gewebe erscheinen, oder stellenweise durch Felsboden, nackte Erde oder Wasser in ihrem Zusammenhange unterbrochen werden, als Dickichte und Lückichte unterscheiden. Auch unterscheiden wir weiterhin die Bestände nach ihren Grundformen und bezeichnen

¹ **Jules Thurmann.** *Essai de Phytostatique, appliqué à la chaîne du Jura et aux contrées voisines, ou étude de la dispersion des plantes vasculaires envisagée principalement quant à l'influence des roches sous-jacentes.* Berne, 1849.

² **Henri Lecoq.** *Traité des plantes fourragères ou Flore des prairies naturelles de la France.* Paris, 1844.

³ **Otto Sendtner.** *Die Vegetationsverhältnisse Südbayerns nach den Grundsätzen der Pflanzengeographie und mit Bezugnahme auf Landeskultur.* München, 1854.

⁴ **Anton v. Kerner.** *Das Pflanzenleben der Donauländer.* Innsbruck, 1863.

einen Bestand aus Bäumen	als Gehölz,
„ „ „ Sträuchern	„ Gesträuch,
„ „ „ Stauden	„ Gestäude,
„ „ „ Kräutern	„ Gekräut,
„ „ „ Blattpflanzen	„ Geblätt,
„ „ „ Filzpflanzen	„ Gefilz,
„ „ „ Schlingpflanzen	„ Geschlinge,
„ „ „ Fadenpflanzen	„ Gefäde,
„ „ „ Röhren	„ Geröhr,
„ „ „ Halmpflanzen	„ Gehälm,
„ „ „ Schwämmen	„ Geschwämm,
„ „ „ Krustenpflanzen	„ Gekruste.

Von diesen Beständen bedeckt nur selten einer für sich allein den Boden; gewöhnlich findet eine gegenseitige Durchdringung statt und fast immer bemerken wir mehrere Bestände in *Schichten* übereinander entwickelt, sodass z.B. über einem Gefilz von Moosen, welches als unterste Schichte den Boden bekleidet, das Geblätt von Farnen als zweite Schichte emporstrebt und dann als dritte Schichte die auf schlanken Säulen getragenen dunkeln Kronen eines Fichtengehölzes ihr düsteres Schattendach wölben. Diese *Verkettungen von Beständen* sind es, welche man Pflanzenformationen genannt hat und deren Studium von den Botanikern unbegreiflicher Weise bis in die neueste Zeit so gänzlich vernachlässigt wurde.“

Also die Gestalt der „Formation“ setzt sich aus ökologisch empfundenen Teilen, genannt „Bestände,“ die oft als „Schichten“ erscheinen, zusammen, und diese Bestände gründen sich auf Grundformen. Die eine Hauptfrage der Gesellschaftsmorphologie nach den Lebensformen und deren Gruppierung erhält hier eine so eingehende Würdigung und fruchtbare Ausgestaltung, auf der nur zu wenig weitergebaut wurde. Dieser Begriff der Kernerschen „Bestände“ als ökologischer Teile der Pflanzengesellschaften ist sehr wichtig. Er wird unter verschiedenen Namen auch weiterhin benutzt, aber oft mit den ganzen Pflanzengesellschaften verwechselt. Es kommt dies daher, dass mancher dieser „Bestände“ sowohl als untergeordneter Teil einer Pflanzengesellschaft vorkommt als auch in ähnlichem Umfang als dominierend vorkommen kann. Wir kennen z.B. eine selbständige Calluna-Heide einerseits, andererseits *Calluna*-Bestände im Wald; wir haben submerse Wasservegetation als Pflanzengesellschaft wie auch submerse Bestände im Schilfsumpf. Ähnlich wird Warmings „Verein,“ „Plantesaufund,“ als selbständige Gesellschaft benutzt, andererseits auch als Teil einer solchen, wie z.B. aus **Schröter** 1902¹ zu ersehen ist. Dort lesen wir, dass man im Phragmitetum folgendes findet (S. 68): „im Boden die schlammbewohnenden Diatomeen und Schizophyceen (Schizophyceen-Verein Warmings), im Wasser das Plankton (Phytoplankton

¹ **Carl Schröter** und **Otto Kirchner**. *Die Vegetation des Bodensees*. Lindau, 1896 und 1902. II. Teil von **Carl Schröter**, 1902.

Warming), die freischwimmenden Uferalgen, auf dem Wasser die Wasserlinsen (Hydrochariten-Verein Warmings), im Schlamm wurzelnd die Charen-, Seerosen- und Potamogetonarten (Limnäen-Verein Warmings) mit ihren epiphytischen Algen, auf den Steinen festsitzende Algen und Moose (Nereiden-Verein Warmings), in die Luft hinausragend das Schilf (Sumpfpflanzen-Verein Warmings), wieder mit Parasiten und Epiphyten; also in derselben räumlich und standörtlich verbundenen Pflanzengesellschaft sechs ökologische Vereinsklassen Warmings."

Bei Drude finden wir diese Teilgruppen dann als "ökologischer Verein" zur Unterscheidung von der ganzen Pflanzengesellschaft, die nicht nur ökologisch ist; anderwärts als "Genossenschaften," neuerdings bei Gams als "Synusien." Die Unterscheidung von "Schichten" sucht ebenfalls, wenn auch schematisch, diese ökologischen Unterteilungen einer Pflanzengesellschaft zu fassen.

Eine eigentliche Gesellschaftsmorphologie besitzen wir in **Hults** (1881) Versuch¹ einer analytischen Behandlung der Pflanzenformationen. Darin treffen wir sowohl die Lebensformen und deren Gruppierung und Schichten als auch Abundanzbestimmungen. Er stützt sich auf die bisher besprochenen Forscher, sowie auf J. P. Norrlin, der das Studium der Pflanzengesellschaften in Finnland eröffnet hat. **Norrin** hatte schon 1870² seine Grundformen aufgestellt: Nadelbäume, Laubbäume, Sträucher, Reiser, Gräser, Kräuter, Schlinggewächse, Blattmoose und Flechten. Hult fügt noch die *Sphagnum* = Weissmoos-Grundform bei. Hult hat sich aber nicht mit den Grundformen begnügt, sondern diese in 43 "Vegetationsformen" aufgelöst, die teilweise epharmonisch, teilweise aber konstitutioneller Natur wie viele Grisebachsche sind. Diese 43 Formen bilden sodann "Bestände," teils reine, nur aus einer Form bestehende, teils gemischte aus mehr Formen einer Schicht, teils Bestandesgruppen aus mehreren Formen mehrerer Schichten.

Beispiele für Einzelbestände:

- Baumbestand der Pinusform
- Reiserbestand der Ericaform
- Gräserbestand der Calamagrostisform
- Kräuterbestand der Geraniumform
- Flechtenbestand der Cladinaform.

Gemischte Bestände:

- Baumbestand der Pinus- und Betulaformen
- Gras- und Krautbestand der Chordorrhiza- und Menyanthesformen.

Bestandesgruppen:

- Salix-, Milium-, Geraniumformen
- Geranium-, Festuca-, Equisetumformen.

¹ **Ragnar Hult**. "Försök till analytisk behandling af växtformationerna." *Meddel. af Soc. pro Fauna et Flora fennica*, 8, 1881.

² **J. P. Norrlin**. "Bidrag till sydöstra Tavastlands flora." *Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora fennica förhandlingar*, 11, 1870.

Hult betont, dass einzelne dieser "Bestände" geeignet sind, selbständige Pflanzengesellschaften zu bilden, andere nicht.

Den Grössenverhältnissen der nordischen Vegetation entsprechend grenzt Hult folgende sieben Schichten ab:

1.	Bodendecke	...	...	...	bis 3 cm. Höhe
2 a.	Niederste Feldschicht	...	...	...	bis 1 dm. Höhe
2 b.	Mittlere Feldschicht	...	...	...	bis 3 dm. Höhe
2 c.	Höchste Feldschicht	...	...	...	bis 8 dm. Höhe
3.	Strauchschicht	...	...	...	bis 2 m. Höhe
4.	Niederwaldschicht	...	...	...	bis 6 m. Höhe
5.	Hochwaldschicht	...	...	...	darüber

Neben diesen ökologischen Formen geht bei Hult auch die Beachtung der Mengenverhältnisse. Die Skala dazu scheint er schon von seinem Lehrer Norrlin übernommen zu haben. Er verwendet die Zahlen 1–10 und fügt für ganz vereinzelt vorkommende Arten noch zwei weitere Stufen r und rr bei. Für praktische Arbeiten fasst er sie in 5 Stufen zusammen. Genau geschildert zitiert **Linkola** 1916¹ (S. 40) als "Dichtigkeitsskala Norrlins" folgendermassen:

Deckend oder häufig (ymniga)

10.	Grad der Beimischung anderer Arten	1–4
9.	" " " " "	4–6
8.	" " " " "	6–7½

Reichlich (rikliga)

7.	Zwischenraum zwischen Individuen der fraglichen Art	2½–15 cm.
6.	" " " " "	15–50 cm.
5.	" " " " "	50–100 cm.

Zerstreut (strödda)

4.	Zwischenraum zwischen Individuen der fraglichen Art	1–2 m.
3.	" " " " "	2–5 m.

Spärlich (spridda)

2.	Zwischenraum zwischen Individuen der fraglichen Art	5–10 m.
1.	" " " " "	über 10 m.

Vereinzelt (enstaka)

r
rr

Hult hat nun diese Skala, die wir ganz entsprechend bei Heer, Thurmann und Lecoq gefunden haben, zum ersten Mal zur genauen Abschätzung der Mengenverhältnisse innerhalb der Pflanzengesellschaft verwendet, wodurch die Gesellschaftsmorphologie eine grosse Förderung erhielt. Im Prinzip ähnliche Skalen werden fast allerorten gebraucht, so von Drude die Ausdrücke

¹ **K. Linkola.** "Studien über den Einfluss der Kultur auf die Flora in den Gegenden nördlich vom Ladogasee. I. allgemeiner Teil." *Acta Soc. pro Fauna et Flora fennica*, **45**, 1916.

socialis, copiosus, sparsus, soltarius; von den Engländern dominant, abundant, frequent, occasional, rare, very rare¹.

Von Hult an halten sich die Untersuchungen meist auch an einen bestimmten Rang von Gesellschaften, nämlich an die grundlegende Einheit, die wir heute Assoziation nennen. Im weiteren historischen Verlauf der Morphologie handelt es sich nun fast stets um die Morphologie der Assoziation.

Hult hat für die Charakterisierung der Gesellschaft eine knappe graphische Darstellung verwendet unter Benützung der Mengenverhältnisse, der Grundformen und Schichten. Ein Viereck wird so zerteilt, dass jede Schicht einen horizontalen Streifen erhält. In senkrechten Kolonnen werden die 5 Häufigkeitsgrade eingetragen, der häufigere jeweils doppelt so breit wie der vorhergehende. In jeder Schicht wird so weit schraffiert als der vorhandene Häufigkeitsgrad angibt. Hinter die Horizontalstreifen wird die Zahl der Grundform gesetzt, die in jener Schicht herrscht nach der Aufstellung

I Nadelbäume	VI Kräuter
II Laubbäume	VII Schlinggewächse
III Gebüsch	VIII Weissmoose (Sphagna)
IV Reiser (Zwergsträucher)	IX Blattmoose
V Gräser	X Flechten

Ein Beispiel mag dies erläutern:

	Menge					Grundform
	1	2	3	4	5	
Schicht 5						I
4						
3						
2c						
2b						IV
2a						IV
1						X

Aus der Figur lesen wir: Geschlossener (M. 5) Nadelholz (I)—Hochwald (Sch. 5), ohne Gesträuch (0 Sch. 4; 0 Sch. 3); spärliche (M. 2), mittelhohe (Sch. 2 b) Zwergstrauchschicht (IV); reichliche (M. 4), niedrige (Sch. 2 a) Zwergstrauchschicht (IV) und deckende (M. 5) Flechten (X)—Bodenschicht (Sch. 1). Hult hat diese Aufnahme am 12. Aug. 1877 in Kittilä in Kemi Lappmark gemacht: Die Hochwaldschicht besteht aus *Pinus silvestris* mit eingestreuter *Picea*; in der niedrigen Feldschicht findet sich reichlich *Vaccinium vitis idaea*, zerstreut *Arctostaphylos uva ursi*, spärlich *Empetrum*, *Calluna* und *Festuca ovina*; die Sträuchlein ragen zum Teil spärlich in die mittlere Feldschicht hinauf. Die Bodenschicht besteht aus *Stereocaulon paschale* 5, Cladinen und

¹ Erstmals ganz durchgeführt in C. E. Moss, *Geographical distribution of vegetation in Somerset: Bath and Bridgwater District*. Royal Geographical Society, London, 1906. Für ganz Grossbritannien durchgeführt in dem hervorragenden Werk: A. G. Tansley, *Types of British Vegetation*. Cambridge, 1911.

Cetrarien 2, *Hylocomium* und *Polytrichum* 3, *Linnaea borealis* 2; als Epiphyten Baumflechten.

Um zum Ausdruck zu bringen, dass die höheren Schichten mehr Masse darstellen und wichtiger sind, hat **Sernander** die Figur etwas verändert, d.h. die höheren Schichten breiter gezeichnet, was folgendes Beispiel (aus **Lagerberg** 1914¹, S. 138) veranschaulichen mag:

Moosreicher Kiefernwald mit dichter Heidelbeerdecke.

a Hochwald: Kiefer,

d höchste Feldschicht: Fichte,

e mittlere Feldschicht: *Vaccinium myrtillus*,

f niederste Feldschicht: *Vaccinium vitis idaea*, *Calluna*,

g Bodenschicht: *Hylocomium parietinum*.

In anderer Weise wird die Morphologie behandelt in **Stebler** und **Schröter** 1892² zur Charakterisierung der schweizerischen Wiesentypen. Nach den Mengenverhältnissen werden Hauptarten, Nebenarten und Akzessorische unterschieden. Von da an führt Schröter in der Schweiz die Schätzung der Mengenverhältnisse in den Pflanzengesellschaften nach der Skala 1–10 ein. Merkwürdigerweise stützt er sich dabei auf Lecoq und nicht auf seinen Lehrer Heer. Das mag daher kommen, dass Heer diese Morphologie in einer Jugendarbeit ausgearbeitet hatte und seine Studien später eine andere Richtung genommen hatten. Stebler und Schröter führen ihre Untersuchungen nach einer gewichtsanalytischen Methode durch. Sie wählen einen typischen Fleck in der Pflanzengesellschaft aus, um an einem abgemessenen Quadrat die vorkommenden Arten und den genauen Anteil einer jeden zu bestimmen. Als Grösse nahmen sie einen Quadratfuss (der alte schweizerische Fuss hat eine Länge von 30 cm.). Der wurde ausgestochen und jedes Pflanz-

¹ **Torsten Lagerberg**. "Markfloras analys på objektiv grund. Meddelanden från Statens Skogsförsöksanstalt, 11." *Skogsvårdsföreningens Tidskrift*, 1914.

² **F. G. Stebler** und **Carl Schröter**. "Versuch einer Übersicht über die Wiesentypen der Schweiz. 10. Abh. der Beiträge zur Kenntnis der Matten und Weiden der Schweiz." *Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz*, 6. Bd. 1892. Bern, 1893.

zentriert, herauspräpariert, nach Arten gesondert, das Material jeder Art für sich getrocknet und gewogen. Auf diese Weise erhält man den genauen Anteil der Arten in Gewichtsprozenten am Aufbau des Quadratfusses der betreffenden Pflanzengesellschaft. Damit tritt in die Gesellschaftsmorphologie die Quadratmethode ein, die dafür von grosser Wichtigkeit wurde. Sie wurde später nicht nur gewichtsanalytisch ausgebeutet, sondern erwies sich auch für andere Methoden der Abundanzbestimmung, besonders für Zählmethoden brauchbar und wurde in England und Amerika weit ausgestaltet.

Pound und **Clements** 1898¹ benutzen zum Auszählen der Abundanz in der Prärie ein Quadrat von 5 m. Seitenlänge. Sie nennen dann cop¹ eine Spezies, die in mehr als 200 Exemplaren in diesem Quadrat vorkommt, cop² erhalten Arten mit 150–200 Exemplaren, cop³ mit 100–150 Stück, cop⁴ mit 50–100, subcop¹ 15–50, subcop² 5–15, spars mit 0,1–5 Stück.

Eine weitere Ausgestaltung gibt **Clements** der Quadratzzählung 1904² und 1905². Es werden hauptsächlich Quadrate von 1 m. Seite verwandt, grössere von 2 m. Seitenlänge sind nötig in Gehölzen und bei offener Vegetation. Es erfolgt nicht nur ein Zählen der Individuen, sondern auch ein Kartieren dieser Quadrate. Diese können markiert werden als Dauerquadrate, in denen man die Veränderungen der Vegetation im Laufe der Jahre nachweist. Denselben Dienst leistet auch die Modifikation von **Oliver** und **Tansley** 1904³, welche die Messquadrate zu Rastern vereinigen. Neben den besprochenen Zählquadraten, Kartenquadraten, Dauerquadraten verwendet **Clements** noch entblösste Quadrate, um Neubesiedelung experimentell zu untersuchen, ferner Linien- und Gürteltranssekte, das sind lineare Querschnitte durch die Vegetation.

Hier seien auch die **Jaccardschen** Untersuchungen von 1900, 1901, 1902, 1908, 1914⁴ erwähnt. Jaccard stellt sich die Aufgabe, Gesetzmässigkeiten für die Artverteilung im Raume zu finden. Er sucht zahlenmässige Verhältnisse zwischen Floren verschiedener Gebiete herzustellen und ferner Verhältnisse zwischen der Zahl der Arten und der Zahl der Gattungen. Je gleichartiger die Verhältnisse von Örtlichkeiten, um so höher wird in der Regel ihr Gemeinschaftskoeffizient sein innerhalb des gleichen Florengebietes. Die Untersuchungen Jaccards beziehen sich nicht auf Pflanzengesellschaften, sie sollen nicht zur Charakterisierung von solchen dienen, wie dies von einzelnen Forschern

¹ **Roscoe Pound** und **Frederic E. Clements**. *The Phytogeography of Nebraska*. I, General survey. Lincoln, Neb. 1898. (Second edition, 1900.)

² **Frederic E. Clements**. *The development and structure of vegetation*. Studies in the vegetation of the State III. Lincoln, Neb. 1904. **Frederic E. Clements**. *Research methods in ecology*. Lincoln, Neb. 1905.

³ **F. W. Oliver** und **A. G. Tansley**. "Methods of surveying vegetation on a large scale." *New Phytologist*, **3**, 1904.

⁴ Verschiedene Arbeiten über die Pflanzenverteilung in *Flora*, Bd. **90**, 1902; *Bull. Soc. vaud. sc. nat.* **38**, 1902; *Rev. gén. des sc.* Paris, 1907; *Bull. Soc. vaud. sc. nat.* **44**, 1908; *Rev. gén. bot.* **26**. Paris, 1914.

vorausgesetzt worden ist, sondern sie wollen die Gesetzmässigkeiten der Beziehungen der Florenbezirke aufdecken. Sie könnten vielleicht aber auch dazu verwendet werden, Verschiedenheit der Standorte darzustellen, daher die Erwähnung in der Gesellschaftsmorphologie.

Es folgt in den Jahren 1905, 1907 ein grosser Fortschritt in den die Lebensformen betreffenden Fragen durch die Arbeiten von **Raunkiär**¹. Er stellt ein Lebensformensystem auf Grund der epharmonischen Eigenschaft der Anpassung an die Überdauerung der ungünstigen Jahreszeit auf. In seiner Absicht liegt die Charakterisierung der Klimate durch den Anteil der einzelnen Lebensformen nach Artenzahl in bestimmten Gebieten. Der Zweck ist nicht auf Gesellschaftsbestimmung gerichtet, aber die aufgestellten Formen lassen sich auch zu diesem Zwecke benutzen, und sie wurden auch von Raunkiär 1909, von Vahl u.a. bald dazu benutzt. Er stellt 30 Lebensformen auf, die er aber meistens zur praktischen Verwendung in 10 Gruppen zusammenzieht. Von einem Gebiet gibt er dann den Prozentsatz an Arten jeder Lebensform an. Dies wird als biologisches Spektrum bezeichnet. Zur vergleichenden Beurteilung stellt er ein Normalspektrum auf, das die Prozentsätze der Arten der ganzen Erde vorstellen soll. Gewisse Modifikationen wurden von Ostenfeld und von Vahl an dem System ausgeführt.

Es folgt nun wiederum ein Wendepunkt für die floristischen Fragen der Gestaltsuntersuchung. Die bisher besprochenen Methoden richteten sich mehr oder weniger an den konkreten einzelnen Bestand, die Einzelsiedelung. Die Pflanzengesellschaft, in erster Linie ihre grundlegende Einheit, die Assoziation, ist naturgemässe eine Abstraktion, die Zusammenfassung der gleichen Bestandesindividuen. Eine Vergesellschaftung mit bestimmter Artenliste tritt in der Regel an vielen Örtlichkeiten mit gleichen Standortsbedingungen auf. Die Synthese aus vielen Einzelsiedelungen ergibt dann die Assoziation. Es ist also nötig, die Ähnlichkeiten der Artenlisten verschiedener Aufnahmen in Beziehung zu bringen. Dies lässt sich schätzungsweise oder dann statistisch durch Zusammenstellung der Artenlisten bewerkstelligen. Eine einzelne Aufnahme ist nicht in allen Bestandteilen das Mittel der Assoziation. Die Artenlisten werden nie ganz identisch ausfallen, eine gewisse Variation findet von einer Stelle zur andern stets statt. Um wieviel Arten dürfen nun zwei Listen sich unterscheiden, um noch zur selben Assoziation gerechnet zu werden? Darüber können all die bisher besprochenen Darstellungen der Mengenverhältnisse nur mangelhaft Auskunft geben. Ein Nebeneinanderstellen der zusammengehörenden Aufnahmen in Tabellenform, aus denen man die Ähnlichkeit herauslesen könnte, hat erstmals **Cajander** 1903² ausgeführt,

¹ **Christen Raunkiär**. *Planterigets Livsformer og deres Betydning for Geografien*. Kopenhagen, 1907.

² **A. K. Cajander**. "Die Alluvionen des unteren Lena-Tales. I. Abh. der Beiträge zur Kenntnis der Vegetation der Alluvionen des nördlichen Eurasiens." *Acta soc. scient. fennicae*, **32**, 1903.

aber die Konsequenzen für die Konstanz nicht daraus gezogen. Die klare Unterscheidung zwischen den Mengenverhältnissen der einzelnen Aufnahmen und den Konstanzverhältnissen der Assoziation hat erst **Brockmann** 1907¹ herausgearbeitet. Dieses neue morphologische Moment hat sich später so fruchtbar erwiesen und grösseren Ausbau erhalten, dass es hier etwas ausführlicher im Zusammenhang behandelt sei.

Die früheren Methoden der Abundanzprüfung wollen eigentlich zugleich auch herausfinden, was die Konstanten sind. Sie tun es nicht direkt, sondern indirekt nach folgender Überlegung: Die Arten, die in grösster Menge vorkommen, sind dem gegebenen Standort demgemäss am besten angepasst und werden wohl daher für die Assoziation bezeichnend sein. Dies wird in vielen Fällen zutreffen. Es ist aber auch möglich, dass lokale Umstände, besondere lokale Besiedlungsmöglichkeiten, Arten in einem Einzelbestand zum Vorherrschen bringen, die sonst nicht für die Assoziation bezeichnend sind. Durch die Brockmannsche Methode macht man sich erstens von diesen Zufälligkeiten unabhängig, zweitens noch von folgender Tatsache, die sonst verschleiern kann: Arten, die nicht wählerisch in Bezug auf Standort sind, die man euryözisch nennen kann, da sie verschiedene Standorte besiedeln, können an verschiedenen Örtlichkeiten herrschend werden, ohne dass diese Örtlichkeiten derselben Assoziation angehören, trotzdem sie äusserlich ähnlich aussehen können. Erst die Prüfung der Artenkonstanz ergibt objektiv die Zugehörigkeit der Einzelsiedelungen zum Typus, zur Assoziation. Man mache daher möglichst viele Aufnahmen einer Assoziation. Die Arten, die mindestens in der Hälfte aller Aufnahmen vorkommen, nennt Brockmann die Konstanten, solche die in weniger als der Hälfte aber mindestens in einem Viertel der Aufnahmen vorkommen, die Akzessorischen, die übrig bleibenden nennt er zufällige Beimischungen. Bei der Aufnahme der Einzelsiedelung ist auf Einheitlichkeit des Standorts zu achten. Dass an einem durchfliessenden Bächlein z.B. der Standort völlig anders ist, wird jedem klar sein, aber es kommen auch ganz geringe Veränderungen vor, über deren Zugehörigkeit man verschiedene Auffassungen haben kann, eine engere oder eine weitere. Bei der Konstanzbestimmung nach dieser statistischen Methode wird diese Subjektivität korrigiert. Die allzu breite Auffassung wird die Zahl der zufälligen Beimischungen erhöhen, sie aber als solche erkennen lassen, denn bei der Zusammenstellung der Aufnahmen in Tabellenform fallen schlecht gemachte Aufnahmen, die nicht zur Assoziation gehören, durch ihre heterogene Liste auf; man kann sie ausscheiden, und es zeigt sich klar, was wirklich zusammengehört. Hier korrigiert sich auch von selber der etwas zu viel sagende Satz, dass die Assoziation durch die gesamte Artenliste charakterisiert sei. Hier kann man die Beimischungen ausscheiden, die für die Assoziation nicht massgebend sind; vorbehalten die Treuebestimmungen, von denen

¹ **Heinrich Brockmann-Jerosch**. "Die Flora des Puschlav (Bezirk Bernina, Kanton Graubünden) und ihre Pflanzengesellschaften." *Die Pflanzengesellschaften der Schweizeralpen*, 1. Leipzig, 1907.

später die Rede sein wird. Die Konstanzbestimmung führt auch aus dem Wirrwarr der Übergänge heraus. Nicht jeder Fleck Erde trägt eine abgeschlossene Assoziation; es kommen unendlich viele Übergänge vor, die man nicht gleich erkennt; hier machen sie sich durch Fehlen von Konstanten, durch Auftreten und Häufigwerden fremder Beimischungen geltend.

Eine Hauptsache bei der Konstanzstatistik ist, dass man eine genügende Anzahl Aufnahmen macht und diese möglichst gleichmässig auf das Gebiet verteilt. Nimmt man viele Aufnahmen von ganz genäherten Flecken, so können Arten in die Massgebenden hineingeraten, die bei gleichmässiger Berücksichtigung des Gebietes nur Beimischungen sind. Kommt z.B. eine Art in 3 Aufnahmen von 6 vor, so wäre sie noch konstant, 2 weitere Aufnahmen ohne sie verweisen sie in die Reihe der Akzessorischen (3 von 8) und noch zwei weitere ohne sie (also 3 von 10) unter die Zufälligen. 6 Aufnahmen sind also unbedingt zu wenig, um vollwertige Massgebende daraus abzuleiten. Nehmen wir dagegen 30 Aufnahmen und eine Akzessorische darin komme 14 Mal vor: Sollte sie nun in 25 weiteren Aufnahmen auch gar nicht mehr vorkommen, so bleibt sie doch noch Akzessorische, denn 14 ist immer noch mehr als ein Viertel der Aufnahmen: $14 > \frac{1}{4}(30 + 25) = 13.75$.

Wie man in der morphologischen Systematik der Einzelpflanzen nicht einig ist, wie weit man eine Spezies oder Varietät fassen soll und die Zahl der Spezies von Forscher zu Forscher sehr variiert; so ist es auch bei den Assoziationen. Man kann verschiedener Ansicht sein, wieviele der Massgebenden (Konstante + Akzessorische) wechseln dürfen, dass man noch von derselben Assoziation sprechen darf, oder von einer neuen Assoziation oder nur einer anderen Subassoziatiön. An der Zahl gemeinsamer Konstanten kann die Verwandtschaft sich nahestehender Gesellschaften beurteilt werden. Eine ausgedehnte Anwendung der Konstanzbestimmung, sei es nach der statistischen Methode oder nach einer andern, z.B. einer schätzungsweisen, scheint mir berufen zu sein, viel Licht in das Wesen der Assoziation und ihrer Unterabteilungen zu bringen. Auch über die Konkurrenzverhältnisse der Arten und die Besiedlungsfähigkeit kann diese Bestimmung viel aussagen. Die von Brockmann für die Fettwiesen des Puschlav erstlich durchgeführte Konstanzbestimmung fand dann eine ausgedehnte Anwendung in den Pflanzengesellschaften des Berninagebietes durch **Rübel** 1911¹.

Diese statistische Methode hat die Wichtigkeit der Konstanz so richtig herausgearbeitet. Vorher und nachher wurden, ohne den Namen Konstanz zu brauchen und das Wesen der Angaben klarzulegen, die konstanten Arten in Gesellschaftsbeschreibungen stets als bedeutend hervorgehoben, als die Pflanzen, aus denen die Gesellschaft besteht, die sie bedingen oder aufbauen. Beim flüchtigen Beobachter waren es dann in Wirklichkeit nur Abundanzahlen weniger Beobachtungsorte, bei gründlichen Beobachtern hingegen kann diese bloss geschätzte Konstanz fast so richtig ausfallen wie die nach

¹ **Eduard Rübel**. "Pflanzengeographische Monographie des Berninagebietes." *Englers Bot. Jahrb.* 47. Bd. 1911 und im Buchhandel, Leipzig, 1912.

der statistischen Methode abgezählte. Ich verweise z.B. auf die vorzüglichen britischen Gesellschaftsbeschreibungen, die in ihren Bezeichnungen dominant, abundant, frequent, occasional Konstanz und Abundanz in einem Ausdruck zusammengefasst enthalten. Die Brockmannsche Methode hat nicht die Sache verändert, wohl aber klargelegt, dass in den allgemein üblichen Schätzungen des Aufbaus der Gesellschaft eigentlich verschiedene Eigenschaften stecken, die Konstanz und die Abundanz im weiteren Sinn (inkl. Dominanz und Geselligkeit), worin im besonderen der Bedeckungsgrad von Bedeutung ist. Wenn man von einer Art aussagt, sie sei in einer Gesellschaft dominierend, so liegt unausgesprochen deren Konstanz drin, ferner wird ihr ein bedeutender Deckungsgrad zugesprochen.

1909 veröffentlicht **Raunkiär**¹ eine neue Methode zur Bestimmung der Mengenverhältnisse. Er sucht das Subjektive des Schätzens durch ein objektiveres Zählen zu ersetzen, indem er ein Quadrat oder einen Kreis von $\frac{1}{10}$ m². Inhalt beliebig auswirft und die umschlossenen Arten bestimmt. Um konstante Zahlen zu erhalten, wird dies 50 Mal wiederholt. Bei der Zusammenstellung der Artenlisten gibt er die Zahl des Vorkommens einer Art in diesen Aufnahmen in Prozentsen an und nennt diesen Mengengrad die Valenz der Art. Für Wälder und Gebüsche eignet sich die Methode natürlich nicht.

Wieder eine andere Abart der Mengenbestimmung stammt von **Lagerberg** 1914 (Zitat siehe oben, S. 28) aus der schwedischen Forstakademie in Experimentalfältet. Statt des beliebigen Auswerfens der auszuzählenden Quadrate steckt er die Probefläche ab und wählt die Zählquadrate in gleichmässigen Abständen. Neben den Abundanzzahlen, er nennt sie Frequenzprozente, bestimmt er noch die Arealprozente, das sind die Deckungsverhältnisse wuchernder Arten, wobei nur bis zu bedeckten Viertelsquadraten hinunterzugehen ist. Diese Auseinanderhaltung ist von Bedeutung. Es ist die Scheidung der eigentlichen Abundanz von der Dominanz, die auch anderwärts noch zur Geltung kommt. Auf die für die Gesellschaftsbestimmung notwendige Einheit des Standorts wird hier nicht gesehen, da die Methode nicht aus soziologischen Gründen ausgearbeitet wurde, sondern zur praktischen Beurteilung forst- und landwirtschaftlicher Böden.

In den letzten Jahren hat sich die Frage der *Gesellschaftstreue* entwickelt. Schon früher wurde die Frage gestreift und hie und da einzelnes darüber ausgesagt. Höck sprach von Begleitern, die in bestimmtem geographischem Bezirk stets mit bestimmten anderen Pflanzen zusammen vorkommen, so die Buchenbegleiter in Deutschland u.s.w. Gradmann und Schröter nennen Leitarten solche, die eine geographische Varietät einer Gesellschaft charakterisieren. Die eigentliche Gesellschaftstreue wird durch die Charakterpflanzen dargetan, die für eine Gesellschaft wirklich charakteristisch oder spezifizierend sind.

Gute Resultate wird die Treue ergeben, wenn man sie klar aus den andern

¹ **Christen Raunkiär**. "Formationsundersögelse og Formationsstatistik." *Botanisk Tidsskrift*, 30. Bd. Köbenhavn, 1909.

Fragen herauschält. In der Entwicklung war sie naturgemäss mit den andern Fragen, besonders mit der Konstanz vermischt. Bei Brockmann 1907 ging die Ausscheidung der Konstanten voraus und erst unter diesen wurde nach Ubiquisten und Charakterarten unterschieden, wodurch man die durch gleichzeitige Konstanz wichtigen erhält, aber die Gruppe der seltenen und doch treuen Arten nicht. **Braun** in den Cevennen 1915¹ dagegen sucht zuerst die Charakteristischen heraus, hernach folgen seine Konstanten, die aber nur noch die Ubiquisten enthalten. Diese hier noch vermischten Fragestellungen finden ihre klare Auseinanderhaltung endlich 1918 in Brauns Unterengadin². Er unterscheidet dort 5 Treuegrade (degré de fidélité³):

(a) Charakterarten

5 gesellschaftstreu, exclusif³

4 gesellschaftsfest, électif

3 gesellschaftshold, préférant

(b) Sekundanten

2 gesellschaftsvag, indifférent

(c) Zufällige

1 gesellschaftsfremd, étranger

Die Gesellschaftstreue kann natürlich nicht nur auf die Assoziation angewendet werden; auch Einheiten höheren Ranges können durch treue Arten charakterisiert sein. Es gibt also eine Treue zu einer einzigen Assoziation, Treue zu mehreren verwandten Assoziationen, auch Treue zu ganzen Formationsgruppen. Man sei sich daher klar, dass eine Art innerhalb mehrerer Assoziationen gesellschaftsvag sein kann, aber der Formationsgruppe treu. Z.B. ist *Phragmites* der Formationsgruppe der Sümpfe, Emersiprata, treu, vagiert aber in Scirpeten, Phragmiteten u.s.w. herum. Ebenso kann eine Art der Formationsgruppe der Nadelwälder treu sein, aber vielen ihrer Assoziationen angehören.

Es ist auch möglich, dass eine Art nicht für die ganze Assoziation treu ist, sondern nur in einer geographisch beschränkteren Region als die Assoziation vorkommt. Dadurch werden geographische Varietäten von Assoziationen charakterisiert. So ist z.B. *Phyteuma pedemontanum* in der Schweiz dem Caricetum curvulae sehr treu, in den ostalpinen Curvuleten kommt sie nicht mehr vor, sie ist dort durch *Phyteuma pauciflorum* ersetzt. Diese Charakterpflanze ist also zugleich Leitpflanze eines Bezirkes. In diesem Sinne gibt es

¹ **Josias Braun-Blanquet**. "Les Cévennes méridionales (massif de l'Aigoual), étude phytogéographique. Études sur la végétation méditerranéenne I." *Arch. des Sc. phys. et nat.* sér. 4, 5, 39 et 40. Genève, 1915. (See notice in this JOURNAL, 5, p. 113.)

² **Josias Braun-Blanquet**. *Eine pflanzengeographische Exkursion durchs Unterengadin und in den schweizerischen Nationalpark*. Beiträge zur geobotanischen Landesaufnahme 4; hsg. von der Pflanzengeographischen Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. Zürich, 1918.

³ **Josias Braun-Blanquet**. "Schedae ad floram raeticam exsiccatam." *Jahresber. der Naturf. Ges. Graubünden*, 58. Chur, 1918.

auch edaphische Varietäten einer Assoziation, die voraussichtlich aber eher durch variierende Konstanzverhältnisse charakterisiert sind als durch wechselnde Treueverhältnisse. Es sind dies die unter dem Namen Nebentypen (Subassoziationen) oft beschriebenen Gesellschaften.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu Brauns Unterengadiner Arbeit zurück. Ausser der klaren Scheidung von Treue und Konstanz werden in derselben auch noch die verschiedenen Fragen der Mengenverhältnisse klar auseinandergehalten, das "absolute Mengenverhältnis" oder die Abundanz im engern Sinn, das "relative Mengenverhältnis" oder Deckungsverhältnis, Dominanz und die Geselligkeit:

Abundanz	Deckung	Geselligkeit
5. Sehr zahlreich (très abondant)	vorherrschend (prédominant)	herdenweise (peuplement)
4. Zahlreich (abondant)	mitbestimmend (codominant)	scharenweise (petit peuplement)
3. Wenig zahlreich (peu abondant)	zurücktretend (peu apparent, diffus)	truppweise, grössere Polster (troupe, coussins)
2. Spärlich (rare)	untergeordnet (effacé)	gruppenweise, Horste (groupe, touffes)
1. Sehr spärlich (très rare)	völlig untergeordnet oder verschwindend (totalement effacé ou disparaissant)	einzeln (isolé)

Hier gibt Braun für jede Eigenschaftskategorie 5 Grade, empfiehlt jedoch in der Praxis Abundanz und Dominanz nicht zu scheiden, sondern in einer Zahl anzugeben nach der allgemeinen Skala 1–10.

Eine ganze Reihe Fragen der Gesellschaftsmorphologie und der Gesellschaftssystematik erörtert **Gams** 1918¹. Was die Lebensformen anbetrifft, baut er auf Raunkiär. Da er aber nicht die Charakterisierung des Klimas, sondern der Pflanzengesellschaften beabsichtigt, kommt er zu einigen andern Formen. Vor allem ist von Bedeutung, dass Gams die Kryptogamen miteinbezieht und für diese Lebensformen aufstellt. Ferner werden Raunkiärs Geophyten und Therophyten anders geschieden in Xerogeophyten und Eugeophyten u.s.w. Gams stellt phaeno-ökologische Spektren von Gesellschaftsaufnahmen her, die Beachtung verdienen. Vor allem greift er aber die Schichten Hults, die "Bestände" Kerners, in ihrer ursprünglichen Bedeutung (siehe S. 23, 24) wieder auf und verwendet das Erkennen und Studieren dieser ökologischen Teile einer Pflanzengesellschaft zu deren genaueren Charakterisierung.

Pavillard 1919² will neben die Gesellschaftstreue noch einen "facteur génétique" setzen, der mit dieser zusammen die "valeur sociologique" einer Pflanze ausmache. Mit Recht weist er darauf hin, dass für den Buchenwald *Fagus* viel wichtiger sei als die allertreueste *Corydalis* oder *Dentaria*. Für die

¹ **Helmut Gams**. "Prinzipienfragen der Vegetationsforschung; ein Beitrag zur Begriffsklärung und Methodik der Biocoenologie." *Vierteljahrsschrift der Naturf. Ges. in Zürich*, 63. Bd. 1918. (See notice in this JOURNAL, 7, p. 98.)

² **J. Pavillard**. *Remarques sur la nomenclature phytogéographique*. Montpellier, 1919.

“importance génétique” (Sie ist nicht eigentlich genetisch, eher mit “bedingend” zu übersetzen) schlägt er Grade wie “édificateur” (aufbauend), “conservateur” (erhaltend), indifferent und “destructeur” (zerstörend) vor. Neu ist der negative Grad “zerstörend”; die positiven Grade jedoch scheinen sich grösstenteils zergliedern zu lassen in einen Konstanzfaktor und einen Deckungsfaktor. Unter Anwendung desselben Beispiels kann man sagen: Da die Buche im Buchenwald konstant und deckend ist, hat sie grossen aufbauenden Wert.

In allen Ländern beschäftigen sich eine Reihe Forscher mit den Begriffen der Soziologie, die sehr oft in die Morphologie hineinspielen, aber in erster Linie zur Gesellschaftssystematik gehören, auf die ich aber in diesem kurzen historischen Morphologie-Abriss nicht eingehen will.

Damit ist in kurzen Zügen die Entwicklung der anfangs aufgestellten gesellschaftsmorphologischen Fragen aufgezeigt. Nicht dass damit schon alles bestimmt wäre, was aus der Gestalt der Assoziation in Zukunft noch zu lernen sein wird, aber die Gestalt der Assoziation ist durch diese Feststellungen recht gut charakterisiert. In Zukunft dürfte vielleicht die Sukzessionslehre sich auch mit morphologischen Fragen beschäftigen, bisher ist sie stets ihre eigenen, fast rein ökologischen Wege gegangen. Als Zusammenfassung möchte ich als Antwort auf die gestaltlichen Fragestellungen einige Beispiele ausführen. Auf Beispiele in der Literatur kann nicht verwiesen werden, da die auseinandergelegten Gesichtspunkte noch nirgends alle nebeneinander behandelt worden sind. Viele Werke geben nur die Abundanz oder mit dieser kombinierte oder vermischte Bezeichnungen, einige Arbeiten die Konstanz und Abundanz, aber ohne die wichtige Treue und die Lebensformen, wenige die Treue, aber dann wiederum ohne durchgreifende Konstanztabellen u.s.w.

Die folgenden Beispiele entsprechen auch nicht ganz den Ansprüchen, die jetzt an sie zu stellen wären, sie sollen nur die Richtung andeuten, in der noch vieles in der Morphologie zu leisten sein wird. Vom ersten Beispiel findet sich die Tabelle über floristische Zusammensetzung, die Konstanz und Abundanz in der Veröffentlichung 1911 (Zitat S. 32), Treue und Lebensformen konnten nachträglich beigelegt werden, es fehlen jedoch etwaige Bodenkryptogamen. Das zweite Beispiel konnte durch dessen Verfasser Braun (Zitat S. 34) umgruppiert und ergänzt werden, sodass es hier dient; es sind aber ebenfalls die Kryptogamen unberücksichtigt geblieben, sowie die Gruppierung der Synusien (Schichten, “Bestände”).

1. BEISPIEL (S. 38–9).

Caricetum curvulae im Berninagebiet (Engadin).

Die Assoziation geniesst ein hochalpines Klima. Sie ist im Berninagebiet von 2300–3120 m. verbreitet als höchststeigender Wiesentypus. Sie bevorzugt ebene und schwach geneigte Flächen, besonders Südlagen. An südgerichteten Hängen vermag sie auch steilere Lagen zu bekleiden. Die Assoziation ist kalkfliehend. Die folgende Tabelle besteht aus 19 Aufnahmen (genaue Lokal-

beschreibungen siehe **Rübel** 1911, S. 174), die sich auf das Berninagebiet verteilen.

Am bedeutsamsten in der Liste ist *Carex curvula*. In der vollen Konstanz und der hohen Abundanz zeigt sich ihr aufbauender Wert. Dazu kommt noch ihre Gesellschaftstreue. Sie ist also in allen Richtungen von grossem Gewicht, ihre soziologische Wertigkeit ist sehr hoch und überragt alle andern Komponenten. An zweiter Stelle folgt *Sesleria disticha*. Sehr treu und konstant sind ferner noch *Phyteuma pedemontanum* und *Senecio carniolicus*, allerdings nicht mehr deckend wie die ersten. Von ziemlich hohem soziologischem Wert sind dann die 5 Konstanten, die noch gesellschaftshold (Treue 3) sind und die 4 treuen, die wenigstens noch Akzessorische sind. Eine gewisse Rolle spielen die konstanten Ubiquisten *Chrysanthemum alpinum*, *Poa alpina*, *Polygonum viviparum*, besonders die reichlich vorkommende erste. Nach den Lebensformen ist die Gesellschaft einfach aufgebaut. Die grosse Mehrzahl der Arten sind Hemikryptophyten, halten also ihre Überdauerungsknospen an der Bodenfläche. Unter diesen befinden sich alle die besonders soziologisch hochwertigen. Eine kleinere Zahl erhebt ihre Überdauerungsknospen etwas über den Boden, es sind Chamaephyten; unter den 3 Konstanten aber nur eine gesellschaftshold, die andern indifferent. Das ganze erweist sich also als ausgesprochene Hemikryptophytengesellschaft.

2. BEISPIEL (S. 40).

Der Buchenwald der Cevennen.

Der Buchenwald findet sich in üppiger Ausbildung in der nebel- und regenreichen Stufe am Aigoual von 800–1500 m., wo er die Waldgrenze bildet. Die folgende Tabelle besteht aus 14 Aufnahmen, die alle auf Urgesteinsboden aufgenommen worden sind (für genaue Beschreibungen siehe **Braun** 1915, S. 103).

Der Wald ist von prachtvoll einheitlicher Zusammensetzung, Zufällige und Akzessorische sind fast fehlend. Die Reihe der Konstanten ist sehr gross und was von besonderer Bedeutung ist, sind viele Arten Charakterarten und zugleich konstant. Von höchster soziologischer Wertigkeit ist *Fagus sylvatica*, welche die Gesellschaft direkt bedingt. In zweiter Linie folgen die treuen, konstanten *Asperula odorata* und *Anemone nemorosa*, die hie und da reichlich aber doch nicht dominierend sind. *Calamintha grandiflora* und *Milium effusum* sind auch sehr treu, ziemlich konstant und hie und da noch reichlich, u.s.w. An Lebensformen ist die dominierende Art Phanerophyt, das ganze ist also ein Wald. Darunter sind die meisten Arten Hemikryptophyten, eine Anzahl Geophyten, nebst nur ganz vereinzelt andern Formen. Trotz der grossen Zahl der Hemikryptophyten ist die Lebensform der Geophyten doch die für den Buchenwald bedeutsamere, da ihr die soziologisch höchstwertigen zum allergrössten Teile angehören.

Dieser kurz skizzierte Gang durch das Werden der Morphologie der Gesellschaften zeigt uns, wie vieles geleistet wurde und wie viel noch zu

Caricetum curvulae im Berninagebiet. (Rübel 1911, S. 174, u. erg. 1919.)

Lebens- form	Nr. der Aufnahme: Höhe in m.:	15 Konstante:															Zahl des Vorkom- mens					Treue
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2300	2450	2500	2590	2670	2710	2720	2730	2750	2770	2810	2830	2880	2930	2950	2977	3030	3080	3120		
H	<i>Carex curvula</i> ...	7	8	7	10	6	10	8	6	8	10	10	8	8	8	10	6	10	8	9	19	4
H	<i>Chrysanthemum alpinum</i>	1	4	1	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	19	2
H	<i>Sesleria disticha</i> ...	...	1	1	1	1	1	2	6	6	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	16	4
H	<i>Poa alpina</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	2
H	<i>Avena versicolor</i> ...	...	3	1	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	3
H	<i>Polygonum viviparum</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2
H	<i>Phyteuma pedemontanum</i>	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4
Ch	<i>Minuartia sedoides</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3
Ch	<i>Silene acaulis</i> u. <i>excapa</i>	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2
H	<i>Senecio carniolicus</i>	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	4
H	<i>Leontodon pyrenaicus</i> ...	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	3
Ch	<i>Saxifraga bryoides</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	2
H	<i>Phyteuma hemisphaericum</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3
H	<i>Salix herbacea</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1 (Schneetälchen)
H	<i>Gentiana punctata</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3
28 Akzessorische:																						
H	<i>Luzula lutea</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	4
H	<i>Ligusticum mutellina</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2
H	<i>Potentilla aurea</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2
H	<i>Gentiana bavarica imbricata</i>	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1 (Felschutt auf Si)
H	<i>Festuca Halleri</i> ...	...	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	4
H	<i>Hieracium alpinum</i>	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2
H	<i>Sieversia montana</i>	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2
H	<i>Pedicularis Kernerii</i>	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	4
H	<i>Juncus trifidus</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	3
Ch	<i>Loiseleuria procumbens</i> ...	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	7	3
Ch	<i>Sempervivum montanum</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	2
Ch	<i>Sedum alpestre</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	2

H	Luzula spicata ...	...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
T	Euphrasia minima	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	2
H	Gnaphalium supinum	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	2
Ch	Cetraria spec. ...	...	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1 (Schneetälchen)
Ch	Cladonia spec. ...	...	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	2
H	Veronica bellidoides	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2
Ch	Saxifraga exarata	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	3
H	Homogyne alpina	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1 (Silikatfels)
H	Luzula spadea ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2
H	Antennaria carpathica	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1 (Luzuletum spadiceae)
H	Gentiana Kochiana	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4
H	Doronicum Clusii	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2
H	Ranunculus glacialis	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1 (Felschutt auf Si)
H	Sibbaldia procumbens	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1 (" ")
H	Erigeron uniflorus	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1 (Schneetälchen)
H	Agrostis rupestris	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2
Ferner vorhanden:																							
H	Taraxacum officinale alp.	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2
H	Primula viscosa All.	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1 (Silikatfels)
H	Anthoxanthum odoratum	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2
Ch	Vaccinium uliginosum	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2
H	Poa laxa ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1 (Felschutt auf Si)
Gesamtzahl der Arten	...	...	53	27	51	17	42	37	21	14	35	19	11	29	15	32	34	21	10	15	14		
Konstante u. Akzessorische	...	...	25	21	34	16	27	25	21	13	25	17	10	25	15	27	31	18	8	12	12		
Charakterarten	...	...	9	9	12	7	7	8	8	7	9	7	3	10	6	13	9	7	3	4	4		
Bestandesfremde	...	...	2	2	4	1	4	3	2	2	7	1	2	3	4	2	6	5	4	4	4		

Je in drei der obigen Aufnahmen fanden sich: Agrostis alpina, Cardamine resedifolia, Anemone alpina ssp. sulfurea, Ranunculus geraniifolius, Primula integrifolia, Cerastium uniflorum.

Die Buchenassoziation der Südcevennen. (Braun 1915, S. 104, u. erg. 1919.)

Lebens- form	Nr. der Aufnahme: Höhe in m.:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14														Zahl des Vorkom- mens	Treue
		1150	1250	1250	1280	1300	1320	1330	1350	1350	1420	1450	1460	1480	1510		
Konstanten	P <i>Fagus silvatica</i> ...	...	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	14	4
	G <i>Asperula odorata</i> ...	...	1	4-8	1-10	1	1-6	1	6	8	4-8	1-9	1	1	1	14	5
	H <i>Galeobdolon luteum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	14	4
	G <i>Anemone nemorosa</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1-6	1	1	1	14	4
	H <i>Oxalis acetosella</i> ...	...	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	3
	H <i>Viola silvatica</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	2
	H <i>Adenostyles alliariae</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	1*
	H <i>Epilobium montanum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	3
	H <i>Luzula nivea</i> ...	...	1	1	1-6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3
	H <i>Prenanthes purpurea</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	11	3
	H <i>Stellaria nemorum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	4
	G <i>Paris quadrifolia</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	10	4
	G <i>Majanthemum bifolium</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	10	3
	G <i>Adoxa moschatellina</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	4
	G <i>Calamintha grandiflora</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1-7	1-4	1	1	1	1	1	8	5
	G <i>Milium effusum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1-6	1-9	1	1	1	1	9	5
	H <i>Myosotis silvatica</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2
	H <i>Geranium Robertianum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2
	T <i>Moehringia trinervia</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2
	G <i>Conopodium denudatum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2
Akzessorische	H <i>Poa nemoralis</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2
	H <i>Athyrium filixfemina</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	8	2
	H <i>Aspidium filixmas...</i>	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	2
	H <i>Doronicum austriacum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	7	1*
	H <i>Lactuca muralis</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	2
	H <i>Ranunculus nemorosus</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	2
	H <i>Phyteuma spicatum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	2
	H <i>Hieracium murorum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2
	H <i>Dentaria pinnata</i> ...	...	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	5
	H <i>Aspidium spinulosum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	3
	H <i>Melandrium diurnum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2
	G <i>Polypodium dryopteris</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3
	H <i>Rubus idaeus</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3
	G <i>Allium ursinum</i> ...	...	1	1	1-10	1	1-10	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
	G <i>Scilla bifolia</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
	H <i>Polygonatum verticillatum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
	H <i>Lamium maculatum</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3
	Ch <i>Veronica chamaedrys</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2
	G <i>Doronicum pardalianches</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
	G <i>Corydalis solida</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4
	G <i>Dentaria digitata</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	5
	H <i>Luzula maxima</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
	Ch <i>Veronica montana</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	5
	G <i>Corydalis cava</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	G <i>Corydalis fabacea</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
	H <i>Festuca silvatica</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
	H <i>Blechnum spicant</i> ...	...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Gesamtzahl der Arten ...		...	24	27	28	24	23	21	22	31	35	34	28	27	23	27	
Konstanten ...		...	16	24	18	17	19	16	16	22	23	24	19	18	16	20	
Akzessorische ...		...	3	2	5	4	3	2	3	5	6	4	5	4	2		
Charakterarten ...		...	17	16	14	15	13	9	16	16	15	16	16	19	14	14	
Bestandesvage ...		...	5	10	9	7	8	8	4	10	12	12	8	4	4	6	
Bestandesfremde ...		...	0	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	

* (Hochstaudenflur).

leisten bleibt auf diesem Teilgebiet der Soziologie. Ich wollte nur einige hervorspringende Punkte der Entwicklung erwähnen; auf jeder Stufe erfolgte vielfache Anwendung unter einer Menge geringerer Modifikationen, die aber kaum prinzipiell neues hineinbrachten. Meist sind die Arbeiten anderer Fragen wegen unternommen worden und der Fortschritt in Gesellschafts-morphologie wurde nebenbei erreicht, aber es ist nach und nach doch ein eigenes Gebäude entstanden, das der Pflege verdient.