Periastron: 1917 Sept. 16.427 m. Z. Greenw.

$$\omega = 101^{\circ} 24'$$

$$e = 0.508$$

$$a \sin i = 32700000$$

$$m_1 + m_2 = 3.32 \odot / \sin^3 i$$

in naher Übereinstimmung mit den aus der *Vogelschen* Kurve von *Eberhard* berechneten Werten (ApJ 13). So wie bei *Eberhard* und später auch bei *Ludendorff* ist dabei auch hier diejenige Komponente als bewegt angenommen, welche 1901 März 24 eine positive Radialgeschwindigkeit hatte. Sie erreicht nach der Geschwindigkeitskurve die Geschwindigkeit $V=0$ beim Übergang von positiven zu negativen Geschwindigkeitswerten zur Zeit 1917 Sept. 16.20 m. Z. Greenwich. Nennt man diese Zeit T_0 , die Zeit des Periastrons aber T , so treten nach den neuen Bahnelementen die Konjunktionen zu folgenden Zeiten ein

$$\text{Obere Konj.: } T \left\{ \begin{array}{l} +20^d 348 \text{ oder} \\ -0.183 \end{array} \right\} = 1917 \text{ Sept. 16.24 m. Z. Gr.}$$

$$\text{Untere Konj.: } T + 8.572 = 1917 \text{ Sept. 25.00 m. Z. Gr.}$$

$$\text{oder zur Zeit Obere Konj.: } T_0 + 0^d 04$$

$$\text{Untere Konj.: } T_0 + 8.80$$

Das Zeitintervall von der oberen Konjunktion zur unteren beträgt also bei den neuen Elementen fast 9^d .

In seinen eingangs erwähnten Publikationen (AN 205.105) rechnet *Guthnick* mit Phase 0: 1917 Febr. 14.00 + $20^d 536 \cdot E$, woraus mit *Eberhards* Elementen die Zeiten der Konjunktionen zu

$$\text{Obere Konj.: 1917 Sept. 17.9}$$

$$\text{Untere Konj.: 1917 Sept. 27.0}$$

folgen würden, während seine Lichtwechselemente eine Verfrühung von $1^d 9$ resp. $1^d 4$ verlangen. Da meine neuen spektroskopischen Elemente nach den obigen Zeiten für die Konjunktionen gegen *Eberhards* Bahn eine Verfrühung von $1^d 7$ resp. $2^d 0$ bringen, bleibt also nunmehr lediglich ein Fehler von $+0^d 2$ resp. $-0^d 6$ in der oberen resp. unteren Kon-

Wien, 1919 im Februar.

junktion im Sinne »*Hnatek* – *Guthnick*« oder »Spektrum – Lichtwechsel« übrig.

Mit Rücksicht auf die schwache mir zur Verfügung stehende Dispersion ist demnach die Übereinstimmung meiner spektroskopischen Bahn mit den photoelektrisch bestimmten Lichtwechselementen eine recht bemerkenswerte.

Weitere Beobachtungen, die ich mit der 60 cm-Kamera des Coudé-Spektrographen schon mit Rücksicht auf die noch offen gebliebene Frage nach eventuellen Gesetzmäßigkeiten im Verhalten der Linien der beiden Komponenten anstellen will, werden diese Übereinstimmung vielleicht noch weiter verbessern können.

A. Hnatek.

Veränderliche Eigenbewegung von R Lyrae? Von H. Kienle.

Bei seinen Parallaxenbestimmungen am Meridiankreise der Münchener Sternwarte benutzte Herr *Grossmann* zur Ableitung der Instrumentalfehler unter anderem auch vielfach R Lyrae. Dabei ergab sich die Uhrkorrektur aus diesem Stern unter Benutzung der RA. des Berliner Jahrbuchs stets um etwa $0^s 05$ größer als aus den anderen Fundamentalsternen, was auf eine negative Korrektur der F. K.-Position von diesem Betrage schließen ließ. Meine eigenen Zeitbestimmungen zeigten dieselbe Erscheinung. Der Grund der Abweichung konnte in einem Fehler der EB. des Sternes zu suchen sein. *Auwers* gibt $\mu = +0^s 0028$, *Boss* $+0^s 0026$. Letzterer gibt den wahrscheinlichen Fehler von α für die Epoche 1879.3 zu $0^s 04$, den von 100μ zu $0^s 26$ an, sodaß man für 1918 zu einem wahrscheinlichen Fehler für α von $\pm 0^s 007$ käme. Die tatsächliche Abweichung zu diesem Zeitpunkt beträgt aber $.1\alpha = -0^s 049$ (Mü. – *Boss*) bzw. $-0^s 051$ (Mü. – *Auwers*), ist also um ein Vielfaches größer. Überdies ist die Differenz nach den hiesigen Beobachtungen, die sich von 1908 bis 1918 erstrecken, offenbar zeitlichen Schwankungen unterworfen.

Um die Frage aufzuklären, begann ich im Frühjahr 1917 eine Beobachtungsreihe am Meridiankreise. Sie wurde in ähnlicher Weise durchgeführt wie dies Herr *Grossmann* bei seinen Parallaxenbestimmungen tat, nur mit dem Unterschied, daß die Beschränkung auf die parallaktischen Extreme wegfiel. Die Gruppe wurde vielmehr von Mai bis Oktober möglichst oft beobachtet, und nur äußere Verhältnisse ließen in den Sommermonaten gelegentlich längere Pausen eintreten. Als Vergleichsterne dienten 9 Sterne von $6^m 5$ bis $7^m 9$, die dem A. G. Bonn entnommen wurden. Zur Bestimmung des Azimuts wurde λ Ursae min. benutzt und der Anschluß an den F. K. geschah mit Hilfe von 109 Herculis, α Lyrae, δ Lyrae, γ Cygni, δ Aquilae, β Cygni. Eine ausführliche Diskussion des über vier parallaktische Extreme sich erstreckenden Beobachtungsmaterials wird an anderer Stelle gegeben werden. Hier sei nur kurz auf R Lyrae hingewiesen.

1. Aus den Zeitbestimmungen der Jahre 1908–1916 resultieren die in der folgenden Tabelle 1 zusammengestellten $.1\alpha$ im Sinne Mü. – F. K.

Tabelle 1.

Datum	$\Delta\alpha$	m	Datum	$\Delta\alpha$	m
1908 Okt. 4	-0°063	4	1913 Sept. 27	-0°027	3
» 6	+	13	» 29	-	55
» 7	+	5	Okt. 2	-	73
» 8	-	36	» 14	-	98
» 9	-	16	» 17	-	23
» 20	-	75	» 23	-	53
1910 Mai 28	-	50	» 25	-	40
Juni 4	-	57	1914 Juni 3	-	62
» 18	-	8	» 20	+	30
Okt. 6	+	13	» 26	-	6
» 7	+	8	Juli 30	-	40
» 18	-	10	Aug. 10	-	59
1911 April 18	-	50	» 11	-	38
» 21	-	72	» 19	-	22
» 22	-	44	» 20	-	74
» 25	-	44	» 24	-	70
Mai 2	-	34	» 29	-	27
Juni 22	-	30	» 31	-	17
Aug. 2	-	24	Sept. 1	-	33
Sept. 20	-	43	» 4	-	43
Okt. 11	-	123	» 9	-	43
» 12	-	114	» 15	-	73
» 13	-	25	» 16	-	50
» 16	-	23	» 24	-	33
» 17	-	35	» 25	-	74
» 18	-	101	» 26	-	52
» 19	-	89	» 30	-	17
» 21	+	5	Okt. 1	-	40
» 23	-	50	» 5	-	87
» 25	-	57	» 11	-	47
» 26	-	61	» 22	-	30
Nov. 1	-	32	1915 Juli 26	-	41
» 2	-	26	Aug. 3	-	13
» 8	-	46	» 9	-	13
1912 April 23	-	20	» 19	+	10
» 24	-	64	» 24	-	20
» 26	-	55	Sept. 1	-	44
Aug. 3	-	69	» 7	-	40
Okt. 5	-	29	» 13	-	37
» 10	-	31	» 20	-	27
1913 Juni 3	+	3	1916 Aug. 22*	-	46
» 7	-	13	» 26*	-	70
» 10	-	27	Sept. 2	-	20
» 16	-	30	» 9*	-	93
» 17	-	3	» 22*	-	20
Sept. 11	-	27	Okt. 1	-	128
» 16	-	87	» 9*	-	132
» 26	-	19	» 17	-	77

Unter m ist je die Anzahl der Sterne angegeben, die den Anschluß an den F.K. vermitteln. Die mit * bezeichneten Beobachtungen von 1916 stammen von mir und ergeben genau den gleichen Mittelwert für $\Delta\alpha$ wie die Beobachtungen *Grossmanns*.

2. Die Ausgleichung der Beobachtungen von 1917-18 führt auf die folgenden Werte für RA., EB. und Parallaxe:

$$\alpha_{1918.00} = 18^h 52^m 50^s 361 \pm 0^s 0031$$

$$\mu = +0^s 0064 \pm 0^s 0064 \quad \pi = -0^s 025 \pm 0^s 046.$$

Die EB. ist in Anbetracht der unsicheren Bestimmung mit der Katalog-EB. verträglich, die Parallaxe kann als unmeßbar bezeichnet werden, was mit der Anschauung übereinstimmt, daß die Sterne vom Spektraltypus M weit von uns entfernt sind. Dagegen hinterläßt die Darstellung Reste durchaus systematischer Natur, wie die folgende Tabelle 2 zeigt.

Tabelle 2.

1917	B-R	1917-18	B-R	1918	B-R
Mai 4	-0°018	Sept. 6	+0°040	Mai 28	+0°002
10	-	7	-	31	+
12	+	11	+	9	-
13	-	18	-	14	+
18	-	23	+	16	-
20	+	24	-	25	-
25	-	26	-	28	-
Juni 3	+	Okt. 1	+	30	+
11	-	2	-	15	-
18	+	3	-	16	-
24	+	4	+	17	-
Juli 12	-	5	+	31	+
22	-	6	+	Aug. 12	-
Aug. 18	+	7	+	15	+
22	+	8	+	16	-
23	+	9	+	25	-
25	-	10	-	26	-
27	-	11	-	Okt. 3	-
Sept. 4	-	12	+		
5	+	13	+		

Leider machen sich die durch die Ungunst der Verhältnisse bedingten Lücken recht unliebsam bemerkbar und lassen keine rechte Anschauung über den Verlauf der übrigen bleibenden Fehler zu. Deutlich zu erkennen ist nur der Anstieg in der ersten Epoche und der Abfall in der dritten. Der Abfall in der zweiten Epoche ist zweifelhaft, und in der vierten ist die Anzahl der Beobachtungen zu gering. Insbesondere entzieht sich aber dem Beobachter am Meridiankreise die ganze Zeit von Oktober bis Mai. Man kann also aus der vorliegenden Beobachtungsreihe nur auf das Vorhandensein von systematischen Schwankungen schließen, ohne zunächst etwas Näheres über sie aussagen zu können.

3. Mittelt man die Werte der $\Delta\alpha$ aus Tabelle 1 für die einzelnen Jahre und fügt diesen noch die für 1917 und 1918 gewonnenen Ergebnisse hinzu, dann gelangt man zu der folgenden Zusammenstellung.

Tabelle 3.

Jahr	$\Delta\alpha$	m	F.
1908	-0°029	$\pm 0^s 015$	6
1910	17	12	6
1911	51	7	22
1912	45	8	6
1913	38	8	15
1914	42	5	24
1915	25	5	9
1916	73	15	8
1917	54	4	38
1918	48	4	29

Die mittleren Fehler für 1908-1916 sind aus der Übereinstimmung der Einzelwerte gerechnet und sollen nur eine

ungefähre Abschätzung der Unsicherheit ermöglichen. n ist die Anzahl der zu einem Mittel vereinigten Werte. Eine anschauliche Vorstellung gewinnt man durch eine kleine

Zeichnung, in der die Werte der Tabelle 3 graphisch aufgetragen sind (s. Figur). Die Begrenzungen der schraffierten Flächen sind in vertikaler Richtung gegeben durch die mittleren Fehler, in horizontaler durch den Zeitraum, über den sich die Beobachtungen erstrecken.

Damit ist der Beitrag, der auf Grund der hiesigen Beobachtungen zu dieser Frage geliefert werden kann, erschöpft. Eine Fortsetzung der Beobachtungsreihe am Meridiankreise verheißt nicht den Erfolg, der dem Arbeitsaufwand entsprechen würde. Es kann daher nur der Wunsch ausgesprochen werden, daß andere Beobachter diesem Stern ihre Aufmerksamkeit schenken und mit anderen Instrumenten und Methoden an die Frage herantreten. Insbesondere erscheinen korrespondierende Messungen der Helligkeitsschwankungen und der Ortsveränderungen notwendig.

München, Sternwarte, 1919 März.

H. Kienle.

Cometa Wolf 1918 b.

1918	T.m. Arcetri	$\Delta\alpha$	$\Delta\delta$	Cf.	α app.	$\log p\Delta$	δ app.	$\log p\Delta$	Red. ad l. app.	*
Ott. 28	6 ^h 38 ^m 22 ^s	-0 ^m 17 ^s 32	-10' 25".2	8,8	20 ^h 53 ^m 51 ^s 71	8.246	+4° 18' 13".0	0.746	+3 ^s 55 +25".3	1
28	6 38 22	-1 30.47	-6 58.3	8,8	20 53 51.50	8.246	+4 18 13.7	0.746	+3.55 +25.3	2
29	7 23 50	+0 37.85	-7 17.3	8,8	20 55 57.03	9.020	+4 0 18.3	0.750	+3.55 +25.3	3
29	7 23 50	+0 17.35	+2 38.6	8,8	20 55 56.92	9.020	+4 0 17.5	0.750	+3.55 +25.3	4
30	7 55 45	+1 31.01	+1 30.4	8,4	20 58 3.29	9.216	+3 42 49.1	0.754	+3.55 +25.3	5
30	7 55 45	-1 43.67	-2 38.0	8,4	20 58 3.29	9.216	+3 42 49.4	0.754	+3.55 +25.3	6
Nov. 21	6 53 57	+0 46.73	+9 37.6	12,8	21 49 34.17	9.067	-1 18 18.7	0.792	+3.61 +25.3	7
21	6 53 57	+0 42.88	+13 53.1	12,8	21 49 34.05	9.067	-1 18 20.0	0.792	+3.61 +25.3	8
22	6 57 15	+0 4.84	-6 2.8	8,8	21 52 8.66	9.100	-1 28 24.5	0.792	+3.61 +25.4	9
25	7 3 52	-1 43.97	+4 7.2	12,8	21 59 58.22	9.156	-1 56 48.9	0.795	+3.63 +25.5	10
26	8 6 44	+1 0.65	-5 5.0	12,8	22 2 42.85	9.396	-2 6 1.1	0.796	+3.64 +25.5	10
30	7 57 6	-0 17.87	+5 34.6	12,8	22 13 21.28	9.383	-2 37 54.6	0.800	+3.65 +25.4	11
30	7 57 6	-0 42.08	-0 57.5	12,8	22 13 21.32	9.383	-2 37 55.3	0.800	+3.65 +25.4	12
Dic. 1	7 12 12	+2 19.16	-1 24.9	12,8	22 15 58.30	9.233	-2 44 54.1	0.801	+3.64 +25.4	11
1	7 12 12	+1 54.96	-7 57.4	12,8	22 15 58.35	9.233	-2 44 55.2	0.801	+3.64 +25.4	12
2	6 53 43	+0 25.35	-0 15.8	16,8	22 18 38.04	9.151	-2 51 41.3	0.803	+3.65 +25.4	13
2	6 53 43	-0 44.46	-9 9.3	16,8	22 18 38.27	9.151	-2 51 40.4	0.803	+3.65 +25.4	14
3	7 12 4	-0 40.85	+13 33.0	12,8	22 21 23.11	9.245	-2 58 15.4	0.802	+3.66 +25.3	15
4	7 14 12	+2 2.83	+7 15.5	8,4	22 24 6.80	9.259	-3 4 32.9	0.799	+3.67 +25.3	15
5	6 56 20	-0 19.20	+9 0.2	12,8	22 26 48.52	9.183	-3 10 28.3	0.804	+3.67 +25.3	16
5	6 56 20	-1 49.57	+11 6.6	12,8	22 26 48.32	9.183	-3 10 23.5	0.804	+3.67 +25.3	17
21	6 33 40	-0 5.49	-8 41.4	12,8	23 11 19.02	9.163	-4 4 52.9	0.810	+3.73 +24.8	18
21	6 33 40	-0 9.53	+3 59.7	12,8	23 11 18.72	9.163	-4 4 53.8	0.810	+3.73 +24.8	19

Stelle di confronto.

*	α 1918.0	δ 1918.0	Autorità
1	20 ^h 54 ^m 5 ^s 48	+4° 28' 12".9	Alb 7348
2	20 55 18.42	+4 24 46.7	Kü 9288
3	20 55 15.63	+4 7 10.3	Alb 7356
4	20 55 36.02	+3 57 13.6	" 7358
5	20 56 28.73	+3 40 53.4	" 7363
6	20 59 43.41	+3 45 2.1	" 7369
7	21 48 43.83	-1 28 21.6	Nic 5525
8	21 48 47.56	-1 32 38.4	" 5526
9	21 52 0.21	-1 22 47.1	" 5532
10	22 1 38.56	-2 1 21.6	Strb 7706

*	α 1918.0	δ 1918.0	Autorità
11	22 ^h 13 ^m 35 ^s 50	-2° 43' 54".6	Strb 7761
12	22 13 59.75	-2 37 23.2	" 7764
13	22 18 9.04	-2 51 50.9	" 7784
14	22 19 19.08	-2 42 56.5	" 7791
15	22 22 0.30	-3 12 13.7	" 7801
16	22 27 4.05	-3 19 53.8	" 7820 m.pr.
17	22 28 34.22	-3 21 55.4	" 7827
18	23 11 20.78	-3 56 36.3	" 8009 m.pr.
19	23 11 24.52	-4 9 18.3	" 8010