(Aus dem Physiologischen Institut zu Leipzig)

Über die Veränderungen des Sehpurpurs durch Licht.

Von

Prof. Dr. med. S. Garten
in Leipzig.

Mit Taf. VII—XII und 15 Figuren im Text (darunter 8 Kurven).

Ein in der Netzhaut vorhandener Farbstoff kann je nach seiner Lage und Beschaffenheit in sehr verschiedener Weise für den Sehakt von Bedeutung werden. Ist er lichtempfindlich, und in der Sehzelle selbst gelegen, so kann möglicherweise seine chemische Veränderung eine Erregung der Sehzelle herbeiführen. Er kann als „Sehstoff“ dienen, was man beispielsweise für den Sehpurpur seit Bolls Entdeckung vielfach angenommen hat. Ausserdem kann aber der Farbstoff bei gleicher Lage, und in noch höherem Grade, wenn er vor den perzipierenden Elementen gelegen ist, durch Absorption die Intensität des wirksamen, terminalen Lichtes herabsetzen. Im Fall grösserer Lichtempfindlichkeit würde er dabei freilich, wie Kühne¹⁾ für den Sehpurpur und das Sehgelb auseinandersetzte, nicht einen konstanten, sondern einen sich durch die Lichtwirkung kontinuierlich verändernden Farbenschild darstellen. Wenn man will, kann man als dritte Möglichkeit hinzufügen, dass der in der Sehzelle gelegene Farbstoff zur Sensibilisierung²⁾ des eigentlichen, der Beobachtung noch nicht zugänglichen Sehstoffes dient, d. h. die Zersetzlichkeit jenes Sehstoffes für die vom Farbstoff absorbierten Lichter vergrößert. Endlich ist

¹⁾ W. Kühne, Das Sehen ohne Sehpurpur. Untersuchungen aus dem Physiologischen Institut zu Heidelberg. Bd. I. 1877. S. 123.

²⁾ Hierunter versteht Eder (Sitzungsberichte d. Wiener Akad. 1884. Bd. C. Heft 5. S. 1141), ausgehend von den Beobachtungen an der photographischen Platte die Erscheinung, dass ein Farbstoff (Sensibilisator) innig mit dem zu zersetzenden Stoff (hier Sehstoff) gemischt oder mit ihm verbunden einen Teil des absorbierten Lichtes in chemische Arbeit umsetzt, bei der der zu zersetzende Stoff mit in den Prozess gezogen wird.

auch noch die Möglichkeit erörtert worden, dass das von dem Farbstoff absorbierte Licht von diesem als Fluoreszenzlicht, d. h. als Licht grösserer Wellenlänge wieder ausgestrahlt, die perzipierenden Teile in Erregung versetzt.

So viel geht jedenfalls aus obiger Betrachtung hervor: jeder in der Netzhaut vorhandene Farbstoff muss für den Sehakt von Bedeutung sein. Es ist daher keineswegs so nebensächlich, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheinen könnte, dass das nach Boll und Kühne in der Netzhaut bei der Bleichung des Sehpurpurs entstehende Sehgelb nach den Angaben einer Reihe neuerer Forscher sich gar nicht bilden soll, sondern der Purpur ohne Bildung eines farbigen Zwischenproduktes direkt zur Farblosigkeit ausbleicht.

Um im Handbuch von Graefe-Saemisch, für welches ich die Darstellung der objektiven Veränderungen der Netzhaut übernommen habe, obige wichtige Frage nach der Bildung des Sehgelbes sicher zu beantworten, habe ich eine Reihe von Versuchen angestellt, die nach meiner Meinung zwingend die Bildung des Sehgelbes bei der Purpurbleichung beweisen. Die zur Beweisführung erforderliche, ausführliche Darstellung der Versuche machte es nötig, an dieser Stelle davon Mitteilung zu machen, um mich so in den betreffenden Kapiteln des Handbuches auf eine kürzere Darlegung beschränken zu können.

Eine zweite Streitfrage in der Lehre vom Sehpurpur knüpft sich an die namentlich von Kühne beschriebene, verschiedenartige Ausbleichung des Sehpurpurs im kurzwelligen und langwelligen Lichte. Auch diese Beobachtungen, von gleicher theoretischer Bedeutung wie die obigen, waren von neueren Untersuchern in Zweifel gezogen worden, ja sie mussten sogar von den genannten in Zweifel gezogen werden, denn wenn wirklich kein neuer Farbstoff bei der Bleichung entsteht, so können ja immer nur dieselben farbigen Zwischenstufen wie bei der Verdünnung einer Sehpurpurlösung hervortreten.

Umgekehrt ist es aber sehr wohl denkbar, dass Sehgelb bei der Bleichung entsteht, und trotzdem bei Bleichung im lang- und kurzwelligen Licht keine Bleichungsdivergenz hervortritt. Es braucht nur das Sehgelb im Vergleich zum Sehpurpur sehr geringe Lichtempfindlichkeit zu besitzen. Auch hier kann der Leser eine Entscheidung nur nach Kenntnis zahlreicher Einzelheiten treffen, deren Darstellung sich zweckmässig an die erste Frage nach der Bildung des Sehgelbes anreihet.

Historisches über Sehgelb.

Schon bald nach der ersten Mitteilung der Entdeckung Bolls (12. bis 23. November 1876), in der die fundamentale Tatsache festgestellt worden war, dass die bereits früher von mehreren Forschern gesehene Rotfärbung der Netzhaut unter dem Einfluss des Lichtes schwindet¹⁾, wurde über die Zwischenstadien der Bleichung Näheres bekannt. In seiner ersten Mitteilung (5. Januar 1877) erwähnt Kühne²⁾, dass Netzhäute in einer ganzen Reihe von Agentien ihre rote Farbe behalten, und dass der Purpur in 1 bis 10 Minuten im Tageslicht in Chamois³⁾ übergeht, von dem endlich kaum etwas zu bemerken bleibt. In dieser, kaum zwei Monate nach der ersten Mitteilung Bolls gemachten Angabe liegt schon der Hinweis, dass bei der Bleichung eine Farbentonänderung eintritt. Aus dem Sehrot, wie Boll (11. Januar 1877) den Farbstoff bezeichnet, oder dem Sehpurpur, wie ihn Kühne nannte (5. Januar 1877), wird nicht wie bei der Verdünnung vieler roter Farbstoffe ein ungesättigteres Rot, sondern es tritt ein ganz anderer Farbton, ein Gelb hervor, ehe die Farblosigkeit durch das Licht erzielt wird. Nun würde diese Tatsache an und für sich von geringer Bedeutung sein, wenn sie sich einfach auf eine Verdünnung des Sehpurpurs zurückführen liesse, ohne dass man gezwungen wäre, die Entstehung eines neuen Farbstoffes in der Netzhaut während der Bleichung anzunehmen.

Lässt doch bekanntlich, wie Brücke⁴⁾ gezeigt hat, das Hämö-

¹⁾ Boll, Zur Anatomie und Physiologie der Retina. Bericht D. Akad. d. Wissensch. zu Berlin 1876. Sitz. v. 23. November, S. 783. Auf die den ersten Beobachtungen Bolls anhaftenden Irrtümer: Schwinden des Sehpurpurs beim Absterben, Sichtbarkeit im lebenden Auge, kann hier nicht näher eingegangen werden.

²⁾ Kühne, Zur Photochemie der Netzhaut. Sitzungsbericht d. Naturh. med. Verein zu Heidelberg, den 5. Januar 1877. Heidelberger Untersuchungen, Bd. I. S. 1.

³⁾ Chamois heisst wörtlich gemsfarben, und wird für die Bezeichnung von Farbstoffen verwendet, die uns unter gewöhnlichen Umständen die Empfindung eines mehr oder weniger ins Grau gehenden Rot-Gelb liefern. Man würde die Farbe also am besten als „durch Grau verhülltes rötliches Gelb“ bezeichnen. Die Definition, die Kühne selbst (Nachträge zu den Abhandlungen über Sehpurpur. Heidelberger Untersuchungen, Bd. I. S. 462 u. 463, 1878) gibt, beruht jedenfalls auf irrümlichen Voraussetzungen.

⁴⁾ Brücke, Über den Dichroismus des Blutfarbstoffes. Sitzungsberichte d. Wiener Akad. d. Wissensch. math.-naturw. Klasse. Bd. XI. 1853. S. 1070.

globin in starker Verdünnung, bzw. in sehr dünner Schicht, alle Strahlen ausser den violetten hindurchtreten. Und diese Absorption des violetten Lichtes bedingt es, dass uns das übrige hindurchgelassene Licht eine gelbgrünliche Empfindung liefert. Ist dagegen die Schichtendicke eine grössere, so bekommen wir infolge der stärkeren Absorption im Grün die Empfindung Rot.

Ganz andere Bedeutung würde die Gelbfärbung bei der Ausbleichung der Netzhaut gewinnen, wenn sie die Folge der Absorption des blauen und violetten Lichtes durch einen neugebildeten Farbstoff, das Sehgelb, wäre, der dann als Produkt des bleichenden Sehpurpurs, aber nicht als Rest von noch ungebleichtem Sehpurpur angesehen werden dürfte.

Nahezu gleichzeitig mit Kühnes erster Mitteilung sagt auch Boll¹⁾: „Die Farbe der Dunkelnethaut ist ein lebhaftes Rot, das beim Ausbleichen in ein blasses Gelb übergeht.“ Und in der Mitteilung vom 11. Januar: „Verfolgt man unter dem Mikroskop das Abblässen, so sieht man, dass die roten Stäbchen in dem Masse, als ihre Farbe schwächer wird, einen deutlich gelbroten und zuletzt fast ganz gelben Farbenton annehmen.“

Eine grundlegende Beobachtung, die schon spätere Forscher von der Bildung eines neuen Farbstoffes bei der Purpurbleichung hätte überzeugen können, beschreiben Ewald und Kühne 1877²⁾. Sie zeigen, dass eine frische Netzhaut beim allmählichen Zerdrücken zwischen zwei Glasplatten bei zunehmender Verdünnung der Schicht statt rot rosa, endlich blass lila erscheint, und dass beim Zusammenschieben diese „wieder schön purpurfarben oder intensiv rot“ aussieht. Anders bei Ausbleichung. Ewald und Kühne sagen (loc. cit. S. 147): „Belichtung zersetzt den Purpur und wirkt gänzlich anders als Verdünnung, weil der Sehpurpur nicht mit einem Schlag in Sehweiss, sondern zuvor in Sehgelb, das erst zu Weiss wird, übergeht. Daher besteht jede Anfangsänderung durch das Licht im

¹⁾ Boll, Sull' anatomia e fisiologia della retina. Atti della R. Acad. dei Lincei. Serie III. Trans. 1. Seduta 3 dicembre 1876. p. 36.

Boll, Aggiunta alla Nota: Interno alla anatomia e fisiologia della retina, den 7. Januar 1877.

Boll, Zur Anatomie und Physiologie der Netzhaut. Du Bois-Reymonds Arch. 1877. S. 4.

²⁾ Ewald und Kühne, Untersuchungen über den Sehpurpur. Heidelberger Untersuchungen. Bd. I. 1877. S. 146.

Auswischen der Purpurfarbe, im Umschlagen ins brandige oder reinere Rot.“

Um sicher zu erkennen, ob „das Licht im Sehgelb noch etwas Neues erzeugt“, stellten Ewald und Kühne folgenden Versuch an: Es wurde in dem auf einer horizontalen Milchglasplatte objektiv entworfenen Sonnenspektrum eine Reihe „Dunkelnetzhäute“ vom Frosch möglichst frisch mit der natürlichen Befeuchtung ausgebreitet. Diese erschienen entsprechend der Absorption des Sehpurpurs vom Gelb bis zum Violett dunkel. Die stärkste Absorption fiel ins Grün bzw. Gelbgrün, darauf folgten in abnehmender Reihe reines Grün, Blaugrün, Blau, Gelb und Violett. Wurde nun eine frische Dunkelnetzhaute, die im Violett lag, für kurze Zeit belichtet, so konnte man die Absorption im Violett bedeutend zunehmen sehen. Diese Absorptionszunahme im Violett war aber nur möglich, wenn ein neuer Farbstoff entstand, denn bei einfacher Ausbleichung war im äussersten Fall ein Bestehenbleiben der ursprünglichen Absorption anzunehmen. Damit war also, soweit man sich auf die Helligkeitsbeurteilung im Violett verlassen konnte¹⁾, durch ein Experimentum crucis der Nachweis für die Bildung des Sehgelbs, oder besser eines Violett stärker absorbierenden Farbstoffes erbracht.

In gleicher Weise stellten Ewald und Kühne²⁾ an Lösungen von Sehpurpur in glykocholsaurem oder taurocholsaurem Natron fest, dass beim Verdünnen der Lösung unter Lichtabschluss die Lösung zart rosa wurde, und keine Spur von Gelb zu erkennen war. Wurde dagegen die konzentrierte Lösung dem Licht ausgesetzt, so durchlief sie die gleiche Farbenreihe wie die Netzhäute: rot, orange, chamois, gelb, um schliesslich farblos zu werden.

Bei Untersuchung der Absorption der Lösungen im Spektrum wurde zunächst ebenso verfahren, wie bei den Netzhäuten: auf einer Milchglasplatte war das objektive Spektrum entworfen, und eine Reihe von Tropfen der Sehpurpurlösung, die sich auf einer Glasplatte befanden, wurde in das Spektrum geschoben. „Besah man den ziemlich durchsichtigen Milchglasstreifen, der die Tropfen trug, von unten, so hatte man auf dem Spektrum im roten und violetten Ende einige

¹⁾ Es wird weiter unten noch besprochen werden, dass die Helligkeitsbestimmung im Violett sehr erschwert ist.

²⁾ Ewald-Kühne, Untersuchungen über den Sehpurpur. 1877. Heidelberger Untersuchungen. Bd. I. S. 160.

kaum bemerkbare Flecken, im Gelb einen hellgrauen und im Ende des Blau einen dunkelgrauen, dazwischen eine Reihe schwarzer Flecken. Durch die farblose Glasplatte allein und von unten betrachtet, sahen die Tröpfchen wie ebensovielen rote, violette, graue und schwarze Perlen aus, deren Verhalten sich aber alsbald in charakteristischer Weise änderte. Überraschend zierlich liess sich hier die Absorptionsänderung durch Belichtung zeigen, besonders im Violett. Wir setzten auf getrennte Glasstückchen Tropfen des klargelösten Purpurs, hielten die einen kurz ins Tageslicht und schoben sie darauf neben den andern ins violette Spektralende. Nun sahen die ersteren, d. h. die gebleichten beinahe schwarz, die letzteren hellviolett aus, und ähnlich auffallend war der Unterschied an den Schatten auf einem unter die Plättchen gehaltenen Papierblatte.“

Während also im Violett die belichteten Tropfen dunkler waren, als die unbelichteten, kehrte sich dieses Verhalten im Gelbgrün um; hier erschienen die belichteten Tropfen heller als die unbelichteten.

Fig. 1. Absorptionskurve des Sehpurpurs und des Sehgelbs nach Kühne.

Auch nach Vorsetzen eines, mit Sehpurpurlösung gefüllten Troges vor den Spalt eines Spektralapparates wurde beobachtet, dass bei Beginn der Bleichung sich das Gelbgrün aufhellte, während im Violett die Absorption zunahm. Am besten ist das Resultat der spektroskopischen Analyse an den beistehenden Kurven (Textfig. 1) ersichtlich, die Kühne später (Heidelberger Untersuchungen, Bd. I, Taf. 7. 1877) mittheilte.

Die Kurven sollen zwar bildlich die beobachtete Absorption des Sehpurpurs und Sehgelbs darstellen, sind aber, was, um Missverständnissen vorzubeugen, ausdrücklich betont sei, nicht das Resultat einer Absorptionsmessung, sondern nach Schätzung der bei den verschiedenen Strahlen des Spektrums auftretenden Lichtschwächung entworfen. Während der Sehpurpur, wie aus der Abbildung ersichtlich, eine maximale Absorption nahe bei E zeigt, und zwischen G und H im Violett nur sehr wenig Licht absorbiert, lässt umgekehrt das entstandene Sehgelb im Grün fast alles Licht durch. Bei ihm ist aber im Blau und Violett die Absorption sehr bedeutend, und

zwar zwischen *G* und *H* am augenfälligsten. Auf diese Zunahme der Absorption im kurzwelligsten Teil des Spektrums zwischen *G* und *H* sei hier nochmals hingewiesen, da spätere Untersucher, die auf Grund von spektrophotometrischen Messungen eine Bildung von Sehgelb verneinten, diesem Differenzpunkt meiner Meinung nach nicht genug Bedeutung beileigten. Kühne selbst hat in seinen zahlreichen Arbeiten über den Sehpurpur immer und immer wieder gerade diesen Punkt betont¹⁾.

Nimmt man nach den obigen Beobachtungen an, dass bei der Bleichung sich Sehgelb bildet, so erscheint die weitergehende Angabe Kühnes, dass die Bleichung des Purpurs im langwelligeren Lichte (Gelbgrün) und im kurzwelligeren Lichte (Violett) qualitativ ver-

¹⁾ Ein weiterer Beweis für die Bildung eines „Stoffes“ während der Bleichung liesse sich nach Kühnes Beobachtungen aus der Messung der Fluoreszenz der ungebleichten, gelbgebleichten und völlig ausgebleichten Netzhaut gewinnen. Kühne findet (Heidelberger Untersuchungen. Bd. I. S. 435. 1878), dass eine Netzhaut mit ungebleichtem Purpur im ultravioletten Licht schwach bläulich-weiss fluoresziert, dass während der Bleichung (bei der Sehgelbbildung) die Fluoreszenz abnimmt, und dass nach völliger Ausbleichung (zu Sehweiss) ein kräftiges grünlich-weisses Fluoreszenzlicht auftritt. Diese Erscheinung könnte nach Kühne dadurch bedingt sein, dass bei der Bleichung ein schwach fluoreszierender Stoff (Sehpurpur) verschwindet und ein nicht fluoreszierender (Sehgelb) an seine Stelle tritt. Geht die Bleichung weiter, so wird das Sehgelb zersetzt, und es tritt nun ein stark bläulich-weiss fluoreszierender Stoff (Sehweiss nach Kühne) dafür auf. Freilich scheint diese Abnahme der Fluoreszenz im Bleichungsbeginn nur bei der chemischen Bleichung, beispielsweise Gelbfärbung durch Chlorzink sicher gestellt zu sein, denn später sagt Kühne (Hermanns Handbuch. Bd. III. Abt. 1. S. 288): „In der Stäbchenschicht nimmt die Fluoreszenz am meisten zu, wenn das Sehgelb schwindet, viel weniger“ (also doch zu!) „so lange der Purpur erst zum Gelb umgewandelt wurde.“ Seit Kühnes Angaben ist die Beobachtung in der beschriebenen Weise nicht wiederholt worden. Himstedt und Nagel (Versuche über die Reizwirkung verschiedener Strahlenarten auf Menschen- und Tieraugen. Festschr. Freiburg 1902. S. 257), die ebenfalls die Fluoreszenz der Netzhaut untersuchen, sagen nur, dass die Dunkelnetzhaut im Vergleich zur gebleichten Netzhaut sehr schwach fluoresziert, so dass direkt durch die Fluoreszenz erkannt werden kann, ob es sich um eine Dunkelnetzhaut oder um eine Hellnetzhaut handelt. Sie lassen, wie auch schon Kühne in seiner späteren Mitteilung (loc. cit. S. 288), es unentschieden, ob der Sehpurpur an sich fluoresziere. Es könnte nach ihnen das schwache Leuchten der Dunkelnetzhaut durch kleine Mengen schon zersetzten Purpurs bedingt sein. Auf eine etwaige Abnahme der Fluoreszenz im Bleichungsbeginn gehen die Verfasser aber nicht näher ein.

Auch hier würde eine neue Untersuchung mit dem technisch jetzt leichter intensiv zu erzeugenden ultravioletten Licht eine Entscheidung bringen können.

schieden verlaufe, im ersteren Falle zu hellgelb, im letzteren zu zart rosa führe, von vornherein sehr annehmbar. Absorbiert doch der Sehpurpur das meiste Licht im Gelbgrün, das Sehgelb dagegen im Violett. Entsteht also beispielsweise im kurzwelligen Licht zunächst aus dem reinen Sehpurpur etwas Sehgelb, so würde dieses Sehgelb vom blauen und violetten Lichte rasch bis zur Farblosigkeit weiter gebleicht werden.

Ebenso wie für die bleichbaren Pigmente der Satz Geltung hat, dass ein homogenes Licht in einem Gemisch von Farbstoffen, die alle im Licht ausbleichbar sind, denjenigen Farbstoff am stärksten bleicht, der die betreffende Strahlung am stärksten absorbiert¹⁾, müsste auch das Sehgelb infolge seiner starken Absorption der kurzwelligen Lichter rasch gebleicht werden. Die währenddessen durch die gleichen kurzwelligen Lichter aus dem noch vorhandenen Sehpurpur freigemachte Sehgelbmenge würde dann ebenfalls unmittelbar wieder durch die energischen Wirkungen des violetten Lichtes zerlegt u. s. f. Umgekehrt im Gelbgrün. Hier ist die Absorption des reinen Sehpurpurs sehr stark; der Sehpurpur wird rasch zu Sehgelb gebleicht, dagegen ist die Absorption des Sehgelb hier sehr gering und infolgedessen kann eine weitergehende Zerlegung desselben nur sehr langsam erfolgen. Es kommt also zunächst zur Bildung von reichlichen Mengen von Sehgelb.

Diese auf den ersten Blick sehr annehmbar erscheinende Überlegung hat aber, wie schon oben kurz erwähnt, zur Voraussetzung, dass die Lichtempfindlichkeit des Sehgelb nicht unter einer bestimmten Grenze liegt. Ist im äussersten Fall das Sehgelb gar nicht durch Licht bleichbar, so wird selbstverständlich der Bleichungseffekt im Gelbgrün und Violett immer der gleiche sein müssen. Mit zunehmender Lichtempfindlichkeit des Sehgelb würde erst von einer bestimmten Grenze an ein qualitativer Unterschied zwischen der im Violett und der im Gelbgrün gebleichten Netzhaut merklich werden können. Eine sichere Beurteilung aus dem Vergleich der Lichtempfindlichkeit des Sehpurpurs und Sehgelbs zu gewinnen, ist aber nicht gut möglich, da wir nicht wissen, ob nicht das Sehgelb im Moment des Entstehens gegen Lichtwirkung viel empfindlicher ist, als längere Zeit nach der Bildung. Ja, für das Sehgelb ist ein solcher Wechsel der

¹⁾ Vorausgesetzt, dass es sich um eine chemische und nicht thermische Lichtabsorption handelt. Vgl. O. Wiener, Farbenphotographie durch Körperfarben und mechanische Farbenanpassung in der Natur. Ann. d. Physik u. Chemie. N. F. Bd. LV. 1895. S. 225.

Lichtempfindlichkeit schon sehr bald durch die zahlreichen Kühne-schen Beobachtungen der Indolenz des Sehgelbs beim Absterben der Netzhaut und bei Einwirkung chemischer Agentien wahrscheinlich geworden. (Vgl. Kühne in Hermanns Handbuch S. 286.)

Kühne hat nun aber direkt in zahlreichen Versuchen gezeigt, und an der Richtigkeit seiner Beobachtungen kann trotz gegenteiliger neuerer Angaben nicht gezweifelt werden, dass beim Einbringen von frischen, gut feucht gehaltenen Netzhäuten in die verschiedenen Teile des Spektrums die Netzhäute nicht nur verschieden schnell, sondern auch qualitativ verschieden ausbleichen. Wurde die Bleichung an einer Reihe von Netzhäuten im Interferenzspektrum zu gleicher Zeit begonnen, so waren die im Gelbgrün und Gelb befindlichen Netzhäute hellgelb, während die im kurzwelligeren Teil hellrosa erschienen oder bis zum hellrötlichen Chamois ausgebleichen waren¹⁾.

Dem Einwurf, die zart rötlich erscheinenden Netzhäute im Violett sind einfach noch nicht lange genug gebleicht, wird zunächst dadurch begegnet, dass sehr lange Bleichungszeiten in Anwendung kommen, nach denen (l. c. S. 58) „man nicht mehr gut sagen konnte, ob z. B. im Grünblau die Ausbleichung weiter fortgeschritten sei, als im Violett“. Dann waren aber doch noch Unterschiede zu erkennen, und zwar Unterschiede „in der Nuance der geringen Reste von Färbung, die noch in den fast ausgebleichenen Netzhäuten vorhanden war. Während in den mittleren Teilen des Spektrums die Ausbleichung sehr leicht bis zu einem hellen Gelb gebracht werden konnte, sahen wir am violetten Ende niemals diesen Farbenton auftreten, sondern als letzten Überrest von Netzhautfarbe immer nur ein ganz helles rötliches Chamois oder meistens eine helle Rosenfarbe zurückbleiben“.

Als besonders beweisend für die stärkere Gelbbleichung im Violett würde die an gleicher Stelle gemachte Angabe anzusehen sein, dass unter Umständen nach gleich langer Expositionszeit in demselben Spektrum die im Grün gebleichten Netzhäute noch eine Spur gelb zeigen, während die im Indigo und Violett gebleichten gar keine Färbung mehr erkennen lassen. Doch die Beweiskraft dieser Versuche ist nicht so gross, da die Verfasser die Mitteilung mit den Worten: „Es kann sogar vorkommen“ beginnen, und da zwei im gleichen Licht gebleichte Netzhäute auch bei anfänglicher Gleichheit der Färbung infolge gewisser äusserer Umstände gegen Ende der Bleichung Verschiedenheiten zeigen.

¹⁾ Ewald und Kühne, Untersuchungen über den Sehpurpur. Bd. I. S. 195.

Noch in mannigfaltiger Weise wurde der gleiche Nachweis der stärkeren Bleichung des Sehgelbs im Violett versucht, was schon darauf hinweist, dass Kühne selbst die bisher geschilderten Experimente noch nicht als entscheidend ansah. So wurde z. B. (loc. cit. S. 212) eine Netzhaut erst einige Zeit im Gelbgrün gebleicht und dann im Violett weitergebleicht. Bei einem solchen Wechsel der bleichenden Lichter schien den Verfassern sehr deutlich die Retina schneller gebleicht zu werden, als wenn sie die ganze Zeit in dem Teil des Spektrums gebleicht wurde, das „erfahrungsgemäss die kräftigste Wirkung auf die Retinafarbe ausübt“.

Endlich wurde, „um die Frage zur Entscheidung zu bringen“, noch folgende Versuchsreihe vorgenommen: die Netzhäute wurden erst am Sonnenlicht zu Chamois ausgebleicht und dann die Bleichung in verschiedenen Teilen des Spektrums fortgesetzt. Es ergab sich, dass nach Schluss der Bleichung die im Violett gebleichten Netzhäute hellrötlich, die im Gelbgrün gebleichten hellgelb waren. „Während Gelbgrün aus dem Chamois den Purpur wegnahm, und nur Sehgelb übrig blieb, nahm das Violett das Gelb weg, so dass nur noch eine rötliche Färbung der Netzhaut übrig blieb.“

Nach allen diesen und vielen andern übereinstimmenden Versuchen hielten die Verfasser obiges Ergebnis für gesichert, was auch in Kühnes Darstellung in Hermanns Handbuch (Bd. III. 1. S. 280) zum Ausdruck kommt.

Von den genannten Tatsachen: der Bildung des Sehgelbs und der Bleichung des Sehpurpurs in verschiedener Weise, je nach der Wellenlänge des Lichtes, wurde zuerst im Jahre 1888 der letztere Punkt in Zweifel gezogen. Hamburger¹⁾ gibt an, dass bei seinen Bleichungsversuchen getrockneter Netzhäute in Lichtern verschiedener Wellenlänge immer die gleichen Farbenänderungen eintreten. Wie später noch klar gelegt werden wird, ist die Differenz der Hamburgerschen Befunde mit denen Kühnes eine nur scheinbare. Auch im Jahre 1894 lässt König²⁾ bei seiner bekannten Absorptionsmessung des menschlichen Sehpurpurs Sehgelb aus dem Sehpurpur hervorgehen, und es zeigte sich sogar, dass wie besonders deutlich aus der von Tren-

¹⁾ Hamburger, Staafjesrood in monochromatisch licht. Onderzoekingen der Utrechtsche Hoogeschool. III. Reeks. Bd. XI. S. 1. 1889.

²⁾ König, Über den menschlichen Sehpurpur und seine Bedeutung für das Sehen. Sitzungsbericht d. kgl. preuss. Akad. d. Wissensch. 1894. Bd. XXX. S. 577.

delenburg¹⁾ gegebenen graphischen Darstellung der Königschen Resultate (S. 42) erhellt, nach teilweiser Bleichung, eine beträchtliche Absorptionszunahme im Violett eingetreten war. Bekanntlich hat König ja auch das Sehgelb noch theoretisch verwertet, und angenommen, dass die Empfindung Blau „bei stärkerer Zersetzung des Sehpurpurs, die sich dann auch auf das erst gebildete Sehgelb erstreckt, entsteht“. In gleicher Weise gründete sich ja auch auf die Sehgelbbildung die Annahme von Ebbinghaus²⁾ 1893, dass die Stäbchen die Träger der Blaugelbsubstanz wären. Aber schon 1895 wurde durch die im Königschen Laboratorium ausgeführte Untersuchung von Köttgen und Abelsdorff³⁾ über die Arten des Sehpurpurs in der Wirbeltierreihe die Bildung des Sehgelbs bestritten. Die Verfasser bestimmten nach der von König für den menschlichen Sehpurpur angewendeten Methode die Absorption in den verschiedenen Teilen des Spektrums für Lösungen der Netzhäute der verschiedensten Wirbeltiere in gallensauren Salzen.

Im Gegensatz zu dem Königschen Versuch, wo die lichtempfindliche Lösung im Okular des Spektrophotometers angebracht war, wurde in der Mehrzahl der Versuche das Sehpurpurtrögchen vor dem Kollimatorsplatt aufgestellt. Allerdings wurde auch hier, um unnötige Bestrahlung zu vermeiden, je nach benutzter Wellenlänge ein entsprechendes Farbenfilter vor die Lichtquelle gebracht. Immerhin bleibt bei der Methode der Verfasser die Gefahr bestehen, dass im Beginn der Bestimmung eine geringe Bleichung stattfindet (von den Verfassern ebenfalls in Erwägung gezogen, aber als so gering gefunden, „dass sie an einzelnen Punkten durch die Beobachtungsunsicherheit verdeckt wird“).

Die ganze Bestimmung der Absorptionskurve des „Sehpurpurs“ gründet sich bei Köttgen und Abelsdorff auf der noch nicht ganz sicheren Voraussetzung, dass in dem gelblichen Rest-

¹⁾ Trendelenburg, Quantitative Untersuchung über die Bleichung des Sehpurpurs im monochromatischen Licht. Zeitschr. f. Phys. u. Psych. Bd. XXXVII. 1904. (Separat.)

²⁾ Ebbinghaus, Theorie des Farbensehens. Zeitschr. f. Psych. Bd. V. 1893. S. 145.

³⁾ Köttgen und Abelsdorff, Die Arten des Sehpurpurs in der Wirbeltierreihe. Sitzungsbericht. d. kgl. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. Bd. XXXVIII. 1895. 25. Juli. Math.-phys. Klasse.

Köttgen und Abelsdorff, Absorption und Zersetzung des Sehpurpurs bei den Wirbeltieren. Zeitschr. f. Psych. Bd. XII. 1896. S. 161.

farbstoff kein Bleichungsprodukt vorliegt, denn es wird die Absorptionskurve in der Weise bestimmt, dass die Absorption des gelblichen Restfarbstoffes von der ursprünglichen Absorption der sonst frischen Lösung in entsprechender Weise in Abzug gebracht wird. Auf diese Schwierigkeit hat schon Trendelenburg hingewiesen (Centralbl. 24. Febr. 1904 und Zeitschr. f. Psych. Bd. XXXVII. 1904. S. 7).

In der Tat, man kann nur dann durch jene Subtraktionsmethode¹⁾ die wirkliche Absorption des Sehpurpurs erhalten, wenn überhaupt bei der Bleichung kein neuer, dem Licht resistenter Farbstoff entsteht. Bildet sich also aus dem Sehpurpur Sehgelb, und bleibt, wie bei der Schwerzersetzlichkeit des von Kühne beschriebenen Sehgelbs kaum anders zu erwarten ist, ein Teil desselben mit dem konstant angenommenen Restfarbstoff zurück, so lässt sich in der beschriebenen Weise die Sehpurpurabsorptionskurve nur mit einem gewissen Fehler darstellen, so dass weitere Beweisführungen aus dem Kurvenverlauf des Sehpurpurs jedenfalls nur mit Vorsicht benutzt werden dürfen. Liesse sich dagegen die Sehpurpurlösung bis zur vollkommenen Farblosigkeit ausbleichen, so wäre die an der frischen Lösung gefundene Absorption, mit Wahrscheinlichkeit als nur durch den Sehpurpur bedingt, anzusehen.

Köttgen und Abelsdorff suchten den Beweis zu führen, dass die Sehpurpurlösung ohne Bildung eines gefärbten Produktes ausbleiche. Zur Begründung diene ihnen die Beobachtung, dass bei fortgehender Bleichung nur eine Abnahme der Konzentration eintritt. Auch heben sie hervor, dass die qualitativen Veränderungen der Farbe bei der Bleichung in ganz der gleichen Weise im lang- wie im kurzwelligen Lichte vor sich gehen. In zwei Versuchen gelang es den Verfassern, unter Benutzung einer von Kühne ihnen zur Verfügung gestellten Gallenlösung, eine Sehpurpurlösung zu erhalten, die nach der Bleichung völlig farblos war. In diesem Fall wäre jedenfalls, wenn sich bei der Bleichung Sehgelb gebildet hätte, dieses bei vollkommener Ausbleichung mit zersetzt worden. Da nun aber gerade in diesen geschilderten Versuchen im Verlauf der Bleichung sich nur eine Konzentrationsabnahme ergab, so wird das Dazwischentreten eines neu gebildeten Farbstoffes verneint.

Ob es sich wirklich um eine gleichmässige Konzentrationsände-

¹⁾ In welcher Weise rechnerisch die Subtraktion auszuführen ist siehe unten S. 168.

rung gehandelt hat, kann man nach dem Vorgang Trendelenburgs (loc. cit. S. 40) aus dem Verhältnis der Endkonzentration zur ursprünglichen Konzentration einigermaßen beurteilen. „Wenn K die Ausgangskonzentration ist, K' die Konzentration des übrigbleibenden Purpurs nach teilweiser Bleichung, so ist $K' = \frac{\log. I'}{\log. I}$, wenn $K = 1$ gesetzt wird. Hierbei bedeutet I die von ungebleichtem Purpur durchgelassene Lichtmenge, I' die nach teilweiser Bleichung von Sehpurpur durchgelassene.“ Führt man diese Berechnung für die zwei Versuche von Köttgen und Abelsdorff (Tab. 7, S. 180) durch, so sieht man, dass die Absorptionskurven keineswegs für alle Teile des Spektrums einer konstanten Konzentrationsdifferenz entsprechen. Nur das eine geht aus den Kurven hervor, dass an allen Teilen des Spektrums eine Konzentrationsabnahme eingetreten ist. Diese hielt aber nicht überall gleichen Schritt, so dass ein strenger Beweis durch die beiden Versuche nicht gegeben ist. Aber auch gerade der Umstand, dass hier eine wirkliche Ausbleichung zur Farblosigkeit gelang, während sonst immer gelbe Reste erhalten wurden, lassen es an und für sich möglich erscheinen, dass die Gallenlösung Kühnes, die von gleicher Qualität von anderer Seite nicht dargestellt werden konnte (vgl. Trendelenburg), auf das eventuell doch entstehende Sehgelb in der Weise eingewirkt hat, dass sie die Lichtempfindlichkeit des entstehenden Sehgelbs in irgend einer Weise erhöhte. Es ist klar, dass, wenn die Lichtempfindlichkeit des Sehgelbs der des Sehpurpurs sich nähert, bei der Bleichung in allen spektralen Teilen die Konzentrationsdifferenz ungefähr wenigstens die gleiche bleiben muss. Doch können auch noch andere Umstände zur Erklärung dienen¹⁾.

In allen anderen Versuchen der Verfasser blieb, soweit sich aus der Darstellung und der Berechnungsmethode der Absorptionskurven ersehen lässt, ein gelblicher Rest bestehen, und es war der Bleichungserfolg der gleiche, unabhängig davon, ob mit weissem, gelbem oder blauem Lichte gebleicht wurde. Dieses zunächst gegen die differente Bleichung im Grün und Violett und damit indirekt scheinbar gegen die Existenz des Sehgelbs sprechende Resultat ist auch verständlich, wenn wir eine Sehgelbbildung annehmen, aber voraussetzen, dass in der Mehrzahl der Fälle, abgesehen von der Benutzung der von Kühne selbst hergestellten Gallenlösung, der Rest-

¹⁾ So könnte das Sehgelb durch gewisse regenerative Umsetzungen (siehe unten) wieder Sehpurpur bilden und daher während der ganzen Bleichungszeit nur in ganz geringer Menge vorhanden sein.

farbstoff in der Hauptsache aus Sehgelb besteht, dessen Bleichungsgeschwindigkeit aber gegenüber der des Sehpurpurs selbst im Blau und Violett minimal ist. Dann muss ja unter allen Umständen das gleiche Endprodukt, nämlich sehr resistentes Sehgelb entstehen.

Die von Köttgen und Abelsdorff an Sehpurpurlösungen gemachte Beobachtung, dass der Sehpurpur ohne Sehgelbbildung ausbleiche, wird auf die frische Netzhaut übertragen, ohne dass hier von den Verfassern ausführliche Versuche mitgeteilt wurden. Es ist — und das halte ich für sehr wichtig — nur an dem aus der Netzhaut künstlich gewonnenen Farbstoff das Fehlen der Sehgelbbildung scheinbar konstatiert worden, und dieses Resultat wurde, nach den unten mitgeteilten Schlussätzen zu urteilen, verallgemeinert auf den Sehpurpur innerhalb der Netzhaut übertragen, der doch streng genommen allein hätte den Ausschlag geben können.

Wie unsicher aber gerade hier die genannten Autoren waren, geht aus folgendem Satz am besten hervor. „Auf die Wahrnehmungen, die wir bei der Betrachtung der Zersetzung mit blossem Auge machten, legen wir weniger Gewicht, zumal hier das Urteil von uns beiden zuweilen verschieden ausfiel; der eine meinte nicht selten bei der Bleichung, besonders der Netzhäute, die Farbe des Übergangsstadiums als Gelb bezeichnen zu müssen, wenn der andere die Richtigkeit dieser Bezeichnung bezweifelte.“ Nachdem sie noch auf eine vergleichende Absorptionsbestimmung einer frischen und einer gelb aussehenden belichteten Lösung des Froschsehpurpurs hingewiesen haben, stellen sie als Ergebnis des letzten Teiles ihrer Untersuchung den Satz auf, den sie zum mindesten nur auf ihre Sehpurpurlösung hätten einschränken müssen: „dass wir das Vorkommen von Sehgelb entschieden verneinen müssen; der Sehpurpur erbleicht, ohne in eine anders gefärbte Substanz überzugehen“.

Warum sie durch ihre messenden Bestimmungen ein ganz anderes Ergebnis erhielten, als Kühne bei seiner einfachen Beobachtung der Netzhäute und Tropfen von Sehpurpurlösungen im kurzwelligen Ende des Spektrums, darauf gehen die Verfasser nicht näher ein. Ich werde versuchen, den Grund dafür weiter unten bei der Besprechung meiner Ergebnisse auseinanderzusetzen, und es wird sich zeigen, dass das bloss scharf beobachtende Auge Kühnes der mühseligen Absorptionsmessung der Verfasser überlegen war.

Seit der eingehenden Arbeit von Köttgen und Abelsdorff galt es bei einer grossen Zahl von Physiologen als ausgemacht, dass der Sehpurpur ohne Bildung von Sehgelb ausbleicht, und doch war

die Beweisführung zunächst nur für die Lösung des Sehpurpurs geliefert, und die Autoren bemerken ja selbst, dass sie betreffs der Ausbleichung der Netzhaut (S. 183) unsicher waren. Und wer bürgt dafür, dass bei der Auflösung des Sepurpurs aus der Netzhaut nicht schon irgend eine Veränderung des Farbstoffes eintrat? Da aber die Verfasser ihr Endresultat ganz allgemein fassen, so ist man zunächst versucht, zu glauben, die Verfasser hätten wirklich den Beweis an dem in der frischen Netzhaut befindlichen Purpur erbracht.

Insbesondere gab bei der Sehpurpurlösung, die Köttgen und Abelsdorff mit der Kühneschen Gallenlösung anfertigten, die Konzentrationsberechnung, in bezug auf den kritischen kurzwelligen Teil des Spektrums, für die erste Bleichung:

bei 480 $\mu\mu$	ein Herabgehen der Konzentration auf	0,39
„ 460 $\mu\mu$	„ „ „ „	0,42
„ 440 $\mu\mu$	„ „ „ „	0,54

Beim zweiten Versuch ergab sich bei erster Bleichung:

bei 480 $\mu\mu$	ein Herabgehen der Konzentration auf	0,53
„ 460 $\mu\mu$	„ „ „ „	0,49
„ 440 $\mu\mu$	„ „ „ „	1,07

Es würde also in beiden Fällen die Konzentration anfänglich bei 440 $\mu\mu$ weniger abgenommen oder gar etwas zugenommen haben, jedenfalls nahm sie in diesem Spektralteil nicht entsprechend einer einfachen Verdünnung ab. Die Verfasser legen auf die Genauigkeit der Bestimmungen im kurzwelligen Teil wenig Wert, denn sie sagen, „dass in einer Reihe des ersten Versuches die Absorption bei 460 $\mu\mu$ und in einer des zweiten diejenige von 440 $\mu\mu$ zu hoch gemessen ist, beruht ja augenscheinlich nur auf Beobachtungsunsicherheit“.

Bei dieser Beobachtungsunsicherheit, die auch in den zahlreich erhaltenen negativen Absorptionswerten bei 440 $\mu\mu$ und namentlich 420 $\mu\mu$ hervortritt, hätte die Schlussfolgerung lauten müssen: wir fanden bei der Bleichung eine ziemlich proportionale Absorptionsabnahme bis zum Blau; wie sich die Verhältnisse im Violett gestalten, konnten wir wegen Beobachtungsunsicherheit nicht entscheiden. Es muss das hier noch besonders hervorgehoben werden, denn Kühne hat ja immer nur gesagt, was auch jenen Forschern bekannt sein musste, dass im Violett eine Absorptionszunahme eintrete.

Die Beobachtungsunsicherheit im Violett ist bedingt durch die beim gewöhnlichen Spektralapparat und daher wahrscheinlich auch bei Köttgen und Abelsdorff verhältnismässig grosse Beimengung von weissem Licht (durch Reflexionen u. dgl.), die besonders dann

hervortritt, wenn die Lichtquelle relativ wenig violette Strahlen enthält (Auerbrenner bei Köttgen und Abelsdorff). Die Absorptionsmessung im Violett nähert sich dann mehr oder weniger einer Absorptionsbestimmung im weissen Licht, und bei einer solchen muss ja frische Sehpurpurlösung mehr Licht absorbieren, als die zu Gelb gebleichte.

Ferner ist auch bei vollkommen reinem Spektrallicht durch die starke Absorption des Violett in der Macula der Vergleich sehr erschwert.

Der von den genannten Forschern ausgesprochene Satz von der Ausbleichung des Sehpurpurs ohne Bildung von Sehgelb wurde hauptsächlich von Nagel vertreten. So sagt dieser Forscher¹⁾ nach Besprechung der Ergebnisse von Kühne und König S. 98: „Neuere sorgfältige Untersuchungen haben nun aber überraschenderweise gezeigt, dass ein gelber Farbstoff bei der Purpurbleichung wenigstens in der Regel nicht entsteht.“ Als Beispiel führt er die Ausbleichung der Eulennetzhäute an, „die einem Rosenblatt in der Farbe gleichen und im Tageslicht zu reiner Farblosigkeit bleichen, ohne dabei ein gelbes oder auch nur gelbrotes Stadium zu durchlaufen“. Die Sicherheit der Darstellung Nagels, die beispielsweise aus dem Satz hervorgeht: „Wie Kühne zu der Annahme eines Sehgelb kommen konnte, das dann seinen Weg durch alle Lehrbücher gemacht hat, ohne doch zu existieren, ist nicht leicht festzustellen“, dürfte die Veranlassung gewesen sein, dass jene neuere, falsche Lehre, wie ich sie auf Grund der später zu besprechenden Versuche bezeichnen muss, auch in andere Lehrbücher überging. So schreibt Tigerstedt, Lehrbuch der Physiologie, 3. Aufl., 1905, S. 232: „Ans Tageslicht gebracht, verliert die Netzhaut ihre Farbe bis zur reinen Farblosigkeit, in der Regel ohne dabei ein gelbes oder gelbrotes Stadium zu durchlaufen.“ Immerhin hielt es auch Nagel für nötig, Bleichungsversuche in kurz- und langwelligem Licht durch Piper vornehmen zu lassen, die natürlich nur einen Sinn haben, wenn aus dem Sehpurpur ein Stoff von anderer Absorption sich bildet. Ein negatives Ergebnis, d. h. die gleichartige Ausbleichung im lang- und kurzwelligen Licht, beweist gar nicht, dass kein Sehgelb entsteht, und ist ebenso gut, wie schon oben erwähnt, durch eine zu geringe Lichtempfindlichkeit des Sehgelbs erklärbar. In der ausführlichen Mitteilung über die Bleichung des Sehpurpurs durch Lichter verschiedener Wellenlänge von Nagel

¹⁾ Nagel, Nagels Handbuch. Bd. III. 1. S. 98. 1904.

und Piper¹⁾ lautet das Resultat: sowohl bei Bleichung unter geeigneten Farbenfiltern, wie auch bei Bleichung mit spektralem Licht ergab sich das übereinstimmende Resultat, „dass die Netzhäute im Rotorange, Grün und Blau in der gleichen Weise, nur verschieden schnell ausbleichen, dabei meistens, soweit sich das beurteilen lässt, im gleichen Farbenton bleiben. Dass ab und zu eine Netzhaut etwas mehr sich gegen Orange hin verfärbt und auffallend lange in diesem Ton bleibt, ist unbestreitbar; ob das aber der Fall ist oder nicht, das hängt entschieden nicht von der Wellenlänge des Bleichungslichtes ab, sondern von anderen unbekannten Umständen“.

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Netzhäute der Eule und des Frosches. Die Verfasser finden wohl auch bei der Eule unter Umständen eine deutlich gelbrote, schliesslich geradezu gelbe Färbung, doch tritt diese Färbung scheinbar unabhängig von der Qualität des bleichenden Lichtes auf und bleibt für sie unerklärbar. Da die Verfasser für die Abweichung ihrer Ergebnisse von denen Kühnes keine Ursache finden konnten, so ist das Resultat ihrer Untersuchungen sehr wenig befriedigend. Die Schlussdarstellung der Verfasser kann, was hier nebenbei bemerkt sei, leicht zu Missverständnissen führen. Sie schreiben hier von der Annahme Kühnes, derzufolge neben dem Sehpurpur noch ein Sehgelb vorhanden wäre, das sich von jenem typisch durch die grössere Empfindlichkeit gegen die stark brechbaren Lichter unterscheiden sollte. Es kann natürlich hier nur gemeint sein, in der bereits angebleichten Netzhaut, da Kühne ja immer hervorhebt, dass sich das Sehgelb erst bei der Bleichung bildet. Wie wenig die Verfasser sich im Grunde genommen betreffs des Fehlens der Sehgelbbildung sicher fühlen, geht daraus hervor, dass sie am Schluss schreiben: „Nicht ausgeschlossen ist es natürlich, dass die Zersetzung des Sehpurpurs in verschiedener Weise vor sich gehen kann, und auch verschieden gefärbte Zersetzungsprodukte entstehen können.“ Übrigens wird in dieser letzten Arbeit zwischen den Ergebnissen an der Sehpurpurlösung und denen der Netzhaut besser unterschieden und damit auch motiviert, dass es ihnen immerhin wünschenswert schien, „an ganzen Netzhäuten Beobachtungen anzustellen, bei denen das Augenmerk ganz speziell auf die bei der Bleichung durchlaufene Farbenskala zu richten war“.

Trendelenburg geht bei seiner Untersuchung über den Seh-

¹⁾ Nagel und Piper, Über die Bleichung des Sehpurpurs durch Lichter verschiedener Wellenlänge. Zeitschr. f. Psych. u. Physiol. d. Sinnesorgane. Bd. XXXIX. 1905.

purpur¹⁾ von einem ganz andern Gedanken aus. Ist die Bleichungswirkung des Lichtes auf den Sehpurpur die Ursache der Lichtempfindlichkeit des Auges bei stark herabgesetzter Beleuchtung, so muss die bleichende Wirkung der verschiedenen spektralen Lichter den Dämmerungswerten derselben entsprechen. Mit Recht betont Trendelenburg, dass der andere Weg, den Sehpurpur mit den Dämmerungswerten in Beziehung zu setzen, noch unsicher ist, nämlich nach dem Prinzip von Köttgen und Abelsdorff die Absorptionskurve zu bestimmen, und diese dann mit den Dämmerungswerten zu vergleichen. Er sagt sehr richtig: „Denn den Absorptionsbestimmungen haftet leider immer noch der Mangel an, dass nach der Belichtung der Lösung ein gefärbter Rest übrig bleibt, welcher bei der Berechnung der Sehpurpurabsorptionswerte nur dann eliminiert werden kann, wenn es feststeht, dass in dem gelblichen Restfarbstoff kein Bleichungsprodukt vorliegt. Wenn hierfür auch besonders die Untersuchungen von Köttgen und Abelsdorff sprechen, so ist doch die Grundlage der Absorptionsbestimmungen noch nicht ganz sicher.“ Am Schlusse seiner Versuche bespricht er die Natur des gelblichen Restes, wie er nach Ausbleichung des Sehpurpurs sichtbar ist. Dass ein Teil desselben auf die Gallenlösung zu setzen ist, macht er dadurch wahrscheinlich, dass er eine Gallenlösung ebenso wie eine Sehpurpurlösung behandelt und dann eine nach dem Violett hin zunehmende Absorption findet. Doch reicht diese geringe Gelbfärbung allein nicht aus, und es wird angenommen, dass andere gefärbte Stoffe aus der Netzhaut in die Lösung übergehen.

Trendelenburg erklärt es aber für irrtümlich, den gelblichen Restfarbstoff mit dem „Kühneschen Sehgelb zu identifizieren, denn dieses soll ein Zwischen-, nicht ein Endprodukt der Sehpurpurbleichung sein“. Diese letztere Unterscheidung: Zwischenprodukt-Endprodukt dürfte nicht ausschlaggebend sein, denn Kühne gibt an, dass das Sehgelb unter Umständen sehr lichtbeständig sein kann, also in der Netzhaut, wenigstens, wenn nicht sehr hohe Lichtintensitäten zu längerer Ausbleichung in Anwendung kommen, das Endprodukt bildet. So lichtbeständig, wie in den Lösungen ist es in den

¹⁾ Trendelenburg, Über die Bleichung des Sehpurpurs mit spektralem Licht in ihrer Abhängigkeit von der Wellenlänge. Centralbl. f. Physiologie. 24. Februar 1904 (a).

Trendelenburg, Quantitative Untersuchungen über die Bleichung des Sehpurpurs im monochromatischen Lichte. Zeitschr. f. Psych. u. Phys. d. Sinnesorgane. Bd. XXXVII. 1904 (b).

Netzhäuten meist nicht, doch ist auch hier namentlich bei alten Netzhäuten die Indolenz sehr gross. Eine Ausbleichung von Sehpurpurlösungen bis zur Farblosigkeit scheint weder Köttgen und Abelsdorff, noch Trendelenburg gelungen zu sein, abgesehen von den oben erwähnten Versuchen mit der Kühneschen Gallenlösung.

Trendelenburg gibt zwar von vornherein die Möglichkeit zu, dass ein Teil des Restfarbstoffes aus Bleichungsprodukten des Sehpurpurs besteht. Doch spricht gegen eine solche Annahme auch nach Trendelenburg die Beobachtung Köttgen und Abelsdorffs, dass bei der Ausbleichung lediglich Konzentrationsdifferenzen auftreten. Dieser Punkt war schon oben erörtert worden. Auch besteht nach ihm zwischen der Absorption der Restfärbung und der Absorption des ungebleichten Purpurs für dieselben homogenen Strahlungen keine feste Beziehung, was nach seiner Ansicht zu erwarten wäre, wenn Sehgelb ein in bestimmter Menge aus dem Sehpurpur sich bildendes Produkt darstellt. Doch erscheinen die Abweichungen der bei ihm auf S. 37 (35) mitgeteilten vier Versuche nicht so beträchtlich, um den obigen Schluss, dass der Restfarbstoff in keinem konstanten Verhältnisse zum Sehpurpur stehe, zu rechtfertigen. Ausserdem bleibt eine derartige Überlegung unanwendbar, wenn man annimmt, dass der Restfarbstoff eine Summe von Verunreinigungen und Sehgelb darstellt.

Wie schon bei den Versuchen von Köttgen und Abelsdorff (s. o. S. 124) auseinandergesetzt wurde, bestimmte Trendelenburg den Absorptionskoeffizienten der frischen und der 6" gebleichten Lösung in verschiedenen Teilen des Spektrums und berechnete aus diesen Werten für die betreffenden Stellen des Spektrums das Verhältnis der ursprünglichen Konzentration zur Konzentration der Lösung nach der 6" anhaltenden Bleichung. Würde das Konzentrationsverhältnis in den verschiedenen Teilen des Spektrums konstant sein, so könnte es sich nach Trendelenburg nur um eine Verdünnung, also Ausbleichung ohne Sehgelbbildung handeln. Die Zahlen Trendelenburgs scheinen wenig beweisend: 1. weil er nur einen kurzen Teil des Spektrums untersuchte (507—463 $\mu\mu$), 2. weil die Konstanz auch hier nur eine sehr angenäherte ist (Schwankungen zwischen 0,61 und 0,68, im andern Falle von 0,72—0,79).

Als weiteren Beweis für die Berechtigung, den Restfarbstoff als einen von vornherein in der Purpurlösung enthaltenen Bestandteil anzunehmen, könnte man die gute Übereinstimmung der Kurve der vom Sehpurpur absorbierten Energiemengen, die nach dem Prinzip

der Subtraktion der Absorptionskurve des Restfarbstoffs gewonnen ist (s. u. S. 168), mit der Kurve der Dämmerungswerte anführen. Doch reichen die Kurven Trendelenburgs (l. c. S. 47 bzw. 51) im kurzwelligen Teil nur bis 455 $\mu\mu$, und eine grössere Differenz könnte ja nur dort hervortreten, wo die Absorptionszunahme des Sehgelbs nach Kühne eintritt. So wahrscheinlich also auch vielen nach den zuletzt genannten Untersuchungen das Fehlen der Sehgelbbildung bei der Ausbleichung des Sehpurpurs sein mag, zum Beweis fehlt die allerdings schwer zu bewerkstelligende Untersuchung im kurzwelligsten Teil des Spektrums. König, der diese Forderung bei der Untersuchung des menschlichen Sehpurpurs zu erfüllen suchte, erhielt ja, wie Trendelenburg ausführlich erörtert, damals nicht zu deuten wusste, und auf S. 42 (40) in Kurvenform abbildet, eine Absorptionszunahme im Violett beim Beginn der Ausbleichung.

Beweis der Bildung des Sehgelbs bei der Ausbleichung des Sehpurpurs.

1. Beobachtung an der frischen Netzhaut.

Eine sichere Entscheidung, ob sich Sehgelb bei der Ausbleichung einer frischen Netzhaut bildet, lässt sich, wie eingangs erwähnt, nach Kühne dadurch herbeiführen, dass man eine Netzhaut so weit ausbleicht, bis sie gelb erscheint, und sie mit einer noch nicht belichtet gewesenen Netzhaut im violetten Lichte des Spektrums vergleicht. Da das Sehgelb mehr Licht im Violett absorbiert, als der ursprüngliche Sehpurpur, so müsste die gebleichte Netzhaut dunkler erscheinen, als die sehpurpurhaltige. Diese von Kühne im Spektrum des Sonnenlichtes gemachte Beobachtung wurde von mir, um möglichst gleiche Bedingungen zu haben, im Sonnenspektrum wiederholt. Es wurde z. B. die eine von zwei frischen Netzhäuten im Gelbgrün so weit gebleicht, dass hier kaum mehr eine Absorption merklich war, und dann wurde diese in ihrer Färbung mit der ungebleichten verglichen. Unter 16 Versuchen bekam ich sechsmal ein positives Resultat, während es bei den anderen zweifelhaft blieb, oder gar die gelbgebleichte heller erschien, als die sehpurpurhaltige. Selbstverständlich konnten die negativen Resultate gegen den Kühneschen Befund nichts beweisen, da ja bei jeder zu weit gehenden Bleichung schliesslich die Netzhaut farblos wird. Aber auch bei den positiven Resultaten kann der Einwand erhoben werden, dass von vornherein der Sehpurpur-

gehalt der Vergleichsnetzhaut geringer war, als derjenige der zweiten Netzhaut des gleichen Frosches, die zur Bleichung verwendet wurde, bzw. dass bei der Präparation die Netzhaut eines Teiles der Stäbchen verlustig ging. Auch ist es an und für sich bei der geringen Helligkeit des Violetts für das menschliche Auge äusserst schwer, feinere Unterschiede wahrzunehmen.

Zum Teil konnte ein besserer Vergleich in dem Spektrum des Bogenlichtes erzielt werden. Es diente bei einer grossen Zahl von Versuchen als Lichtquelle eine Bogenlampe von 50 Ampère, die ein an violetten Strahlen sehr reiches Spektrum lieferte. Um möglichst alle durch Reflexion bedingten Verunreinigungen mit weissem Licht zu vermeiden, kamen entweder noch Farbenfilter zur Verwendung, oder es wurde schliesslich auch bei einem Teil der Versuche nach der Methode von Helmholtz¹⁾ das Violett des ersten unreinen Spektrums als Lichtquelle benutzt und von diesem ein zweites Spektrum entworfen. Bei der letzteren Versuchsanordnung wurde, um die Verschiedenartigkeit der Netzhäute auszuschalten, durch Abdecken einer Netzhauthälfte nur die eine Hälfte rasch zu Gelb ausgebleicht und dann im reinen Violett der Vergleich angestellt. Nach dieser Methode gelang es mehrfach, die von Kühne gesehene Verdunkelung der gelbgebleichten Hälfte wahrzunehmen. Nur muss bei der Ausbleichung der einen Hälfte die andere sorgfältig vor Licht geschützt werden. Sind auch die Resultate nach der beschriebenen Methode ziemlich einwandfrei, insbesondere wenn die Netzhäute von unbeteiligten Personen angesehen werden, die über den Gang des Versuches nicht orientiert sind, wie es mehrfach geschah, so bleibt immerhin der Einwand bestehen, dass von vornherein beide Netzhautteile in ihrer Färbung etwas verschieden waren, und nur eine sehr ausgedehnte Versuchsreihe hätte diesen Fehler und alle immerhin möglichen Täuschungen der Beobachter mit grösserer Sicherheit ausschalten können.

Eine volle Sicherheit liesse sich erst dann gewinnen, wenn man ein und dieselbe Netzhaut ungebleicht und zu Gelb gebleicht gleichzeitig vergleichen könnte, und dieser Vergleich sich am gleichen Objekt in voller Ruhe ausführen liesse, ohne weitere Bleichung oder Veränderungen fürchten zu müssen. Diese scheinbar paradoxe Forderung lässt sich nun mit Hilfe der

¹⁾ Helmholtz, Über die Empfindlichkeit der menschlichen Netzhaut für die brechbarsten Strahlen des Sonnenlichtes. Poggendorfs Annal. d. Physik. Bd. XCIV. S. 205. 1855.

Photographie durchführen. Die Grundzüge des Verfahrens sind sehr einfach.

Es wird auf einem matten Porzellanstreifen ein objektives Spektrum entworfen und auf diesem eine Reihe frischer Netzhäute ausgebreitet. Diese von den verschiedenen Lichtern des Spektrums bestrahlten Netzhäute werden nun mehrfach nebeneinander auf der gleichen Trockenplatte photographiert; zuerst ungebleicht, dann nach Gelbbleichung und schliesslich nach vollkommener, oder fast vollkommener Entfärbung. Die Schwärzlichkeit derselben Netzhaut in den verschiedenen Bleichungsstadien ist dann ein direkter Massstab für die Grösse der Lichtabsorption.

Bei der ursprünglichen Versuchsanordnung, auf die im einzelnen hier nicht näher eingegangen zu werden braucht, wurde der Glühstab einer Nernst-Lampe als relativ konstante Lichtquelle benutzt und mit Hilfe eines Merzschen Spektralapparates ein objektives Spektrum entworfen. In der Ebene des Spektrums im äussersten Violett befand sich eine streifenförmige Skala grauer Papiere, und dicht über dieser, ebenfalls vom Violett bestrahlt, ein Porzellanknopf, auf dem sich die Netzhaut befand. Der Porzellanknopf liess sich durch eine einfache Vorrichtung immer rasch an die gleiche Stelle des Spektrums bringen (vgl. Fig. 1, Taf. VIII). Durch eine Verschiebungsvorrichtung konnten auf der Trockenplatte drei Aufnahmen nebeneinander vorgenommen werden. Der Porzellanknopf wurde vom äussersten, noch eben sichtbaren Violett beleuchtet. Um die Expositionszeit bei der schwachen Beleuchtung möglichst abzukürzen, diente als photographisches Objektiv ein Paar Quarzlinsen, deren Chromasie, da mit nahezu monochromatischem Lichte photographiert wurde, nicht störte. Die Expositionszeit betrug für jede Aufnahme 5 Minuten, und es wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die Aufnahmen möglichst bald nach der Tötung des Frosches vorgenommen wurden, um eine Veränderung der Netzhaut durch Absterben auszuschliessen.

In Fig. 1 entspricht die unregelmässige dunkle Fläche auf der weissen Porzellankugel einer unbelichteten Froschnetzhaut. Die dunkeln Flecken links unten und rechts oben sind nasse Filtrierpapierstreifen, durch deren Adhäsion die Netzhaut auf der glatten Porzellankugel gehalten wird. Bei *b* ist dieselbe Netzhaut in der zweiten Aufnahme wiedergegeben, nachdem sie zu Gelb ausgebleicht war, schliesslich bei *c* die Netzhaut nach vollständiger Ausbleichung. Dass während der drei Aufnahmen die Beleuchtungsintensität hinreichend konstant blieb, zeigten die Bilder der unterhalb der Kugel

befindlichen Streifen von verschiedenen grauen Papieren (*P*). Die verschiedene Weisslichkeit der Fliesspapierstreifen bei *b* und *c*, die mit obiger Angabe scheinbar in Widerspruch steht, ist voraussichtlich durch das Austrocknen und damit der grösseren diffusen Lichtreflexion des Papiere bedingt. Der angeführte Versuch zeigt, dass ein und dieselbe Netzhaut bei der gleichen Beleuchtung mit violettem Licht dunkler erscheint, nachdem sie zu Gelb ausgebleicht ist.

Dem Einwurf, dass etwa das Stehen und Eintrocknen an sich (letzteres wurde, nebenbei bemerkt, bei einem Teil der Versuche durch eine Zerstäubungsvorrichtung nach Möglichkeit vermieden) eine merkliche Veränderung der Lichtabsorption im Violett bedinge, wurde dadurch begegnet, dass ohne Bleichung ein und dieselbe Netzhaut in längeren Zwischenzeiten aufgenommen wurde, ohne dass man für Anfeuchtung derselben Sorge trug. Fig. 2 zeigt das Resultat dieses Kontrollversuches. Zwischen den Aufnahmen 1 und 2 verstrichen hier 34 Minuten, zwischen Aufnahme 2 und 3 23 Minuten. Zugleich zeigt diese photographische Aufnahme, dass das zur Photographie eben ausreichende violette Licht trotz längerer Einwirkung keine merkliche Absorptionsänderung der Netzhaut und somit keine Ausbleichung erzeugen konnte.

Im ganzen gelang es, 18 Versuche zu erhalten, bei denen ein und dieselbe Froschnetzhaut, ohne dass sie sich auf dem Porzellanknopf irgendwie verschob¹⁾, purpurhaltig, gelb und nahezu farblos aufgenommen werden konnte. Unter diesen 18 Versuchen ergaben 11 ein positives Resultat, d. h. es zeigte sich bei ihnen eine Zunahme der Netzhautabsorption nach der Gelbbleichung. Dass in 7 Fällen ein Unterschied nicht zu konstatieren war, ist nicht wunderbar, denn sobald die Bleichung zu weit geht, oder auch zu gering ist, braucht die Absorptionszunahme nicht merklich zu sein.

Da es wünschenswert war, auch noch am Auge eines Säugetieres dieses, neuerdings so entschieden in Abrede gestellte Verhalten nachzuprüfen, wurden vier analoge Versuche an Augen von albinotischen Ratten angestellt. Man kann hier nach meinen Erfahrungen ebenso, wie auch beim albinotischen Kaninchen²⁾, den Sehpurpur mit

¹⁾ Durch Abrutschen der Netzhaut von der glatten Porzellanfläche wurden verschiedene Versuche vereitelt.

²⁾ Dietl und Plenk (Untersuchungen über die Wahrnehmbarkeit des Sehpurpurs mit dem Ophthalmoskope. Med. Centralbl. 1877. S. 273) versuchten schon unter möglichst günstigen Bedingungen die Wahrnehmbarkeit des Seh-

dem Augenspiegel im uneröffneten Auge sehen und die Ausbleichung zu Sehgelb beobachten, wovon ich mich schon mehrfach durch verschiedene Versuche überzeugt hatte, wenn man durch Einbinden einer Kanüle in die Carotis das Blut nach Möglichkeit mit Ringerscher Lösung ausspült. Es wurde nun ein im Dunkeln in der beschriebenen Weise blutfrei gemachtes Rattenauge derartig in einen runden Ausschnitt einer vertikalen Korkplatte befestigt, dass die hintere Bulbushälfte von der skleralen Seite aus mit dem spektralen Violett beleuchtet werden konnte, während ein Teil der vorderen Bulbushälfte mit der Pupille und der durchsichtigen Iris auf der andern Seite der Korkplatte in dem Ausschnitt sichtbar war. Das aus dem vorderen Augenabschnitt dringende Licht diente nun zur photographischen Aufnahme. Da dasselbe den ganzen Bulbus und mithin die ganze Netzhaut durchsetzt hatte, so war die Intensität desselben mit von der Absorption der Netzhaut abhängig. Um auch hier eine Kontrolle über die Konstanz der Beleuchtung zu haben, befand sich unterhalb des Auges noch ein Kreisausschnitt, dessen eine Hälfte mit einem durchscheinenden Papier bedeckt war. Der Lichthof um die Öffnung dürfte als Kontrolle für die Beleuchtungskonstanz dienen können. In Fig. 3, Taf. VIII, ist ein solcher Versuch wiedergegeben. Man sieht im unteren Teil der Figur drei unregelmässige Flecke, die dem leuchtenden Vorderteil des Rattenauges entsprechen. Das Auge vor der Bleichung (rechts in der Figur) ist

purpurs beim Augenspiegeln festzustellen. Auch dann, wenn sie die Albinokaninchen entbluteten, und von der einen Carotis aus Milch injizierten, um eine weisse Unterlage zu gewinnen, gelang es nicht, den Sehpurpur wahrzunehmen. Im Gegensatz zu der Angabe Helfreichs (*Ophthalmoskopische Mitteilungen über den Purpur der Retina. Centralbl. f. med. Wissensch. 1877. S. 113*), dass beim Augenspiegeln, insbesondere des entbluteten Albinokaninchens zwischen dem vorher belichteten und unbelichteten Auge eine Farbendifferenz erkennbar wäre, betonen die Verfasser, dass bei Milchinjektion der Augenhintergrund milchweiss erschien, bei nachheriger Blutinjektion die Chorioidealgefässe wieder hervortraten und nach Herausnahme die Netzhaut doch dabei blass rosa war. Da die Beobachtungen bei gewöhnlicher, künstlicher Beleuchtung gemacht waren, werden weitere Versuche bei Tageslicht in Aussicht gestellt. Voraussichtlich wäre den Verfassern, wenn sie diese zur Wahrnehmung günstigere Bedingung später erfüllt hätten, auch die Wahrnehmung des Sehpurpurs in situ geglückt. Ich selbst habe öfters einfach nach gründlicher Ringerdurchspülung teils am Bogenlicht, besonders aber beim Spiegeln mit Tageslicht beim uneröffneten Albinauge (Kaninchen und Ratte) eine Rotfärbung des Augenhintergrundes wahrnehmen und demonstrieren können, die unter Einwirkung des bleichenden Lichtes in helles Gelb überging.

deutlich heller, als nach der Gelbbleichung (in der Mitte), und endlich nach vollständiger Ausbleichung (links) sendet das Auge noch wesentlich mehr Licht aus, als bei seinem anfänglichen Purpurgehalt. Der Lichthof der unteren (in der Figur oberen) Öffnung zeigt, wie schon erwähnt, dass die spektrale Beleuchtung bei allen drei Aufnahmen konstant blieb. Von vier derartigen Versuchen ergaben drei ein positives Resultat, wenn auch die Differenz nicht so gross war, wie in obigem Versuch, d. h. Absorptionszunahme im Violett bei der Sehgelbbildung.

Bei den bisherigen Versuchen war das durch ein Prisma entworfene objektive Spektrum infolge der Reflexion an den Prismenflächen, Linsen usf. nicht ganz rein, was bei Untersuchung mit dem Handspektroskop namentlich am violetten Ende hervortrat. Konnte hierdurch das Ergebnis auch nicht in Frage gestellt werden, ja kann man sogar sagen, dass trotz der Zumischung weissen Lichtes zum Violett die Absorptionsdifferenz noch merklich blieb, und der Versuch also *a fortiori* beweisend ist, so erschien es doch wünschenswert, die Absorption in möglichst reinem spektralem Licht zu bestimmen. Ausserdem würde der Versuch am einwandsfreiesten sein, wenn man in den Stand gesetzt wäre, gleichzeitig Netzhäute im lang- und kurzwelligen Teil des Spektrums aufzunehmen und so zu zeigen, dass bei der Bleichung neben der Absorptionszunahme im Violett eine Absorptionsabnahme im Grün auftritt, so dass man also gewissermassen jeweilig die Absorptionsänderung im ganzen Spektrum überblicken kann.

Ein sehr reines Interferenzspektrum erhielt ich durch ein echtes Rowlandsches Konkavgitter von 61 cm Brennweite, und es gelang mir nach mühevollen Vorversuchen, mit Hilfe der sog. panchromatischen Platten der Firma Kranseder in München (Kranzplatte 3) das objektive Interferenzspektrum vom Violett bis zum Orange aufzunehmen, so, dass die chemische Wirkung der verschiedenen Lichtwellen auf die Platte angenähert die gleiche war. Das Spektrum erschien infolgedessen als ein ziemlich gleichmässig graues Band. Allerdings musste, da bei der Beleuchtung mit der Nernst-Lampe das violette Ende des Spektrums zu dunkel wird, elektrisches Bogenlicht angewendet werden, das infolge seines Reichtums an violetten Strahlen die Unterempfindlichkeit der panchromatischen Platten gegen Violett wieder ausgleicht.

Beschreibung der Versuchsanordnung.

Die Lichtquelle, eine sehr gleichmässig brennende Bogenlampe (L) von 15 Ampère, befindet sich in dem einen Zimmer, während in einem Nachbarzimmer das Gitter G aufgestellt ist, das das objektive Spektrum des Spaltes S entwirft. Beide Zimmer (vgl. die untenstehende Textfig. 2) kommunizieren durch eine Öffnung in der Wand W , in der zur Abhaltung alles Seitenlichtes ein längeres mit Diaphragmen versehenes, schwarzes Papprohr eingefügt ist. Die vom Spalt S ausgehenden Strahlen gehen also, wie die Figur zeigt, durch das Papprohr hindurch und werden vom Konkavgitter G so reflektiert, dass in M das reelle Bild des Spaltes entsteht. Hier ist ein feiner vertikaler Papierstreifen befestigt, auf dessen Mitte sich der Spalt S als helle Lichtlinie bei richtiger Einstellung abbildet. Das erste Beugungsspektrum würde dann bei $Ro-V$ zu stande kommen.

Zur Messung der Wellenlängen des Spektrums dient eine, mit ihrer Längsachse vertikal aufgestellte, also dem Spalt S parallel verlaufende Heliumröhre H . Wird der um A drehbare Spiegel $A-R$ um 45 Grad gedreht, so dass er den Anschlag R' berührt, so werden die von der Heliumröhre ausgehenden Strahlen vom Spiegel $A-R'$ so reflektiert, als ob die Heliumröhre sich an dem Ort des Spaltes befände. Infolgedessen entsteht auch, wenn der Spiegel die Lage $A-R'$ einnimmt, in der Mitte des Papierstreifens M als feine vertikale Lichtlinie, das Bild der Heliumröhre. Es muss dann aber auch, wenn das Bild des Spaltes an derselben Stelle, wie das der Heliumröhre liegt, das erste Beugungsspektrum des Spaltes mit dem der Heliumröhre zusammenfallen. Man kann also bei der obigen improvisierten Versuchsanordnung hinreichend genau die Wellenlängen bestimmen, wenn man nur dafür sorgt, dass Spaltbild und Bild der Heliumröhre immer genau auf die Mitte der Marke M fallen.

An der Stelle des ersten Beugungsspektrums $Ro-V$ befand sich ein auf einer Korkplatte befestigter matter Porzellanstreifen, der durch einen Anschlag immer wieder an die gleiche Stelle gebracht werden konnte. Die

Fig. 2.

scharfe Einstellung des Spektrums auf diesem Streifen wurde rein empirisch mit Hilfe der Heliumlinien vorgenommen, d. h. es wurde durch Verschieben des Porzellanschirmes diejenige Stelle aufgesucht, bei der sowohl die gelbe Heliumlinie ($587,6 \mu\mu$) als auch die violette ($447,2 \mu\mu$) möglichst scharf erschien ¹⁾.

Dieses in *Ro—V* entworfene Spektrum, das je nach Stellung des Spiegels der Heliumröhre oder dem Bogenlicht entsprach, wurde mit Hilfe eines photographischen Apparates aufgenommen, der als Objektiv eine einfache Quarzlinse trug. Da sich die verschiedenen Teile des Spektrums in verschiedener Entfernung von der nicht achromatisierten Quarzlinse scharf abbilden, wurde die Visierscheibe so gegen die optische Achse geneigt, dass der linke Teil derselben, wo sich das violette Spektralende abbildete, der Quarzlinse etwas näher, das rote *Ro'* etwas entfernter lag. Trotz der hierdurch bedingten Verzerrung ergab die Aufnahme der Heliumlinien, dass für den vorliegenden Zweck die Abstände der einzelnen Punkte des Spektrums den Wellenlängen direkt proportional gesetzt werden konnten.

Die gleichmässige Beleuchtung des Spaltes *S* und damit ein im oberen wie unteren Teil (abgesehen vom Rand) gleich helles Spektrum wurde dadurch erzielt, dass die von der Bogenlampe ausgehenden Strahlen durch ein photographisches Objektiv (Voigtländerscher Porträtkopf) *O* so gebrochen wurden, dass in der Ebene des Konkavgitters *G* ein reelles Bild der Lichtquelle *L* entstand. Ferner wurde vor der Wand noch ein durch Elektromagnet angetriebener Verschluss aufgestellt, der nach Bedarf zeitweilig die vom Spalt oder von der Heliumlampe kommenden Strahlen in das zweite Zimmer eintreten liess, oder abblendete.

Bei möglichst gleichmässig brennender Bogenlampe wurden nun durch geringe vertikale Verschiebung des Quarzobjektives auf ein und derselben Trockenplatte 3 oder noch mehr Aufnahmen untereinander vorgenommen. Zunächst wurde eine Aufnahme gemacht von dem durch die spektralen Lichter beleuchteten Porzellanstreifen, auf dem eine Reihe frischer sehpurpurhaltiger Netzhäute ausgebreitet war. Sodann wurde nach Gelbbleichung direkt darunter bei gleich langer Expositionszeit eine zweite Aufnahme vorgenommen, und schliesslich darunter eine dritte nach vollständiger Ausbleichung. Zur Bestimmung der Wellenlänge wurde dann in vielen Fällen noch einmal mit ganz kurzer Expositionszeit eine Aufnahme des Spektrums gemacht und dann auf die gleiche Stelle der Platte nach Umlegen des Spiegels die Heliumlinien entworfen. Bei der grossen Lichtschwäche der Linien dauerte eine solche Aichung gewöhnlich 20 bis 30 Minuten. Dagegen brauchte man für die Photographie des Bogenlichtspektrums nur eine Expositionszeit von $1\frac{1}{2}$ Minuten. Um bei einer fortlaufenden Versuchsreihe nicht jedesmal die Aichung vornehmen zu müssen, wurden auf dem Porzellanstreifen als konstante Marken vier punktierte Linien mit Tusche gezogen, die, so lange die Anordnung konstant bleibt, immer den gleichen Wellenlängen entsprechen.

¹⁾ Die Aufstellung des Konkavgitters nach der für die Spektroskopie üblichen Regel (vgl. Kayser, Spektroskopie. Bd. I. 1905. S. 167) konnte aus äusseren Gründen hier nicht durchgeführt werden.

Ergebnisse.

Die nach der beschriebenen photographischen Methode vorgenommenen Absorptionsbestimmungen ergaben ganz einwandsfrei, dass bei der Ausbleichung die Netzhäute im Violett dunkler werden, während gleichzeitig auf denselben Bildern die Absorption im langwelligen Teil abnimmt. Als Belegstücke sei hier von jeder Tierart, die untersucht wurde, nur ein Beispiel auf Taf. IX und X angeführt. Der Vergleich hätte wesentlich schlagender werden können, wenn ich für die Reproduktion die einzelnen Spektralstreifen hätte näher zusammenrücken lassen, doch hielt ich es für wichtiger, hier Kopien der Originalphotogramme ganz unverändert mitzuteilen, da sie nur dann als sichere Beweisstücke gelten können. Die Photographien sind auf den Tafeln auf rein photomechanischem Wege hergestellt, dabei zum Teil (Taf. X) etwas verkleinert, aber ausdrücklich jede Retouche untersagt. Abgesehen von Taf. X wurden direkt die Originalaufnahmen durch Abziehen von den Glasplatten für den Lichtdruck verwendet.

Die zahlreichsten (22) Versuche wurden am Frosch ausgeführt, da an diesem zunächst die Methode genauer erprobt wurde. In Fig. 4, Taf. IX ist ein derartiger Versuch mit elf Netzhäuten angestellt. Die Netzhäute wurden am oberen Rande des Porzellanstreifens auf der darunterliegenden Korkplatte mit Nadeln festgesteckt und mit ihrer vitralen Fläche möglichst glatt, so weit sich das bei schwachem roten Licht ausführen lässt, auf der Porzellanplatte ausgebreitet. Die Reihe I entspricht der Aufnahme der unbelichteten, sehpurpurhaltigen Netzhäute. Unmittelbar nach der $1\frac{1}{2}$ Minuten dauernden Exposition im Spektrum wurden die Netzhäute mit dem Licht der elektrischen Glühlampe von einer bestimmten Entfernung aus bestrahlt und dann die Aufnahme II vorgenommen. In gleicher Weise nach weiterer Bestrahlung mit Glühlicht von $\frac{1}{2}$ Minute, Reihe III, und endlich nach möglichst vollständiger Ausbleichung am Tageslicht Reihe IV. Leider ist diese letzte Reihe nicht streng mit den übrigen vergleichbar, weil die Intensität der Spaltbeleuchtung durch die Bogenlampe während der längeren Zwischenzeit (Bleichung am Tageslicht) etwas zugenommen hatte, was an der grösseren Weisslichkeit des Grundes zu erkennen ist. In der V. Reihe endlich ist das Spaltspektrum nur ganz kurz aufgenommen und dann $\frac{1}{2}$ Stunde lang die Platte dem Spektrum der Heliumröhre exponiert worden. Man sieht sehr deut-

lich die von Tschermak¹⁾ angeführten Heliumlinien, 587,6 $\mu\mu$ gelb, 502 $\mu\mu$ grün, 495 $\mu\mu$ schwach bläuliches Grün, 470 $\mu\mu$ Blau, die beiden letztgenannten sind auf der Kopie am wenigsten gut zu erkennen, und wiederum sehr deutlich die violette Linie von 446 $\mu\mu$ ²⁾. Ausserdem treten die Cyanbanden Nr. 2, 3 und 4, die sich nach Kayser (loc. cit. Bd. II, S. 471) im elektrischen Kohlenflammenbogen finden, sehr deutlich auf der kürzer exponierten Reihe V hervor. Der linke langwelligere Rand derselben beginnt bei 421,6 $\mu\mu$, 388,4 $\mu\mu$ und 359,0 $\mu\mu$. Letztere Bande ist nur bei der längeren Expositionszeit in der Reihe I bis IV sichtbar. Bei einer Ausmessung nach den Heliumlinien, die keineswegs auf grössere Genauigkeit Anspruch erheben soll, ergab sich 421 $\mu\mu$, 391 $\mu\mu$ und 358 $\mu\mu$. Diese genannten drei helleren Streifen werden auch in den folgenden Bildern hervortreten und können zur ungefähren Orientierung der Wellenlängen dienen. Ausser den charakteristischen von Tschermak bzw. Erdmann angeführten Linien des Heliums bekam ich bei etwa 385 $\mu\mu$ noch eine sehr kräftige Linie, deren sichere Deutung ich zunächst nicht zu geben vermochte, bis ich bei Kayser die Angabe fand, dass eine sehr starke Heliumlinie bei 388,8785 $\mu\mu$ auftritt.

Man sieht nun bei genauem Vergleich der Reihen, dass die Absorptionszunahme, besonders zwischen Reihe I und II, bei den beiden ersten Netzhäuten, die am rechten Ende der den Spektren entsprechenden hellen Streifen liegen, sehr deutlich ist. Die beiden Netzhäute bilden eine zusammenhängende Masse, und sind am kurzwelligen Ende von der Cyanbande 3 überdeckt. Aber auch noch die dritte Netzhaut vom kurzwelligen Ende an gerechnet, deren Lage der Linie G entspricht (430,5 $\mu\mu$), zeigt eine eben merkliche Absorptionszunahme, insbesondere nach dem kurzwelligen Ende hin. Dagegen tritt bei der auf 446 $\mu\mu$ liegenden Netzhaut bereits in Reihe II eine Absorptionsabnahme auf und dasselbe gilt zum Teil in noch höherem Masse für alle übrigen Netzhäute bis zu der im Gelbgrün gelegenen. Zugleich zeigt nun aber das Photogramm auf Grund der verschie-

¹⁾ A. Tschermak, Über die spektrometrische Verwendung von Helium. Pflügers Arch. Bd. LXXXVIII. H. 1—2. S. 95. 1901.

²⁾ Nach Kayser liegt die starke violette Linie nicht bei 446 $\mu\mu$, wie Tschermak nach Erdmanns Tabelle (Erdmann, Lehrbuch der anorgan. Chemie. 1898. S. 230) angibt, sondern bei 447,16 $\mu\mu$, auf Grund der Messungen von Runge und Paschen. Da diese Differenz, die ich erst nachträglich fand, eine nur geringe Abweichung bedingt, habe ich sie in den Zeichnungen der Kurven nicht berücksichtigt.

denen Dunkelheit der Netzhäute, dass die Absorption der sehpurpurhaltigen Netzhäute ihr Maximum etwa zwischen *E* und *F* hat, und die Absorption nach dem kurzwelligen Teil langsam, nach dem langwelligen rasch abnimmt. Vergleicht man damit dagegen Reihe III, so sieht man ohne weiteres, wie die Absorption nach dem kurzwelligen Ende zunehmend zwischen *G* und *H* am stärksten zu sein scheint.

Noch deutlicher tritt der Umschlag in der Absorption im Violett bei der Netzhaut des Bleys (*Abramis brama*) ein, wie man auf Fig. 5 sieht. Bei der Empfindlichkeit der frischen Fischnetzhaut (Stäbchenverlust bei der Präparation) ist in der Reihe I bereits die dritte Netzhaut vom kurzwelligen Ende an gerechnet an Sehpurpur arm, desgleichen die siebente. Die übrigen Netzhäute zeigen aber das für den Fischsehpurpur charakteristische Verhalten. Wie schon Kühne und Sewall (Zur Physiologie des Sehepithels, insbesondere der Fische. Heidelberger Untersuchungen. Bd. III. 1880. S. 266) hervorheben, ist bei Fischen die Farbe des Sehpurpurs bläulicher als bei den übrigen Wirbeltieren. „Der Sehpurpur des Bleys hat die bei Fischen sehr verbreitete, mehr zum Violett, als zu der Nuance, die wir noch als Purpur zu benennen pflegen, neigende Farbe.“ Durch die Absorptionsbestimmungen der Sehpurpurlösungen wurde bekanntlich diese Differenz als allgemeine Regel von Köttgen und Abelsdorff (a. a. O.) aufgestellt. Schon die auf Grund der Beobachtung der Netzhäute im Spektrum von Kühne und Sewall entworfene Absorptionskurve zeigt diese Differenz sehr klar (vgl. die umstehende Kopie).

In der Tat geht, wie bei dieser Figur, die Absorption bis ins Orange. Die letzte Netzhaut, die etwa bei $600\mu\mu$ liegt, ist bei I noch deutlich dunkler, als im angebleichten Zustand II.

Die Ausbleichung gibt eine Erhellung bis zu der links von $446\mu\mu$ liegenden Netzhaut, dagegen erfahren die Netzhäute zwischen $446\mu\mu$ und $400\mu\mu$ eine deutliche Absorptionszunahme. Weitere fortgesetzte Bleichung führt schliesslich wenigstens zu einer Verringerung der Absorption auch im kurzwelligen Teil. Zur Beurteilung der Wellenlänge müssen hier die nachträglich gemachten Marken bei $446\mu\mu$ und $587\mu\mu$ dienen, da die Heliumlinien selbst auf der Kopie nur schwer erkennbar sind.

Von besonderem Interesse war der gleiche Nachweis bei der Enle, Fig. 6, Taf. IX, hatten doch gerade hier Nagel und Piper angegeben, dass in der Regel kein gelbliches Zwischenstadium auftritt. Es gelingt aber gerade hier, wenigstens beim Waldkauz (*Syrnium*

aluco), die Absorptionszunahme während der Bleichung im Violett nachzuweisen. Da die Netzhäute ausserordentlich purpurreich sind, so ist auch, wie ein derartiger Versuch auf Taf. IX, Fig. 6 zeigt, die Absorption im Grün sehr bedeutend. In dem Versuchsbeispiel war das Objektiv von unten nach oben geschoben worden, so dass hier die erste Reihe zu unterst steht. Es zeigt der Versuch dadurch gleich, dass die etwas verschiedene Lage des Objektives zum Spektrum das Resultat nicht merklich beeinflusst. Es sei noch bemerkt, dass hier das Spektrum bei etwas stärkerer Vergrösserung aufgenommen wurde, so dass die durch weisse Marken am oberen Rand der Figur angegebenen Heliumlinien einen etwas grösseren Abstand von einander haben. Vergleich von I und II gibt Zunahme der Absorption an den, zwischen $446\ \mu\mu$ und $400\ \mu\mu$ liegenden Netzhäuten. Besonders auffallend ist die Zunahme in dem kurzwelligen Teil des Spektrums, der dem Auge gerade noch sichtbar ist. Die Netzhaut,

Fig. 3. (Kühne, Untersuch. Bd. III. S. 266.)

die zwischen $470\ \mu\mu$ und $446\ \mu\mu$ liegt, zeigt kaum eine Änderung, dagegen alle weiteren Netzhäute bis zu $587\ \mu\mu$ erfahren eine wesentliche Absorptionsabnahme. Ein anderer Versuch bei der Eule führte zu ganz dem gleichen Ergebnis.

Von Säugetieren wurde die Netzhaut des Kaninchens und des Affens untersucht. Beim Kaninchen, Fig. 7, Taf. X, musste die Alaunhärtung angewendet werden, da die frische Netzhaut wegen ihrer grossen Zerreisslichkeit sich nur schwer im Zusammenhang erhalten lässt. In Fig. 7 sind nur drei Netzhautstücke benutzt worden. Die zwischen $400\ \mu\mu$ und $446\ \mu\mu$ gelegenen zeigen beide bei der Gelbbleichung eine Absorptionszunahme, während das dritte Stück im Blaugrün eine Absorptionsabnahme erfährt.

Beim Affen, Fig. 8, wurde eine Netzhaut benutzt, die unmittelbar nach der Enucleierung in Ringerscher Lösung isoliert worden war. 20 Minuten nach der Entfernung des Auges aus dem Körper wurde schon die erste Aufnahme gemacht, und etwa zehn Minuten

später der zweite Versuch. Die frische Netzhaut wurde nach der ersten Aufnahme rasch bei Tageslicht angesehen, ihre Farbe nach der mir zur näheren Bestimmung der Netzhautfarbe dienenden Farbenscheitel¹⁾ (Taf. VII) auf B_{10} — C_9 abgeschätzt. Sie ging rasch bis E_9 und bei dieser Färbung wurde der zweite Versuch angestellt. Die Absorptionszunahme im äussersten Violett ist auch hier deutlich (zwischen 390 und 420 $\mu\mu$). Die dritte Reihe, die nach möglichst vollkommener Ausbleichung im Sonnenlicht zu E_{10} — F'_{10} aufgenommen wurde, ist auszuschneiden, wegen ungleichmässigen Brennens der Bogenlampe (scheinbare Absorptionszunahme im Grün!). Es wurde noch eine Reihe IV aufgenommen, die richtig exponiert wurde unter sonst denselben Bedingungen, wie Versuch III. Ein zweiter Versuch an dem Auge des frisch gestorbenen Tieres führte zu dem gleichen Ergebnis, doch war der Unterschied nicht so ausgesprochen wie in Fig. 8.

Herrscht nach obigen Versuchen wohl auch kein Zweifel, dass in der isolierten Netzhaut des Warm- und Kaltblüters bei der Bleichung ein Farbstoff entsteht, der im kurzwelligen Teil sogar mehr Licht absorbiert, als der Sehpurpur, so war damit noch nicht erwiesen, dass auch im lebenden Auge unter Umständen Sehgelb in merklicher Menge auftritt. Der Beweis für die Sehgelbbildung im lebenden Auge dürfte direkt nur schwer zu erbringen sein²⁾. Indirekt lässt es sich nun freilich ziemlich wahrscheinlich machen, dass ein gewisses Quantum Sehgelb unter gewissen Umständen vorhanden sein muss, insbesondere beim raschen Übergang von sehr niedrigen zu hohen Beleuchtungsintensitäten. Und zwar würde sich das auch auf das menschliche Auge, bzw. Säugetierauge beziehen müssen. Da an der herausgeschnittenen Netzhaut erwiesen ist, dass die Gelbfärbung bei der Ausbleichung wirklich durch einen neuen Farbstoff bedingt ist, so wird es per analogiam erlaubt sein, zu schliessen: findet sich an

¹⁾ In der beiliegenden Farbenscheitel (Taf. VII) wurde es versucht, die Farben wiederzugeben, welche bei frischen Netzhäuten und während ihrer Ausbleichung zur Beobachtung kommen können. Die Horizontalreihen sind von oben nach unten mit $A B C D E$ bezeichnet, und in jeder Horizontalreihe sind die verschiedenen Sättigungsstufen (Verhüllung durch Weiss) durch die Nummern 1, 2 usf. bezeichnet.

²⁾ Sollte nach der folgenden Auseinandersetzung noch ein Zweifel bestehen, ob sich Sehgelb auch im Auge des lebenden Tieres unter Umständen in merklicher Menge finden kann, so wäre es technisch wohl durchführbar, und nur betreffs der Aufstellung etwas mühselig, ein Bleyauge im spektralen Licht am lebenden Tier ungelbleicht und gebleicht zu photographieren usw.

der lebensfrischen Netzhaut nach Bleichung *intra vitam* an Stelle des Sehpurpurs ein Gelb, von ganz der gleichen Färbung wie an der erst nach Isolierung gebleichten Netzhaut, so sind wir berechtigt, diese an der frischen Netzhaut zu konstatierende Gelbfärbung ebenfalls auf einen neuen Farbstoff zu beziehen.

Die entscheidendsten Versuche sind an der Kaninchennetzhaut gemacht worden. In den Optogrammen, die während des Lebens aufgenommen wurden und dann unmittelbar nach dem Tode fixiert wurden, haben Ayres und Kühne¹⁾ und namentlich Ewald und Kühne²⁾ gezeigt, dass bei unvollkommener Bleichung gelb- und orangefarbige Streifen in der Netzhaut erhalten wurden. Dass diese Gelbfärbung der partiell gebleichten Netzhaut schwerlich erst bei der Alaunfixierung erfolgte, geht daraus hervor, dass bei einer intravitalem Regenerationszeit die angebleichten Partien sehr wohl rosa erscheinen können, also eine partielle Bleichung kann ganz gut als rosa Streif fixiert werden, wenn nur dem Tier Zeit zur Bildung von Purpur aus Sehgelb gelassen wird. Es wird also eine rosa gebleichte Netzhaut nicht durch die Alaunfixierung gelb, sondern die gelbgefärbten Teile enthielten diesen Farbstoff auch schon vor der Fixierung³⁾.

Von Kaltblütern ist für den Frosch das Vorhandensein von Sehgelb in der lebenden Netzhaut höchst wahrscheinlich, denn Kühne gibt an, dass bei Fröschen, die in geschlossenen Räumen, also bei mässiger Belichtung sich aufhalten, die Netzhäute reinrot (d. h. bei Kühne spektralrot), chamois, oder gelb gefunden werden (Kühne, Hermanns Handbuch. Bd. III. 1. 1879. S. 299). Auch für die Netzhaut der Fische erscheint ein Vorhandensein von Sehgelb in der Netzhaut des lebenden Tieres höchst wahrscheinlich. Selbst Abelsdorff⁴⁾ kann nicht ganz die zuerst von Kühne gesehene Veränderung der isolierten Netzhaut von tiefviolett nach strohgelb in Abrede

¹⁾ Ayres und Kühne, Über Regeneration des Sehpurpurs beim Säugetiere. Heidelberger Untersuchungen. Bd. II. S. 215. 1879.

²⁾ Ewald und Kühne, Untersuchungen über den Sehpurpur. III. Heidelberger Untersuchungen. Bd. I. S. 370. 1878.

³⁾ Natürlich bleibt der sehr unwahrscheinliche Einwand: Es hat sich hier ein unbekannter Stoff gebildet, der dann in Alaun Sehgelb erzeugt.

⁴⁾ Abelsdorff, Die ophthalmoskopische Erkennbarkeit des Sehpurpurs. Zeitschr. f. Psych. u. Physiol. der Sinnesorgane. Bd. XIV. 1897. S. 77.

Abelsdorff, Über die Erkennbarkeit des Sehpurpurs von *Abramis brama* mit Hilfe des Augenspiegels. Sitzungsbericht d. preuss. Akad. d. Wissensch. 1895. Bd. XVIII. S. 325.

stellen, noch die von Deyl¹⁾ beim Ophthalmoskopieren von Kaulbarsch, Sander und Bley gefundene rötlichgelbe Färbung. Er sagt: „dass die rötlichgelbe Färbung der von Deyl untersuchten Netzhäute sehr widerstandsfähig war, ist eine Erscheinung, welche in dem zuweilen von der Regel abweichenden Verhalten des Sehpurpurs ihre Erklärung findet. Gerade beim Kaulbarsch habe ich öfter beobachtet, dass die dem Lichte ausgesetzte Netzhaut schnell ihre violette Farbe verlor, an deren Stelle dann eine rötlichgelbliche oder gelbliche Farbe trat, deren grosse Widerstandsfähigkeit gegen die Anwesenheit einer lichtzersetzlichen Substanz sprach; ganz unempfindlich gegen starke Lichtintensitäten war sie jedoch nicht.“ Die Untersuchung mit dem Augenspiegel ergab beim lebenden Bley, wie Abelsdorff selbst angibt, ein Abblassen vom Violett zum gelblichen Weiss. Die Beobachtungen Abelsdorffs wurden in der Regel bei Auerlicht ausgeführt, und wir werden daher die Angaben betreffs der Farbenänderung der Netzhaut im lebenden Auge mit grosser Vorsicht aufnehmen müssen. Immerhin erscheint es bemerkenswert, dass er trotz der unzuweckmässigen Beleuchtung (künstliche, relativ gelbe Lichtquelle statt Tageslicht!) bei der Ausbleichung ein gelbliches Weiss wahrnahm. Auch an einer andern Stelle S. 88 sagt er: „dass die Netzhaut nach 20 Minuten Bleichung durch Auerlicht von gelblichweisser Farbe ist“. Aus seiner Darstellung geht aber hervor, dass er die in diesem Endstadium der Bleichung auftretende gelblichweisse Färbung nicht durch das Sehgelb bedingt ansah, sondern sich offenbar vorstellte, dass das eigentliche „Sehgelb“ als Zwischenstadium vor der Ausbleichung zu der beobachteten gelblichweissen Färbung hätte auftreten müssen. Er sagt S. 87: „Obgleich mir so im Gegensatz zu früheren Untersuchern ein Mittel zu Gebote stand, die Veränderungen des Sehpurpurs am Lebenden direkt zu verfolgen, will ich hier doch nur die Tatsache einfach verzeichnen, dass der Sehpurpur einfach erblasste und ein Zwischenstadium von Sehgelb nicht bemerkt wurde, ohne dieser Beobachtung eine entscheidende Bedeutung beizulegen.“

Die analogen Beobachtungen Abelsdorffs²⁾ am lebenden Krokodilauge, die zum Teil ebenfalls mit Auerlicht ausgeführt wurden, ergaben, dass auf diese Weise hier kein Sehgelb bei der Bleichung wahrgenommen werden konnte. Es sei noch bemerkt, dass die Art der

¹⁾ Die Arbeit von Deyl konnte ich bisher noch nicht im Original erhalten.

²⁾ Abelsdorff, Physiologische Beobachtungen am Auge der Krokodile. Engelmanns Archiv. 1898. S. 154.

Ausbleichung, $1\frac{1}{2}$ Stunden Auerlicht, für die Anhäufung von Sehgelb im lebenden Auge die ungünstigste ist, was schon aus den alten Kühneschen Beobachtungen über Regeneration am lebenden Auge hervorgeht (s. a. u. S. 172). Übrigens fand Abelsdorff, dass bei einem im Dämmerlicht gestorbenen Alligator das ohne Lichtschutz eröffnete Auge einen stark gelblichen Hintergrund zeigte. „Die Intensität des Gelb nahm bei Belichtung ab.“

Die wichtigste Frage: ist im menschlichen Auge *intra vitam* eine irgendwie beträchtliche Anhäufung von Sehgelb anzunehmen? ist bisher noch nicht entschieden. Von den von Kühne¹⁾ untersuchten menschlichen Augen ist besonders der Fall wichtig, in dem das Auge unmittelbar nach Exstirpation zur Untersuchung kam. Es verblich da ein unmittelbar nach der Eröffnung entnommenes kleines Probestück, das von vornherein von sehr heller Purpur- oder Rosenfarbe war, ohne Gelbstadium. Da das Sehgelb schon beim Frosch, wo die ursprüngliche Netzhautfarbe sehr gesättigt ist, ziemlich ungesättigt wird (E_7 oder E_8), so ist ohne weiteres zu erwarten, dass ein Netzhautstück von sehr heller Purpur- oder Rosenfarbe ein sehr ungesättigtes Gelb liefert und daher leicht sich der Beobachtung entziehen kann (vergleiche auch die unten zu erörternde Regeneration des Sehgelbs bei langsamer Bleichung). Entgegen diesem negativen Resultat wurde ein Stück der gleichen Netzhaut, was freilich später zur Untersuchung kam, deutlich chamois und gelb. Dass das erste Netzhautstück kein Sehgelb erkennen liess, wird von Kühne darauf bezogen, dass das Sehgelb beim Menschen ausgeprägter, als bei vielen Tieren eine grössere Lichtempfindlichkeit vor Ausbruch der kadaverösen Prozesse besitzt²⁾. In einem zweiten Fall³⁾ ist zwar die Netzhaut rosa-chamois bei einer im hellen Zimmer gestorbenen Patientin, doch wird die schmutzig gelbe Färbung, die die Netzhäute im guten Licht zeigen, auf Verunreinigung durch anhaftendes Pigment bezogen. Der Fall ist also nach Kühne nicht beweisend. Eine sehr frisch untersuchte Netzhaut⁴⁾, die zehn Minuten nach einer Hinrichtung an

¹⁾ Kühne, Beobachtungen an der frischen Netzhaut des Menschen. Heidelberger Untersuchungen. Bd. II. S. 69. 1879.

²⁾ Vgl. auch den späteren Abschnitt über Regeneration des Sehpurpurs aus Sehgelb, S. 172 folgende.

³⁾ Kühne, Notiz über die Netzhautfarbe belichteter menschlicher Augen. Heidelberger Untersuchungen. Bd. III. S. 194. 1879.

⁴⁾ Kühne, Beobachtungen zur Anatomie und Physiologie der Retina. Heidelberger Untersuchungen. Bd. IV. S. 280.

einem trüben Herbstmorgen zur Untersuchung kam, war hellrosa und zeigte ein farbloses Optogramm. Es war also auch hier nach einer offenbar kurz zuvor stattgefundenen Bleichung kein Gelb nachweisbar. Immerhin muss auch hier bemerkt werden, dass die Netzhaut an und für sich hellrosa, also ungesättigt gefärbt war, was schon eine Erkennung des noch viel ungesättigteren Gelbs erschwerte, und dass anderseits vor der Exekution für kurze Zeit die Augenbinde umgelegt war, so dass auch hier Gelegenheit zu einer Regeneration des möglicherweise gebildeten Sehgelbs gegeben war (vgl. die Kühnischen Beobachtungen über die Regeneration des Sehpurpurs beim Säugetier¹⁾).

Die geschilderten Versuche am Menschen lassen es unentschieden, ob Sehgelb während der Bleichung im lebenden Menschaugen auftritt. Es sind hier kaum die Bedingungen so zu gestalten, dass mit Wahrscheinlichkeit eine merkliche Menge zu erhalten ist, wenn man die Erfahrungen am Tierauge, insbesondere die rasche Regeneration des Sehpurpurs aus Sehgelb in Rechnung zieht.

Um wenigstens mit Hilfe eines Analogieschlusses zu entscheiden, ob überhaupt im Auge des Menschen Sehgelb *intra vitam* zu erwarten ist, müssen systematische Versuche an Affen vorgenommen werden, wo sich leicht Bedingungen herstellen lassen, unter denen nach den Erfahrungen an niederen Tieren grössere Sehgelbmengen auftreten. Es liesse sich das erreichen durch rasche Ausbleichung am lebenden, vorher gut dunkel adaptierten Tiere und unmittelbarer Besichtigung. Tritt, wie zu erwarten, unter diesen Bedingungen eine merkliche Menge Sehgelb auf, so wird man eine gewisse Menge des gelben Farbstoffes auch normalerweise im lebenden, sehenden Auge zu vermuten haben.

Dass sich unter den zuletzt genannten Bedingungen bei leichter zu beschaffenden Tieren Sehgelb im Auge nachweisen lässt, davon habe ich mich mehrfach überzeugt. Beim Bley kann man, wenn man an einem hellen Sonnentag ein länger im Dunkeln aufbewahrtes Tier in ein Bassin ins Freie setzt, und nach ungefähr 5 Minuten rasch in einem dunkleren Raum mit Tageslicht spiegelt, die Netzhaut deutlich hellgelb finden (z. B. E_8), während sie vor der Exposition des Fisches im Freien unter gleichen Bedingungen gespiegelt rein violett erschien (beispielsweise B_4). Bleibt dann der Fisch längere Zeit im Freien, so erscheint die Netzhaut bei wiederholtem

¹⁾ Ayres-Kühne, Über Regeneration des Sehpurpurs beim Säugetiere. Heidelberger Untersuchungen. Bd. II. S. 215. 1879.

Spiegeln mit Tageslicht rein grau ohne eine Spur von gelb. Es sei hervorgehoben, dass diese Beobachtungen an frischen Tieren gemacht wurden, die sich in gut durchlüftetem Wasser befanden. Die Farbangaben wurden auch von andern Herren in gleicher Weise gemacht, die nicht wussten, um was es sich handelte. Sehr charakteristisch war der erstaunte Ausruf eines Beobachters, der erst die Gelbfärbung gesehen hatte: Die (d. i. Netzhaut) sieht ja jetzt (nach einer Stunde im Freien) grau aus! Da die Farbe, wie sie hier bei rascher starker Belichtung entsteht, ganz der gleicht, die man an der freigelegten Netzhaut erhält, und die hier sicher auf der Bildung von Sehgelb beruht, siehe oben S. 141, so halte ich es für entschieden, dass im lebenden Auge des Bley's sich unter den genannten Bedingungen eine merkliche Menge von Sehgelb bilden kann. Dass sich bei der Abelsdorff'schen Spiegelung mit Auerlicht das Sehgelb der Beobachtung oft entzog, ist nicht zu verwundern, zumal da er sehr langsam mit Auerlicht bleichte, so dass ein Teil des Sehgelbs sicher durch Regeneration verschwunden war (siehe unten).

Beim Frosch habe ich mich ebenfalls von der Sehgelbbildung *intra vitam* überzeugt. Ein länger im Dunkeln aufgehobener Frosch wurde intensivem Bogenlicht zwei Minuten ausgesetzt und dann unmittelbar im anstossenden Dunkelzimmer so rasch wie möglich die Netzhaut herausgenommen und bei Tageslicht angesehen. Sie war deutlich gelb im mittleren Teil, im Randteil dagegen noch gelbrot oder rot. Eine Gelbfärbung durch Anhängen des Pigmentes war ausgeschlossen, da bei der kurzen Belichtungszeit und raschen Abhebung der Netzhaut die Pigmentwanderung die Trennung vom Pigmentepithel noch nicht erschwert hatte. Es stimmt das mit der obigen Angabe Kühn's von der gelben Netzhautfarbe der in geschlossenen Räumen lebenden Frösche überein.

Auch bei der Eulennetzhaut (Sumpfohreule) gelang es mir sogleich, nach der Herausnahme der Netzhaut nach Tötung ein sehr helles ungesättigtes Gelb wahrzunehmen. Die zuvor gut dunkel gehaltene Eule war (den 12. XII. 05) von 11 Uhr 20 Minuten bis 11 Uhr 35 Minuten mit dem einen unverschlossenen Auge — das andere trug zu anderem Zweck einen lichtdichten Verband¹⁾, direk-

¹⁾ Dr. A. Birch-Hirschfeld empfiehlt bei Vögeln für einseitige Dunkeladaptation einen Verband aus Kollodium, Tusche und Watte, der, auch im vorliegenden Fall angewendet, einen sehr guten Abschluss gab. Dieses Archiv 1906. Der Einfluss der Helladaptation auf die Struktur der Nervenzellen der Netzhaut.

tem Sonnenlicht ausgesetzt worden. Unmittelbar darauf wurde sie getötet und 11 Uhr 47 Minuten wurde das erste Stück angesehen und von mir und einem unbefangenen Beobachter mit D_{10} als sicher gelblich bezeichnet. Das zweite Stück, das 4 Minuten später zur Beobachtung gelangte, war dagegen zart rosa C_{10} , was vielleicht durch die auch in der isolierten Netzhaut sich vollziehende Regeneration des Sehgelbes zu Sehpurpur zu erklären ist (siehe unten).

Sichergestellt ist nach meiner Meinung das Vorkommen von Sehgelb im lebenden Auge bei Bley, Frosch, vielleicht der Eule¹⁾ und beim Kaninchen (siehe oben Kühne), und daher für den Menschen ebenfalls zum mindesten wahrscheinlich. Doch glaube ich auch, dass unsere noch rohen, direkten Beobachtungsmethoden hier den Nachweis nur in extremen Fällen möglich machen werden. Insbesondere tritt auch nach rascher Blendung des dunkeladaptierten Auges die Regeneration des jeweilig gebildeten Sehgelbes zu Sehpurpur, wie weiter unten noch ausgeführt wird, störend dazwischen. Viel eher wird sich vielleicht aus der Analyse der Gesichtswahrnehmungen das Vorhandensein von Sehgelb im menschlichen Auge ableiten lassen.

2. Versuche an Lösungen.

Die Versuche an Lösungen des Sehpurpurs haben nur dadurch in der Lehre vom Sehpurpur eine so grosse Bedeutung gewonnen, dass bei diesen die Messung der Lichtabsorption sich leichter durchführen lässt, als bei dem in der frischen Netzhaut enthaltenen Sehpurpur. Ihre theoretische Verwertbarkeit hat aber zur Voraussetzung, dass der Sehpurpur in der Lösung sich physikalisch genau so verhält, wie in der frischen Netzhaut, und dass namentlich auch die Bleichung in der gleichen Weise erfolgt. Nach den Befunden Köttgens und Abelsdorffs an der Lösung und meinen Befunden an der lebensfrisch dem Auge entnommenen Netzhaut schien nun freilich zunächst eine derartige Differenz zu bestehen, — wenn nämlich wirklich, wie Köttgen und Abelsdorff wollen, in der Lösung sich kein Sehgelb bildet. Von den bei den Absorptionsbestimmungen möglichen Fehlern wurde schon oben gesprochen.

¹⁾ Bei einem zweiten Versuch an einem Waldkauz, 19. XII. 1905, war die Netzhautfarbe nach nur 8 Minuten langer Besonnung des Tieres unregelmässig fleckig zwischen B_6 und D_8 , und die Gelbbildung nicht so deutlich wie im ersten Versuch.

Durch die Erfahrungen an den Netzhäuten wusste ich, dass, wenn ein analoger Unterschied im Verlauf der Absorptionskurve bei Lösungen vorhanden ist, dieser von $450\ \mu\mu$ an deutlich wird, also nur im kurzwelligsten Teil des Spektrums. Andererseits musste jede Bleichung während der Bestimmung vermieden werden. Diese Gesichtspunkte führten mich dazu, die Absorptionsänderungen zunächst auf photographischem Wege in ähnlicher Weise, wie die Absorption in den Netzhäuten festzustellen. Sind die Unterschiede der Absorption in den Lösungen von gleicher Grösse, wie bei den Netzhäuten, so müssen sie wie jene bei der Photographie des Spektrums hervortreten. Wie schwer die Bestimmung mit blossem Auge im Violett ist, geht auch aus folgender Angabe von Eder¹⁾ hervor: „Das Absorptionsspektrum der Chrysoidinlösungen ist meist unrichtig angegeben. So fand Stebbius, dass die Absorption desselben von Blau sich über das Violett gleichmässig, ja sogar im Violett etwas ansteigend erhebt. Die Photographie des Absorptionsspektrums ergibt das Gegenteil, indem die Absorption gegen das Violett rasch abnimmt. Der Grund dieser widersprechenden Angaben liegt darin, dass die Beobachtung der Absorptionsspektren im violetten Teil mit dem Auge viel unsicherer ist, als die photographische Aufnahme.“

Diese grössere Unsicherheit des Auges dürfte sich zum Teil folgendermassen erklären lassen: Das bei den meisten Spektralapparaten unter Anwendung der gewöhnlichen Lichtquellen erhaltene Violett ist sehr lichtschwach und stark mit weissem Lichte verunreinigt, wovon man sich leicht mit jedem Handspektroskop überzeugen kann. Während nun für das Auge das beigemengte weisse Licht für die Helligkeitsbeurteilung der Vergleichsfelder von Bedeutung ist, spielt dasselbe bei der photographischen Platte nur eine untergeordnete Rolle, da ja die kurzwelligen Lichter gerade fast ausschliesslich, wenn es sich nicht um orthochromatische Platten handelt, die Schwärzung der photographischen Platte bewirken.

Photographie von Absorptionsspektren der Sehpurpurlösungen vor und nach Bleichung.

Die Anordnung war die gleiche, wie sie bei der Photographie der Netzhäute benutzt wurde (s. oben S. 137). Statt aber den absorbierenden Körper auf dem Porzellanstreifen anzubringen, wurde derselbe, es handelt

¹⁾ Eder, Über einige geeignete praktische Methoden zur Photographie des Spektrums in seinen verschiedenen Bezirken mit sensibilisierten Bromsilberplatten. Sitzungsbericht d. Akad. d. Wissensch. zu Wien. 1886. Juli. Bd. XCIV. H. 1 u. 2. S. 378.

sich ja um eine klare Lösung, unmittelbar hinter das zur Photographie dienende Objektiv gebracht. Bei dieser Anordnung wurde die Lösung nur von dem „terminalen“ Lichte getroffen, welches unumgänglich zur Belichtung der Platte erforderlich war. Im einzelnen war dieser Teil der Anordnung folgender: Ein von der Firma Zeiss gelieferter planparalleler Glastrog, der auch zu den späteren Absorptionsmessungen diente, hatte eine Weite von 5 mm, war 5 mm breit und 20 mm hoch. Er konnte direkt hinter der Quarzlinse befestigt werden. Da die Lichtstrahlen, die nach dem Randteil der Platte laufen, den Trog etwas schräg durchsetzen (vgl. beistehende Abbild.), also die Schichtendicke, eine etwas grössere ist, so wird die Absorption an beiden Seitenteilen des Spektrums immer mit einem gewissen, aber konstanten Fehler behaftet sein (etwas zu gross ausfallen). Gegen eine Verringerung der Beleuchtungsintensität durch die von den hinteren Trogkanten zurückgehaltenen Randstrahlen konnte ich mich, wie in beistehender Skizze übertrieben dargestellt ist, dadurch schützen, dass ich vor den 5 mm breiten Trog eine Spaltblende von 3 mm Breite und 15 mm Höhe anbrachte. Wie man sieht, wird dann in einem ziemlich grossen Gebiet, entsprechend $A-B$ bzw. $A'B'$ die Lichtstärke nicht beeinträchtigt, und erst bei sehr exzentrisch gelegenen Punkten C bzw. C' wird ein Teil des durch die Blende tretenden Strahlenbüschels von den Rändern des Troges zurückgehalten. Doch kamen so seitlich einfallende Strahlenbüschel hier nicht in Betracht. Der Trog liess sich, da er in einen genau rechteckigen Einschnitt am Apparat passte, immer wieder an genau der gleichen Stelle direkt hinter der Linse einsetzen, was wegen der Ausbleichung von Wichtigkeit war.

Entsprechend dem engen Blendenspalte, 3×15 , bzw. 2×15 mm musste 20 Minuten exponiert werden. Trotz dieser langen Exposition war aber eine merkliche Bleichung nie eingetreten, da nur eine minimale Lichtmenge einwirkte. Die Lösung wurde ja nur von dem Licht getroffen, das von dem objektiven Spektrum zurückgestrahlt, gerade genügte, um wie gesagt, die höchst lichtempfindliche photographische Platte ausreichend in 20 Minuten zu verändern. Da als Lichtquelle die Bogenlampe diente, so hätte man denken können, dass die dem Spektrum entsprechenden Streifen durch unregelmässiges Brennen der Bogenlampe bei mehreren hintereinander folgenden Expositionen sehr verschieden hätten ausfallen müssen, doch gerade hier war seltener, als bei den früheren Versuchen ein Unterschied zu bemerken. Offenbar war durch die lange Expositionszeit ein Ausgleich eher möglich, als bei den kürzeren Belichtungen der Netzhäute von $1\frac{1}{2}$ Minute. Auch wurde die Beleuchtung stets von zwei Personen im Lampen- und im Gitterzimmer überwacht. Nebenbei sei bemerkt, dass zu anfäng-

Fig. 4.

lichen Versuchen ein aus Deckgläsern selbst angefertigter Trog diente, der in ganz ähnlicher Weise direkt vor der Quarzlinse angebracht war.

Es wurden Versuche angestellt an Sehpurpurlösungen vom Bley, von der Eule und vom Kaninchen. Bei der Herstellung der Lösungen erwiesen sich die Angaben von Trendelenburg als sehr brauchbar. Die Kaninchen-sehpurpurlösung wurde aus drei Stunden in Alaun gehärteten Augen ganz in der von Trendelenburg geschilderten Weise hergestellt (loc. cit. S. 33). Beim Bley und der Eule wurden die frisch dem Auge bei ganz schwachem rotem Licht entnommenen Netzhäute (beim Bley meist 6, bei der Eule 2) in 4 cbcm 4 % glykohlensaurem Natron aufgelöst, nachdem sie in einer reichlichen Menge Ringerscher Lösung abgespült worden waren. Nach etwa $\frac{1}{2}$ stündigem Stehen wurde die Lösung filtriert, mehrere Stunden, besonders nachhaltig beim Bley, zentrifugiert und die Lösung über Schwefelsäure im Vakuum getrocknet, was in einem kühlen Kellerraum während einer Nacht gelang. Der eingetrocknete Rückstand wurde dann in 0,8 oder 1 cbcm Wasser aufgelöst, filtriert und nochmals zentrifugiert. So gelang es konzentrierte und vollkommen klare Lösungen zu erhalten, und zur Darstellung war nur die Zeit von 3 Uhr nachmittags bis 10 Uhr vormittags am folgenden Tag erforderlich. Für den Versuch wurde der oben beschriebene Zeiss'sche Trog mit der Lösung gefüllt. Zunächst wurde eine Aufnahme mit ungebleichtem Purpur gemacht, dann die Lösung am Tageslicht gebleicht, bis sie eine deutliche Gelbfärbung zeigte, und dann der Versuch wiederholt. In vielen Fällen habe ich zum Vergleich darüber oder darunter noch das durch eine frische Gallenlösung gegangene Spektrum aufgenommen und am Schluss in der schon oben beschriebenen Weise die Heliumlinien.

Ergebnisse.

Abgesehen von Vorversuchen mit zum Teil nicht ganz klaren Lösungen, die aber das gleiche Ergebnis lieferten, wie die späteren Versuche, wurden im ganzen 8 Bestimmungen ausgeführt, 4 an Sehpurpurlösungen vom Bley, 2 an Sehpurpurlösungen der Eule, 2 an denen des Kaninchens. Sie alle führten zu dem Resultat, dass bei der Bleichung die Absorption im Violett zu-, im Grün abnimmt, dass also in dieser Beziehung zwischen Netzhaut und Lösung keine Differenz besteht.

Als Beleg können die beigegebenen Photographien dienen. Es wurde absichtlich an den Photographien nichts geändert, insbesondere wurde auch hier nicht der dunkle Zwischenraum zwischen den Originalaufnahmen verkleinert, was natürlich die Differenzen noch viel deutlicher gemacht hätte. Sobald man beispielsweise unter Benutzung eines Doppelspathes die Streifen optisch nebeneinander legt, macht sich der Helligkeitsunterschied ganz ausserordentlich geltend.

Auf Taf. XI, Fig. 9 ist noch mit dem älteren Trog ein Versuch

an der Sehpurpurlösung des Kaninchens angestellt. Streifen I zeigt die Absorption des ungebleichten Purpurs¹⁾. Nach der in diesem Fall 40 Minuten langen Expositionszeit wurde die Lösung am Tageslicht angesehen. Sie war sehr klar und ihre Farbe lag zwischen der *B*- und *C*-Reihe (vgl. Taf. VII). Nach der Bleichung schien sie gegen ein ebenfalls vom weissen Tageslicht beleuchtetes weisses Papier gehalten etwa die Färbung F_7 zu haben. Es wurde dann bei gleichlanger Exposition der Streifen II aufgenommen. Darunter endlich wurde zur Ausmessung das Spektrum ohne Trog ganz kurz aufgenommen und darüber die Heliumlinien photographiert. Da der selbstangefertigte Trog eine geringe prismatische Wirkung besass, ist, wie die Markierungslinien zeigen, das Aichungsspektrum ein wenig nach links verschoben. Von den Heliumlinien sind namentlich 587, 502 und 446 $\mu\mu$ deutlich. Ausserdem können die beiden Cyanbanden des Bogenlichtspektrums 521 und 389 $\mu\mu$ zur Orientierung benutzt werden. Man sieht bei Vergleich der Streifen I und II, dass etwa bis zu 440 $\mu\mu$ sowohl im violetten, wie auch im ultravioletten Teil die Absorption und damit die Verdunklung nach der Bleichung zugenommen hat. Sehr deutlich wird aber von 440 $\mu\mu$ der Streifen II heller als Streifen I, insbesondere zeigt sich die Aufhellung sehr deutlich im Grün (vgl. Linie 502 $\mu\mu$). Im langwelligsten Teil bei 587 $\mu\mu$ tritt aber kein Unterschied mehr hervor.

Ganz ähnlich ist das Ergebnis bei der Eule, wie Fig. 10, Taf. X, zeigt. Das Objektiv wurde hier in der entgegengesetzten Richtung verschoben, so dass die Verdunklung in dem unteren Streifen I der Absorption der frischen Sehpurpurlösung entspricht, während der obere Streifen II der ausgebleichten Lösung entspricht. Auch hier

¹⁾ Leider ist auch bei den von mir benutzten „panchromatischen“ Platten die chemische Wirkung des Lichtes in den verschiedenen Teilen des Bogenlichtspektrums nicht überall die gleiche. Es wird daher auch schon bei Wasser- oder Gallenfüllung des Troges auf den Photographien ein Teil des Spektrums weisslicher als der andere erscheinen. Besonders im Grün ist die chemische Wirkung gering und daher erscheint das Bild des Spektrums beispielsweise in Fig. 12, Streifen III und Fig. 13, Streifen I, wo der Trog nur mit Gallenlösung gefüllt war, nicht als gleichmässig grauer Streifen, sondern derselbe ist namentlich im Grün etwas schwärzlicher gefärbt. Durch diesen Umstand wird natürlich der Vergleich der Absorptionsänderung bei der Ausbleichung nicht erschwert, nur ist man nicht im stande quantitativ genauer die Absorption in den verschiedenen Teilen des Spektrums aus der Schwärzlichkeit des betreffenden Streifenstückes abzuschätzen. Dasselbe gilt auch für die oben beschriebenen Photographien der Netzhäute.

ist der gleiche Unterschied wie bei dem Versuch vom Kaninchen wahrzunehmen. Die benutzte Lösung stammte von einem Waldkauz, der schon mehrere Tage in vollkommenem Dunkel gehalten war. Sie war aus beiden Netzhäuten hergestellt und ziemlich konzentriert. Nach der ersten Aufnahme, die hier, wie auch in den folgenden Versuchen immer 20 Minuten dauerte, wurde die Farbe der Lösung bei doppelter Schichtendicke (Reflexion des durchgegangenen Lichtes durch ein dahintergehaltenes weisses Papier) auf B_5 abgeschätzt. Die Farbe ging am Tageslicht in ungefähr 10 Sekunden in die C -Reihe über und war nach weiteren 40 Sekunden $= D_5$. Im ganzen wurde 3 Minuten gebleicht und die Färbung auf etwa D_7 abgeschätzt. In diesem Stadium wurde die Aufnahme II vorgenommen. Schliesslich nach $\frac{3}{4}$ Stunde langer Bleichung bei diffusem Wolkenlicht am Fenster wurde die Farbe zu E_{10} — F_{10} . Es wurde jetzt eine weitere Aufnahme III vorgenommen, die hier aber wegen eines Plattenfehlers nicht wiedergegeben werden kann. Sie zeigte weitere Aufhellung im Grün, während die Verdunklung im violetten Teil etwa die gleiche blieb, wie bei II.

Am allerdeutlichsten aber tritt der Unterschied bei der Bley-netzhaut hervor. Man konnte das schon, wenn, wie gesagt, das Verhalten der Lösung dem Verhalten des Sehpurpurs parallel geht, aus der Absorptionsphotographie der Bleynetzhäute (Fig. 5, Taf. IX) schliessen. Die beiden Versuche auf Taf. XII, Fig. 12 und 13, zeigen zwei Absorptionsreihen mit einer auf die Hälfte verdünnten Lösung (Fig. 12) und mit der gleichen, aber unverdünnten Lösung (Fig. 13). In Fig. 12 ist die unterste Kurve die des ungebleichten Sehpurpurs, die darauffolgende höhere entspricht der Bleichung zu Sehgelb. Dann kommt eine Aufnahme des Troges bei Füllung mit Gallenlösung, und endlich IV. Aichung mittels der Heliumlinien. Die Verdunklung, die nach der Gelbbleichung im violetten Teil eintritt, erstreckt sich nahezu bis 440μ . Dagegen ist hier die Aufhellung nach der Bleichung zu Gelb eine weiter nach dem langwelligen Ende gehende, bis in den Anfang des Orange hinein. Es entspricht das der mehr blauen Farbe des Fischsehpurpurs, wie es auch in den Absorptionskurven von Köttgen und Abelsdorff zum Ausdruck kommt; vgl. hierzu übrigens auch die Absorption der Bleynetzhäute in Fig. 5, wo ebenfalls die im Orange gelegene Netzhaut noch eine sehr merkbare Aufhellung bei der Bleichung zeigt. Bei der konzentrierteren Lösung Fig. 13 ist der Unterschied zwischen gebleichter und ungebleichter Lösung noch bedeutender. Streifen I entspricht hier der

Gallenlösung, Streifen II der Sehpurpurlösung, Streifen III der zu Gelb gebleichten Lösung und Streifen IV endlich der Aichung mit Helium. Die beiden Kurven sind dadurch von besonderem Wert, dass zugleich von derselben Lösung, wie weiter unten des näheren zu schildern ist, eine Messung der Absorption im Spektrum vorgenommen wurde, so dass diese letzteren subjektiven Ergebnisse mit den eben angeführten objektiven verglichen werden können.

Bei der Ausbleichung der Netzhäute sowohl wie der Lösungen vom Bley tritt eine Erscheinung hervor, die besonders beweisend für die Bildung eines neuen Farbstoffes, des Sehgelbs, ist. Da der Fischsehpurpur stark bläulich gefärbt ist, so ist in ihm viel von der Gegenfarbe des Sehgelbs enthalten. Ausserdem wird, wenn beide Farben, wie es während der Bleichung geschieht, gemischt in der Netzhaut bzw. Lösung vorhanden sind, das durch den einen Farbstoff hindurchgelassene Licht in nicht unbeträchtlichem Grade von dem andern Farbstoff absorbiert werden (vgl. Textfig. 6 u. 7, S. 162). Die Folge ist eine Graufärbung der Netzhaut in einem bestimmten Zwischenstadium der Bleichung, wo sich die farbigen Komponenten für unser Auge nahezu aufheben, und nur eine geringe Rötlichkeit übrig bleibt. Das ist in der Tat der Fall. Die Netzhaut sowohl, wie die Lösung vom Bley zeigt bei der Bleichung eigentümlich graurötliche Übergangstöne, die bei weiterer Bleichung einem reinen Hellgelb Platz machen. Man hat geradezu die Empfindung, als ob sich eine graue Wolke über den schwindenden Sehpurpur legte, hinter der nach ihrer allmählichen Zerteilung das reine Hellgelb der gebleichten Netzhaut hervortritt. Die Beobachtung spricht ganz entschieden dafür, dass aus dem Sehpurpur nur eine neue Farbe, das Sehgelb entsteht.

Im Anschluss an diese Versuche sei kurz der Versuch erwähnt, eine Trockenplatte mit Sehpurpurlösung zu sensibilisieren. Es wurde die eine Plattenhälfte mit einem Rest der Sehpurpurlösung des Bleys mittels Pinsels überstrichen und am darauffolgenden Tag auf dieser Aufnahmen des Spektrums vorgenommen. An dem mit Sehpurpur behandelten Plattenteil war die Lichtempfindlichkeit des der stärkeren Absorption des Sehpurpurs entsprechenden Gebietes nicht gesteigert, sondern gesunken, und das gleiche Ergebnis hatte ein zweiter Versuch. Kontrollversuche über die Wirkung der Gallenlösung an und für sich konnten bisher noch nicht angestellt werden, jedenfalls gehört aber wohl kaum der durch Galle in Lösung übergeführte Sehpurpur zu den Farbstoffen, die die Lichtempfindlichkeit der photo-

graphischen Platte in den Bezirken steigern, in denen sie die Lichtstrahlen absorbieren. Damit soll aber keineswegs gesagt sein, dass nicht in der Netzhaut eine derartige Sensibilisierung einer zweiten durch das Licht zersetzlichen Substanz bewirkt werden könnte. Auch für die Sensibilisierung der Trockenplatten müssten zu einer sicheren Entscheidung noch Sehpurpurlösungen der verschiedensten Konzentrationen untersucht werden.

Messung der Absorption von Sehpurpurlösungen vor und nach der Bleichung.

Der durch die vorausgegangenen Versuche gelieferte Nachweis, dass auch an den Lösungen eine Absorptionszunahme im kurzwelligen Lichte auftritt, liess es wünschenswert erscheinen, dieses Verhalten auch noch durch photometrische Messungen genauer darzustellen. Die schon oben betonten zwei Hauptpunkte: Abhaltung alles fremden Lichtes von der Sehpurpurlösung, und möglichst hohe Intensität des violetten Lichtes bei möglichster Reinheit, führten mich schliesslich zu folgender Methode, die im Prinzip der von König und anfangs von Köttgen und Abelsdorff angewendeten entspricht. König brachte den Sehpurpurtrog ins Okular des Spektralapparates, so dass tatsächlich nur das Licht, das zur Beobachtung selbst erforderlich war, den Sehpurpur durchsetzte. Nach vielen Vorversuchen kam ich schliesslich zu folgender definitiver Anordnung.

Im Bogenlampenzimmer blieb die Anordnung die gleiche, wie bei meinen früheren Versuchen (vgl. Textfig. S. 137), nur wurde statt des einfachen Spaltes *S* ein Doppelspalt verwendet, mit symmetrischer Bewegung der Schneiden, bei dem ein Umgang der Schraube 0,38 mm entsprach, ein Teil der in hundert Teile geteilten Schraubentrommel also 0,0038 mm betrug. Im Gitterzimmer blieb das Gitter am alten Orte stehen und es wurde nur zwischen dem auffangenden Porzellanschirm *Ro* — *V* und dem Gitter *G* (vgl. nebenstehende Textfig. 5), ein Planspiegel eingeschoben *s*' — *s*'. Hierdurch erreichte ich, dass das Spektrum in der Ebene *Ro*' — *V*' entstand. An dieser Stelle war in einer Schlittenführung ein Schirm verschiebbar, der den Absorptionstrog trug. Durch eine besondere Schiebereinrichtung konnte der Trog, was hier des näheren nicht erörtert werden kann, ausserhalb der Beobachtungszeit vor jedem Lichteinfall geschützt werden. Der von der Firma Zeiss gelieferte Trog bestand aus einem Körper aus schwarzem Glas von $50 \times 40 \times 5$ mm. In der einen Längsseite (50 mm) befand sich ein Ausschnitt von 5×20 mm. Zwei planparallel geschliffene Deckplatten von 1,3 mm Stärke waren so aufgekittet, dass sie den Ausschnitt abschlossen. Es entstand dadurch eine Kammer von 5 mm Tiefe, 5 mm Breite und 20 mm

Höhe. In diese konnte ein prismatischer Glasstab von 4,5 mm Dicke bis auf 5 mm oberhalb des Kammerbodens herabgeschoben werden. Da der Stab an seiner unteren Fläche genau rechtwinklig abgeschliffen war, so lieferte diese bei Seitenansicht eine ganz scharfe Grenzlinie zwischen oberem Kammerteil, wo die Schichtendicke 0,5 mm, und unterem Kammerteil, wo die Schichtendicke 5 mm betrug. Der Trog liess sich verhältnismässig leicht mit Sehpurpurlösung füllen, ohne dass sich an der unteren Kante des Verdrängers Luftblasen ansetzten. Die in Betracht kommende Schichtendicke der Sehpurpurlösung betrug also in allen Versuchen 4,5 mm.

Wie schon oben erwähnt, wurde das Spektrum auf dem beweglichen Schirm R' — V' entworfen, und zwar entstanden jetzt hier, wenn der obere und untere Doppelspalt verschiedene Weite hatte, zwei verschieden intensive Spektren übereinander, deren scharfe Grenzlinie der Grenze zwischen oberem

Fig. 5.

und unterem Spalt entsprach. Der ganze in Schlittenführung bewegliche Schirm mit dem Glastrog liess sich nun so einstellen, dass die scharfe Grenzlinie der beiden Spektren genau mit der haarscharf erscheinenden Kante des Verdrängers zusammenfiel. Es wurde dann der untere, 5 mm weite Kammerteil nur von dem oberen Spalte beleuchtet, der obere 0,5 mm weite Kammerteil empfing sein Licht nur vom unteren Spalt. Um immer die gleichen Stellen des Spektrums zur Beobachtung benutzen zu können, war an dem feststehenden Teil der Schlittenführung eine Millimeterskala angebracht, nach der sich leicht immer die gleichen Lagen des Troges im Spektrum herstellen liessen.

Bei dem verhältnismässig schmalen Strahlenbüschel, welches den Trog traf, erwies sich eine Beobachtung mittels eines direkt am Schirm angebrachten Okulars als ungeeignet. Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen wurde schliesslich folgende Anordnung getroffen. In etwa 3 m Entfernung vom Trog (vgl. obenstehende Textfig. 5), wurde parallel zum Schirm $R'o'$ — V' eine 1 m lange optische Bank $B'B''$ aufgestellt. Auf

dieser konnte das Fernrohr F entlang geschoben werden und auch die Stellung desselben wurde an einer an der Bank befestigten Skala abgelesen. Das Fernrohr war auf die Entfernung des Troges eingestellt und der Beobachter konnte, ohne aus dem Strahlenbüschel herauszukommen, beide Felder beobachten, die im Bild durch eine feine Grenzlinie voneinander getrennt waren, so dass der Vergleich der Helligkeiten beider Felder jetzt gut ausführbar war.

In den ersten Versuchen wurde die ganze Trogbreite von 5 mm benutzt, später aber ein Spalt von 3 mm Breite direkt vor dem Trog angebracht, so dass bei ein und derselben Beobachtung Lichter von sehr geringer Differenz in der Wellenlänge Verwendung fanden. (Bei einem Spalt von 3 mm ungefähr $7,5 \mu\mu$.) Eine noch weitgehendere Einschränkung war bei der benutzten Einrichtung nicht gut möglich.

Zur Aichung des Spektrums diente wiederum die Heliumröhre. Es wurden jetzt in der Ebene $R' - V'$ die Heliumlinien entworfen und durch Verschieben des mit Wasser gefüllten Troges an der Millimeterskala des Schlittens diejenigen Stellungen aufgesucht, bei denen die betreffenden Linien gerade in der Mitte des Trogspaltes lagen. Um das Spektrum möglichst rein von fremdem Licht zu gewinnen, wurden nach Bedarf farbige Glasplatten vor den Doppelspalt geschoben und ausserdem kamen, um an den verschiedenen Teilen des Spektrums die zur Beobachtung geeignete Intensität zu haben, eine Reihe von grauen, auf photographischem Wege hergestellten Scheiben zur Anwendung, die zwischen Objektiv und Bogenlampe zu stehen kamen.

Bei den Bestimmungen blieb der obere Spalt, aus dem das Licht durch den unteren Kammerteil ging, immer gleich weit auf 300 bzw. 600 Trommelteile eingestellt, d. h. 1,14 bzw. 2,24 mm (im vom Konkavgitter entworfenen Spaltbild 0,55 bzw. 1,1 mm). Der untere Spalt wurde entsprechend verengt, bis das von diesem ausgehende, durch den Glaskörper strahlende Licht dieselbe Helligkeit hatte, wie das durch den unteren, breiten, mit Sehpurpurlösung gefüllten Kammerteil hindurchgelassene. Die Einstellung im Bogenlampenzimmer wurde von einer zweiten Person ausgeführt und der Beobachter stets darüber im Unklaren gelassen, in welcher Richtung die Spaltbreite geändert wurde. Die Bestimmung lief auf eine Grenzbestimmung hinaus. Es wurde die Spaltbreite aufgesucht, bei der das obere Feld sicher zu hell, und bei der es sicher zu dunkel war. Als richtige Grenzen wurden die Werte angenommen, die meist dreimal, mindestens zweimal ohne Fehler als zu hell, bzw. als zu dunkel angegeben waren. Der Mittelwert beider wurde als gleich angenommen. Es waren dadurch für jeden einzelnen Punkt mindestens 15 bis 20 Einstellungen erforderlich. Um trotzdem den Sehpurpur durch das einwirkende Licht nicht zu verändern, wurde bei jeder Beobachtung vom Beobachter mit Hilfe einer elektromagnetischen Vorrichtung nur für wenige Sekunden das Licht eingelassen. Auch wurde die Zahl der Bestimmungspunkte nach Möglichkeit reduziert. Meist habe ich nur an neun Stellen des Spektrums Beobachtungen vorgenommen, dieselben aber so ausgewählt, dass namentlich im kurzwelligsten Teil zwischen $450 \mu\mu$ und $410 \mu\mu$ mehrere Bestimmungspunkte lagen. Ja in vielen Versuchen wurde sogar bei $400 \mu\mu$ eine Bestimmung ausgeführt. Dass gerade

dieser Teil eingehend untersucht werden musste, ist aus obigem selbstverständlich, standen doch meine photographischen Befunde an Sehpurpurlösungen mit den Angaben von Köttgen und Abelsdorff in direktem Widerspruch.

Die im grossen und ganzen improvisierte Versuchsanordnung brachte es mit sich, dass bei weitem nicht der Grad von Genauigkeit zu erreichen war, wie bei einem exakt konstruierten Spektrophotometer. Wie weit die Fehler selbst nach längerer Einübung gehen, ist am besten aus folgender Bestimmung der Fehlergrenze und dem Versuchsbeispiel zu ersehen. Es wurde bei 415μ der 2 mm breite Trogspalt eingestellt und der Trog mit destilliertem Wasser gefüllt, ohne dass der Glaskörper eingeschoben war. Beide Kollimatorspalte waren zunächst auf 620 gestellt (Nullpunkt beider Kollimatorspalte bei 20). Es entspricht das einer Breite von 1,1 mm im Spaltbild. Dann wurde der untere Spalt in der verschiedensten Weise verstellt, ohne dass der Beobachter wusste, in welcher Richtung.

Den 4. XII. 05.

Bestimmung der Fehlergrenze der Beobachtungen
im äussersten Violett (415μ).

+ = Angabe „zu hell“, — = „zu dunkel“.

I. Trog mit destilliertem Wasser ohne Verdränger:

Geforderte Gleichheit beider Spalte bei 620.

680 +	665 —	600 —	670 —	670 +	$\left. \begin{array}{l} \text{zu hell 675} \\ \text{zu dunkel 590} \end{array} \right\} \text{Mittel 632,5}$
560 —	600 +	650 —	690 +	595 —	
660 —	670 +	660 —	580 —	675 +	
670 +	660 +	670 —	680 +	590 —	
590 —	595 —	700 +	590 —		
660 —	595 —	595 +	675 +		
580 —	670 +	560 —	675 +		

II. Trog mit destilliertem Wasser und Verdränger:

680 +	660 +	650 +	590 —	650 +	$\left. \begin{array}{l} \text{zu hell 655} \\ \text{zu dunkel 580} \end{array} \right\} \text{Mittel 617,5}$
560 —	580 —	595 —	650 +	585 —	
670 +	650 —	590 —	590 —	580 —	
470 —	590 —	650 +	585 +	650 +	
550 —	655 +	595 +	655 +	585 +	
570 ?	655 +	590 —	585 —	580 —	
600 +	595 —	655 +	580 —	580 —	

Der Fehler bei der ersten Versuchsreihe betrug 12,5 Skalenteile auf 600, d. h. 2,1%. Unter Umständen können freilich die Fehler grösser werden, da längere Beobachtungen, namentlich bei violettem

Licht, ausserordentlich rasch ermüden. Um dem vorzubeugen, habe ich zumeist die hier wichtigsten Beobachtungen im Violett bei jeder Versuchsreihe zuerst angestellt. Auch wird der Fehler grösser, wenn die zur Bestimmung dienende Intensität, die immer durch vorgesetzte Farben- und Grauscheiben geregelt wurde, weit über oder unter dem Optimum der Beleuchtung liegt.

Von den Versuchen, die zur Absorptionsmessung dienten, verzichte ich auf Wiedergabe der früheren, mit einem improvisierten Glastrog angestellten, und derjenigen, wo durch Trübung der Lösung genauere Werte nicht zu gewinnen waren. Eine Wiedergabe des gesamten Zahlenmaterials ist wenig geeignet, die Versuche zu illustrieren. Viel eher erhält man durch die ausgerechneten Absorptionskurven einen Überblick, und ich habe diese deshalb auch sämtlich wiedergegeben. Doch seien zunächst von einem besonders beweisenden Versuch an einer Sehpurpurlösung vom Bley als Beispiel sämtliche bei der Absorption gefundene Werte mitgeteilt und die aus den Spaltbreiten berechneten Absorptionskoeffizienten¹⁾.

5. XI. 05.

Absorptionsbestimmung einer frisch hergestellten Auflösung von acht Netzhäuten von *Abramis brama*.

I. Ungebleicht	Weite des Vergleichspaltes = 620 Nullpunkt beider Spalte = 20 Spaltbreiten für:			
	zu hell	zu dunkel	gleich	Absorptionskoeffizient ²⁾
— I 400 $\mu\mu$	250	210	230	0,650
0 410	270	230	250	0,617
I 423	290	250	270	0,583
II 440	400	370	385	0,392
III 471	460	410	435	0,308
IV 501,5	270	230	250	0,617
V 536	240	200	220	0,667
VI 583	300	260	280	0,567
VII 610	500	400	450	0,283
— I 400	200	140	170	0,750

¹⁾ Ein Fehler, der bei meiner Versuchsanordnung noch in Betracht kam, beruht, wie schon aus der Textfig. 5, S. 157 hervorgeht, darauf, dass bei Beobachtung an beiden Enden des Spektrums die ins Fernrohr gelangenden Strahlen, da sie den Trog etwas schräg durchsetzen, stärker absorbiert werden. Da dieser Fehler, zu starke Absorption an beiden Endteilen des Spektrums, in gleicher Weise bei allen Versuchen auftreten muss, ist er für das Hauptergebnis nicht von Belang.

²⁾ Unter Absorptionskoeffizient A wird hier und im folgenden der

Es sei zur Erläuterung des Versuches noch bemerkt, dass die unter „zu dunkel“ und „zu hell“ stehenden Werte direkt bestimmt wurden, und zwar so, dass der Beobachter vollkommen über die Richtung der Spaltänderung im Unklaren gelassen wurde. Es entspricht also jede Reihe etwa 10 bis 20 Einzelbeobachtungen, bei denen, um eine Bleichung möglichst zu vermeiden, mit Hilfe des elektrischen Verschlusses nur wenige Sekunden Licht zugelassen wurde. Trotz dieser Vorsicht ist aber schon am Schluss des Versuches bei nochmaliger Prüfung bei $400\ \mu\mu$ eine deutliche Absorptionsänderung eingetreten. Es war die sicher als zu hell gefundene Spaltbreite jetzt schon schmaler, als die eingangs als zu dunkel gefundene (200 jetzt zu hell, während früher 210 zu dunkel war). Es lag also schon jetzt die Absorptionszunahme jenseits der möglichen Fehlergrenze! Trotzdem war bei der nun folgenden Besichtigung der Lösung im Tageslicht die Lösung blauer, als die *B*-Reihe der Farbentafel (Taf. VII). Es wurde nun die Lösung so weit gebleicht, dass sie in die *C*-Reihe kam; und nun einige Bestimmungen an den Hauptpunkten vorgenommen.

II. Bis zur *C*-Reihe gebleicht:

Beobachtung bei	Spaltbreiten für:			
	zu hell	zu dunkel	gleich	Absorptions- koeffizient
— I $400\ \mu\mu$	120	80	100	0,867
0 410	140	100	120	0,833
III 471	360	320	340	0,467
IV 501,5	330	290	310	0,517
V 536	370	310	340	0,467

III. Nach weiterer Bleichung:

— I $400\ \mu\mu$	100	60	80	0,900
0 410	130	100	115	0,842
I 423	200	170	185	0,725
II 440	290	250	270	0,584
III 471	400	360	380	0,400
IV 501,5	420	380	400	0,367
V 536	480	430	455	0,275
VI 583	500	455	477,5	0,237
VII 610	520	470	495	0,208

Bruchteil des in die Lösung eintretenden Lichtes verstanden, der von ihr zurückgehalten wird. Unter Durchlässigkeitskoeffizient *D* der Bruchteil des in die Lösung eintretenden Lichtes, der nicht absorbiert die Lösung wieder verlässt. Es ist also $A + D = 1$. Bei Berechnung des Absorptionskoeffizienten wird zunächst durch Subtraktion der in Trommelteilen abgelesenen Spaltbreite

Die Grenzwerte für zu hell und zu dunkel sind so weit genommen, dass sie sicher ausserhalb der Fehlergrenze liegen. Da schon nach der ersten Bleichung im ganzen Violett die Werte für zu hell tiefer liegen, als die früheren Werte für zu dunkel, so ist das Ergebnis, Absorptionszunahme im Violett, schon jetzt vollständig gesichert. Zwischen zweiter und dritter Bestimmung ist aber, wie die Tabelle zeigt, sogar noch eine weitere Absorptionszunahme im äussersten Violett eingetreten.

Einen besseren Überblick über die Versuche gewinnt man durch die Absorptionskurven, die von diesem und auch allen folgenden Ver-

Fig. 6 u. 7.

suchen in den beistehenden Textfiguren wiedergegeben sind. Als Abscisse dient das Spektrum, in das die Bestimmungspunkte von — I bis VII eingetragen sind. Als Ordinaten wurden die Absorptionskoeffizienten eingetragen. Die ausgezogene Linie entspricht der Absorption der ungebleichten Lösung, die — — — -Linie der Absorptionsbestimmung nach der ersten Bleichung, die — · — · — -Linie der Absorption nach der zweiten Bleichung. Der Punkt — I' bei $400 \mu\mu$ entspricht der Absorption nach Schluss der ersten Reihe.

Man sieht jetzt, vgl. Textfig. 6, sehr deutlich, dass schon in der ungebleichten Auflösung der Netzhaut neben der starken Absorption im Grün (bei $536 \mu\mu$ liegt hier das Maximum) eine starke Absorption

bei der Gleichheit beider Felder erreicht wird, von der Breite des zweiten auf 620 stehenden Spaltes ($20 = \text{Nullpunkt}$) die von der Lösung absorbierte Lichtintensität in Trommelteilen gefunden. Ist z. B. wie bei — I 230 als gleich anzusehen, so entspricht die Absorption $620 - 230 = 390$ Trommelteilen. Dieser Wert ist aber $\frac{390}{600}$, d. h. 0,65 der Gesamtintensität. Eine Reduktion auf eine Einheit der Schichtendicke hatte bei der von Versuch zu Versuch wechselnden Konzentration keinen Zweck.

im kurzwelligsten Teil eintritt. Zwischen den beiden Maximis liegt ein Minimum bei $471 \mu\mu$, also im Blau. Bei der Lösung der Fischnetzhaute tritt die geringe Absorption im Blau, entsprechend der stark blauen Farbennuance des Sehpurpurs der Fische besonders deutlich hervor. Auch liegt hier dieses Absorptionsminimum weiter gegen das langwellige Spektralende zu verschoben, als bei den Lösungen von Netzhäuten aus den übrigen Tierklassen (siehe unten).

Bei einer andern entsprechenden Lösung konnte ich unter andern auch Herrn Geheimrat Hering die Absorptionszunahme im Violett direkt demonstrieren. Es wurde zunächst eine Gleichung im Violett eingestellt (bei $410 \mu\mu$), dann der Sehpurpur belichtet und der Trog an die gleiche Stelle gebracht. Ohne weiteres gab auch Herr Geheimrat Hering an, dass dasjenige Feld, welches der Lösung entsprach, d. h. im Fernrohr das obere, jetzt dunkler erschien, als das Vergleichsfeld.

Der gleiche Verlauf der Absorptionskurven wurde auch bei den andern Lösungen von *Abramis brama* erhalten. So bei der Lösung Fig. 7, 8 und 9. Überall zeigt sich an der frischen Lösung ein Absorptionsmaximum bei $536 \mu\mu$, ein Minimum bei 459 bzw. $471 \mu\mu$. Ausserdem ist bei allen Lösungen der Fischnetzhaute, wie ja auch aus den

Fig. 8 u. 9.

Messungen von Köttgen und Abelsdorff hervorgeht, auch noch die Absorption im Gelb ziemlich bedeutend. Der Kreuzungspunkt zwischen der Kurve der gebleichten und der ungebleichten Lösung, d. h. der Punkt, an dem die Absorption vor und nach der Bleichung konstant bleibt, liegt in der Regel weiter nach dem langwelligen Ende zu, als bei den Lösungen von Netzhäuten von andern Tierklassen. So in Kurve 6 bei $480 \mu\mu$, in 7 bei $451 \mu\mu$, in 8 bei $454 \mu\mu$ und nur in 9 bei $439 \mu\mu$.

Der letztere Versuch ist an einer Lösung gemacht, die einen Tag gestanden hatte und bei der scheinbar aus unbekannten Grün-

den eine geringe Veränderung im Sinne einer Gelbbildung vor sich gegangen war. Von derselben Lösung, aber unmittelbar nach der Herstellung stammt Kurve 8. Man sieht beim Vergleich der Kurven sehr deutlich, wie im grossen und ganzen der Verlauf beider übereinstimmt, nur ist die Absorptionszunahme bei der älteren Lösung im Violett sehr wenig ausgesprochen, und man würde, wenn die Absorptionsbestimmung nur bis $439\ \mu\mu$ durchgeführt worden wäre, das gleiche Resultat erhalten haben, wie Köttgen und Abelsdorff, d. h. überall eine Absorptionsabnahme bei der Ausbleichung. Ja, auch bei Durchführung der Bestimmung bis $412\ \mu\mu$ würde man bei der geringen Differenz geneigt sein, die Absorptionszunahme am violetten Ende auf Messungsfehler zu beziehen (vgl. z. B. die negativen, allerdings von 0 sehr wenig verschiedenen Werte, wie sie Köttgen und Abelsdorff selbst bei den Mittelwerten sämtlicher Messungsreihen S. 174 für Amphibien und Fische bei $420\ \mu\mu$ erhielten).

Das Absorptionsminimum im Blau und das ungefähre Konstantbleiben der Absorption in diesem Spektralgebiet vor und nach der Ausbleichung liess sich auch schon voraussagen, wenn man die Photographie der Bleynetzhäute Fig. 5, Taf. IX daraufhin nochmals betrachtet. Die beiden Netzhäute, die zwischen 446 und $400\ \mu\mu$ liegen, nehmen bei der Bleichung (vgl. Reihe II und III) an Schwärzlichkeit zu, während die übrigen Netzhäute im langwelligeren Teil sich aufhellen. Ja, man ist sogar versucht, aus der ziemlich hellen Färbung der im Blau liegenden Netzhaut das oben beschriebene Minimum der Absorption herauszulesen, doch dürfte hier der Zufall gerade bei der vorliegenden Aufnahme eine Rolle mitgespielt haben, da es bei der Fischnetzhaute leicht vorkommt, dass bei der Präparation die Stäbchen-aussenglieder zum Teil leicht abgestreift werden.

Von der Netzhaut der Eule stammen die Kurven 10, 11 u. 12. Bei ihnen allen liegt vor der Bleichung das Maximum weiter nach dem kurzwelligen Teil zu, als bei den Fischen, bei ungefähr $500\ \mu\mu$. Auch bei ihnen kommt es meist, abgesehen von Kurve 10, zu einem Minimum, das etwas mehr nach dem kurzwelligen Teil zu gelegen ist, bei $440\ \mu\mu$, aber weniger stark ausgesprochen ist, als bei dem Fischsehpurpur. Im Versuch 10 wurden drei Bestimmungen vorgenommen, bei denen mit zunehmender Bleichung, zunächst zu D_s , dann zu E_s , zwei Kurven gewonnen wurden. Sie zeigen, dass mit zunehmender Absorptionsverminderung bei $500\ \mu\mu$ eine entsprechende Absorptionszunahme im äussersten Violett erfolgt. In Fig. 11 sind zwei Versuche von der gleichen Lösung eingezeichnet. Von der ersten

Probe wurde eine ausführliche Bestimmung gemacht, von der zweiten Probe wurden nur einige wichtige Punkte bestimmt. Die Kurven zeigen die gute Übereinstimmung der Absorptionsänderung. Fig. 12 stammt von der Lösung der Netzhäute der Sumpfohreule. Der Kurvenverlauf stimmt mit dem oben besprochenen überein.

Endlich wurde auch an der Lösung der Kaninchennetzhaut der Absorptionsverlauf vor und nach der Bleichung festgestellt. Die ausführliche Bestimmung Fig. 13 (schwarz) zeigt, dass, wie bei der Eule, an der ungebleichten Lösung das Maximum bei $500 \mu\mu$ liegt, ein deutliches Minimum bei $440 \mu\mu$ auftritt, und dann bis zum kurzwelligen Ende die Absorption wieder zunimmt. Die Lösung erschien gegen ein weisses Blatt im Tageslicht in der Farbe B_9 und blich zu E_{10} aus. Die Absorptionszunahme im kurzwelligen Teil geht bis zu $447 \mu\mu$, und von da setzt die Abnahme der Absorption ein. Am Schluss des Versuches bei Punkt VI zeigt die Kurve eine Kreuzung mit der zuerst aufgenommenen, was offenbar auf einem groben Beobachtungsfehler beruht. Es war dies die letzte Bestimmung, bei der der Beobachter schon sehr ermüdet war. Fig. 13 zeigt eine zweite

Bestimmung an einer Kaninchensehpurpurlösung, an der wieder eine beträchtliche Zunahme bei $400 \mu\mu$ einer beträchtlichen Abnahme der Absorption bei $500 \mu\mu$ gegenübersteht.

Alle mitgeteilten Absorptionskurven (Fisch, Eule, Kaninchen) zeigen, dass bei der Bleichung tatsächlich im kurzwelligsten Teil des Spektrums, worauf ja auch schon die Photogramme hinwiesen, eine gut messbare Absorptionszunahme eintritt, bei Herabgehen der Absorption im langwelligen Teil. Ferner zeigten die Kurven regelmässig zwischen dem Maximum bei etwa $500 \mu\mu$ und dem zweiten Maximum im Violett ein Absorptionsminimum. Nach der Ausbleichung

Fig. 10 u. 11.

besaßen die Lösungen alle eine ziemlich geradlinig ansteigende Absorption gegen das violette Ende hin.

Nur die Versuche Königs über die Absorption des menschlichen Sehpurpurs geben, wie Trendelenburg gezeigt hat, einen ähnlichen Kurvenverlauf, wenn man die Absorption der frischen Lösung und der Lösung nach teilweiser Bleichung graphisch aufträgt. Herr Kollege Trendelenburg, dem ich bei einem Besuch eine meiner Absorptionskurven zeigte, war über diese Übereinstimmung überrascht. Er wusste selbst mit der Kurve von König, insbesondere der nach teilweiser Bleichung, nichts anzufangen und schob

ebenso, wie Köttgen und Abelsdorff, die hier und da am kurzwelligen Ende auftretenden negativen Werte auf Beobachtungsunsicherheit. Er sagt (loc. cit. S. 42): „Es zeigt sich, dass die Kurve nach teilweiser Bleichung,“ siehe beistehende Figur, die der Arbeit Trendelenburgs entnommen ist (Kurve 2), „von 640 bis 500 $\mu\mu$ zum Teil über, zum Teil unter der vor der Bleichung gültigen Kurve (1) liegt, und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als ob dies zum Teil auf Beobachtungsunsicherheit beruht;“ hierin glaube ich dem Autor beipflichten zu müssen. Er sagt

Fig. 12 u. 13.

dann weiter: „dann pflegt weiter im Violett die Beobachtungsschwierigkeit bedeutend zuzunehmen. Doch es ist immer misslich, an den Resultaten eines ausgezeichneten Forschers Kritik zu üben, welcher so früh seinem Wirken und zugleich seiner Rechtfertigung entrissen wurde, und so sei es dahingestellt, ob die Kurven für die Existenz von Sehgelb beweisend sind.“ Nachdem nun für verschiedenartige Sehpurpurlösungen von Tieren gegen Köttgen und Abelsdorff die Existenz des Sehgelbes erwiesen ist, so glaube ich, dass, wenn man die Königsche Kurve, die einzige bisher vom menschlichen Sehpurpur gewonnene Lösung, trotz der vorhandenen Beobachtungsunsicherheiten,

in Betracht zieht, man sagen wird, gerade hier ist die Absorptionszunahme im Violett sehr bedeutend, und ganz analog wie beim Tier wird sich auch aus menschlichem Sehpurpur Sehgelb während der Ausbleichung entwickeln können. Dass ähnlich wie in den Versuchen Köttgen und Abelsdorffs mit der Kühneschen Gallenlösung hier wenigstens eine teilweise Ausbleichung des voraussichtlichen Sehgelbs gelang, ist zunächst nicht erklärbar, bedenkt man aber, dass Seh-

Nach König³ Tab. I und II.

Aus Trendelenburg, Quantitat. Untersuch. üb. d. Bleichung d. Sehpurpurs. S. 42.

Fig. 14.

purpur und Sehgelb, wie Kühne gezeigt hat, durch die verschiedensten Reagentien zerstört werden können, so erscheint es ganz gut möglich, dass irgend ein zufälliger Zusatz eines Stoffes, der in stärkerer Konzentration das farbige Produkt zerstört, in geringer Menge die Zerstörbarkeit durch Licht erleichtert¹⁾. Eine andere Möglich-

¹⁾ Hier denke ich besonders an folgende Angabe Kühnes: „Seit wir ätherfreie Purpurlösungen verwenden, hat es uns scheinen wollen, als ob deren totale Ausbleichung, d. h. die schliessliche Umwandlung von Gelb zu Weiss, auch in

keit für die wechselnde Zersetzlichkeit des Sehgelbs durch Licht könnte in der von Kühne mehrfach gesehenen Regeneration des Sehpurpurs in der bereits gelb aussehenden Gallenlösung liegen. Wie sich das Verschwinden der Gelbfärbung in einem solchen Fall trotz grosser Unempfindlichkeit des Sehgelbs gegen Licht aus wiederholter Zersetzung des jeweilig regenerierten Sehpurpurs denken lässt, wird im folgenden gezeigt werden.

Durch den Nachweis der Sehgelbbildung ist nun, wie man wohl sagen kann, „leider“ der Ableitung der Sehpurpurabsorptionskurve aus ungebleichter Lösung und aus der nicht mehr bleichbaren Restfarbe der Boden entzogen. Zwar ist es möglich, dass, wenn neben Sehgelb in der gebleichten Lösung ein konstanter Restfarbstoff vorhanden ist, dieser bis zum Blau ganz allein die Absorption in der gelbgebleichten Lösung bedingt, und nur der Zuwachs im Violett durch das neu entstehende „Sehgelb“ bedingt wäre. Dann würde die sogenannte Sehpurpurabsorptionskurve bis zum Blau richtig sein. Im kurzwelligsten Teil aber von etwa 450 bis 400 μ muss sicher eine Korrektur eintreten.

Die Entscheidung, wie wirklich der Absorptionsverlauf des oder der in der frischen Lösung vorhandenen lichtempfindlichen Stoffe beschaffen ist, dürfte am ehesten nach der Trendelenburgschen Methode, der Bestimmung der Bleichungsgeschwindigkeit (und zwar hier am besten nur bis zur eben merklichen Änderung), zu gewinnen sein, und parallel zu dieser Bestimmung müsste an der gleichen, natürlich an Violett reichen Lichtquelle die Bestimmung der absorbierten Energiemenge gehen.

Um einen Vergleich zu geben, wie etwa die Absorptionskurve der „Sehpurpurlösung im Sinne von Köttgen und Abelsdorff“ nach meinen Kurven aussehen würde, habe ich für eine derselben die Rechnung ausgeführt. Da die Theorie der Umrechnung, wie sie zuerst den Königschen Bestimmungen und dann den Bestimmungen von Köttgen und Abelsdorff zu Grunde lag, nicht jedem geläufig sein dürfte, sei sie hier kurz auseinandergesetzt.

Es sei an einer bestimmten Stelle des Spektrums I die Lichtmenge, welche von der ungebleichten Lösung hindurchgelassen wird, sie mag wie gewöhnlich als Bruchteil der gesamten einfallenden Lichtmenge I_0 gemessen werden. Desgleichen sei I_1 diejenige Lichtmenge, welche von der ge-

direktem Sonnenlichte wesentlich langsamer verlaufe, als wir es früher an ätherhaltigen sahen.“ (Ewald und Kühne, Heidelberger Untersuchungen. Bd. I. S. 267. 1877.)

bleichten einen Restfarbstoff enthaltenden Lösung durchgelassen wird. Man bezeichnet I und I_1 als die Durchlässigkeitskoeffizienten, wenn die gesamte in die Lösung eintretende Lichtmenge I_0 gleich 1 gesetzt wird. Für die ungebleichte Lösung würde der Absorptionskoeffizient A gleich $I_0 - I$, für die gebleichte A_1 gleich $I_0 - I_1$ sein. Es fragt sich nun, wie gross ist der Absorptionskoeffizient A_2 , der in der ungebleichten Lösung neben dem Restfarbstoff enthaltenen lichtempfindlichen Substanz, d. h. wie viel vom auffallenden Licht I_0 würde absorbiert werden, wenn die lichtempfindliche Substanz allein in der Lösung vorhanden wäre?

Statt des Absorptionskoeffizienten A_2 kann man auch den Durchlässigkeitskoeffizienten I_2 bestimmen und fragen: Welcher Bruchteil I_2 des einfallenden Lichtes I_0 würde hindurchgelassen, wenn die betreffende lichtempfindliche Substanz allein vorhanden wäre?

Ist I_2 bekannt, so ist auch A_2 gegeben, denn es ist: $A_2 = 1 - I_2$.

Man kann sich nun die absorbierende Schicht der ungebleichten Lösung in n Schichten zerlegt denken und von jeder Schicht mag $\frac{1}{\alpha}$ der auftreffenden Lichtmenge hindurchgelassen werden. Es ist dann die schliesslich austretende Lichtmenge:

$$I = I_0 \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{\alpha} \cdots n \text{ mal.}$$

Oder, da $I_0 = 1$ gesetzt wurde:

$$I = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^n = \alpha^{-n}.$$

In derselben Weise ist, wenn durch jede Elementarschicht des Restfarbstoffes $\frac{1}{\alpha_1}$ hindurchgelassen würde, die durch die ganze Schicht des Restfarbstoffes tretende Lichtmenge:

$$I = \alpha_1^{-n},$$

und ebenso wenn durch die Elementarschicht des lichtempfindlichen Stoffes, ohne dass weitere lichtabsorbierende Stoffe vorhanden wären, $\frac{1}{\alpha_2}$ des einfallenden Lichtes hindurchgelassen würde, so ist die durch die ganze Schicht des lichtempfindlichen Stoffes hindurchgelassene Lichtmenge:

$$I_2 = \alpha_2^{-n}.$$

Ist in der Lösung neben dem Restfarbstoff der lichtempfindliche Farbstoff vorhanden, so könnte man sich beide in je n Schichten hintereinander angeordnet denken, und es würde durch die erste Schicht beider von dem auftreffenden Licht hindurchgelassen:

$$I_0 \cdot \frac{1}{\alpha_1} \cdot \frac{1}{\alpha_2}$$

durch die zweite:

$$I_0 \cdot \left(\frac{1}{\alpha_1} \cdot \frac{1}{\alpha_2}\right) \cdot \left(\frac{1}{\alpha_1} \cdot \frac{1}{\alpha_2}\right)$$

und schliesslich durch die n te Schicht:

$$I_0 \cdot \alpha_1^{-n} \cdot \alpha_2^{-n},$$

$$\text{d. h.} \quad I = \alpha_1^{-n} \cdot \alpha_2^{-n} \quad (1)$$

$$\text{ausserdem war aber} \quad I_1 = \alpha_1^{-n} \quad (2)$$

$$I_2 = \alpha_2^{-n} \quad (3)$$

$$\text{Aus (2): } \log I_1 = -n \log \alpha_1.$$

$$\text{Aus (1): } \log I = -n \log \alpha_1 - n \log \alpha_2.$$

$$\log I - \log I_1 = -n \log \alpha_2.$$

$$\text{Nach (3) ist} \quad \log I_2 = -n \log \alpha_2$$

$$\log I_2 = \log I - \log I_1.$$

$$\text{oder} \quad \text{num. } \log I_2 = \text{num. } (\log I - \log I_1).$$

Damit ist aber I_2 und zugleich A_2 gefunden, wenn I und I_1 bzw. A und A_1 gegeben sind.

Nach diesem Verfahren ist aus den Absorptionskurven der gebleichten und ungebleichten Lösung der Netzhaut von Abramis brama (10. X.) die sogenannte Absorptionskurve berechnet worden (vgl. in der Textfig. 8, S. 163, die $\cdot - \cdot - \cdot$ -Linie). Natürlich war die Kurve nur bis zu $453 \mu\mu$ darstellbar. Sie stimmt gut mit der von Köttgen und Abelsdorff für die Fische gegebenen Kurve überein. Einige der von mir wiedergegebenen Kurven würden bei der Berechnung im langwelligen Teil ein rascheres Absinken ergeben, als bei Köttgen und Abelsdorff, was wohl zum Teil auf der hier von mir weniger eingehend vorgenommenen Beobachtung herrührt, da ich das Hauptgewicht auf die Beobachtung im Violett gelegt habe und mehrfach die letzten Werte im Gelb nur noch rasch näherungsweise zu bestimmen suchte. Natürlich wird infolge des Auftretens des neuen Farbstoffes der als Sehpurpurabsorptionskurve bezeichnete Linienzug namentlich im kurzwelligen Teil von der wirklichen „Sehpurpurabsorptionskurve“ abweichen. Wie ihr Verlauf ist, muss noch unentschieden bleiben.

Über den Einfluss der Qualität des bleichenden Lichtes auf die Netzhautfarbe.

Nachdem nachgewiesen ist, dass sich bei der Bleichung aus dem Sehpurpur Sehgelb bildet, erhebt sich nun weiter die Frage: wird infolge der verschiedenartigen Absorption des Sehpurpurs und Sehgelbs eine qualitativ verschiedene Ausbleichung im lang- und kurzwelligen Licht zu stande kommen? Wie schon in der Einleitung erwähnt war, stehen sich hier die Beobachtungen von Kühne und Nagel direkt gegenüber, und der letztgenannte Forscher war nicht im stande, diesen Widerspruch aufzuklären. Ich selbst habe mich seit $1\frac{1}{2}$ Jahren mit zahlreichen Versuchen über die Differenz der

Sehgelbbleichung bei Verwendung von Lichtern verschiedener Wellenlänge beschäftigt und bin jetzt in der Lage, willkürlich, je nach Anordnung des Versuches, die obengenannten einander gegenüberstehenden Resultate zu erhalten.

Statt die zahlreichen, in verschiedener Weise angestellten Versuche hier anzuführen, erscheint es vorteilhafter, von vornherein den Schlüssel zu obigem Widerspruch zu geben, ihn durch Versuchsbeispiele zu begründen und auf die genannten Ergebnisse anzuwenden.

Methode der Bleichungsversuche.

Die Froschnetzhäute, die der Bleichung unterworfen wurden, befanden sich entweder ohne Flüssigkeit auf Porzellanknöpfchen in kleinen lichtdichten Kassetten, oder in einer geringen Menge Ringerscher Lösung in einem Porzellannöpfchen, ebenfalls unter lichtdichtem Verschluss. Zur Bleichung diente spektrales Licht, das durch eine geeignete Anordnung von einer Bogenlampe von 50 Ampère gewonnen wurde.

Zur Beurteilung der Netzhautfarbe wurde die selbstverständlich im Dunkelzimmer gebleichte Netzhaut in ihrer lichtdichten Kassette ans Tageslicht gebracht, durch rasches Aufziehen des Schiebers konnte die Besichtigung in wenigen Sekunden vorgenommen werden. Eine stark dämmrige Beleuchtung wurde prinzipiell zur Besichtigung vermieden, da bei dieser die Farbenunterscheidung zu unsicher ist.

Wie bei zahlreichen Vorgängen zu einer genaueren Untersuchung ein geeigneter Massstab unumgänglich nötig ist, um alle Phasen des Vorganges an dem konstanten Vergleichsobjekt jeweilig reproduzieren zu können, so lässt sich auch die Farbenänderung der Netzhaut in der Weise am leichtesten untersuchen, dass man zunächst eine Skala herstellt, bei der auf Grund vorläufiger Beobachtungen die Farbtöne, die man an der frischen Netzhaut sieht, vertreten sind. Durch eine zweckmässige Bezeichnung ist es nach einiger Übung leicht, die der Netzhautfärbung ähnlichste Farbe durch rasche Vergleichung herauszufinden und zu bezeichnen. Wenn Kühne seinerzeit die Untersuchung noch nicht in der Weise verfeinerte, so ist das bei der ungeheuren Zahl von Einzelfragen, die sich ihm zunächst darboten, nicht zu verwundern. Aber auch die ganz neue, speziell auf die qualitativ verschiedene Bleichungsart des Sehpurpurs gerichtete Untersuchung Nagels und Pipers enthält nur Farbenangaben, die sich, soweit aus dem Text zu ersehen ist, auf die Erinnerung an frühere Farbeneindrücke beziehen. Ja, der eine der beiden Forscher scheint

eine derartige Farbenskala für überflüssig zu halten, wie aus folgender Äusserung hervorgeht: „Die Aufstellung einer Farbenskala zur Bezeichnung irgendwelcher Grade von Sehpurpurgehalt (Rhodopsimeter) hat Cavazzani für notwendig gehalten“ (Nagels Handbuch Bd. III, 1, S. 101). Durch Anwendung einer solchen Farbenskala, wie sie beispielsweise Gatti¹⁾ auf Cavazzanis Rat anwendete, um den Purpurgehalt während der Regeneration zu messen, ist aber tatsächlich auch der Leser in den Stand gesetzt, viel besser die Versuche zu beurteilen, und der Forscher gewinnt aus seinen Protokollen viel eher einen Einblick in die verschiedenen Farbenänderungen, welche die betreffende Netzhaut während des Versuches erfahren hat.

Die beiliegende Tafel (VII) enthält eine Reihe von Farbentönen wie sie näherungsweise in der Netzhaut von Fischen und den Netzhäuten der übrigen Wirbeltiere vorkommt. Jeder einzelne Farbenton ist in zahlreichen Stufen bis zur geringsten Sättigung vertreten. Im folgenden sollen die Farbentöne mit *A, B, C, D, E, F* bezeichnet werden, und die einzelnen Sättigungsgrade durch Anhängung von 1, 2 usf. an den Buchstaben. Scheint die Färbung der Netzhaut zwischen zwei Reihen zu liegen, so wird die entsprechende Kombination, wie beispielsweise A_5-B_5 , zur Bezeichnung der Zwischenfarbe verwendet. Übrigens wurden ausser von Gatti bzw. Cavazzani auch schon von Hamburger (a. a. O.) Farbentafeln (er benutzte die von Chevreul) zu den analogen Versuchen gebraucht, ganz abgesehen davon, dass auch schon Boll²⁾ bei seiner Darstellung über die Farbenänderung der Netzhaut durch verschiedenfarbiges Licht solche Farbentafeln benutzte.

Erklärung der widersprechenden Ergebnisse.

Schon Kühne hatte darauf hingewiesen, dass nicht nur in der im lebenden Auge befindlichen Netzhaut, sondern auch in der aus dem Auge entfernten, ja sogar in der abgestorbenen und vertrockneten Netzhaut Regenerationsprozesse ablaufen, die zu einer Wiederfärbung der ausgebleichten Netzhaut führen können. Er hat versucht, da er die Verschiedenartigkeit der Prozesse erkannte, dieselben weiter zu differenzieren. So finden sich nach ihm im sehenden Auge zwei verschiedene Arten der Purpurbildung (Rhodogenese). „Nach

¹⁾ Gatti, *Intorno all' influenza della temperatura nella formazione della porpora retinica*. *Annali di ottalm.* Bd. XXX. Fasc. 1. p. 377. 1901.

²⁾ Boll, *Zur Anatomie und Physiologie der Netzhaut*. *Du Bois-Reymonds Arch.* 1877. S. 4.

vollständiger Ausbleichung *intra vitam* kehrt der Purpur“ (beispielsweise beim Kaninchen) „erst vollständig nach 40 Minuten zurück, und während dieser Regenerationszeit durchläuft die Netzhaut die Farbenstufen vom blassesten Lila unter steigender Sättigung bis zum Purpur, ohne aber jemals gelbe Farbentöne aufzuweisen.“ Diesen Prozess bezeichnet er als Neogenese.

Ausserdem erfolgt eine Erneuerung des Purpurs unter Mitbeteiligung des Zerfallsmaterials. Sie erfolgt wesentlich rascher als die Neogenese, ist aber auch an eine Wechselwirkung zwischen Stäbchen und Epithelzelle geknüpft. Bei ihr beginnt die Neubildung mit Gelb und geht durch „Chamois, Orange und Rot zum Purpur zurück“. Diese Art der Regeneration wird von Kühne als Anagenese bezeichnet. Auch bei der isolierten Netzhaut, die, nach Bleichung in den Epithelgrund des Froschauges zurückgelegt, in verhältnismässig kurzer Zeit die Purpurfärbung wiedererlangt, wird die Regeneration zur Anagenese gerechnet. Ausserdem findet Kühne aber, dass jede isoliert gebleichte Froschnetzhaut „nach zwei- bis dreistündigem Verweilen im Dunkeln eine gewisse Wiederkehr der Farbe zeigt. Sie wird blass strohgelb, dann hell chamois, endlich blass rosa, und wenn man diese Farbe am folgenden Tag etwa wieder fortbleicht, so kehren die Farben schwächer und langsamer zum zweiten Male zurück, nach abermaligem Belichten selbst zum dritten Male. Kühne ist der Meinung, dass das Absterben der Netzhaut von keinem oder nur geringem Einfluss auf diese „Autoregeneration“ ist. Es zeigt sich nämlich, dass gewisse chemische Agentien die Autoregeneration nicht aufheben, die doch aller Wahrscheinlichkeit nach ein Absterben der Netzhaut herbeiführen (konzentrierte *Na-Cl*-Lösung). Zur Erklärung der Autoregeneration nimmt Kühne an, dass Zersetzungsprodukte des Sehpurpurs (Sehweiss) in den Stäbchen haften bleiben, und ausserdem in kleinen Mengen immer ein aus dem Pigmentepithel stammender Stoff (Rhodophylin) vorhanden ist. Durch diese beiden Stoffe könnten sich wieder Sehgelb und Sehpurpur bilden. Weniger ausgesprochen, aber doch merklich, war eine Bildung von Purpur auch in Lösungen vorhanden, die zuvor vollständig ausgebleicht waren.

Die verschiedenartigsten Bleichungsversuche brachten mich nun zu der Überzeugung, dass die Regeneration der isolierten Netzhaut sich viel rascher merklich machen kann, als es nach den Kühneschen Mitteilungen zu erwarten ist, vorausgesetzt, dass die Entfärbung der isolierten Netzhaut nicht bis zur Farblosigkeit, sondern nur bis zur Bildung von Sehgelb ging.

Hierfür seien zunächst einige Beispiele angeführt.

Am 15. IX. 1905 wird eine Froschnetzhaut rasch am Tageslicht bis zu E_8 ausgebleicht und dann eine Stunde in Ringerscher Lösung aufgehoben. Nach Ablauf dieser Zeit zeigt die betreffende Netzhaut die Farbe $C_6 - B_6$.

In einem andern Falle, den 24. IX. 1905, ist eine Netzhaut bei frischer Besichtigung gleich B_3 , wird 3 Uhr 52 Minuten zu E_7 ausgebleicht, und ist 5 Uhr 7 Minuten, nachdem sie in der Zwischenzeit, d. h. 1 Stunde 15 Minuten im Dunkeln gelegen hat, gleich C_8 .

Den 30. IX. 1905 wird eine Netzhaut am Tageslicht von 11 Uhr 53 Minuten bis 11 Uhr 57 Minuten gebleicht, von B_3 bis zu E_7 , die Netzhaut dann im Dunkeln gelassen von 11 Uhr 57 Minuten bis 12 Uhr 45 Minuten. Nach dieser Regenerationspause von 48 Minuten ist die Färbung C_9 und im Tageslicht ändert sich dieselbe bis auf $E_9 - E_{10}$. Nachdem sie weitere 2 Stunden 25 Minuten im Dunkeln aufgehoben worden war, zeigt sie wieder in geringerem Grade eine Regeneration bis zu $D_{10} - C_{10}$ und wird jetzt am Licht rasch nahezu farblos.

Auch nach noch kürzeren Pausen kann unter günstigen Bedingungen eine sehr beträchtliche Regeneration hervortreten. So wurde am 13. IX. 1905 bei sehr hellem Tageslicht, teilweise sogar Sonnenlicht, eine Netzhaut rasch von B_3 zu E_8 ausgebleicht. Nach 32 Minuten Verdunklung war die Netzhaut bereits C_{10} .

Eine so starke und rasche Regeneration kann man nun fast regelmässig dann erhalten, wenn man, wie in dem angeführten Beispiel, durch intensive Beleuchtung dafür sorgt, dass die Bleichung möglichst rasch von statten geht. So war nach Ausbleichung von Froschnetzhäuten in der Sonne — die Gelbfärbung erfolgt hier in wenigen Sekunden — und nach nachheriger Verdunklung fast regelmässig nach $\frac{1}{2}$ stündiger Regenerationspause der Farbumschlag sehr ausgesprochen. Ja bei einem Versuch (11. XII. 1905) war bereits nach 10 Minuten ein Farbumschlag eben merklich: von E_8 nach $E_9 - D_9$.

Da Nagel und Piper ihre Bleichungsversuche insbesondere an der Eulennetzhaut angestellt hatten, wurde, soweit es die Kostbarkeit des Materials gestattete, auch an dieser die Autoregeneration untersucht. Bei der Ausbleichung der meist vom Waldkauz stammenden Netzhautteile trat bei der Gelbbleichung ein gewisser Unterschied gegenüber der Froschnetzhaut auf. Während diese letztere sehr rasch, in der Sonne in wenigen Sekunden, aus der B -Reihe in die E -Reihe übergeht, bleibt die Eulennetzhaut lange zwischen der D - und E -Reihe stehen. Dieses „Zögern“ in der Farbenänderung ist beim Frosch in geringem Masse auch vorhanden. Man gewinnt

aber bei der Eulennetzhaut fast den Eindruck, als ob der aus dem Sehpurpur hervorgegangene neue Farbstoff hier eine etwas stärkere Orangefärbung hätte, als beim Frosch, wo es sich um ein fast reines Gelb handelt. Diese etwas geringere Differenz in dem Farbenton zwischen ungebleichter und „gelb“ gebleichter Netzhaut dürfte wohl die Ursache sein, dass Nagel und Piper gerade hier die Ausbleichung ohne Tonänderung vor sich gehen lassen wollen (vgl. loc. cit. S. 92: „dabei meistens, soweit sich das beurteilen lässt, im gleichen Farbenton bleiben“). Als Beispiel der Ausbleichung der Netzhaut eines Waldkauzes am Tageslicht sei folgender Versuch angeführt.

Den 2. X. 1905 wird ein Waldkauz nach längerem Dunkelaufenthalt 3 Uhr 25 Minuten getötet, 3 Uhr 46 Minuten, also 21 Minuten post mortem wird das erste Netzhautstück in Ringerscher Lösung angesehen, Farbe $= B_4$. Nach etwa 5 Sekunden Bleichung, hellbewölkter Himmel am Fenster, war die Farbe nach C_5 übergegangen, und nach 20 Sekunden nach D_8 . 3 Minuten später wird sie bei immer weiter gehender Belichtung zu $D_8 - E_8$ und ist 3 Uhr 59 Minuten, also nach 13 Minuten langer Belichtung, immer noch $D_8 - E_8$. Erst nachdem etwa $\frac{1}{2}$ Minute direktes Sonnenlicht auf sie einfiel, wurde 4 Uhr 5 Minuten fast E_7 erreicht, d. h. die Farbe war nur andeutungsweise rötlicher als E_7 .

Nun wurde die Netzhaut zur eventuellen Regeneration verdunkelt. Es fand sich nach 10 Minuten (4 Uhr 15 Minuten) $D_7 - E_7$, nach weiteren 20 Minuten (4 Uhr 35 Minuten) D_7 . Am nächsten Morgen war die Regeneration wesentlich weiter gegangen: C_{10} .

Im angeführten Fall war also in $\frac{1}{2}$ Stunde sicherlich schon eine merkliche Regeneration eingetreten, und das gleiche Resultat wurde noch in mehreren Versuchen erhalten. Doch kam es auch vor, besonders an Netzhautteilen, welche länger gelegen hatten, dass die Regeneration innerhalb der ersten halben Stunde sehr geringfügig war, bzw. von $D_9 - E_8$ bis zu D_7 , also an der Grenze des Erkennbaren. Die stärkste Regeneration in kurzer Zeit war auch hier in einem Fall zu erhalten, wo ein frisches Netzhautstück rasch im Sonnenschein gebleicht wurde (vgl. folgenden Versuch).

Sumpfohreule den 12. XII. 1905 getötet 11 Uhr 40 Minuten.

Netzhautstück des Dunkelauges ungebleicht B_5 12 Uhr 2 Minuten. An der Sonne gebleicht bis 12 Uhr 10 Minuten zu $E_7 - D_7$, dann verdunkelt. Bereits 12 Uhr 30 Minuten Regeneration zu D_7 , 12 Uhr 50 Minuten $C_8 - D_8$ und 1 Uhr 18 Minuten C_8 . Bei einer zweiten Probe hatte die zunächst von B_6 nach $D_9 - E_9$ 12 Uhr 22 Minuten ausgebleichte Netzhaut, 1 Uhr 18 Minuten die Farbe von $C_9 - C_{10}$ angenommen. Während in diesem Fall die Regeneration nahezu ebenso rasch wie beim Frosch erfolgte, und ganz sicher zu beobachten war, war sie bei der Netzhaut eines Wald-

kauzes den 14. XII. 1905 allerdings in einem sehr kalten Raum (ungefähr 5 Grad), so gering, trotz rascher Ausbleichung im Sonnenschein, dass man sie an den Netzhautstücken schwerlich entdeckt hätte. In einem andern Versuch endlich, den 24. I. 1906, wurde an der Netzhaut eines Waldkauzes eine deutliche Regeneration wahrgenommen.

Die beschriebene Regeneration des Sehpurpurs aus Sehgelb ist nun in hohem Masse von dem Zustand der isolierten Netzhaut abhängig. Um die bei den Ausbleichungsversuchen auftretenden Differenzen auf die Regeneration zurückzuführen, war es vor allem notwendig, festzustellen, durch welche Mittel die isolierte Netzhaut die Regenerationsfähigkeit einbüsst, bzw. durch welche Mittel sie so herabgesetzt wird, dass sie bei einem Ausbleichungsversuch keine Rolle mehr spielen kann.

Derartige Versuche sind zum Teil schon von Kühne ausgeführt worden. Er erwähnt (Hermanns Handbuch S. 320), dass das Absterben nicht den geringsten Einfluss auf die Regeneration ausübt. Auch erfolgte eine Rückfärbung, wenn die Netzhaut 24 Stunden im Dunkeln in gesättigter Kochsalzlösung gelegen hatte und dann mit 0,5% Kochsalzlösung ausgewaschen, dem Lichte ausgesetzt worden war. Netzhäute, die in der gesättigten Kochsalzlösung verblieben, oder die mit Glycerin befeuchtet waren, zeigten eine sehr geringe, nur bis zum Chamois gehende Autoregeneration. Für obige Frage kam es aber darauf an, festzustellen, ob innerhalb kurzer Zeit (von $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde) bei den mit verschiedenen Reagentien behandelten Netzhäuten schon eine Regeneration auftritt. Es handelte sich bei mir nicht um die allmähliche Wiederkehr der blass strohgelben, hell chamois und blass rosa Färbung der vollkommen entfärbten Netzhaut, sondern um die Neubildung von Sehpurpur in der gelbgefärbten. Es ergab sich, dass, je länger die isolierte Netzhaut gelegen hatte, desto langsamer erfolgte nach der Gelbbleichung die Regeneration. Ich benutzte geradezu das längere Liegenlassen der Netzhäute, um ohne andere Reagentienwirkung den Einfluss der Regeneration bei den Bleichungsversuchen auszuschalten. War man danach versucht, die Geschwindigkeit der Regeneration mit dem Überleben der Netzhaut in Beziehung zu bringen, so zeigte sich anderseits, dass eine relativ rasche Regeneration auch noch nach Eingriffen vorhanden war, die im allgemeinen die Zellen abtöten. Dahin gehört ein Gefrieren der Netzhaut, und zwar eine Abkühlung bis auf — 20 Grad. Schon Kühne hat beobachtet, dass durch Gefrieren und wieder Auftauenlassen zwar ein ausgedehnter Plättchen-

zerfall der Stäbchenaussenglieder auftritt, der Sehpurpur aber hierbei nicht in Lösung geht (Heidelberger Untersuchungen, Bd. I, S. 41). Andererseits sah Kühne bereits (Hermanns Handbuch S. 284), dass nach Abkühlung auf -13 Grad die Ausbleichung durch Licht wesentlich langsamer von statten geht. Betreffs der Regeneration der zuvor gefrorenen Netzhaut hat er meines Wissens keine Angaben gemacht.

Es ergab sich, dass die zuvor auf -20 Grad abgekühlten und dann aufgetauten Froschnetzhäute nach der Gelbbleichung noch ganz gut der Regeneration fähig waren. Ob freilich die Regeneration so weitgehend ist, wie bei den frisch dem Auge entnommenen Netzhäuten, vermag ich bei der geringen Zahl derartiger Versuche nicht zu entscheiden. Da es an und für sich von Interesse war, näher festzustellen (vgl. Kühne), inwieweit der Aggregatzustand der Netzhaut für die Lichtempfindlichkeit des Sehpurpurs von Bedeutung war, wurden bei den Versuchen die Netzhäute zunächst bei -20 Grad selbst gebleicht. Es ergab sich, wie schon Kühne bemerkte, eine sehr starke Herabsetzung der Lichtempfindlichkeit. Doch geht nach meinen Versuchen anfangs die Bleichung bis zur D -Reihe noch ziemlich rasch von statten, auf dieser Stufe aber bleibt die Netzhaut lange stehen. Selbst 10 Minuten lange Bestrahlung mit direktem Sonnenlicht vermochte kaum eine Änderung herbeizuführen, während bei Zimmertemperatur schon in etwa 3 Sekunden die Netzhaut in die E -Reihe übergeht. Wird aber die bis zur D -Reihe gebleichte Netzhaut bis auf ungefähr -5 Grad erwärmt, so geht jetzt ganz plötzlich die Bleichung bis zur E -Reihe weiter. Nach Verdunklung zeigt sie dann, wie gesagt, eine in relativ kurzer Zeit deutliche Rückkehr der Rotfärbung. Hierfür ein Beispiel.

Eine Froschnetzhaut wird bei -20 Grad in der Sonne rasch von B_3 zu D_7 gebleicht. Nach 10 Minuten Sonne kaum eine Änderung (D_8) und auch 3 Minuten später zeigt sie immer noch D_8 . Nun in der Wärme aufgetaut, geht sie in wenigen Augenblicken in E_7 über. Nach 31 Minuten Verdunklung ist die Regeneration sicher nachweisbar (D_8).

Den 12. XII. 1905 wird eine Froschnetzhaut nach Abkühlung auf -20 Grad in direkter Sonne (durch Einschaltung eines Spiegels) gebleicht. Belichtung von 11 Uhr 31 Minuten an:

11 Uhr 31 Minuten	B_3
11 „ 32 „	D_7
11 „ 35 „	D_7

Jetzt wird die Netzhaut verdunkelt bei -20 Grad gehalten bis 12 Uhr 35 Minuten. Auch jetzt ist die Farbe noch D_7 und 5 Minuten lange Einwirkung der Sonne bringt die Farbe höchstens bis D_8 (d. h. kaum ein sicherer Unterschied). Nun wird die Netzhaut im Dunkeln auf Zimmer-

temperatur gebracht und geht bei nochmaliger Belichtung mit Sonne in wenigen Sekunden in E_7 — E_8 über, 12 Uhr 45 Minuten wird sie nun bei Zimmertemperatur wieder ins Dunkle gebracht und ist 1 Uhr 23 Minuten zu D_9 regeneriert, das in der Sonne rasch zu E_9 ausbleicht. Gerade dieser letzte Farbenumschlag bei der letzten Belichtung machte die vorausgegangene Regeneration sicher.

Anderseits lassen sich durch Reagentien, welche die Struktur der Netzhaut gut erhalten, wie Formol, Veränderungen erzeugen, durch welche die Regeneration vollkommen aufgehoben wird. In Formol hält sich, wenigstens in 4% Lösung, der Sehpurpur ganz gut, in Übereinstimmung mit den Beobachtungen von Andogski¹⁾ und Abelsdorff²⁾. Freilich konnte ich bei einer 10% Lösung, wie sie Andogski beim Kaninchenauge anwendete, keine gute Konservierung beim Frosch erhalten, wohl aber in einer 4% Lösung. Vielleicht ist von Andogski auch nur eine 4% Formaldehydlösung gemeint, es wäre das eine zehnfache Verdünnung der käuflichen 40% Formaldehydlösung. An den in Formol gehärteten Netzhäuten war auch nach 24 Stunden keine Regeneration eingetreten. In ähnlicher Weise, wie durch Formol, konnte auch durch Ätherdämpfe die Regeneration vollkommen aufgehoben werden.

Nach Einwirkung von Alaun, welches bekanntlich als erstes Mittel von Kühne angewendet wurde (Heidelberger Untersuch. Bd. I, S. 83), um die Netzhaut mechanisch widerstandsfähiger zu machen, tritt ebenfalls, wie ich mich an Froschnetzhäuten überzeugen konnte, wenigstens für kürzere Zeit, 1 bis 2 Stunden³⁾, sicher keine Regeneration ein.

Es ist nun von Interesse, dass alle die Mittel, welche die Regeneration des Sehgelb hemmen, dasselbe zugleich indolent machen. Hierunter versteht Kühne die Erscheinung, dass Netzhäute vielfach, namentlich beim Absterben die Netzhäute der Säugetiere, gegen Lichtwirkung ausserordentlich resistent werden. Er nahm an (Heidelberger Untersuch., Bd. I, S. 433), „dass das Sehgelb unter Umständen an andere Dinge gebunden oder fixiert werde und daher die

¹⁾ Andogski, Über das Verhalten des Sehpurpurs bei Netzhautablösung. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. Leipzig 1897.

²⁾ Abelsdorff, Physiologische Beobachtungen am Auge des Krokodils. Engelmanns Arch. 1898. S. 154.

³⁾ Ob die von mir ausführlich beschriebene Farbenänderung mit der ganz langsam erfolgenden Wiederfärbung alter getrockneter Netzhäute zusammenhängt, die nach wochenlangem Liegen auch nach vorheriger Alaunhärtung eintritt, muss ich unentschieden lassen.

Lichtempfindlichkeit zum Teil oder ganz verliere“. Auffallenderweise konnte Kühne an Lösungen das Indolentwerden des Sehgelbes nicht beobachten. Um Froschretinae mit indolentem Sehgelb zu versehen, lässt er isolierte Netzhäute 24 bis 48 Stunden in dem Lymphsack eines lebenden Frosches absterben. Der in ihnen dann noch enthaltene Sehpurpur setzt sich im Licht in ein Sehgelb um, welches erst nach lange fortgesetzter Bleichung verschwindet. Ich habe mich bei einem Versuch überzeugt, dass derartige Retinae nach Gelbbleichung, ebenso wie die längere Zeit in Ringerscher Lösung aufbewahrten, keine Regeneration gaben.

Dieser enge Zusammenhang zwischen Indolenz des Sehgelbes und Wegfall der Regeneration brachte mich auf die Vermutung, dass auch bei der frisch dem Auge entnommenen Netzhaut das Sehgelb an und für sich ziemlich indolent ist, d. h. nur äusserst langsam durch Licht zersetzbar, und das verhältnismässig rasche Farbloswerden einer frischen Netzhaut weniger durch die Bleichung des Gelb bis zur Farblosigkeit, als durch die Regeneration des Sehgelb zu Sehpurpur bedingt werde. In der Tat sind die Bleichungszeiten für eine frische Netzhaut des Frosches, um vollkommene Farblosigkeit zu erzielen, ausserordentlich lang. So verschwand in klarer Novembersonne, deren Strahlen durch einen Spiegel senkrecht auf die in Ringerscher Lösung befindliche Netzhaut fielen, das in wenigen Sekunden gebildete Sehgelb (E_6) erst nach einer halben Stunde vollständig. Ja in einem zweiten Versuch ging die Farbe der in der Sonne rasch zu E_6 ausgebleichten Netzhaut nach halbstündiger Besonnung nur bis zu E_{10} .

Wie kann nun aber die Regeneration, die ja, wie gesagt, schon innerhalb einer halben Stunde an der isolierten Froschnetzhaut zu beobachten ist, das Verschwinden des Sehgelbs begünstigen? Denn entsteht innerhalb dieser Zeit auf Kosten des Sehgelbs Sehpurpur, so wird dieser ja wieder vom Licht zu Sehgelb gebleicht, und wir hätten einen Kreisprozess, durch den nicht das allmähliche Verschwinden des Sehgelbs erklärt werden könnte. Es lässt sich aber ein Ausbleichen infolge der Regeneration sehr gut verstehen, wenn man beispielsweise folgende Annahme macht: Es könnte unter Einwirkung des Lichts ein Teil Sehpurpur einen Teil Sehgelb bilden, neben andern Produkten, die farblos wären und für die Regeneration nicht weiter in Betracht kämen. Das gebildete Sehgelb würde aber in folgender Weise wieder Sehpurpur bilden können: Es treten, eventuell unter Beteiligung gewisser Reservestoffe, zwei Teile Sehgelb zusam-

men, um einen Teil Sehporpur zu erzeugen. Wie sich unter dieser Annahme die allmähliche Ausbleichung vollzieht, lässt sich am besten aus folgendem Schema ersehen. Es wird angenommen, dass der Einfachheit halber die Regeneration ohne andere Reservestoffe einfach nur durch Verkuppelung von zwei Teilen Sehgelb zu stande kommt.

Die Figur zeigt, wie sich nach der obigen Annahme aus 4 Teilen Sehporpur, abgesehen von farblosen Produkten, 4 Teile Sehgelb bilden können, und es würden nun je 2 Teile Sehgelb zusammentreten, um 1 Teil Purpur zu erzeugen. Infolgedessen würden jetzt nur noch 2 Teile Purpur nach der ersten Regeneration in der Netzhaut vor-

handen sein. Wirkt das Licht länger ein, so werden wiederum aus den 2 Teilen Sehporpur 2 Teile Sehgelb entstehen, und aus diesen beiden Teilen würde sich wieder ein Teil Sehporpur bilden, der unter weiterer Lichteinwirkung schliesslich 1 Teil Sehgelb abspaltet.

Dieses allmähliche Farbloswerden würde natürlich noch begünstigt durch die sicher vorhandene, wenn auch geringe, Lichtempfindlichkeit des Sehgelbs. Dass in der Tat bei der Ausbleichung einer frischen Netzhaut vom Gelb

Fig. 15.

zur vollkommenen Farblosigkeit der Grad der Bleichung nicht einfach dem Produkt aus Intensität mal Einwirkungsdauer des Lichts proportional ist, sondern in viel höherem Masse von der Zeitdauer der Einwirkung als der Intensität abhängt, geht aus folgenden beiden Versuchen hervor.

Den 23. XI. 1905 werden 11 Uhr 35 Minuten zwei Netzhäute in der direkten Sonne rasch zu $E_{\frac{1}{2}}$ gebleicht, die eine Netzhaut *a* bleibt in der Sonne, während die Netzhaut *b* im Hintergrund des schwach beleuchteten Zimmers gebleicht wird. Die Intensitätsunterschiede der Bestrahlung von *a* und *b* sind also ganz ausserordentliche, trotzdem ist der zeitliche Bleichungsverlauf gar nicht sehr wesentlich verschieden.

	11 Uhr 35 Min.	11 Uhr 45 Min.	12 Uhr 5 Min.
Es war Netzhaut <i>a</i>	E_6	$E_{10} - E_{11}$	farblos
„ „ „ <i>b</i>	E_6	$E_9 - E_{10}$	E_{10}

Und bei einem zweiten Versuch:

	12 U. 7 M.	12 U. 12 M.	12 U. 17 M.	12 U. 37 M.
Es war Netzhaut <i>a</i>	E_6	E_8	$E_9 - E_{10}$	E_{10}
„ „ „ <i>b</i>	E_6	E_7	$E_8 - E_9$	E_9

Gerade in dem letzten Beispiel zeigt sich, dass ungefähr dasselbe Bleichungsstadium ($E_9 - E_{10}$) bei der Sonnennetzhaut in 10 Minuten eintritt, während es bei der Zimmernetzhaut der Dauer einer halben Stunde bedarf (E_9). Die einwirkenden Lichtintensitäten sind aber wesentlich verschiedener, als die Bleichungszeiten.

Man kann sich auch in folgender Weise von der Bedeutung der Regeneration für das verschwindende Sehgelb eine Vorstellung verschaffen. Man bleicht zunächst zwei Netzhäute am Tageslicht bis zum Gelb aus, bleicht die eine (*a*) am Tageslicht weiter, während man die andere vor Lichteinfall schützt. Ist dann die erste *a* am Tageslicht nahezu farblos geworden, so zeigt die einige Zeit verdunkelte sich schön rosa, und wenn jetzt nun Licht, auch nur für kurze Zeit auf diese letztere einfällt (*b*), geht ihre Farbe in ein ganz helles Gelb über, das fast so ungesättigt ist, wie das der die ganze Zeit über im Tageslicht gebleichten Netzhaut.

Versuchsbeispiel: Die Farbe der Netzhäute *a* und *b* war:

	11 U. 53 M.	11 U. 56 M.	11 U. 57 M.	12 U. 10 M.	12 U. 45 M.
<i>a</i> B_3	$D_7 - E_7$	E_7	$E_8 - E_9$	$E_{11} - F_{11}$ d. h. fast farbl.	
<i>b</i> B_3	$D_7 - E_7$	E_7 . . .	verdunkelt .	C_9 in 5 Min.	$E_9 - E_{10}$

Infolge länger dauernder Bleichung wird also unter allen Umständen, wegen der Begünstigung der Regeneration, ein ungesättigteres Gelb erhalten werden, als wenn mit viel stärkerer Lichtquelle beispielsweise Sonnenlicht kurze Zeit gebleicht würde.

Versuch 30. XI. 1905. Zwei Netzhäute *a* und *b* werden flüchtig bei Tageslicht betrachtet, und es erscheint *a* eher etwas satter zu sein als *b*, doch wird die Färbung beider auf B_4 geschätzt. Es bleibt nun *b* im Dunkeln, während *a* im Hintergrund des Zimmers bei schwacher Beleuchtung weiter gebleicht wird. *a* durchläuft hierbei folgende Stufen:

11 Uhr 45 Min.	12 Uhr 15 Min.	12 Uhr 44 Min.	1 Uhr 5 Min.	1 Uhr 13 Min.
B_4'	D_6	D_6	$D_9 - E_8$	E_9

Nun wird Netzhaut *b* in wenigen Sekunden in der Sonne ausgebleicht zu E_6 . Es ist also die rasch gebleichte Netzhaut viel satter gelb, als die langsam gebleichte. Um die Netzhaut *b* auf dieselbe Stufe, wie Netzhaut *a* zu bringen, musste sie noch 8 Minuten in direktem Sonnenlicht gebleicht werden.

Man kann also sagen, und es gilt das ganz allgemein: An frischen Netzhäuten wird ein sattes Sehgelb nur dann erhalten, wenn die Bleichung sehr rasch vor sich geht. Ist, wie der Untersucher es ja meistens absichtlich herbeiführt, die Beleuchtung stark herabgesetzt, so wird er nie ein Sehgelb von der Sättigung erhalten, wie es bei greller Beleuchtung möglich ist. Man versteht jetzt auch, wie Kühne zahlreiche Stoffe angibt, die Netzhäute mit „haltbarem Sehgelb“ liefern. Es sind das eben Netzhäute, bei denen die Regeneration und damit das weitere Fortschreiten des Bleichungsvorganges aufgehoben ist. Andererseits sehen wir auch ein, wie Beobachter, die ihre Netzhäute sehr langsam bleichen, ein Gelbstadium leichter übersehen können, weil, wie gesagt, dann nur sehr ungesättigte Farbentöne auftreten.

Es wird sich nun auch leicht erklären lassen, wie bei der Bleichung im Gelb und Violett sich bald Resultate im Sinne Kühnes, bald im Sinne Nagels und Pipers ergeben. Ein scheinbar beweisender Versuch für die stärkere Bleichung des Gelb im Violett wurde unter folgenden Bedingungen fast regelmässig erhalten: Es wird zunächst eine frisch herausgenommene Froschnetzhaut lange Zeit in spektralem Violett gebleicht, da die Wirkung des spektralen Lichtes eine verhältnismässig schwache ist, so wird die Netzhaut erst nach sehr langer Bleichungszeit vollkommen farblos werden. Bei der verhältnismässig langen Dauer der Ausbleichung wird aber das jeweilig gebildete Gelb immer eine geringe Menge Purpur regenerieren, so dass die Netzhaut immer rot gefärbt bleibt, aber dabei immer ungesättigter wird. Bleicht man dann die andere Netzhaut verhältnismässig schnell im Gelbgrün, so wird in dieser, da zur Regeneration zu wenig Zeit bleibt, ein mehr oder weniger sattes Gelb entstehen. Man erhält also scheinbar ein sehr beweisendes Resultat, es ist die im Violett gebleichte Netzhaut ungesättigter, dabei aber viel weniger gelblich, als die im gelben Licht gebleichte.

Hierfür nur ein Beispiel: Den 29. IX. 1904 wird Netzhaut *a* eines curaresierten Frosches von 5 Uhr bis 5 Uhr 30 Minuten = 30 Minuten im Violett gebleicht. Hierauf wird Netzhaut *b* 10 Minuten im Gelbgrün gebleicht¹⁾. Bei der unmittelbar darauffolgenden Besichtigung im Tageslicht ergibt sich:

Netzhaut *a* = C_3 , Netzhaut *b* = $E_7 - D_7$. Ein Uneingeweihter gab richtig an, *a* ist bläulicher, aber heller als *b*. Dass die im Violett ge-

¹⁾ Die relativ lange Bleichung im Gelbgrün ist durch Vorschaltung eines Farbenfilters bedingt.

bleichte Netzhaut, wie es hier der Fall ist, ungesättigter erscheinen muss, als die im Gelb gebleichte, ist für eine sichere Beweisführung im Sinne Kühnes notwendig, denn man kann immer einwenden, wenn die im Violett gebleichte rötlicher aussehende Netzhaut eine vergleichsweise grössere Sättigung aufweist, als die im Gelbgrün gebleichte gelblich aussehende: Im Violett ist eben noch nicht lange genug gebleicht worden.

Analoge Versuche, wie der eben beschriebene, haben, in sehr verschiedener Weise angestellt, immer das gleiche Resultat ergeben, wenn nur dafür gesorgt war, dass bei der Bleichung im Violett die betreffende Netzhaut längere Zeit zur Regeneration bekam, als die gelbgebleichte.

Man braucht nun aber nur den Versuch ein wenig zu ändern, um unentschiedene oder gar widersprechende Resultate zu erhalten. Bleicht man im Gelbgrün zuerst, und dann erst die andere Netzhaut im Violett, so kommt es oft vor, dass zwischen den beiden gebleichten Netzhäuten kein Unterschied vorhanden ist. In diesem Fall hat die im Gelb gebleichte Netzhaut eine längere Regenerationszeit, und es kann dann vorkommen, dass diese bei der Vergleichung am Schluss des Versuches sogar rötlicher ist, als die im Violett gebleichte. Den Schlüssel für solche paradoxe Versuche findet man, wenn man unmittelbar nach der Gelbbleichung die Farbe der gebleichten Netzhaut bestimmt.

So fand sich beispielsweise 30. IX. 1904: Netzhaut a ist nach Bleichung im Gelbgrün (1 Uhr 43 Minuten bis 1 Uhr 53 Minuten) $= E_6$. Nun wird Netzhaut b im Violett 34 Minuten gebleicht (1 Uhr 57 Minuten bis 2 Uhr 31 Minuten). Bei dem nun erst vorgenommenen Vergleich ergibt sich, dass die Farbe der im Violett gebleichten und der im Gelbgrün gebleichten beide in der D -Reihe liegen. Es war also hier sicher gestellt, dass die Farbe der Netzhaut a aus der E -Reihe in die D -Reihe durch Regeneration übergegangen war. Es liess sich nun aber leicht das Kühnesche Resultat erzielen, wenn, wie im vorliegenden Versuch, die Netzhaut a noch weitere 2 Minuten im Gelbgrün gebleicht wurde. Dann war $a = E_8$, $b = D_9$.

Diese beiden Beispiele zeigen, wie leicht man hier einer Täuschung anheimfallen kann, wenn man nicht alle Bedingungen in der verschiedensten Weise variiert. Ich selbst habe anfangs, ehe mir die grosse Bedeutung der Regeneration für den Bleichungsvorgang bekannt war, sehr „schöne“ Versuchsreihen erhalten, die ganz klar die Kühneschen Angaben bestätigten. Erst Versuche, wie der zuletzt genannte mit mehrfacher Besichtigung der beiden Netzhäute, führten mich zu der Erkenntnis, dass in gewissem Sinne das Licht in der

Netzhaut eine Penelopearbeit¹⁾ auslöst, nur mit dem Unterschiede, dass nach der Verdunklung nicht der Status quo ante erreicht ist, sondern immer ein Teil des Farbstoffes verloren geht.

Diese hier zunächst an der Froschnetzhaut nachgewiesene Abhängigkeit der Bleichungsergebnisse von der Bleichungsdauer und von der Regenerationsfähigkeit der isolierten Netzhaut — und zwar unterliegt letztere, soweit meine Versuche reichen, ziemlich Schwankungen — dürfte auch auf Netzhäute anderer Tierarten anwendbar sein. Bei der Eule konnte ich eine Regeneration der isolierten Netzhaut sicher beobachten, wenn sie auch hier nach meinen wenigen Versuchen grösseren Schwankungen unterworfen ist. Auch beim Bley liess sich eine recht bedeutende Regeneration der isolierten Netzhaut nachweisen. Nur ist hier freilich der Versuch nie so rein, weil hier leicht Reste des regenerierenden Epithels mit den Stäbchen abgelöst werden.

Jedenfalls sind aber die eingangs erwähnten entgegengesetzten Resultate Kühnes und Nagels nun erklärbar, und es muss dem Leser überlassen bleiben, sich namentlich die verschiedenartigen Ergebnisse der Kühneschen Versuche im einzelnen aus dem Gesagten abzuleiten. Wir können jetzt beispielsweise vielleicht auch die Beobachtung von Nagel und Piper (a. a. O. S. 91) erklären, dass bei einem Bleichungsversuch mit vier Netzhäuten vom Waldkauz die im Tageslicht bleichende am deutlichsten gelblichrot und schliesslich geradezu gelb wurde; es braucht nur, was hier nicht näher angegeben ist, die Bleichung hier rascher erfolgt zu sein, als hinter den in diesem Versuch verwendeten Farbenfiltern.

Vielleicht lässt sich auf Grund der beschriebenen Regeneration des Sehpurpurs aus vorhandenem Sehgelb auch das Verhalten der Gallenlösung bei der Ausbleichung verstehen. Kühne selbst gibt an, dass bei seinen Gallenlösungen (vgl. Heidelberger Untersuchungen Bd. I, S. 267) eine Regeneration zu Purpur stattfand, besonders kehrte das Rosa schneller zurück, wenn er die Ausbleichung nur bis zum Gelb hatte gehen lassen. Bei den neueren Versuchen an Sehpurpurlösungen ist über diese Regeneration der gebleichten Lösung nichts angegeben²⁾, und auch ich selbst habe dieselbe an den Lö-

¹⁾ Boll (Sull' anatomia e Fisiologia della retina. Atti della R. Acad. dei Lincei. 1876—77. III. Serie. Vol. I. p. 371) verwendet den gleichen Ausdruck für die zunächst von ihm übersehene, vollständige Regeneration des Purpurs im lebenden Froschauge, wie sie während jeder Nacht eintreten musste.

²⁾ Nur Trendelenburg (a. a. O. S. 52) gibt an, dass im Bleichungsverlauf der Sehpurpurlösung die Reaktionskonstante abnimmt, und dieses mög-

sungen nie beobachtet. Es scheint nicht unmöglich, dass durch irgend einen Nebenumstand bei den Kühneschen Präparaten die Regeneration ermöglicht war, und damit indirekt auch die Ausbleichung. Eine Bemerkung Kühnes (Heidelberger Untersuchungen Bd. I, S. 267) weist anderseits darauf hin, dass vielleicht auch die vollkommene Bleichung durch spurweise Verunreinigung mit Äther bedingt ist. Doch müssen hier noch weitere Versuche Klarheit schaffen.

Zusammenfassung.

Durch vorliegende Untersuchungen ist erwiesen, dass sich in der aus dem Auge entfernten Netzhaut unter allen Umständen Sehgelb bildet. Der Beweis erstreckt sich auf Netzhäute von Frosch, Bley, Eule, Kaninchen, Ratte und Affe. Der Nachweis liess sich, abgesehen von Beobachtungen im Spektrum, durch die Photographie führen: Es trat während der Bleichung eine Absorptionszunahme an den Netzhäuten ein, die sich im violetten Lichte befanden, während die vom übrigen Spektrum beleuchteten Netzhäute eine Abnahme der Absorption erfuhren.

Auch im lebenden Auge lässt sich bei sehr greller Belichtung die Bildung von Sehgelb nachweisen (Bley, Frosch, Kaninchen), doch dürfte bei gewöhnlichen Beleuchtungsverhältnissen die vorhandene Sehgelbmenge sehr gering sein, infolge der sich fortwährend vollziehenden Regeneration des entstandenen Sehgelbs zu Purpur.

In Lösungen war von vornherein eine Sehgelbbildung nur dann zu erwarten, wenn der Sehpurpur durch das Auflösen keine eingreifenden Änderungen erfuhr. Dieses ist in der Tat der Fall. Auch in Lösungen bildet sich durch die Ausbleichung ein und zwar äusserst resistentes Sehgelb, das sich in gleicher Weise auf Photographien des Spektrums durch Absorptionszunahme im Violett mit voller Sicherheit verrät. Diese Absorptionszunahme im Violett wurde ausserdem noch durch spektrophotometrische Messungen sichergestellt.

Schliesslich wurde gezeigt, dass der Einfluss der Wellenlänge des bleichenden Lichtes auf die Netzhautfarbe durch die bisher nicht genügend beachtete rasche Regeneration in der isolierten Netzhaut bedingt ist. Eine bis zu Gelb gebleichte Netzhaut wird nach $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde hellrosa, was dadurch zu stande kommt, dass das Sehgelb

licherweise auf eine Regeneration des Purpurs aus den Bleichungsprodukten zurückzuführen wäre.

wieder frischen Sehpurpur bildet. Bei diesem Kreisprozess geht aber mit jeder Ausbleichung ein gewisses Quantum der Farbstoffe verloren, so dass die resultierenden Farben immer ungesättigter werden. Lässt man durch langsame Bleichung dem jeweilig gebildeten Sehgelb Zeit zur Regeneration, so erhält man rosa Farbentöne, bleicht man sehr schnell, so resultiert ein mehr oder weniger sattes Gelb. Nimmt man hinzu, dass je nach Behandlung und Nebenumständen die isolierte Netzhaut eine sehr verschiedene Regenerationsfähigkeit besitzt, so lassen sich die widersprechenden Ergebnisse der verschiedenen Forscher verstehen.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel VII—XII, Fig. 1—13.

Tafel VII. Farbenskala.

Die mit *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* bezeichneten Reihen enthalten die bläulich-roten, roten, gelbroten und gelben Farben, die an den frischen Netzhäuten bzw. bei der Ausbleichung auftreten. Die Farbenstufen sind auf Grund der Beobachtung der Netzhäute, wie sie bei diffusem Tageslicht erscheinen, angefertigt. Die Netzhäute waren meist auf weissem Porzellan ausgebreitet, so dass die Farben der doppelten Schichtendicke entsprechen.

In jeder Reihe sind durch die Nummern 1—10 die Stufen des gleichen Farbtones, aber verschiedener Sättigung bezeichnet. Die Reihe *A* entspricht ungefähr der Färbung des Sehpurpurs der Fische, die Reihe *B* dem Sehpurpur der übrigen Wirbeltiere.

In den Reihen *C* bis *F* liegen die Farben, welche die Netzhäute bei der Ausbleichung durchlaufen.

Tafel VIII.

Fig. 1. (19. X. 1904.) Froschnetzhaut auf Porzellankugel, dreimal hintereinander im violetten Lichte photographiert. Erste Aufnahme rechts (*a*) sehpurpurhaltig, mittlere Aufnahme (*b*) nach Gelbbleichung, dritte Aufnahme (*c*) nach möglichst vollkommener Ausbleichung. Dass die Beleuchtung in allen drei Versuchen hinreichend konstant blieb, ist durch die immer gleichmässige Wiedergabe der Skala von grauen Papierstreifen sicher gestellt.

Fig. 2. (14. X. 1904.) Dreimalige Aufnahme ein und derselben Froschnetzhaut in grösseren Pausen (34. bzw. 23 Minuten ohne Anfeuchtung) zeigt dass, wenn wie im vorliegenden Fall keine Bleichung hinzukommt, die Vertrocknung allein die Absorptionsdifferenz nicht bedingen kann.

Fig. 3. Uneröffnetes Auge einer albinotischen Ratte, dreimal nacheinander aufgenommen. *a*. ungebleicht, *b*. nach Gelbbleichung, *c*. nach möglichst weitgehender Ausbleichung. Die drei Flecken im unteren Teil der Figur (von rechts nach links) entsprechen der Ansicht der Vorderfläche des Bulbus, der von hinten her mit violettem Licht beleuchtet wurde.

Tafel IX.

Fig. 4. (17. III. 1905.) Photographie eines von dem spektralen Lichte bestrahlten Porzellanstreifens, der entsprechend den helleren oder dunkleren Flecken mit Froschnetzhäuten behangen ist. Das rechte Ende des Streifens in der Figur entspricht dem kurzwelligen Ende des Spektrums. An diesem Teil (Reihe II und III) nimmt nach Gelbbleichung die Absorption deutlich zu, während sie am langwelligen Ende abnimmt. Reihe V lässt einige der zur Aichung dienenden Heliumlinien (besonders $587 \mu\mu$ und $446 \mu\mu$) erkennen.

Fig. 5. Wie Fig. 4 Versuche mit Fischnetzhäuten (*Abramis brama*).

Tafel X (auf $\frac{4}{5}$ der ursprünglichen Grösse verkleinert).

Fig. 6. Wie Fig. 4. Netzhautstücken einer Eule (Waldkauz, *Syrnium aluco*).

Fig. 7. Desgl. Versuch mit Stücken der Kaninchennetzhaut nach Alaunhärtung.

Fig. 8. Desgl. Versuch mit frischen Netzhautstücken eines Affen. (Nach Isolierung in Ringerscher Lösung.) Reihe III ist wegen zu geringer Belichtung auszuscheiden.

Tafel XI.

Fig. 9. (6. IV. 1905.) Absorptionsspektren der Sehpurpurlösung vom Kaninchen: I ungebleicht, II nach Bleichung. Man sieht sehr deutlich, wie im kurzwelligen Teil in II die Absorption zugenommen hat, während bei $500 \mu\mu$ (vgl. die Marken unterhalb der zur Aichung mit dem Heliumrohr dienenden Reihe III), deutlich eine Absorptionsabnahme eingetreten ist. Reihe III liegt infolge des Wegfalls der prismatischen Wirkung des alten, selbstgemachten Glastroges, wie die dunkeln, mitphotographierten Tuschestriche auf der Porzellanplatte zeigen, etwas weiter links, als die beiden oberen Aufnahmen.

Fig. 10. Absorption der Sehpurpurlösung des Waldkauzes. I (untere Reihe) ungebleicht, II nach Gelbbleichung.

Tafel XII.

Fig. 12 u. 13. Absorptionsspektren ein und derselben Sehpurpurlösung vom Bley (*Abramis brama*).

In Versuch 12 ist aber diese Lösung auf die Hälfte verdünnt.

In Versuch 12 entspricht Reihe I der Absorption vor, II nach der Bleichung, III einer einfachen Gallenlösung.

In Versuch 13 entspricht Reihe I der Gallenlösung, II der ungebleichten und III der gebleichten Sehpurpurlösung.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.