schliesslich löst man ihn in Alkohol und fällt mit Wasser. Er bildet braune kleine Nadeln, die bei $260-261^{\circ}$ schmelzen. Die Analyse ergab folgendes Resultat:

Ber. für $C_{13}H_{10}N_2O_4$	Gefunden
N 10.22	9.95 pCt.

Die Verbindung ist etwas in heissem Wasser löslich, gut in Alkohol, sehr leicht in Aceton, schwierig in Benzol, Chloroform und Ligroin.

584. Nicolaus Zelinsky und Marc Feldmann:
Ueber symmetrisches Diphenyltrimethylenecyanid und sym-
metrische Diphenylglutarsäure.

(Eingegangen am 13. November.)

Es ist kürzlich¹⁾ von dem Einen von uns bewiesen, dass die symmetrische Dimethylglutarsäure in zwei isomeren Modificationen zu existiren vermag. Indem wir zur Erledigung der Frage über die Isomerie solcher gesättigten Verbindungen schritten, die auf Grund der Structurtheorie nur in einer Modification auftreten dürfen, wurden wir ganz natürlich zu der symmetrischen Diphenylglutarsäure geführt, die uns synthetisch darzustellen gelang.

Das Hauptziel dieser Abhandlung war, zu untersuchen, ob die Existenz von zwei isomeren symmetrischen Diphenylglutarsäuren möglich ist. Die von uns erhaltene Diphenylglutarsäure enthält, ihrer Synthese aus Methylenjodid und Benzylcyanid nach, zwei asymmetrische Kohlenstoffatome und sollte demgemäss vom Standpunkte der van't Hoff-Le Bel'schen Theorie wenigstens in zwei isomeren Modificationen erhalten werden. Bei der vorliegenden Untersuchung verwandten wir um so grössere Aufmerksamkeit, als es uns, auf Grund einiger theoretischen Ueberlegungen, die wir jetzt noch nicht darthun wollen, sehr wahrscheinlich war, dass, abgesehen von der vollständigen Analogie der Structur der symmetrischen Dimethylglutarsäuren und der Diphenylglutarsäure, die letztere gemäss ihrer Synthese aus Benzylcyanid und Methylenjodid doch nur in einer Modification existiren wird. Die weitere Aufklärung dieser Frage wird nächstens von uns untersucht; einstweilen erlauben wir uns, die folgenden bis jetzt erhaltenen experimentellen Ergebnisse mitzutheilen.

¹⁾ Journal d. Russ. chem. Gesellsch. XXI, 389. Siehe auch diese Berichte XXII, 2823.

α - α -Diphenyltrimethylencyanid.

Zur Darstellung des α - α -Diphenyltrimethylencyanids liessen wir Benzylcyanid, Methylenjodid und trockenes Natron, d. i. unter Anwendung von Victor Meyer's »Natronmethode«¹⁾, aufeinander wirken. 23.4 g Benzylcyanid wurden mit 26.8 g Methylenjodid gemischt und zur erhaltenen Mischung in kleinen Mengen 8 g pulveriges geschmolzenes Aetznatron zugefügt. Die Mengen der angewandten Substanzen entsprachen der Gleichung:

Der Kolben mit der erwähnten Mischung wurde mit einem aufrecht stehenden Kühler in Verbindung gebracht und zur Einleitung der Reaction mit einer blauen Flamme erhitzt. Sobald die stürmisch verlaufende Reaction eintritt, muss die Flamme entfernt werden. Lässt sie nach, so wird der Kolben noch ein wenig erhitzt und somit das Ende der Einwirkung erzielt. Innerhalb 10—15 Minuten hat sich derart im Kolben eine ansehnliche Menge von Jodnatrium gebildet, das von einer schweren, dunklen und wenig beweglichen öligen Schicht bedeckt ist. Das ölige Product wird abgessogen, Jodkalium mit Aether gewaschen, die ätherische Lösung zum Product zugegeben und nach dem Abdestilliren des Aethers das Oel mit Wasserdämpfen destillirt, um nicht angegriffenes Methylenjodid und Benzylcyanid zu isoliren. Das mit Wasserdämpfen nicht übergehende Oel wurde vom Wasser getrennt und in heissem Alkohol gelöst.

Aus der alkoholischen Lösung schieden sich beim Abdampfen des Alkohols an der Luft sehr schöne, gut ausgebildete Krystalle ab, die abgepresst und aus Alkohol umkrystallisirt wurden.

Die nähere Untersuchung zeigte, dass diese Krystalle nichts anderes, als das von uns gesuchte Nitril der Diphenylglutarsäure ist. Die Untersuchung der Krystallform von dieser Substanz wurde auf unsere Bitte von Herrn Privatdocent Prendel ausgeführt, der uns Folgendes mittheilt:

»Die Krystalle der untersuchten Substanz besitzen eine plattenartige Gestalt und sind zu fächerförmigen Aggregaten und Stäben angeordnet. Ihre Grösse beträgt von 0.5—1.5 mm. Bei der Untersuchung unter dem Mikroskope im parallelpolarisirten Lichte erwiesen sie sich doppelbrechend; sie besitzen eine starke Doppelbrechung,

¹⁾ Ann. Chem. Pharm. 250, 123.

indem sie in den feinsten Schuppen die Interferenzfarben der ersten Ordnung geben. Auf allen Schnitten tritt bei ihnen eine gerade Auslöschung statt, sie gehören demnach dem rhombischen System an. Alle stellen sie Combinationen von einem Prisma, einem Brachydoma und einem Macropinakoid vor, siehe die beiliegende Figur. Beim Zerquetschen mit dem Deckgläschen geben sie eine Reihe von Spalten, die dem Brachypinakoid parallel sind; man darf also mit Recht annehmen, dass die vollkommenste Spaltbarkeit dieser Ebene parallel gerichtet ist. Bei zwei und zwanzig Krystallen wurde der Winkel der Brachydoma gemessen (im brachydiagonalen Schnitte unter dem Mikroskop) und das Mittel dieser Messungen gab 128° . Da aber hier keine andere Domen gefunden waren, so berechnet sich das Verhältniss der Parameter, indem wir diese Dome für die Hauptdome annehmen, zu:

$$\bar{b} : c = 1 : 0.4877.$$

Das Verhältniss $a : \bar{b}$ konnte nicht berechnet werden, weil kein einziger Krystall mit einer guten Ausbildung der Prismenflächen vorhanden war.«

Die Verbrennungen dieser Substanz gaben folgende Resultate:

- I. 0.1589 g Substanz mit Kupferoxyd verbrannt gaben 0.4863 g Kohlensäure und 0.0838 g Wasser.
- II. 0.1255 g Substanz mit Kupferoxyd verbrannt gaben 0.3820 g Kohlensäure und 0.0658 g Wasser.
- III. 0.1532 g Substanz mit Kupferoxyd verbrannt gaben bei Bar. von $0^\circ = 762$ mm und bei $t^\circ = 18^\circ$ ein Volum von 15.1 cem feuchten Stickstoffs.

	I.	Versuch II.	III.	Ber. für $C_{17}H_{14}N_2$
C	83.45	83.01	—	82.93 pCt.
H	5.87	5.82	—	5.69 »
N	—	—	11.41	11.38 »

Sa. 100.24 pCt.

Zur Ermittlung des Moleculargewichtes dieses Körpers benutzten wir Raoult's Methode ¹⁾.

- I. Versuch in Essigsäure. Gew. der Essigsäure = 21.2416; Gew. der Substanz = 0.0694 g; die Erniedrigung des Gefrierpunktes = 0.055° .
- II. Versuch in Benzol. Gew. des Benzols = 15.660 g; Gew. der Substanz = 0.1473 g; Erniedrigung des Gefrierpunktes = 0.185° .

¹⁾ Unter Anwendung des Beckmann'schen, in $\frac{1}{100}$ Grade getheilten Thermometers. Zeitschrift f. physik. Chem. II, 644.

Versuch		Ber. für $C_{17}H_{14}N_2$
I.	II.	
232	249	246

Wir hatten es hiernach in der That mit dem Nitril der symmetrischen Diphenylglutarsäure zu thun, denen beiden auf Grund ihrer von uns ausgeführten synthetischen Darstellung folgende Formeln zuzuschreiben sind:

Der Schmelzpunkt des Nitrils liegt bei $70-71^\circ$. Die Ausbeute ist genügend: aus 23.4 g Benzylcyanid und den entsprechenden Quantitäten von Methylenjodid und Natron werden bei der ersten Krystallisation 8 g reinen Nitrils erhalten, während die Mutterlauge noch eine verhältnissmässig ansehnliche Menge enthält.

Symmetrische Diphenylglutarsäure.

Das Product der Einwirkung von Methylenjodid auf Benzylcyanid, das nach dem Abdestilliren mit Wasserdämpfen von dem nicht angegriffenen Methylenjodid und Benzylcyanid im Kolben blieb, wurde in wenig Alkohol gelöst und zu einer starken wässerigen Lösung von Aetzkali zugegossen. Die Verseifung des Nitrils verläuft schnell und ist nach 6—8 stündigem Erwärmen völlig beendet. Beim Ansäuern der Lösung mit Salzsäure fällt eine organische Säure, als ein sehr schweres und dichtes Oel nieder, das nach kurzer Zeit erstarrt. Die Säure ist sehr schwer löslich, sogar im heissen Wasser, aus dem sie sich aber umkrystallisiren lässt. Beim Erkalten der wässerigen Lösung scheidet sich die symmetrische Diphenylglutarsäure in kleinen Nadeln aus, die sich knospenartig gruppiren. Ihr Schmelzpunkt liegt bei 164° .

Bei der Analyse wurden folgende Resultate erhalten:

- I. 0.1465 g Substanz mit Kupferoxyd verbrannt gaben 0.3867 g Kohlensäure und 0.0775 g Wasser.
- II. 0.1142 g Substanz mit Kupferoxyd verbrannt gaben 0.3010 g Kohlensäure und 0.0613 g Wasser.

	Versuch		Theorie
	I.	II.	für $C_{17}H_{16}O_4$
C	71.98	71.87	71.83 pCt.
H	5.87	5.96	5.63 „

Aus der Säure wurde durch Fällen des Ammoniumsalzes mit Silbernitrat ein Silbersalz erhalten und analysirt:

0.1530 g Silbersalz gaben beim Glühen 0.0647 g Silber.

	Gefunden	Ber. für $C_{17}K_{14}Ag_2O_4$
Ag	43.09	43.37 pCt.

Nachdem sich auf solche Weise die in heissem Wasser schwer lösliche Säure als die von uns gesuchte symmetrische Diphenylglutarsäure erwiesen hatte, wandten wir uns natürlich zu der wässerigen Lösung und hofften darin eine löslichere isomere Säure zu finden. Durch vielfaches Extrahiren dieser Lösung gelang es, ganz geringe Mengen einer organischen Säure in Form von kleinen Platten zu erhalten, deren Schmelzpunkt bei $72 - 74^{\circ}$ liegt. Sehr wahrscheinlich liegt die Phenylelessigsäure vor, entstanden durch Verseifung kleiner Mengen Benzylcyanids, welches bei der Destillation mit Wasserdämpfen nicht völlig abgetrieben war.

Es ist also durch das vorläufige Studium der symmetrischen Diphenylglutarsäure einstweilen die Existenz von nur einer Modification constatirt. Die nächste Untersuchung muss die Frage entscheiden, in wie weit die von uns gemachte Voraussetzung betreffs der Existenz nur einer symmetrischen Diphenylglutarsäure richtig ist. Diese Frage in Verbindung mit der zweifachen Isomerie der symmetrisch substituirten Glutarsäuren, die synthetisch aus α -Cyanpropionsäureester und Methylenjodid dargestellt werden, wird jetzt im hiesigen Laboratorium von Einem von uns zusammen mit einigen seiner Mitarbeiter untersucht.

Was das beschriebene Nitril betrifft, so scheint es als sehr interessantes Material für weitere synthetische Arbeiten dienen zu können. Wir denken durch Reduction daraus das symmetrische Diphenylpentamethyldiamin, und aus diesem Diphenylpiperidin folgender Gleichung gemäss darzustellen:

Der Versuch der Umwandlung des Nitrils der Diphenylglutarsäure in Diphenylpiperidin wird zum Gegenstande des nächsten Studiums für Einen von uns (für M. Feldmann) sein.

Odessa, im November 1889. Organische Abtheilung des chem. Laboratoriums der Universität.