Die zuletzt angeführten Zahlen sind, wie man sieht, beträchtlich kleiner, als die zuerst gefundenen, sodass der Einfluss der unvermeidlichen Beobachtungsfehler und namentlich der Wahl der nicht sehr genau bekannten Ausdehnungscoëfficienten der Gase verhältnissmässig um so grösser wird. Die stets positiven Werthe von x zeigen indess doch, dass die Verdichtung der Gase auf den Wänden jene Fehler überwiegt.

Ich hoffe, weitere Mittheilungen über den behandelten Gegenstand, namentlich über die Beziehung zwischen Adhäsion und Druck, bald machen zu können.

Zum Schlusse sei es mir hier gestattet, Hrn. Prof. A. Mousson und besonders Hrn. Prof. O. E. Meyer, die so gütig waren, mich auf die vorstehende strengere Behandlung aufmerksam zu machen und mir ihre Rechnungsergebnisse zur Verfügung zu stellen, den verbindlichsten Dank zu sagen.

Basel, den 25. October 1879.

XX. *Spectralröhren mit longitudinaler Durchsicht; von W. v. Zahn.*

Anlässlich der von Piazzzi Smyth unter der Bezeichnung: „End-on-illumination“ beschriebenen Methode, die electrischen Funken in Geissler'schen Röhren in axialer Längsdurchsicht zu betrachten (Beibl. III. p. 604. 1879) darf ich vielleicht erwähnen, dass ich ganz den Smyth'schen entsprechende Röhren im Jahre 1874 benutzt habe, um (bei Anwendung starker Dispersion) zu untersuchen, ob die Lage der hellen Spectrallinien mit der Richtung der electrischen Entladung eine Veränderung erleidet. Da der Spectralapparat höchstens $\frac{1}{40}$ des Abstandes der D -Linien schätzen liess, war das erzielte negative Resultat ohne Bedeutung.

Leipzig 1879.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 8.

Curva des reinen Lösungsmittels. Curva.

Normalcyaninlösung.

Excentrische Cyaninlösung.

Normalcyaninlösung.

Fig. 9.

Fig. 12.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 3
 $\frac{1}{5}$ nat. Grösse.

Fig. 1
 $\frac{1}{20}$ nat. Grösse.

Fig. 4
 $\frac{1}{5}$ nat. Grösse.

Fig. 1.

Fig. 4.

Fig. 9.

Fig. 10.