Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 29. Juni 1854. IV. Jahrgang. № 26.

Das Oesterreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl., die frei durch die Post bezogen werden sollen, blos in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; ausserdem bei allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: *Iris (Pogoniris) junonia* Schtt. et Ktsch. Von Schott. — Vergleichende Zusammenstellung der Früchte von *Loranthus* und *Viscum*. Von Schnaase. — Beobachtungen über die örtliche Abstufung des Klimas und Einwirkung desselben auf die Pflanzen. Von Joh. Seywald. — Correspondenz: Breslau, Nees v. Esenbeck. — Mittheilungen. — Inserat.

***Iris (Pogoniris) junonia*. Schtt. et Ktschy.**

I. foliis subarcuato-ensiformibus, a medio dilatato-basin versus angustatis, apice acuminatis, utrinque elevato-striatis, glaucescentibus; caule foliis altiore ramoso, (2-pedali); spathis bractescentibus supra medium scariosis; latis obtusis; perigonio longe- et crasse-tubuloso; sepalis exterioribus arcuatim recurvis, late oblongo-obovatis, apice rotundatis, basin versus late cuneato-angustatis, barba intense-lutea ad exitum pallente barbatis, ad medium usque pallidissimis, externe sanguineo punctato-striolatis, interne venis remotis interrupte-dichotomis patentibus et patentissimis, ferrugineis, notatis, reliqua parte apicali ex purpureo-violascentibus, sensimque pallidioribus; sepalis interioribus erectis, arcuatim conniventibus, unguiculatis, ungue $\frac{3}{4}$ -pollicari externe viridi, interne ex flavo-pallescenti, cum lamina rotunde-ovali, apice retusa, basi repentino contracta, disco concaviusculo; $2\frac{1}{4}$ pollices lato, $2\frac{1}{2}$ pollices longo; pallide-et-amoene-violaceo infima basi patentissime-ferrugineo-venoso, externe sanguineo-punctato-striolato; filamentis inferne sparse et pallide sanguineo-punctatis; antheris (apertis) lanceolato-linearibus, basi sagittatis, apice acutiusculis; ovario tubo brevioris; stigmatibus albis fere bipollicaribus, $\frac{3}{4}$ pollicis latis, oblongis, basin versus linea extrorsum arcuata angustatis, arcuatis; fornicatis; appendicibus lacerato-incisis majusculis, cum stigmatum parte-costali pallide-violascentibus — Odor floris suavis.

Habitat in Tauro Ciliciae (Kotschy.)

H. Schott.