Herr **Eisel**-Mainz (früher Rostock). An der Frieboesschen Hautklinik in Rostock wurden an 30 Sklerodermiefällen in über 50% der Fälle ein Abbau der Thyreoidea, Thymus, Hypophyse und Nebenniere mittels des Abderhaldenschen Dialysierverfahrens nachgewiesen. Gleichzeitiger Abbau von Thyreoidea, Thymus und Nebenniere war in der Mehrzahl.

Herr **Hauck**-Erlangen. In der Erlanger Klinik wurden genau nach der Vorschrift von Brock die Thymus mit Röntgen-Reizdosen bestrahlt, jedoch konnte bei 12 Fällen von Psoriasis keinerlei Beeinflussung des Leidens festgestellt werden. Es trat danach weder Besserung noch Verschlimmerung auf, nur in einem Falle wurden neue Schübe im Gesicht beobachtet. Wahrscheinlich handelt es sich bei der Psoriasis nicht nur um eine innersekretorische Beeinflussung der Haut von seiten einer einzigen Drüse, sondern um pluriglanduläre Einflüsse. Bei eigenen Untersuchungen mit dem Abderhaldenschen Dialysierverfahren wurden die verschiedensten Drüsen abgebaut, regelmäßig Pankreas und Nebenniere, sehr häufig auch Schilddrüse. Daß die Schilddrüse bei der Psoriasis nicht ganz außer acht gelassen werden darf, geht schon daraus hervor, daß in früheren Jahren Schilddrüsenextrakt häufig mit gutem therapeutischen Erfolg bei der Schuppenflechte gegeben wurde. Auch bei der Röntgenbestrahlungsmethode der Thymus, wie sie Herr Brock angegeben hat, ist eine teilweise Mitbestrahlung der Schilddrüse anzunehmen.

Herr **Braun**-Rostock. Einige an der Rostocker Universitätsklinik mit Röntgenbestrahlung der Thymus (nach Brock) behandelte Fälle von Psoriasis wurden weder günstig noch ungünstig beeinflusst.

Die Frage, ob es sich bei der Psoriasis wirklich um eine Hypofunktion der Thymus handelt, kann nach Brauns Meinung am besten experimentell gelöst werden, indem man an Tieren versucht, die werdende Thymusdrüse in der Entwicklung zu stören oder das ausgewachsene Organ zu schädigen und zu beobachten, ob sich Hautveränderungen im Sinne der Psoriasis einstellen. Derartige Versuche werden von Braun seit längerer Zeit gemeinsam mit Eggers (Chirurg. Klinik Rostock) gemacht, jedoch bislang noch ohne sichtbares Ergebnis.

Braun erinnert daran, daß Klose und Vogt in ihrer großen Arbeit über Thymusexstirpation eine Beobachtung französischer Autoren mitteilen, die nach Thymusexstirpation „un état psoriasique“ an der Tierhaut gesehen haben.

44. Herr **Gennerich**-Kiel: Stand der Lupus-erythematoses-Frage.

Der Stand der Lupus-erythematoses-Frage dürfte Ihnen aus dem letzten Referat Jadassohns über die Tuberkulide im Jahre 1912 wohl in guter Erinnerung sein. Trotz der gelegentlichen Bacillenbefunde und trotz vereinzelter positiver Übertragungsversuche glaubte J. damals auf seinem seitherigen Standpunkte, den er bereits in seiner Monographie des Lupus erythematoses eingenommen hatte, beharren und besonders hinsichtlich der tuberkulösen Ätiologie auf ein Ignoramus erkennen zu sollen.

Da ich ferner auf Klinik, Histologie und die bisherigen ätiologischen Forschungen beim Lupus erythematoses in einer demnächst im Archiv für Dermatologie und Syphilis erscheinenden Arbeit näher eingegangen

bin, so möchte ich mich heute lediglich darauf beschränken, Ihnen über neuere ätiologische Ansichten zu berichten, die sich bei der Aufarbeitung eines hier beobachteten Falles von Lupus erythematoses discoides + acutus ergeben haben.

Der Fall war kurz folgender:

Es handelte sich um einen 31jährigen Seeoffizier, der infolge eines sehr anstrengenden Dienstes und unter ungünstigen Ernährungsverhältnissen in einen schlechten Allgemeinzustand geraten war. Familienanamnese o. B. Er selbst nie wesentlich krank. Besonders keine Drüsenerkrankung.

Im Sommer 1914 hatte er einen roten Fleck an der rechten Schläfe, der ohne ärztliche Behandlung wieder verschwand. Im Mai 1918 entwickelte sich an der rechten Wange ohne Störung des Allgemeinbefindens ein roter Fleck, der sich mit Schuppen bedeckte und trotz Chrysarobinbehandlung allmählich zunahm. Anfang Dezember 1918 stellte sich in der Umgebung dieses Herdes eine stärkere Rötung ein; gleichzeitig machte sich auf der linken Wange an symmetrischer Stelle die gleiche Veränderung bemerkbar. Wegen leichter Frostschauder glaubte Patient sich erkältet zu haben, weshalb er längere Zeit zu Hause Schwitzprozeduren vornahm. Da sich keine Besserung einstellte, das Hautleiden sich schnell ausdehnte, gelangte Patient am 13. I. 1919 hier zur Aufnahme.

Bei seinem Zugehen fand sich bereits ein ausgesprochenes Erysipelas perstans faciei, Rötung der Mundschleimhaut, mehr oder weniger starkes Nässen und Borkenbildung an der Primärläsion und an den Ohren, linsen- bis markstückgroße erythematöse Flecke hinter den Ohren, am Halse und auf der Brust. Die Hände waren frei, zeigten aber starken Morbus Raynaud. Es bestand leichte Halsdrüenschwellung beiderseits, im Urin zahlreiche Zylinder, rote Blutkörperchen und ein halb pro Mille Albumen. Das Blutbild zeigte 4 Tage nach der Aufnahme eine deutliche Verminderung der weißen Blutzellen, das Verhältnis der Lymphocyten zu den Leukocyten verhielt sich wie 65:35. Im weiteren Verlaufe kam es nach verschiedenen therapeutischen Eingriffen zu starker Leukocytose. Die Pirquetreaktion war negativ, die S. R. + + + +.

Zunächst stellte sich trotz völlig indifferenter Behandlung nach leichten Fiebersteigerungen und unter Zunahme des Krankheitsbildes besonders an der Mundschleimhaut am 10. Krankheitstage eine hohe Febris continua ein, so daß wir uns zu einer eingreifenderen Behandlung entschlossen. Trotz Drüsenexcision auf der rechten Halsseite und trotz Tiefenbestrahlung auf der linken Halsseite und Kochsalzinfusion nach reichlichem Aderlaß verschlimmerte sich das Krankheitsbild zusehends. Das entnommene Blut, ca. 250 ccm zeigte bis zum an-

deren Tage keinerlei Gerinnungserscheinungen, was im Einklange mit dem Blutbild darauf hinwies, daß sich der Organismus in einem Zustande völliger Anaphylaxie befand. Auch zweimalige Bluttransfusionen, wozu von mir selbst das Blut entnommen wurde, weil ich über 20 Jahre an einem ausgedehnten Gesichtslupus gelitten hatte, verschlimmerten nur den anaphylaktischen Zustand. Der Eiweißgehalt des Urins stieg auf 9 pro Mille. An der erkrankten Haut bildeten sich an zahlreichen Stellen, besonders am Mund, dicke braunrote Krusten, während sich die Mundschleimhaut in Fetzen abstieß. Die wiederholt angestellte Wassermannsche Reaktion war jedesmal stark positiv. Es trat beiderseitige Lungen- und Brustfellentzündung und Herzmuskelschwäche hinzu, denen der Patient 8 Tage nach Einsetzen des hohen Fiebers erlag.

Die Sektion ergab außer Pneumonie und Pleuritis einen käsigen Lymphdrüsenzerfall am Halse, bronchialen und mesenterialen.

Histologisch fand sich folgendes:

Die Haut zeigte die typischen Veränderungen eines Lupus erythematodes acutus (siehe aufgestellte Präparate!). Die verkästen Drüsen zeigten nirgends mehr tuberkulöses Gewebe, noch Tuberkelbacillen. Die zentralen Drüsenpartien sind vollkommen verkäst, nehmen aber noch in deutlicher Weise Farbflüssigkeit an. Gerade letzteres erscheint von besonderer Bedeutung, weil sich daraus ein gewisser Fortbestand vitaler Eigenschaften der durch den Lymphdrüsenzerfall freigewordenen Fermente ergibt. Wir werden nachher noch darauf zurückkommen.

Bei der näheren Analysierung des soeben berichteten Falles läßt sich erweisen, daß sich beim Lupus erythematodes noch gewisse Krankheitsvorgänge abspielen, denen wir sowohl bei der klinischen wie der histologischen Untersuchung noch keine genügende Beachtung geschenkt haben. Ihre Bedeutung tritt allerdings beim L. e. disc. nicht so deutlich hervor, als beim L. e. ac., dessen stürmischer Verlauf die vorhandenen Schädlichkeiten in akuterer Weise zutage treten läßt.

Zunächst hätten wir uns die Frage vorzulegen, worauf ist der in dem soeben berichteten Falle von L. e. ac. eingetretene anaphylaktische Zustand zurückzuführen?

Da keine Tuberkelbacillen mehr nachweisbar waren, so kommen Tuberkulotoxine als Ursache der Krankheit nicht in Frage. Bevor wir jedoch ein bisher noch unbekanntes Virus ins Auge fassen, muß die Anwesenheit sonstiger blutfremder Protamine mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Aus den Arbeiten von Weichardt, Schittenhelm, Friedemann, Citron u. a. geht zunächst hervor, daß sowohl durch chemische Einflüsse wie durch Krankheitsvorgänge wie z. B. Tuberkulose ein Gewebe heterologisiert, d. h. entarteignet werden und somit antigenen Cha-

rakter annehmen kann. Zur Unschädlichmachung bzw. Eliminierung eines derart heterologisierten Gewebes wird der Organismus natürlich seinen ganzen fermentativen Apparat aufbieten. Gelingt dadurch die Einstellung des Organismus, so haben wir die Immunität vor uns. Wird aber ein gewisses Maß von Giftstoffen überschritten und evtl. der mühsam eingestellte Organismus noch durch andere Einflüsse geschädigt, so können die vorhandenen Antigene und Nichtantigene ungehemmt ihre Wirkung entfalten, d. h. der Organismus wird anaphylaktisch. Besonders schwierig wird sich jedoch die Einstellung des Organismus dann gestalten, wenn der Gewebszerfall den fermentativen Apparat, wie z. B. die Lymphdrüsen selbst betrifft.

Würde also der L. e., was ich nachher noch zu beweisen haben werde, mit dem Lymphdrüsenzerfall in einem bestimmten ursächlichen Zusammenhange stehen, so würde der beim L. e. häufig zu beobachtende sehr labile Immunitätszustand sehr verständlich sein. In schweren Fällen kann sogar jeder Eingriff, wie z. B. eine A.T.-Injektion, Chrysarobinbehandlung oder, wie in unserem Falle, eine Kochsalzinfusion den mühsam vom Organismus hergestellten Immunitätszustand stark beeinträchtigen oder sogar über den Haufen werfen. Erst recht kann natürlich eine durch Unterernährung oder sonstige Schädigungen erfolgte Herabsetzung des Allgemeinzustandes die Einstellung des Organismus gefährden, weil es letzterem natürlich besonders schwer fällt, gegen Zerfallsprodukte seines eigenen fermentativen Apparates und hauptsächlichsten Träger der Abwehrreaktion neue Fermente zu mobilisieren.

Daß nun in der Tat der Lymphdrüsenzerfall in noch zu erörternder Art und Weise den L. e. verursacht, darauf deutet zunächst schon der Eintritt positiver S.R. und zwar in all denjenigen Fällen hin, wo die Übersättigung des Organismus mit Lymphocytenfermenten besonders abundant wird. Die positive S.R. in diesen Fällen von L. e. ac., die einen besonders stürmischen Verlauf nehmen, bildet den Schlüssel zur L. e.-Ätiologie.

Die positive S. R. beruht, wie ich bereits 1910 auf Grund der Beobachtungen bei der Salvarsanprovokation annehmen mußte, wie es Wassermann und Lange, Wagner und ich durch Lymphocytenauflösungen im Liquor nachweisen konnten, auf dem Lymphocytenzerfall.

Nun findet auch bei dem L. e. ein ausgiebiger Lymphocytenzerfall statt, und zwar in den Lymphdrüsen. Die in ihnen vorhandenen Erweichungsherde machen histologisch zwar einen ziemlich homogenen Eindruck, sie nehmen aber, wie alle ausgeführten Schnitte zeigen, doch noch Farbflüssigkeit an. Letzteres weist entschieden darauf hin, daß die durch den Gewebszerfall freiwerdenden Lymphocytenfermente noch vitale Eigenschaften besitzen.

Unter der Voraussetzung, daß sich dieses auch experimentell beweisen läßt, würde sich für den an Lymphdrüsenzerfall erkrankten Organismus folgende Situation ergeben. Die Lymphocytenfermente, deren Hauptfunktion der parenterale Abbau irgendwelcher körperfremder Protamine ist, gelangen unter besonderen Umständen in verschiedener Menge in den Kreislauf und betätigen hier ohne ein höheres Prinzip ihre abbauende Fermentwirkung. Dies wird hauptsächlich dort der Fall sein, wo sich infolge eines ausgiebigen Capillarnetzes und äußerer Einflüsse auf die Haut (Licht, Luft, mechanische und thermische Reize) ein *Locus minoris resistentiae* befindet. Vorwiegend wird daher die Gesichtshaut die günstigste Stelle sein, wo die Abbaufermente das cutane Gewebe angreifen und zur sterilen Einschmelzung bringen können.

Bevor ich auf die experimentellen Ergebnisse eingehe, sind noch einige Fragen zu erörtern.

Zunächst muß es auffällig erscheinen, daß die meisten Lymphdrüsenprozesse auf tuberkulöser Basis sich im ersten, höchstens im zweiten Lebensjahrzehnt abspielen, während der L. e. vorwiegend im dritten Lebensjahrzehnt vorkommt. Der scheinbare Widerspruch läßt sich aber nach dem histologischen Befunde unschwer erklären. In den ersten beiden Lebensjahrzehnten handelt es sich noch um entzündliche Prozesse an den Drüsen. Der Fortbestand der Erreger bewirkt hier reaktive Entzündungen, d. h. einen Granulationswall, der einen ausgiebigen Übertritt zerfallener Lymphdrüsenelemente in den Kreislauf verhindert. Im dritten Lebensjahrzehnt ist jedoch die Lymphdrüsentuberkulose an vielen Stellen überwunden. Mit der Heterologisierung des lymphoiden Gewebes verschwinden auch die Erreger und damit auch der reaktive Entzündungsvorgang, der den Übertritt der Zerfallsprodukte in den Kreislauf hemmte.

Es ist aber klar, daß die Einstellung des Organismus gegen entartetes Eiweiß seines eigenen fermentativen Abwehrapparates außerordentlich schwierig ist. Daraus erklärt sich einmal die geringe zellige Exsudation bei der Einschmelzung des cutanen Gewebes und zum anderen die hohe allgemeine Empfindlichkeit des an seinen Lymphdrüsen erkrankten Organismus gegenüber interkurrenten Störungen.

Wir haben demnach zwei Wirkungen der Fermente der heterologisierten Lymphdrüsen, die wir als L. e. -Toxine anzusprechen haben, zu verzeichnen:

Und zwar 1. ihre allgemein toxische Wirkung, die derjenigen irgendwelcher anderer parenteral einverleibter Protamine entspricht.

2. Die abbauende Wirkung der Lymphdrüsenfermente auf das cutane Gewebe. Hält sich die Menge der abbauenden Fermente in gewissen Grenzen, so nimmt die Einschmelzung des cutanen Gewebes

unter Einstellung des Organismus gegen die fortlaufende Resorption toxischer Produkte einen chronischen Verlauf, wobei Stoffe in vermehrtem Maße entstehen, welche die Hyperkeratose begünstigen. Bei starker Anhäufung der Fermente im Kreislauf nehmen die Hautveränderungen eine mehr akute Form an. Außer verstärkter Ödembildung durch Abbau des Gewebes stellt sich unter hochgradiger Erweiterung und Durchlässigkeit der Gefäße eine blutig-seröse Exsudation ein.

Es ist besonders darauf hinzuweisen, daß nur die hochgradige, d. h. akute Form des cutanen Abbauvorganges mit drohender oder bereits eingetretener Anaphylaxie einhergeht, und daß diese hochgradige Überschwemmung des Organismus mit abbauenden Fermenten auch im positiven Wassermann zum Ausdruck gelangt. Schon dieser war ein deutlicher Hinweis auf den Ursprung der L. e.-Toxine, d. h. ihrer Genese aus lymphocytären Elementen. Da es sich bei der positiven S. R. möglicherweise nur um eine Nebenerscheinung des L. e. ac. handeln konnte, bin ich seiner ursächlichen Bedeutung experimentell nachgegangen. Es mußte außerdem noch der Nachweis erbracht werden, daß das gleiche Agens für den L. e. disc., wie für den L. e. ac. in Betracht kam. Um hierzu zu gelangen, habe ich versucht mit Extrakten aus zerfallenen Lymphdrüsen Fermentwirkungen zu erhalten und damit zu erweisen, daß das heterologisierte Lymphdrüsengewebe nicht nur als artfremdes, oder besser entarteignetes Eiweiß auf den Organismus einwirkt, sondern in konstanter Weise und in gleicher Richtung noch biologisch wirksam bleibt. Zu diesem Zwecke wurden die hergestellten Drüsenextrakte im Hauptsystem der Wassermannschen Reaktion an Stelle des Patientenserums als Antikörper verwendet. Die Extrakte wurden in Mengen von 0,5—1,5 ccm austitriert. Wir erhielten mit diesen Extrakten in gleicher Weise positiven Ausfall der WaR., wie mit Extrakten aus syphilitischen Drüsen und damit den objektiven Nachweis der biologischen Wirksamkeit der im Lymphdrüsenzerfall vorhandenen Fermente. Über die weiteren Ergebnisse dieser Versuche wird an anderer Stelle noch ausführlicher berichtet werden. Normales Drüsengewebe gibt stets neg. WaR., desgleichen unerweichte Carcinomdrüsen. Stark erweichte Carcinomdrüsen ergeben nur wenig Hemmung. Unter den verwendeten erweichten Drüsen boten einige noch tuberkulöse Struktur, andere wiederum nicht.

Die angeführten Versuche wurden, da ich zur Zeit ohne eine eigene serologische Abteilung bin, nach meinen Angaben von Herrn Prosektor Dr. Emmerich und von meinem früheren Assistenten Herrn Dr. Soll ausgeführt, wofür ich ihnen auch an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen möchte. Über das Ergebnis des Abderhaldenversuches kann ich noch nichts Abschließendes berichten.

Aus den bisherigen Versuchen geht aber wohl zur Genüge hervor, daß dem durch infektiöse Prozesse heterologisierten Lymphdrüsengewebe noch sehr ausgesprochene biologische Fermentwirkungen zukommen. Von diesen Fermentwirkungen dürfte die in der positiven WaR. zutage tretende Komponente nur einen geringen Anteil bedeuten, während die überwiegende Mehrzahl der Fermente wohl in erster Linie gegen die jeweilig vorhanden gewesene infektiöse Grundlage abbauende und verdauende Eigenschaften besitzt, bzw. entwickelt hat. Hierfür spricht entschieden die negative S. R. beim Lupus e. disc.; der bei ihm vorhandene Lymphdrüsenzerfall, bzw. seine Ausschwemmung ins Blut, reicht quantitativ nicht aus, um neben der Abbauwirkung im cutanen Gewebe auch die zu positiver S. R. notwendigen Fermente zu liefern. Hierzu bedarf es eben einer so massenhaften Ausfuhr der Lymphocyten-Trümmer, daß sich sowohl das cutane Krankheitsbild ändert, als auch der Organismus dadurch anaphylaktisch wird.

Hinsichtlich des Zusammenhanges des L. e. mit der Tuberkulose läßt sich somit folgendes feststellen. Sie bildet wohl die Hauptursache des Lymphdrüsenzerfalles, ob jedoch die alleinige, läßt sich keinesfalls mit Sicherheit behaupten. Die gelegentlichen Bacillenbefunde erklären sich aus dem gleichzeitigen Vorhandensein aktiver tuberkulöser Prozesse an irgendwelchen inneren Organen, evtl. sogar noch an einzelnen Drüsen; mit der Erzeugung des cutanen Krankheitsbildes haben sie jedoch nichts zu tun, es ist vielmehr anzunehmen, daß sie von den hierher gelangenden Lymphdrüsenfermenten unschwer bewältigt werden.

Auf der anderen Seite sind die L. e.-Toxine identisch mit den Abbauf fermenten der heterologisierten Lymphdrüsen.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß vielleicht auch noch bei anderen Tuberkuliden Fermente eines heterologisierten Organ Gewebes als Ursache in Betracht kommen.

Diskussion.

Herr **Ullmann-Wien**. Es freut mich, daß die interessante Frage der L.-e.-Ätiologie heute hier wieder gestreift wird. Von 1901 angefangen bis etwa 1909 habe ich auf die Beeinflußbarkeit der atrophisierenden Erytheme durch Röntgenbestrahlung regionärer benachbarter Drüsen wiederholt in der Wiener Dermatologischen Gesellschaft hingewiesen. Auch in meiner physikalischen Therapie der Hautkrankheiten 1908 bei Enke und 1909 in Budapest. Ich freue mich besonders, daß Kollege Prof. Gennrich dies heute anerkennt, der seinerzeit für die Ätiologie durch Streptokokken wenigstens für den L. e. acut. eingetreten ist. Die Konvenienz von L. eryth., und Lup. vulg. ist keine zufällige, kein Naturspiel, sondern organisch gerechtfertigt, je nachdem die, wie ich glaube, modifizierten Tuberkelbacillen in gewisse Gewebsräume, vielleicht Lymphspalten gelangen, wo sie nicht zu typischen Granulomen, sondern, wie schon Gougerot seinerzeit zeigte, zu rein lymphocellulären Infiltraten, schließlich zur typischen Atrophie führen. — Ich glaube nicht an eine andere oder gemischte Ätiologie.

Herr **Bettmann-Heidelberg**. Ausgesprochene Verlaufserkrankungen („Frühlingsgipfel“) im Verlauf des Lupus erythematodes, wie die therapeutischen Reaktionen auf ultraviolette Strahlen, lassen die Erkrankung in gewissem Sinne unter die Lichtdermatosen einreihen.

Herr **Rost-Freiburg**. Möchte zu den Ausführungen des Votr. nicht direkt Stellung nehmen, aber auf Untersuchungen aus seiner Klinik verweisen. Vorwiegendes Auftreten an der Belichtung ausgesetzten Körperstellen, vorwiegendes Befallensein der im Freien arbeitenden Bevölkerung, Auftreten eines Frühlings- und Sommergipfels bei der Kurve der Zugänge. Hiernach Zusammenhang mit Insolation, also wohl Wirkung der ultravioletten Strahlen als möglich bzw. wahrscheinlich anzunehmen.

Der Zusammenhang mit Tuberkulose ließ sich bei dem Material der Freiburger Klinik trotz eingehender darauf gerichteter Untersuchung nur für einen kleinen Teil der Fälle feststellen.

Herr **L. Pulvermacher-Berlin**. Die von Herrn Gennerich vertretene Hypothese der Pathogenese des akuten Lupus erythematodes erinnert an den Versuch der Erklärung der Graviditätsdermatosen als abhängig von dem Versagen von Abwehrfermenten. Daß celluläre Invasionen von Organismen anstandslos bewältigt werden können, beweisen die Geburtsvorgänge, wo sicherlich bei der Placentarlösung lymphocytäre Elemente in das mütterliche Blut gelangen, ohne gemeinhin krankhafte Reaktionen auszulösen.

45. Herr **Alexander-Charlottenburg**: a) Statistik der Pilzflora 1919 und 1920, *Trichophyton persicolor*; b) Interdigitale Soormycose; c) Lichen chronicus Vidal.

Im folgenden möchte ich ganz kurz über die Resultate berichten, die wir im Charlottenburger Krankenhause über die **Pilzflora** der Nachkriegszeit gesammelt haben. Über die der letzten Kriegszeit hat bereits **Br u h n s** 1918 in der D. W. berichtet. Im Jahre 1919 und 1920 konnten wir im ganzen von 235 Fällen von Trichophytie Kulturen anlegen, wobei die Mikrosporien außer Ansatz bleiben. Von diesen 235 Fällen waren

Tr. cerebriforme	194
Tr. gipseum ast.	21
Tr. gipseum gran.	2
Tr. rosaceum	15
Tr. violaceum	2
Tr. persicolor	1

Wir sehen also in Übereinstimmung mit anderen Beobachtern eine auffallende Einförmigkeit: Es sind immer wieder die gleichen Pilzsorten, die sich finden, nur ist im Gegensatz zur Friedenszeit das durch den Krieg eingeschleppte *Tr. rosaceum* noch immer relativ häufig nachweisbar. Was dagegen die zweite, hauptsächlich von Fischer als Kriegscharakteristicum bezeichnete Pilzart, nämlich das *Tr. granulorum* betrifft, so habe ich mich von seinem häufigen Vorkommen nicht überzeugen können; alle unsere Kulturen bis auf zwei, die auf Peptonagar die bekannten gelblichen Tröpfchen zeigten, waren *gipseum ast.*